


С. ПЕТЕРБУРГЪ.

ТРАВНИКЪ.



РУССКИЙ ЛЕЧЕБНЫЙ

ТРАВНИКЪ

ИЛИ ОПИСАНІЕ

ОТЕЧЕСТВЕННЫХЪ ВРАЧЕБНЫХЪ РАСТЕНИЙ,

ЦѢЛЕБНЫМИ КАЧЕСТВАМИ ЗАМѢНЯЮЩИХЪ ЧУЖЕЗЕМ-
НЫЯ, И УПОТРЕБЛЯЕМЫХЪ ДЛЯ ЛЕЧЕНІЯ ВНУТРЕННИХЪ
И НАРУЖНЫХЪ БОЛЕЗНЕЙ, ОСНОВАННОЕ НА НАБЛЮ-
ДЕНІЯХЪ ПРЕЖНИХЪ И НОВѢЙШИХЪ ОПЫТНЫХЪ ВРА-
ЧЕЙ, СЪ ПРИСОВОКУПЛЕНІЕМЪ СОСТАВНЫХЪ ДѢЙСТВИ-
ТЕЛЬНѢЙШИХЪ ЛЕКАРСТВЪ И ЭКОНОМИЧЕСКИХЪ ЗА-
МѢЧАНІЙ, ДЛЯ ВСѢХЪ СОСТОЯНІЙ ПОЛЕЗНЫХЪ,

РАСПОЛОЖЕННЫЙ АЗБУЧНЫМЪ ПОРЯДКОМЪ.

СОЧИНЕНІЕ

Доктора Медицины и Хирургіи

Н. КАШИНСКАГО.

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ.

МОСКВА.

ТИПОГРАФІИ С. ОРЛОВА.

1862.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва. Апрѣля 1 дня 1861 года.

Цензоръ *Я. Прибиль.*


Напечатано съ изданія 1817 г.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ

ИМПЕРАТОРУ

АЛЕКСАНДРУ ПАВЛОВИЧУ

САМОДЕРЖЦУ ВСЕЯ РОССИИ.



2005347294

Монархъ прославленный великими дѣлами!
Благословляемый отъ всѣхъ концевъ земли,
Ты услаждаешься полезными трудами,
Они безсмертія вѣнецъ Тебѣ сплели.

И се мной собранный десятилѣтній плодъ,
На пользу ближняго, Тебѣ я посвящаю,
Въ немъ выгоды найдетъ счастливый Твой
народъ,
Колѣна приклонивъ, къ Престолу повергаю.

Прими горячее усердіе мое,
Превыше чтущаго воззрѣніе Твое,
И награжденнаго, коль скажутъ безприст-
растно,
Что для соотечественной труждаеся не напрасно.



Великій Александръ! должайшій вѣкъ живи,
Дѣлами громкими вселенну удивляя,
Залогъ Божественной къ Отечеству любви,
И благоденствіе повсюду назидая.

Тобою Марсъ, Врачи, Θεологи, Витіи,
И всѣ сословія прославленны въ Россіи.
Господь благословилъ Тебя и Твой народъ,
И царствіе Твое прославить въ родъ и родъ.

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

всеподданнѣйшій

Вмѣсто предувѣдомленія, излагающаго содержаніе сей книги, предлагаю почтеннѣйшимъ читателямъ извлеченіе изъ протокола Императорской Медико - Хирургической Академіи, удостоившей одобреніемъ къ напечатанію оной.

Въ заключеніе своего сужденія, Конференція Академіи, рассмотрѣвъ сочиненіе правившаго должность корпуснаго Доктора г. Надворнаго Совѣтника и Кавалера *И. Кашинскаго*, подъ названіемъ: *Описаніе отечественныхъ лечебныхъ растений* и проч., представленное имъ

къ одобренію, Конференція ученаго сословія усмотрѣла, что:

1. Въ сочиненіи семъ, не только описана большая часть полезнѣйшихъ растений, самородно прозябающихъ въ разныхъ странахъ и климатахъ обширнѣйшаго отечества нашего; но и по садамъ произрастающихъ, съ показаніемъ природнаго Русскаго названія (подъ какими они извѣстны тѣхъ странъ обитателямъ); — латинскаго систематическаго; — свойственной почвы земли, на которой оныя растенія природа въ большемъ количествѣ производитъ; — качествъ, чувствамъ подверженныхъ, или химически испытанныхъ, и проч.

2. Что описаніе этихъ растений, ихъ наружныхъ и внутреннихъ свойствъ или дѣйствій на тѣло человѣческое, а нѣкоторыхъ и на тѣла животныхъ, особенно домашнихъ; равно

какъ и экономическое употребленіе очень основательно, и подтверждено опытами и наблюденіями прежнихъ и новыхъ искуснѣйшихъ врачей какъ отечественныхъ, такъ и чужеземныхъ; съ присовокупленіемъ полезныхъ замѣчаній Россійскихъ Академиковъ, путешествовавшихъ по разнымъ краямъ нашего пространнѣйшаго отечества, и другихъ новыхъ открытій ученыхъ мужей въ Европѣ.

3. При изложеніи простыхъ лечебныхъ средствъ, испытанныхъ въ общезжитіи, означены также дѣйствительнѣйшія составныя лекарства, приготовляемыя изъ нашихъ растений въ аптекахъ (*præparata pharmaceutica*), которые отмѣчены въ росписяхъ звѣздочками, съ показаніемъ внутренняго и наружнаго оныхъ употребленія, правильнаго составленія, приемовъ, со-

образныхъ возрастамъ , нужныхъ предосторожностей касательно ядовитыхъ растений, съ присовокупленіемъ противудѣйствующихъ опытами дознанныхъ средствъ (*antidota, s. reagentia*).

По этимъ причинамъ, почитая сочиненіе сіе очень полезнымъ какъ для учащихся отечественному травознанію, такъ равно для молодыхъ врачей и экономовъ, занимающихся пріятно-полезнымъ сельскимъ хозяйствомъ, и художниковъ, словомъ: для всѣхъ состояній, находя оное очень достойнымъ скорѣйшаго напечатанія, особливо по недостатку сего рода книгъ на отечественномъ языкѣ, — ОПРЕДѢЛИЛА:

Сообразно съ желаніемъ сочинителя, возвратить ему оное для представленія Г-ну Министру Народнаго Просвѣщенія, для напечатанія казен-

НЫМЪ иждивеніемъ, коего ходатайствомъ чрезъ Комитетъ Гг. Министровъ и удостоено Высококоманднаго благоволенія.

Въ уваженіе же сего очень полезнаго труда, имѣющаго вліяніе на всѣ состоянія въ общежитіи, а особенно для живущихъ въ отдаленности отъ городовъ, гдѣ нѣтъ врачей и аптекъ;—поставляя также на видъ и другія *Г. Кашинскаго* сочиненія и переводы врачебныхъ книгъ, одобренныя Медицинскимъ Совѣтомъ съ особенною похвалою; равно какъ и отличныя знанія его во врачебной наукѣ, доказанныя многими опытами, и долговременною службою, засвидѣтельствованныя бывшими его начальниками по военной и гражданской части, и за производство операций надъ ранеными на полѣ сраженій минувшей компаніи, по предложенію

Г-на Президента Конференціи о та-
 ковыхъ заслугахъ сего достойнаго
 медицинскаго чиновника, признанъ
 корреспондентомъ Медико-Хирурги-
 ческой Академіи, и по утверждению
 Г-на Министра Народнаго Просвѣ-
 щенія, удостоенъ званія Доктора
 Медицины и Хирургіи, съ выдачею
 ему *Кашинскому* дипломовъ на
 оныя ученыя достоинства.

Подлинное подписали:

Президентъ *Яковъ Виліе*.

В ъ р н о:

Въ должности Уче-
 наго Секретаря *Яковъ Кайдановъ*.

ПРИМЪЧАНІЕ

Г. ДОКТОРА РЕМАННА,

О ВРАЧЕБНЫХЪ СРЕДСТВАХЪ, ПРОСТЫМЪ НАРОДОМЪ
ВЪ РОССІИ УПОТРЕБЛЯЕМЫХЪ.

Разсматривая исторію большей части полезнѣйшихъ лекарствъ, находимъ, что нѣкоторыя изъ оныхъ введены въ употребленіе простымъ народомъ.—Не смотря на суевѣріе и предразсудки простолюдиновъ, не лзя отрицать, чтобы нѣкоторыя изъ употребляемыхъ ими средствъ, особенно изъ растеній, по особенному дѣйствию не заслуживали вниманія врачей.

Опытные врачи должны бы сперва дѣйствительныя сего рода средства различить отъ недѣйствительныхъ, и опредѣлить употребленіе первыхъ. Должно однакожь признаться, что они обыкновенно сими наблюденіями, которыя не безполезны могутъ быть въ Россіи, не занимаются съ надлежащимъ вниманіемъ.

Сколь большая польза была бы отъ таковыхъ занятій, еслибы губернскіе и уѣздные медици-

скіе чиновники вошли въ подробнѣйшее изслѣдованіе отечественныхъ растений и домашнихъ лекарствъ, простымъ народомъ употребляемыхъ, и для дальнѣйшаго испытанія оныхъ представляли главному медицинскому начальству. Императорская Медико-Хирургическая Академія, споспѣшествующая всякому распространенію въ Россіи познаній, издавая *всеобщій журналъ врачебной науки* (*), могла бы таковыя полезныя наблюденія предлагать для общаго свѣдѣнія,—и по этому предмету 1809 года опредѣлила награжденіе тому, кто опишетъ отечественныя наши растенія, дико прозябающія, или насаждаемыя, качествами своими могущія замѣнять чужеземныя (**).

(*) Это періодическое изданіе, на основаніи Устава ея, Высочайше конфирмованнаго 1800 года въ С. П. Б. и по нынѣ продолжается, которое какъ въ обѣихъ столицахъ, такъ и во всѣхъ врачебныхъ управахъ продается за весьма умѣренную цѣну.

(**) IMPERATORIAE Medico-chirurgicae Academiæ exquisitoria themata peritis medicis solvenda, in consensu academico Petropoli proposita, die 13 novendris, anni 1809. praeside. Jacobo de Wylie.—Задача II.

Какими растеніями дико растущими въ Россіи, или садовыми, можно отчасти или совершенно замѣнить растенія чужеземныя, во врачеваніи употребляемыя? и проч.—Въ награду за удовлетворительныя рѣшененія, назначена золотая медаль въ 30 голландскихъ червонцевъ. Срокъ по 1-е число Іюня 1812 года.

Ревностное желаніе быть полезнымъ общему, благу, и долговременное стараніе въ познаніи нашихъ природныхъ растеній, испытанныхъ въ пользованіи разнородныхъ болѣзней отечественными и чужеземными врачами, побудили меня къ изложенію сего сочиненія, которое, будучи предварительно разсмотрѣно ученымъ сословіемъ Медико-Хирургической Академіи, удостоенно съ очень лестною похвалою къ напечатанію.

Ежели этимъ посильнымъ трудомъ моимъ любезнымъ соотечественникамъ могу принести хотя малую пользу; а особенно, когда страждущіе найдутъ въ ономъ по своему предмету нѣкоторыя изъ описанныхъ мною растеній достойныя вниманія, испытывая оныя по руководству упомянутыхъ врачей: то я уже сверхъ мѣры награжденъ, ощущая въ душѣ моей то величайшее утѣшеніе, что малый трудъ этотъ, посвящаемый на пользу ближняго, не будетъ отринуть, яко два лепта евангельской вдовицы.

Таковыми бо жертвами благоугождается Богъ!

И. К.

ВЫИСКА

ИЗЪ УЧЕНІЯ СОКРАТОВА.

Всѣ состоянія и должности почтены!
Да въ добродѣтеляхъ проходятъ ваши дни.

Одни безпечные и праздные презрѣны,
Не могутъ въ обществѣ терпимы быть они.

Въ чемъ польза есть другимъ, охотно по-
могайте,

И по возможности вы ближнихъ назидайте.

Ученья нечего стыдиться,
И я желалъ бы всякой часъ,

При старости моей полезному учиться,
Коль болѣе могу полезнымъ быть для васъ.

Что знаю, сообщаю вамъ,
Что знаете и вы, мнѣ также сообщите.

Я наставляю васъ, — и вы меня учите;
Взаимно назидать другъ друга должно намъ.

ПРИМЪЧАНІЕ

Г. ОБЕРЪ-АРЦТА ЕВЕСТА

КАСАТЕЛЬНО ПОЛЪЗЫ И УПОТРЕБЛЕНІЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХЪ ЛЕЧЕБНЫХЪ СРЕДСТВЪ.

Творецъ вселенныя, хотя каждую страну и часть земнаго шара одарилъ всёмъ тѣмъ, что только пужно и полезно для человѣка и скота; но склонности наши не всегда тѣмъ довольны, или невѣдѣніе наше не могло еще испытать, къ чему служатъ нѣкоторыя средства, часто подъ ногами нашими находящіяся?

По сему и думаютъ, что нельзя обойтись безъ чужеземныхъ лекарствъ, собираемыхъ въ отдаленнѣйшихъ странахъ свѣта, платя охотно иноземцамъ по произволению требуемую цѣну (*).

Опыты научаютъ, что домашнія средства, особенно изъ растений ежегодно въ свое время собираемыхъ, могутъ служить очень дѣйствительными, всегда свѣжими, и ничего почти не стоящими ле—

(*) Гдѣ г. Бодаръ справедливо замѣчаетъ, что употребленіе отечественныхъ произведеній вмѣсто иноземныхъ, можетъ сохранить милліоны въ государствѣ.

каретвами, нежели чужестранныя, которыя кромѣ высокой цѣны, доходятъ къ намъ почти бездѣйственными, или подложными, затхлыми и вовсе испорченными, отъ долговременнаго храненія въ магазинахъ.

Всѣ врачебныя средства; служащія къ здоровью человѣческому, могутъ употребляемы быть и отъ припадковъ скотскихъ; различіе состоитъ въ томъ только, что приемы оныхъ, судя по величинѣ и крѣпости животныхъ, должно располагать по надлежащему, т. е. удвояя, или утраояя.

Изъ большаго множества описанныхъ здѣсь лечебныхъ растеній, можно избирать по произволению дѣйствительнѣйшія, или по обстоятельствамъ, гдѣ какія находятся, не только для составленія домашней аптеки; но и для разныхъ потребъ служащія въ общежитіи: для каждаго врача, художника и сельскихъ хозяевъ. Словомъ, для всѣхъ состояній достаточно будетъ.

Luxus est non necessitas peregrinis uti, quum Deus et natura unicuique regioni provideat, sudoresque benedicat.

(Bartolin: *Medicina domestica*).

Изнѣжась роскошью и модой безъ конца,
 Мы ищемъ чуждыхъ средствъ, забывъ дары
Творца;
 Для каждой Онъ страны всѣ блага сотворилъ;
 Но въ потѣ оныя стяжать благоволилъ (*).

В Ы П И С К А

ИЗЪ РАЗНЫХЪ НАСТАВЛЕНІЙ О ЛЕЧЕНІИ БОЛѢЗНЕЙ
 ПРОСТЫМИ СРЕДСТВАМИ, ИЗДАННЫХЪ Г. ЛЕЙБЪ-
 МЕДИКОМЪ, О. К. КАМЕНЕЦКИМЪ.

Хотя врачебная наука, неуспышнымъ стараніемъ
 испытателей природы и тщательнымъ наблюденіемъ
 врачей надъ больными, время отъ времени от-
 крываетъ многія средства, служащія къ успѣш-

(*) Въ потѣ лица твоего снѣси хлѣбъ твой.—
 На таковой трудъ осуждается человѣкъ Богомъ; но это
 наказаніе есть вкупѣ для него и милость, поелику земе-
 дѣльческій трудъ есть естественная обязанность къ сни-
 сканію необходимыхъ потребностей для жизни; по вну-
 шенію же Творца, предопредѣлившаго человѣка для обще-
 житія, Высочайшая благодать Его предположила: дабы
 разумомъ и опытомъ изслѣдывая общія свойства и зако-
 ны существъ, находилъ въ оныхъ для себя полезное, и

ному излеченію различныхъ болѣзней; но при всемъ томъ остается въ безвѣстности множество и таковыхъ, которые по внушенію самой природы (случайно, или по преданіямъ опытныхъ стариковъ) открыты бывають простымъ народомъ и по хорошему дѣйствию своему, не должны быть презираемы отъ врачей.

Слѣдовательно, познаніе простыхъ лечебныхъ средствъ, особенно домашнихъ, каждому въ обществѣ необходимо нужно, особливо гдѣ нѣтъ врачей, чтобы въ обыкновенныхъ болѣзняхъ, случающихся у поселянъ, имѣющихъ пребываніе въ отдаленныхъ мѣстахъ, подаваема была священниками, или управителями скорая помощь такими средствами, которые въ самыхъ селеніяхъ удобно приготавлиемы быть могутъ.

Средства эти по большей части состояются изъ растений, въ огородахъ и около селеній про-

проклятой землѣ въ дѣлахъ его преслушанія, возвращагь благословеніе Божіе послушаніемъ, смиреніемъ и благодареніемъ. — Какое наставленіе для чловѣка покореннаго грѣху, что вся земля его преступленіемъ подвергается проклятію, опустошается вселенная, и возвращаетъ терніе и волчцы тамъ, гдѣ онъ насаждаетъ цвѣты, или сѣетъ пшеницу! См. Записки на книгу Бытія Духовной Акад. Ректора, Архимандрита Филарета.

С. П. Б. 1816, г. Стр. 107, и слѣд.

израстающихъ дико, коими запасаться можно всякому, (безденежно) въ лѣтнее время для всякихъ случаевъ.—*Всяческая яже сотвори Богъ, добра зло* (*).

Подавать же руку помощи ближнему страждущему, есть первый и священнѣйшій долгъ христіанства;—ибо *Отецъ небесный, и за чашу студеныя воды не лишаетъ мзды своей!*

Благотвореніе власть сильную имѣетъ,
И ни одинъ упрекъ тревожить не уснѣетъ;
Коль по возможности добро творить стремимся,
Предъ людьми и Богомъ оправдимся.
Богатство, слава, честь, все съ жизнью
исчезаетъ;
Благотвореніе намъ вѣчность отверзаетъ.

(*) По сему, когда Творецъ произноситъ свое одобреніе на все царство растеній, человекъ не долженъ возставать противъ онаго, находя нѣкоторыя травы вредныя, или ядовитыя.—Бл. Августинъ говоритъ: если ты находишь ихъ полезными, хвали Бога; если бесполезными, предоставь Богу, ихъ Художнику; если вредными, дивись, грѣшникъ, Божіей благодати: поелику наказаніе Онъ дѣлаетъ тебѣ случаемъ къ подвигу, исправляющему растленіе земли.—Записки на книгу Бытія. Стр. 22, 23.

О Г Л А В Л Е Н І Е .

	Стр.
Наставленія, какъ собирать, готовить, хранить и употреблять врачевныя растенія	1

ГЛАВНЫЯ ПРАВИЛА, НАБЛЮДАЕМЫЯ ПРИ СОБИРАНИИ.

1. Кореньевъ— <i>radices</i>	5
2. Травъ и листовъ— <i>herbæ, folia</i>	10
3. Цвѣтовъ— <i>flores</i>	10
4. Сѣмянъ и плодовъ— <i>semina, fructus</i>	11
5. Корокъ— <i>cortices</i> , деревъ— <i>ligna</i> , шишекъ и по- чекъ— <i>turiones, gemmæ</i>	13
Предварительныя понятія о главныхъ свойствахъ врачевныхъ веществъ, взимаемыхъ изъ растеній, и дѣйствии оныхъ на тѣло человеческое	15
Расположеніе оныхъ по главному дѣйствию на систему нашего организма	55

I. ПИТАТЕЛЬНЫЯ СРЕДСТВА—*nutrientia*.

1. Мучныя <i>farinosa</i>	15, 55
2. Клейко-слизистыя— <i>mucilaginosæ</i>	15, 56
3. Крахмалныя— <i>amylaceæ</i>	16,—
4. Бѣлчныя, студенистыя— <i>albuminosa, gelatinosa</i>	17,—
5. Камедныя— <i>gummosæ</i>	18, 57
6. Сладко-сахарныя— <i>dulcîa saccharina</i>	58
7. Кисло-сладкія— <i>acidodulcîa</i>	19, 59
Кислыя— <i>acidæ</i>	—
8. Масляныя жирныя— <i>oleoso-pinguia</i>	20, 60

II. ПОВУЖДАЮЩІЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО— *incitantia positive*.

a. Углекислыя средства— <i>remîda carbonica</i> , или по- вуждающія постоянныя	
---	--

XXVI

b.	Водотворныя — <i>hydrogenica</i> или побуждающія летучія.	67
c.	Кислотворныя— <i>oxygenica</i>	70
9	Смолистыя— <i>resinosa</i>	21,60
10	Бальзамныя— <i>balsamica</i>	23
11	Масляно эфирныя, или летучія— <i>oleoso-aetherea</i> , <i>s. volatilia</i>	24,70
12	Спиртныя— <i>spirituosa</i>	28,68
13	Усыпительныя— <i>narcotica</i>	31,69
14	Горько экстрактыныя— <i>amaro-extractiva</i>	33,71
15	Вяжущія чистыя— <i>adstringentia pura</i>	— 73
16	———— горькія и пряныя— <i>adstringentia amaro-aromatica</i>	39,71,75
17	Смолисто-острыя, испражняющія— <i>resinoso-acria</i> , <i>purgantia</i>	40,77
18	Смолисто-острыя, или ѣдкія— <i>resinoso-acria</i> , <i>rodentia</i>	43
19	Щелочныя— <i>alcalina</i>	45
20	Противудядныя, или противудѣйствующія— <i>antidota</i> , <i>reagentia</i>	52

III. ПОБУЖДАЮЩІЯ ОТРИЦАТЕЛЬНО—*incitantia negative*.

1	Средства ослабляющія положительно, или непосредственно.	40
a	Слабительныя легкія— <i>laxantia</i> , <i>catartica</i>	40,76
b	————— крѣпкія— <i>purgantia</i> , <i>drastica</i>	77
c	Рвотныя— <i>emetica</i> , <i>vomitoria</i>	41,78
2	Средства ослабляющія отрицательно, или противудѣйствующія— <i>reagentia</i>	52,75

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКІЙ ВѢСЪ И МѢРА.

a	Таблица для точнѣйшаго опредѣленія приемовъ.	80
---	--	----

XXVII

b	Таблица показывающая полный медицинскій фунтъ въ раздробленіи и сравненіи съ Россійскимъ или гражданскимъ фунтомъ.	80
c	Таблица означающая приемы лекарствъ по возрастамъ.	81
	Планъ описанія отечественныхъ врачебныхъ растений.	—
	Описаніе оныхъ, расположенное азбучнымъ порядкомъ	86
	Авранъ дикій.	—
	Анисъ	91
	Арбузь.	93
	Армудъ	94
	Артишокъ	95
	Багунъ,	97
	Базиликъ.	91
	Баранья трава.	100
	Барбарисъ	104
	Бедренець	106
	——— черный.	107
	Безвременный цвѣтъ	109
	Бѣлена.	111
	——— черная.	112
	Береза.	115
	Блошница ѣдка.	120
	Бобовникъ	121
	Бобы простые.	122
	——— турецкіе	123
	Бодяга.	659
	Божіе дерево.	125
	Борщъ.	127
	Брусница.	128
	Будра	130
	Бузина.	131
	Бузникъ	135

XXVIII

Буквица	136
Бѣлокопытникъ	139
Б. чумный	141
Вахта	142
Верба	145
Вербейникъ обыкновенный	146
————— полусечный	150
Вербишникъ бѣлый	151
Вербишникъ черн.	153
Вероника аптечн.	154
————— ручейная	155
Виноградъ	157
Вишня	164
Воловикъ аптечн.	166
————— красильн	167
Волчець	168
Воронецъ	170
Вѣтряница лѣсная	172
————— печеночн.	174
————— прострѣл.	175
Гвоздичка полевая	177
Глазница	178
Голубки	179
Горець аптечный	180
————— водоперечн.	182
Горчичникъ	184
Горохъ	185
Горчица бѣлая	186
————— черная	187
————— полевая	192
Гравилать аптечн.	193
————— ручейный	196
Гречуха	202
Грызовникъ	203
Груша	204

Губка древесная	207
—— пахучая	208
—— листовичи	209
Гулявица благовон	211
—— тысячелис	—
—— чихотная	213
Девясиль большой	116
—— меньшей	192
Дождевикъ	220
Дрокъ	222
Дубъ	223
Дубровка	230
—— бѣлая	229
—— пирамиди	231
—— трилистн	232
Душица	235
Дурманъ	237
—— меньшій	240
Дымница аптечн	242
—— орѣшистая	244
Дыня	245
Дягиль аптечный	247
—— лѣсной	250
Ежевика	252
Ель	254
Естрагонъ	258
Жабникъ	260
—— чистотѣльный	262
Желтникъ	265
Жеруха	266
—— струйчатая	269
Журавлиникъ	272
Завязникъ	274
Звѣрбой	278
Земляника	281

Змѣвикъ двудомн	285
———— кустарный	286
Змѣголовникъ молдавскій	387
Золотничка болотная	289
Золотоцвѣтъ	290
Золотуха желтая	291
Золотушникъ	293
Зоря	295
Истодъ горькій	298
———— обыкновенный	301
Илемъ	302
Ирь, Аирь	305
Иссопъ	311
Калина	314
Калуферъ	316
Каменоломъ	318
Каменосѣкъ	319
Каменное сѣмя	320
Камфорная трава	321
Каперсы	323
Капуста огородн	325
———— рѣпчатая	330
Кашкара	333
Каштанъ дикій	339
Кервель	341
———— дикій	344
Кислица	346
Кишнець	349
Кленъ	352
Клещеница	356
Клубочникъ	361
Клюква	—
Кминъ	363
Княженица	365
Козелець	366

Козлобородъ	368
Кокорникъ	370
Кокушница	373
Колосница лѣсная	375
————— однолѣтн	379
————— нѣмецкая	380
Колоцинты	—
Конопельникъ	385
Конопля	387
Конерьъ французск	392
Копытень	393
Косатикъ болотн	397
Косатикъ сибирскій	399
————— синій	400
Кошечья трава	403
Крапива большая	405
————— глухая	410
————— меньшая	409
Красавица	413
Крессъ индійскій	419
————— луговой	421
————— садовый	422
Крестоникъ	425
Крушина	426
Кунджуть	429
Кувшинчикъ водяной	436
Куролѣпъ	440
Лаванда	443
Лавровая вишня	449
Ландышъ майскій	455
————— многоколѣнчатый	457
Ласточникъ	459
Лебеда	461
Левкой	463
Лень дикій	466

Ленъ Кокушкинъ.	468
— обикновенный	469
— слабительный.	476
Лилія бѣлая.	478
Линнея сѣверная.	481
Липа.	483
Листвяница.	492
Лишай грудной	502
— исландскій	504
— червецоносный	512
— прыщеватый.	513
— собачій.	514
— сплетенный.	515
— олений	516
Ложечная трава.	—
Ломоносъ.	524
Лукъ.	528
Львиноустъ.	535
Лютикъ	537
Маіоранъ.	544
— лошадиный.	549
Макъ дикій.	557
— садовый.	551
Малина.	559
Марена.	562
Маргаритка.	565
Марь благовонная.	567
— вонючая.	570
— красная.	575
— кудрявая.	—
— трехугольная.	574
Маунъ.	576
Медуница.	583
Мелисса.	584
Могильница.	587

Могущикъ гусиный.	589
————— пятилиственный.	592
Можжевельникъ.	593
————— Донской	599
Молодилъ большой.	608
————— заячій.	611
————— остросочный.	613
Молочай болотный	617
Морковь.	622
Морошка.	626
Мужескій корень, или мадрагоръ.	630
Мыльная трава.	632
Мята водяная.	663
——— кудрявая.	638
——— перечная.	642
Мяхунка.	645
Наперсточная трава.	648
Нитчанка ручейная или рѣчная.	659
Ноготки	666
Норичникъ водяной.	667
————— узлокоренной.	669
Овесъ.	671
Огуречникъ	677
Огурецъ.	679
Одуванчикъ.	688
Ольха.	683
Омегъ водяной.	634
Омегъ малый.	700
————— пестрый.	692
Омела.	703
Орлякъ, или папоротникъ женскій.	706
Орѣхъ грецкій.	709
————— лѣсной.	717
Осина.	721
Осока песочная.	725
Осокорь бѣлая.	653
————— душистая.	727
————— черная.	653
Осотъ.	730

НАСТАВЛЕНІЯ

**КАСАТЕЛЬНО СОБИРАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПРИ-
ГОТОВЛЕНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЯ РУССКИХЪ
ВРАЧЕБНЫХЪ РАСТЕНІЙ.**

НАСТАВЛЕНІЕ,

КАКЪ СОБИРАТЬ, ПРИГOTOВЛЯТЬ, СОХРАНЯТЬ И
УПОТРЕБЛЯТЬ РУССКІЯ ВРАЧЕБНЫЯ РАСТЕНІЯ.

Для достиженія желаемого успѣха въ пользова-
ніи разнородныхъ болѣзней, требуется необходимо
познаніе всѣхъ тѣхъ лечебныхъ растений—*plantae
medicinales*, которыя, по опытамъ знаменитыхъ вра-
чей, въ древнія и новѣйшія времена, признаны дѣй-
ствительнѣйшими.

Познаніе отечественныхъ растений—*plantae indi-
genae* заслуживаетъ преимущественно вниманіе
каждаго просвѣщеннаго врача. Ему должны быть
извѣстны не только употребительнѣйшія, принятая
въ русской фармакопеѣ, изъ коихъ пригото-
вляютъ обыкновенно простыя и сложныя аптечныя
лекарства; но также нужно знать и мало-извѣс-
тныя, или вышедшія уже изъ употребленія—*obso-
leta*, чтобы въ недостаткѣ признанныхъ всѣми дѣй-
ствительнѣйшими иностранныхъ лекарствъ могъ

удобно замѣнять оныя рускими врачебными растеніями, испытанными въ тѣхъ же болѣзняхъ съ равною пользою (*).

Неоспоримая истина, что растенія, въ природномъ своемъ климатѣ и на матерой почвѣ земли—*solum natale* произрастающія, бываютъ всегда дѣйствительнѣе тѣхъ, которыя искусствомъ воспитываются, или насаждаются въ ботаническихъ садахъ. Не смотря на всѣ попеченія, прилагаемыя въ сохраненіи оныхъ, въ наблюденіи естественной температуры воздуха и сообразованіи съ природною почвою, составныя части таковыхъ растений, ихъ дѣйствіе и самый внѣшній видъ много измѣняются, да и цѣлебная сила необходимо ослабѣваетъ.

(*) На этомъ основаніи знаменитый Лебъ-Медикъ и Президентъ Императорской Медико-Хирургической Академіи Яковъ Васильевичъ Вилліе обогатилъ русскую военную фармакопею большею частию природными русскими цѣлебными растеніями, которою руководствуясь въ изложеніи сего описанія, я присовокуплялъ вездѣ нужныя примѣчанія, касательно дорогихъ иностранныхъ средствъ, утверждаясь на опытахъ и практическихъ наблюденіяхъ славнѣйшихъ врачей, показывая тѣ природныя мѣста, гдѣ лекарственныя растенія, отыскиваемыя въ нашемъ отечествѣ, находятся въ изобиліи, и замѣчалъ употребляемыя въ народѣ или общежитіяхъ домашнія лекарства, могущія въ нуждѣ замѣнять иностранныя аптечныя припасы.

Такъ многія врачевныя растенія, произвольно растущія на поляхъ, горахъ, въ лесахъ, лужахъ и болотахъ, бывъ перенесены въ ботаническій садъ на тучную почву, дѣлаются великорослыми, полноцвѣтными и многосочными; но сила ихъ чрезъ то гораздо уменьшается, или и вовсе теряется. Примѣромъ служатъ: цыхорій дикій *cichorium intybus*, лѣсная морковь—*daucus sylvestris*, булдырьянь дикій—*valeriana sylvestris s. officinalis* и проч. Почему и не удивительно, ежели выписываемыя изъ аптекъ таковыя лекарственныя травы бывають не рѣдко малодѣйствительны, напротивъ одна горсть дикорастущихъ растеній, сорванныхъ въ томъ же климатѣ, но на своемъ природномъ мѣстѣ, въ приличное время года и притомъ хорошо сбереженныхъ, часто оказываетъ превосходную пользу.

Успѣхъ сельскихъ лекарей въ излеченіи иногда самыхъ застарѣлыхъ и опасныхъ болѣзней одними извѣстными, невинными травами зависить единственно отъ собиранія оныхъ ежегодно на природныхъ своихъ мѣстахъ, также отъ надлежащаго приготовленія и сбереженія отъ переменъ воздушныхъ, которыя большею частію измѣняютъ или вовсе уничтожаютъ цѣлебную силу дѣйствительнѣйшихъ растеній.

Опытный врачъ, при всемъ своемъ знаніи, часто, полагаясь на одобреніе ученыхъ медицинскихъ журналовъ, выписываетъ изъ аптекъ модныя рекомендуемыя средства не рѣдко безъ всякаго успѣха. Это по больше части бываетъ при употребленіи иностранныхъ лекарствъ, привозимыхъ къ намъ изъ отдаленнѣйшихъ странъ свѣта, а особенно растеній, которыя долговременнымъ храненіемъ въ стеклянныхъ сосудахъ, освѣщаемыхъ солнечными лучами, потеряли уже всю силу или, бывъ испорчены насѣкомыми, представляютъ одишь скелеть, разпадающійся въ земляную первобытную массу.

Не рѣдко также случается, что и свѣжія природныя наши растенія, лежа въ аптекахъ долгое время въ кучѣ, подвергаются броженію, плесни и гнилой порчѣ, изъ которыхъ наконецъ извлекаютъ бездѣйственные экстракты, приготовляютъ модныя элексиры, или жизненныя эссенціи, и множество другихъ лекарствъ, о пользѣ которыхъ всякій теперь легко судить можетъ, какихъ успѣховъ ожидать долженъ врачъ, при всѣхъ возможныхъ его стараніяхъ и познаніяхъ.

А потому для надлежащаго испытанія врачевныхъ силъ отечественныхъ нашихъ растеній и приготовленія изъ оныхъ дѣйствительнѣйшихъ лекарствъ, могущихъ замѣнить иноземныя медицинскіе припасы, должно стараться:

1. Собирать извѣстные врачевныя растенія, которыя всѣ почти здѣсь описаны, въ ихъ естественномъ климатѣ и на той самой почвѣ, на которой природа намъ ихъ представляетъ.

2. Выбирать способное время и погоду, въ которыя врачевныя растенія болѣе изобилуютъ своими цѣлительными силами.

3. Слѣдовать принятому способу приготовленія и храненія оныхъ, который заключается въ слѣдующихъ правилахъ:

1. корни—radices.

Корни однолѣтныхъ растеній должно выкапывать въ глубокую осень тогоже лѣта, когда листы опадутъ и стволы увянутъ, и въ началѣ весны, прежде, чемъ листы или цвѣты начнутъ развиваться. Двулѣтніе и многолѣтніе корни тоже собираются весною или, по необходимости въ нихъ, можно выкапывать ихъ осенью, по увяденіи листьевъ и стеблей, которые подъ осень нарочно обрѣзываютъ, чтобы чрезъ то корень былъ сочнѣе и полнѣе.

При выборѣ оныхъ должно отдѣлять частицы трухляя, позреватя, деревянистыя и согнившія, да и самую, прильнувшую къ нимъ, землю омыwać холодною водою. Доброту корней показываетъ здоровый оныхъ видъ, полнота и цѣлость вѣн-

ней кожицы, въ которой лучшая сила ихъ со-
держится.

Обмываніе благовонныхъ корней, имѣющихъ въ себѣ ароматныя, смолистыя и летучія частицы, оставляется, потому что чрезъ это можетъ послѣдовать немалая потеря дѣйствительнѣйшихъ частицъ. А потому довольно будетъ и одного отиранія при-
ныхъ кореньевъ сухимъ полотенцемъ, или, высу-
шивъ умѣренно, потомъ уже очистить прильну-
шую къ нимъ пыль и другіе сорныя порошки.

Толстые и сочные корни, разрѣзавъ въ длину пластинками или въ кружки и наизавъ на нити, развѣшивать въ тепломъ тѣнистомъ мѣстѣ, вѣт-
ромъ продуваемомъ, или высушивать можно на
скорое время въ печкѣ самую умѣренную тепло-
тою, развѣшивая или переворачивая ихъ чаще, и
потомъ содержать въ деревянныхъ ящикахъ въ су-
хомъ и холодномъ воздухѣ, чтобы не могли отсы-
рѣть, заплеснѣвать, или быть червями и гниlostію
испорчены.

Слишкомъ сочные корни, требующіе очень
продолжительнаго на воздухѣ высушиванія, отъ
чего они теряютъ много цѣлительныхъ своихъ силъ,
также слишкомъ клейкіе, удобно на открытомъ
воздухѣ окисающіе, не худо высушивать въ
скорости печною умѣренною теплотою.

Благовонные корни, одаренные тонкими силами или скоро улетающими частицами, сохранять должно въ стеклянныхъ, хорошо-закупоренныхъ сосудахъ, и притомъ въ тѣнистомъ холодномъ мѣстѣ, возобновляя сборъ оныхъ ежегодно. Корни, одаренные летучестію, которые имѣютъ большую силу въ свѣжемъ своемъ состояніи, чемъ въ сухомъ, какъ-то: хрѣвъ, ирѣ, клещенца, безвременній цвѣтъ, переступень и т. п., собравъ въ приличное время года, хранить въ погребѣ, зарывъ оныя въ сухой песокъ.

Древесные корни слишкомъ толстые, также корки и сочные стебли, очищенные и разфзанные пластинками, въ лѣтнее время высушиваются одною солнечною теплотою, и тѣмъ сохраняются отъ плесни, не подвергаясь большому жару, разрушающему ихъ дѣйствительную силу.

II. ТРАВЫ И ЛИСТЫ—herbae et folia.

Травы и листья сильно пахучихъ или душистыхъ растений должно собирать молодые, сочные, довольно зеленые, пахучіе, передъ развертываніемъ ихъ цвѣтныхъ почекъ—gemmae.—Однолѣтнія растения собираются, когда листья совершенно распустились и цвѣтъ начинаетъ развиваться, двулѣтнія — до

прозябенія стебля, многолѣтнія—въ началѣ ихъ разцвѣтанія, или когда уже цвѣсть начинаютъ.

Травы и листья, зеленѣющіе, во все лѣто собирать можно; но весеннее время къ сему предпочитается; притомъ избирается хорошая и сухая погода, когда растенія не овлажжаются ни утреннею ни вечернею россою; а потому ясный день и самое полуденное время для срыванія травъ разцвѣтающихъ, или отцвѣтшихъ уже, признаны способнѣйшими.

Собравши, очистить листья отъ твердыхъ стебельковъ и отъ гнилыхъ поблекшихъ или постороннихъ листочковъ. Травы, собираемыя съ стебельками, связываютъ въ пучки и вѣшаютъ въ тѣнистомъ, солнцемъ согрѣваемомъ и вѣтромъ свободно продуваемомъ, мѣстѣ.—Листы же одни въ подобномъ сему мѣстѣ, для скорѣйшаго высушиванія и предохраненія отъ порчи или гнилости, разстилать можно тонкими слоями.

При высушиваніи многихъ, а особливо сочныхъ листовъ, не бесполезно употреблять искусственную теплоту комнатную, или умѣренную печную; при чемъ сила оныхъ и естественный цвѣтъ весьма удобно сохраняются (*). Листья же омега пе-

(*) По Фаренгейтову термомѣру опредѣляется средній степень теплоты: отъ 90—100 градусоѡ; теплота кипя-

страго—*coniium maculatum* и подобныхъ ему растеній, одаренныхъ тонкимъ летучимъ веществомъ, но высушеніи, тотчасъ истереть въ порошокъ и хранить въ стеклянномъ сосудѣ, хорошо закупоренномъ.

Есть вѣрное примѣчаніе, что природныя наши растенія, въ деревняхъ ежегодно заготавливаемыя и собираемыя въ сухое лѣто, суть дѣйствительнѣе и лучше сохраняемыхъ въ аптекахъ иноземныхъ.

Ибо опытные травовѣды все вообще цѣлебныя растенія, собранныя ими во время (около Иванова дня), и на своихъ природныхъ мѣстахъ, умѣютъ хорошо сберечь отъ сырости, плесени, гнилой порчи и другихъ поврежденій, уничтожающихъ лучшія ихъ силы. Они привѣшиваютъ ихъ въ мѣшкахъ или кулькахъ въ сухомъ мѣстѣ; сырые же содержатъ въ холодныхъ покояхъ или погребахъ, куда бы морозъ не могъ проникнуть. Свежіе корни, назначаемые для разводу, хранятъ тоже въ погребахъ, зарывъ въ песокъ, и весною высаживаютъ.

При храненіи травъ и листьевъ должно остерегаться, чтобы не смѣшивать ихъ съ другими рас-

щей воды простирается отъ 200—212 град. Реомюровъ термометръ, употребляемый во Франціи точку кипѣнія показываетъ 80 град.

теніями, особливо сильно дѣйствующими или ядовитыми, которыя всегда быть должны сохраняемы отдѣльно, или въ различныхъ мѣстахъ. Равнымъ образомъ, для избѣжанія худыхъ послѣдствій, могущихъ произойти отъ испорченныхъ или согнившихъ растений, должно оныя тотчасъ отдѣлить и не употреблять въ составленіе лекарствъ; но нѣкоторые корыстолюбивые аптекари рѣдко выполняютъ сіе правило, имѣющее столь важное вліяніе на здоровье! Замѣтить должно, что нововысушенные корни, травы, сѣмена, плоды и корки бываютъ сильнѣе годовалыхъ, оставшихся.

III. ЦВѢТЫ—fiores.

Цвѣты собирать должно, какъ только они примѣтно распускаются, и когда плодотворная пыль ихъ еще не улетѣла изъ цвѣтныхъ пестиковъ; ибо когда они нѣсколько дней уже цвѣли, въ такомъ случаѣ теряютъ свою силу, а отцвѣтшіе совсѣмъ не годятся. Время для собиранія цвѣтовъ назначается—хорошая ясная погода, когда роса солнечными лучами уничтожена будетъ.

Ежели цвѣты бываютъ такъ мелки, что ихъ срывать со стебельковъ не возможно, тогда собираются съ травными цвѣтными верхушками—*summitates*, начинающими распускаться. Почти всегда

собираютъ одни цвѣтныя лепесточки—*petala*, безъ ихъ оцвѣтниковъ—*calix*, исключая ароматныя растенія, напр. лавенда, розмаринъ; равнымъ образомъ цвѣты ромашки, тысячелиственишка и проч. собираются вмѣстѣ съ ихъ цвѣтными головками, содержащими въ сихъ частяхъ врачебную силу.

Эти нѣжныя части растеній требуютъ скорѣйшаго высушиванія, чѣмъ листья и травы, если хотимъ, чтобъ оныя удержали свой естественный цвѣтъ и силу; наилучшимъ образомъ это дѣлается помощію искусственной теплоты. Цвѣты, не имѣющіе летучихъ частицъ, сохраняются въ ящикахъ; одаренные же эфирнымъ масломъ, хранить должно въ стеклянкахъ, завязанныхъ плотно пузыремъ и бумагой, притомъ въ сухомъ и холодномъ мѣстѣ.

IV. СѢМЕНА И ПЛОДЫ—*semina, fructus*.

Сѣмена собираютъ совершенно зрѣлыя, но прежде, чѣмъ они сами выпадутъ изъ своего сѣменохранилища—*capsula*, или произвольно отдѣлятся отъ растенія, созрѣвая вмѣстѣ съ сѣмянными корбочками. Они не требуютъ для сущенія своего иной теплоты, какъ только сухаго воздуха, свободно провѣяемаго. Наилучшимъ образомъ сохраняются сѣмена въ собственныхъ корбочкахъ,

содержимыхъ въ сухомъ мѣстѣ, или въ ящикахъ, для сего опредѣленныхъ.

Сѣмена сочныя и масляныя всячески беречь должно отъ горклости или промозглости; равнымъ образомъ и мучныя должны быть избираемы сухія, цѣлыя, полныя; но тощія или морщиноватыя и высохшія выбрасываются. Содержащія существенное или летучее масло тоже должны быть свѣжія и полныя; напротивъ не имѣющія вкуса и запаха, или пустыя, не годятся.

Выборъ сѣмянъ производится посредствомъ опущенія ихъ въ воду; плавающія на поверхности оной выбрасывать; а потонувшія на дно, высушивъ, для сбереженія ихъ, содержать должно въ сухомъ и прохладномъ мѣстѣ.

Плоды и сочныя ягоды собираются тоже совершенно зрѣлыя, исключая, когда неспѣлыя потребны будутъ въ заготовленіе.

По высушеніи оныхъ сохранять нужно отъ плесни, гнилости и насѣкомыхъ; когда же примѣчены будутъ поврежденными, во врачеваніе употреблять не должно. Для заготовленія въ прокъ, зрѣлые плоды толкутъ, выжимаютъ сокъ и увариваютъ оный до густоты патоки, а потомъ сберегаютъ въ глиняныхъ или стеклянныхъ банкахъ.

v. КОРКИ, ДЕРЕВА И ШИШКИ—*cortices, ligna, turiones.*

Врачебныя деревья, корки и вѣтви или стебли кустарниковъ всего лучше срѣзывать весною, отдѣляя отъ нихъ мохъ, прильнувшія гнилыя частицы и проч. *Шведіоръ* совѣтуетъ древесныя шишки—*turiones*, и почки—*gemmae*, изобилующія сокомъ, снимать въ началѣ весны, прежде развертыванія листовъ, — стебли—*stipites* обрѣзывать подь осень; ибо въ сіе время оныя болѣе изобилуютъ дѣйствительнымъ сокомъ.—Корки—*cortices* съ кустарниковъ снимать осенью, а съ деревъ въ глубокую зиму, или при наступленіи весны; ибо оныя въ сказанныя времена весьма удобно отсѣкаются отъ дерева. Избираютъ къ сему преимущественно молодыя здоровыя деревья.

Для высушенія нужна умѣренная теплота; но благовоенныя оныхъ части нужно защищать отъ прикосновенія атмосфернаго воздуха, сырости и проч.

Наконецъ тѣ цѣлительныя растенія, которыя долгимъ храненіемъ или высушиваніемъ лишаются самой дѣйствительной своей силы, необходимо нужно употреблять всегда свѣжими, а въ особенности весною для приготовленія такъ называемыхъ противудинготныхъ или кровочистительныхъ соковъ—*succi antiscorbutici s. purificantes*. Такого рода суть: цихорій, одуванчикъ, жеруха, щавель и проч.

Если описанныя природныя наши растенія будутъ собираемы по объясненнымъ здѣсь правиламъ и при томъ берегаемы съ надлежащимъ раченіемъ и осторожностію; то, безъ всякаго сомнѣнія, по своей испытанной пользѣ и свойствамъ, въ новѣйшія времена открытымъ, могутъ дѣйствительно замѣнять иностранныя медицинскіе припасы, и бывъ введенны въ такое же употребленіе, доставятъ большіе успѣхи въ излеченіи разнородныхъ болѣзней какъ врачамъ, такъ и всеѣмъ любезнымъ нами соотечественникамъ огромныя выгоды.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ ПОНЯТІЯ

О ГЛАВНЫХЪ СВОЙСТВАХЪ ВРАЧЕБНЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ,
ИЗВЛЕКАЕМЫХЪ ИЗЪ РАСТЕНІЙ, И О ДѢЙСТВІИ ОНЫХЪ НА
ТѢЛО ЧЕЛОВѢЧЕСКОЕ.

Жизнь и здоровье наше поддерживаются питаніемъ. Мучное вещество, крахмальное, клейкое, сахарное, и получаемое изъ хлѣбныхъ зеренъ, кореньевъ и плодовъ—образуютъ животную склизъ *mucus s. gelatina animalis*, которая не только питаетъ, но и перемѣняется въ существо наше дѣйствіемъ плототворной системы—*systema reproductivum* или органическихъ силъ.

1. *Клейкая жидкость* или *склизъ*—*mucilago* многолѣтнихъ растеній и деревьевъ, содержащая въ клѣтчатой плевѣ и собственныхъ каналахъ, или между лубомъ и заболонью—*liber, alburnum*, служитъ для питанія и образованія всѣхъ частей произрастенія. Она выступаетъ иногда наружу, или

исходить въ корень; жидкость эта удобно окиса—
еть и изобилуетъ угольною кислотою—acid. carbonic.

Въ чистомъ своемъ состояніи запаху и вкусу
не имѣеть, растворяется въ водѣ и съ оною со—
единяетъ жирныя масла—olea pinguia, и даже смо—
листыя вещества—resinosa; отъ жару и стужи
не твердѣеть, но въ продолженіи времени пере—
ходитъ въ гнилость, изобилующую азотомъ; изъ
водянаго раствора осаждается прибавленіемъ крѣп—
каго виннаго спирта—alcohol, въ видѣ желе или
студени—gelatina.

Силу имѣеть притуплять остроты, умягчать
жестокія и напряженныя части, уменьшать раздра—
жимость мышечныхъ волоконъ, и укрощать воспа—
лительную боль, прореходящую особенно отъ погло—
щенныхъ острыхъ ядовъ—venena acia (20).

2. *Крахмальное вещество*—amylum есть не
иное что, какъ сухая слизь, осажденная самою
природою въ клѣтчатой плевѣ растеній, которая
бываетъ иногда съ экстрактивно—смолистымъ началомъ
соединена; раждается же по испареніи водяной ча—
сти, теряя при томъ азотное начало—azoticum.
Вареній съ водою крахмаль, въ продолженіи вре—
мени, окисаетъ и наконецъ покрывается плесенью—
mucor. Настойкою чернильныхъ орѣшковъ—tin—
ctura gallarum отдѣляется въ видѣ бѣлаго сладкова—
таго порошка. Помощію крѣпкой селитряной ки—

слоты—acid. nitric. извлекается сахарная и уксусная кислота—acid. oxalic. et acetic.

Силу имѣеть подобную предыдущей слизи; сверхъ того болѣе питаетъ, потому что удобнѣе перемѣняется въ нашу органическую сферу; укрощаетъ кровоточенія и поносы.

3. *Бѣлочное вещество* или *студень*—albumen, gelatina тоже находятся во многихъ частяхъ растеній особенно въ хлѣбныхъ зернахъ—grana cerealia. Оныя служатъ лучшимъ питаніемъ для нашего тѣла, возстановляя животную матерію, смягчая напряженныя или жесткія части, и уменьшая спазмы и боли, происходящія отъ сильнаго раздраженія. При разрывѣ или поврежденіи цѣлости—solutio continui, склеиваютъ и соединяютъ, образуя животный клей—gluten, отдѣляемый пасочными сосудами.

По химическому свойству, различествуютъ отъ слизи—mucus тѣмъ, что имѣютъ большую часть азота, и скорѣе согниваютъ. Бѣлочное вещество отъ жару свертывается и отъ кислотъ; помощію селитряной кислоты извлекается азотный газъ и селитрянный—gaz azotic. et nitrosum; перегонкою получается газъ водотворно-углекислый—g. hydrogено-carbonic. и пригорѣлое масло—ol. empyreumatic. См. подъ № 41.

4. *Камедьное вещество*—gummi происходитъ изъ сухой слизи растений, такимъ же образомъ, какъ и крахмальное (2), различуя только прозрачностью. Качества имѣеть тѣже, т. е. соединяетъ воду съ маслами, умягчаетъ напряженныя части, утоляетъ боли и доставляетъ тѣлу питаніе.

5. *Сладко-сахарныя вещества*—dulcia, saccharina. Изъ опытовъ Г. Морво видно, что сахаръ есть не что иное, какъ склизъ растений, пресыщенная кислотворомъ—mucilago oxudata; потому что всякая слизъ растительная тѣмъ удобнѣе перемѣняется въ сахарное вещество, чѣмъ больше насыщается кислотворомъ—oxugenium; сахарное же вещество, будучи лишено онаго, перемѣняется въ склизъ.

Каждое растеніе, содержащее въ себѣ сахарное начало, будучи подвержено броженію—fermentatio и перегонкѣ—destillatio даетъ винный спиртъ (12).

Сахарная слизъ имѣеть свойство: масляныя и смолыстыя вещества соединять съ водою, и способствуетъ растворенію оныхъ или смѣшенію съ тѣлесными соками; притомъ питаетъ, притупляетъ остроту желчи, отвращаетъ запоры—obstipationes. Многіе, питаясь однимъ сахаромъ, достигли дол-

гладчайшей жизни (*). Сыропы, вывариваемые изъ сладкихъ растений, служатъ для приправы кушанья, наитковъ и лечебныхъ средствъ, имѣющихъ противный вкусъ.

6. *Кисло-сладкія и кислыя вещества*—*acidodulcia et acida*. Къ симъ принадлежатъ плоды, содержащіе сахарное вещество, слизь и лимонную или яблочную кислоты—*acid. citric. v. malic.*—Качества и силу имѣютъ предыдущихъ, т. е. доставляютъ тѣлу легкое питаніе, утоляютъ непомѣрную жажду, укрощаютъ лихорадочный жаръ, отвѣщаютъ запоръ, поправляютъ цыготную порчу соковъ, противудѣйствуютъ гнилости, и весьма полезны какъ въ желчно-гнилыхъ горячкахъ, такъ и въ поносѣ того же рода—*dysentheria biliosoputrida*.

7. *Кислота укусуная*—*acidum aceticum*, приготовляемая изъ вишней жидкости, подвергаемой вторичному броженію; во 100 частяхъ оной кислоты содержится: 44 кислотвора—*oxygen*, 50 угле-твора—*carbonium* и 5 частей водотвора—*hydrogen*.

Свойство имѣетъ пріятно-летучимъ запахомъ ободрять, слабыя органическія части сжимать, лихорадочный жаръ укрощать и бредъ въ нервныхъ

(*) О пользѣ и вредныхъ слѣдствіяхъ отъ сахара см. въ изданной мною Матеріи Медикѣ Ч. II № 227 стр. 466—470.

горячках—*f. typhodes* утолять. Хорошій винный уксусъ—*acetun vini*, настоянный малиною—*bassæ tubi idæi*, прибавляемый къ питью больныхъ, производитъ упомянутыя дѣйствія, открывая при томъ кожные поры, умѣряя волненіе крови, и препятствуя воспаленію важнѣйшихъ органовъ.

Полезьа уксусной кислоты чрезвычайная для ослабленія усыпительныхъ ядовъ—*venena narcotica*, и укрощенія головной боли отъ угару. Уксусная примочка разводитъ ушибы, стягиваетъ кровоточивыя раны или порубленія, и унимаетъ маточныя непомѣрные кровотоки—*profluvia uterina*. О уксусно-спиртной кислотѣ упомянуто подъ № 12.

8. Масляно-жирныя—oleosa, pinguis. Свѣжовыжатое масло изъ тучныхъ сѣмянъ запаху почти не имѣеть; вкусъ нѣжный, нѣсколько сладковатый, заимствуя оный отъ слизи и сахарнаго вещества, служащихъ основаніемъ къ питанію.

Свойство имѣють горѣть съ дымомъ или сажею и кошотью; на открытомъ воздухѣ, притягивая кислотворъ, скоро горкнутъ; растворяются въ винномъ спиртѣ, со щелочами *alcalina*, составляютъ мыло растворяемое въ водѣ и алкоголь; содержатъ большую часть углетвора, нежели водотвора.

Дѣйствуютъ химически, лишая части кислотвора (19), укрощая излишнее напряженіе волоконъ, смягчая раздраженіе, утоляя боли и спазмы, и

послѣшествуя испражненіямъ; отъ глисть—vermes служатъ превосходнымъ средствомъ, также и отъ острыхъ поглощенныхъ ядовъ (20). Жирное масло, втираемое въ кожу, помогаетъ въ ядовитыхъ угрызеніяхъ змѣй и насѣкомыхъ, защищаетъ тѣлесныя части отъ дѣйствія сыраго холоднаго воздуха и простуды, препятствуя также вступленію въ тѣло повальной заразы—contagium populare. *Балдвинъ*.

Маковое и орѣховое масла приличіе дается внутрь; льняное и конопляное употребляются снаружи для составленія мазей, пластырей, промывательныхъ и проч.—

Всѣ упомянутыя средства (отъ № 1—8) числены ниже подъ I классомъ; слѣдуютъ принадлежащія къ II и III классамъ.

9. *Смолистыя вещества*—resinosa суть такія части растений, кои еодержать въ себѣ настоящую смолу—resina, растворяемую въ вишномъ спиртѣ, въ летучихъ и постоянныхъ маслахъ (8, 11) и въ водѣ посредствомъ слизи—mucilago, или перегонки; горятъ съ дымомъ и сажею; со щелочами образуютъ смоляное мыло—sapo resinosus.

Сухою перегонкою извлекаются: углекислый водоторъ, угольная кислота, пригорѣлое масло и кисловатая вода. Опытами дознано: что эфирныя масла и натуральные бальзамы, лишившись водо-

твора, и втянувъ большее количество кислотвора, переменяются въ смолистое вещество.—*Тенардъ* и *Гай-Люссакъ* показали, что во 100 частяхъ смолы содержится: 75 углетвора, 15 водотвора и 10 частей кислотвора.

Сверхъ упомянутыхъ составныхъ началъ, природа въ органическомъ царствѣ растений часто производитъ безчисленные перемены, по испытанію другихъ новѣйшихъ химиковъ. Такъ напр. ревенъ и чемерица содержатъ смолистое вещество, соединенное то со щелочнымъ, то съ экстратно-камеднымъ началомъ, отдѣляемымъ посредствомъ виннаго спирта, или вывариванія съ водою.

А потому и дѣйствіе оныхъ въ животномъ тѣлѣ бываетъ различное. Смолистыя вещества, по своему болѣе-постоянному свойству, производятъ мѣстное раздраженіе гораздо продолжительнѣе, нежели летучія вещества—*volatilia*. Тѣ напротивъ смолы, которыя имѣютъ мыльное свойство—*resinae saponosae*, побуждая желудокъ и кишки сильно и продолжительно, производятъ не только живѣйшія отдѣленія сосудисто-мокротной плевы, но, вмѣстѣ съ тѣмъ раздражая мышечныя волокны, причиняютъ часто сверхъ-естественныя движенія и чрезвычайныя чувствованія (17).

Подобное раздраженіе производятъ смолисто-острыя вещества—*resinoso-acria*, будучи извѣстны прило-

жены, воспаляя кожу и умножая новыя отдѣленія и загноенія (18).

Смолистыя вещества летучія или соединенныя съ эфирнымъ масломъ—*resinosa volatilia s. ætherea*, принятыя внутрь, побуждаютъ желудокъ, умножаютъ отдѣленія даже отдаленнѣйшихъ частей, возбуждаютъ нервную систему, и такимъ образомъ производятъ живѣйшее дѣйствіе во всемъ тѣлѣ (10, 11).—Наконецъ тѣ слабыя смолистыя вещества, кои суть прянаго свойства—*aromatica*, побуждая продолжительно пищеварительные органы, дѣйствуютъ, единственно ободряя и укрѣпляя (14, 16).

10. Бальзамическія—balsamica. Бальзамы натуральные различествуютъ отъ смолы какъ жидкостію своею, такъ и по содержанію летучаго камфорнаго масла — *ol. volatile camphorinum*. Въ бальзамы имѣютъ въ себѣ то эфирное масло, то смолистое начало, то особливую кислоту, коею сіи соки растеній перемѣняютъ въ красный цвѣтъ, и воду дѣлаютъ кислотою. Кислота оныхъ бываетъ большею частію росно-ладанная—*acid. benzoic.* горячаго свойства, совершенно растворяемая въ алкоголь; перегонкою въ закрытыхъ сосудахъ образующая булавчатые кристаллы; сухою перегонкою измѣняется въ искусную кислоту.

Бальзамическія вещества имѣютъ силу волоса—

ные сосудцы—*vasa capillaria* побуждать и умножать отдѣленія—*secretiones*. Явленія сии производятъ не только въ желудкѣ и кишкахъ, но и въ отдаленныхъ частяхъ, умножая особенно отдѣленіе мочи и испарины. Вѣроятно также, что эти средства поправляютъ отдѣленіе сукровицы упомянутыхъ сосудовъ, и потому называются *раноцелительными*—*vulneraria*.

11. Масляно-эфирныя или летучія масла—*oleoso-ætherea s. olea volatilia* суть самыя ближайшія къ натуральнымъ бальзамамъ. Различествуютъ отъ постоянныхъ тучныхъ маселъ—*olea pinguis*, *fixa* пронизательнымъ запахомъ, острымъ вкусомъ и великою летучестью, такъ, что, накашавъ на бумагу, не оставляютъ пятна; горятъ безъ копоти и сажи, растворяются въ винномъ спиртѣ, и даже водѣ сообщаютъ свой запахъ; по большей части плаваютъ на поверхности оной; нѣкоторыя же густоватыя, по тяжести своей, опускаются на дно, какъ-то: розовое масло—*ol. rosarum*. Въ продолженіи времени эфирныя масла портятся отъ притяженія кислотвора изъ воздуха и дѣлаются острыми, разѣдающими корочныя пробки, коими были закупорены; изобилуютъ большею частию водотвора и меньшею углетвора.

Силу имѣютъ чрезвычайно побуждающую, умножая особенно дѣйствіе или чувствительность—*sensi-*

bilitas органическихъ нервовъ, сосудовъ и животную теплоту—*caloric. animale*, отъ чего силы желудка и кишекъ возвышаются, пищевареніе удобнѣе совершается и вѣтры—*flatus* изгоняются.

Чѣмъ чище и летучѣе существенныя масла—*olea ætherea*, тѣмъ пріятнѣе бываютъ для обонянія, посредствомъ конхъ чувственная сила мозговыхъ нервовъ умножается, и бодрость всѣхъ чувствъ возвышается. Между тѣмъ по летучему своему началу и водотворному то имѣютъ особенное свойство, что послѣ скоропроходящаго возбужденія—*incitatio fugax*, при послѣдовавшей перемежкѣ онаго, умножаютъ отдѣленія и испражненія, и такимъ образомъ прекращаютъ спазмы и другія сверхъ—естественныя раздраженія, а потому называются *противусудорожными летучими средствами*—*antispasmodica volatilia*.

Благовоишныя масла—*olea fragrantia* пріятнолетучее свое начало сообщаютъ также винному спирту и водѣ, которые тоже возбуждаютъ мозговые нервы, укрощаютъ органическія спазмы и, поощряя волосяныя сосудцы, поспѣшествуютъ отдѣленіямъ, каждому испаренію и отдѣленію мокротъ, но гораздо слабѣе самыхъ маселъ.

Другія летучія масла, притяженіемъ кислотвора образующія камфору—*olea camphorina*, силу крово-

носныхъ сосудовъ и волосяныхъ чувствительно и продолжительно возбуждаютъ, умножая при томъ жаръ въ тѣлѣ, хотя на языкѣ и въ пищепріемномъ горлѣ производятъ впечатлѣніе холода по своему обыкновенному летучему испаренію.

Къ сему роду принадлежатъ мятное розмариновое и шалфейное масла, кои продолжительнымъ испареніемъ осаждаютъ, или переходятъ въ камфору. По свидѣтельству *Тромсдорфа*, камфора раждается также изъ терпентиннаго масла—*ol. terebinthinæ* прохожденіемъ чрезъ оное сухихъ паровъ соляной кислоты—*acid. muriatic.*

Ежели летучее масло въ соединеніи своемъ имѣетъ экстрактно-горькое, или смолистое, или водяное вещество, то оное продолжительно дѣйствуетъ на нервную и мышечную системы, возбуждая постоянно желудокъ и кишки, изгоняя скорѣе вѣтры, и усиливая движеніе жидкостей, умножаетъ теплоту всего тѣла. Извѣстъ будучи приложенное, побуждая кожные сосудцы и ускоряя отдѣленія, производитъ разводящее дѣйствіе—*discutiens.*

Пригорѣлыя масла растений—*olea empyreumatica*, содержащія уголь или сажу и несовершенную кислоту, не только сильнѣе раздражаютъ, но вмѣстѣ умножаютъ жаръ и волненіе крови. Сред-

ства эти полезны въ астенической ломотѣ—*arthritis anomala*, равно какъ и винная настойка сажи—*tinctura fuliginis*, одобряемая *Меллиномъ*, и рекомендуемая *Г. Каменецкимъ* въ маточныхъ припадкахъ—*anomalie uterinæ*; но для нѣжныхъ особъ или полнокровныхъ и крѣпкаго сложенія людей не годятся! *Шпрегель*.

Вонючія вещества—*graveolentia*, которыя имѣютъ противный запахъ, производятъ также особенное дѣйствіе въ нервахъ; потому что отвратительный духъ дѣлаетъ тошноту, или такъ возбуждаетъ чувственную силу, что болѣзненное побужденіе иногда перестаетъ. Нѣкоторыя изъ сихъ скоро проходящихъ побужденій въ продолженіи перемежки умножаютъ равномерно всѣ тѣлесныя отдѣленія.

А потому вонючія средства имѣютъ силу—утолять спазмы и боли нервнаго свойства—*neuralgie*; полезны также въ чревныхъ судорожныхъ заваляхъ—*neurantistases*, и отъ глисть—*vermes*. По сему и называются *противоглистными*—*anthelminthica*, коихъ дѣйствіе зависитъ отъ упомянутой противосудорожной силы (*).

(*) На семъ основываясь, Вурдье удачно изгонялъ тесемочную глисту—*t. solium*, давая крѣпкій отваръ папоротника—*p. filix mas* вмѣстѣ съ хиною, или съ мауномъ—*valeriana offic.* и купороснымъ эфиромъ—*æther. sulphuri*.

Впрочемъ польза этихъ средствъ не для всѣхъ бываетъ одинакова; ибо противный запахъ у людей, имѣющихъ пѣжные нервы, производитъ болѣзненные припадки, какъ-то: головную боль, круженіе и обмороки. Нѣкоторыя, по горячительному своему свойству, дѣлаютъ сильный приливъ крови—*impetus sanguinis* къ важнѣйшимъ органамъ; по сему надлежитъ употреблять оныя съ осторожностію полнокровнымъ, и имѣющимъ особенное отвращеніе—*antipathia*.

12. *Спиртныя вещества—spirituosa*. Всѣ произрастенія и плоды, содержащія сахарное вещество, разведенное водою, на открытомъ воздухѣ при 70 град. *Фаренгейтова* термомѣра подвергаемая броженію, послѣ внутренняго возмущенія всей массы и отдѣленія угольной кислоты, переменяются въ винную кислую жидкость. Вино натуральное и искусственное тѣмъ лучше бываютъ, чѣмъ большее количество содержатъ сахарнаго начала, и долѣе сохраняются.

Старое вино, нѣсколько спиртоватое и изобилующее углекислымъ газомъ, удивительно ободряетъ нервы, возстановляетъ унадшія силы, скорѣе проходитъ чрезъ мочевые пути и гонитъ потъ; а потому съ большою пользою употребляется въ нервныхъ лихорадкахъ и гнилыхъ горячкахъ съ пятнами—*f. petechiales*, давая больнымъ каждый

часть по столовой ложкѣ (*). Пространіе о винѣ излагается при описаніи винограда—*vitis vinifera*.

Изъ вино-сахарной жидкости перегонкою извлекается *винный спиртъ*—*spiritus vini*, который очищается повтореннымъ двоеиѣмъ и прибавленіемъ солякислой извести, —*calx muriatica*, или древеснаго угля, и сѣрной крѣпкой кислоты—*acid. sulphuric*. Такимъ образомъ получается алкоголь, который легче воды, какъ 792: 1000. Обыкновенный же спиртъ—*spiritus vini*, извлекаемый изъ хлѣбныхъ зеренъ—*frumenta*, имѣетъ удѣльную тяжесть: отъ 930—935 къ 1000 воды.

Винный спиртъ имѣетъ запахъ летучій, пронзительный, вкусъ горячительный, силу чрезвычайно побуждающую, горитъ синеватымъ пламенемъ безъ дыму и копоти. По опытамъ *Соссюра*, основныя начала онаго суть: 43 части углетвора, 37 кислотвора, 15 водотвора и 5 азота. Имѣетъ свойство—растворять смолистыя вещества, жирныя и эфирныя масла, самородныя балзамы, экстрактную часть растений и мыльныя вещества.

(*) *Vinum generosum omnium excellentissimum, cuius utilitati vix deorum potentia aequatur!* (Asclepias). О пользѣ различныхъ винъ см. въ моеи Матеріи Медикѣ Ч. II. № 277.

Для врачебнаго употребленія избирается винный спиртъ, не имѣющій никакой пригорѣлости—*emruegna*, для составленія лекарственныхъ настоекъ—*tincturæ*, и къ извлеченію смолисто-экстрактныхъ и горькихъ частей изъ растений. Снаружи употребляемый, раздражаетъ и укрѣпляетъ слабыя части; будучи смѣшанъ съ уксусомъ, разводитъ шибы, унимаетъ кровотеченія свѣжихъ порубленныхъ ранъ, и помогаетъ изцѣленію переломленныхъ костей. Подробнѣе о семъ излагается при описаніи ржи—*secale cereale*.

Винный спиртъ, съ крѣпкимъ уксусомъ перегоняемый, даетъ *уксусную нефть*—*partha acetis* s. *aether. acetic.*, имѣющую пріятнѣйшій ароматный запахъ, такой же вкусъ, и весьма летучее свойство (*). Польза сего средства величайшая, въ нервныхъ лихорадкахъ, гнилыхъ горячкахъ, поносахъ, простудной ломотѣ, боляхъ роженицъ, снзмахъ, судорожныхъ маточныхъ припадкахъ, и отъ усыпительныхъ ядовъ—*venena narcotica*, (20). Даютъ на сахаръ по 10—20—40 капель, или съ наливкою Мауна—*infus. valerianaе*, для возбужденія ослабѣвшихъ нервовъ, и умноженія кожной испарины. Извнѣ втираютъ въ виски при обморокѣ,

(*) Аптечное приготовленіе оной, см. in *Fahrmasop. Rossica* N. Karpinsky, Petropoli. 1799, p. 225.

даютъ нюхать, и прикладываютъ въ гнилымъ бо-
лящимъ зубамъ—*dentes sariosi*.

13. *Усыпительныя*—*narcotica* суть такія средства, кои чувственную силу уменьшаютъ; дѣйствуютъ же оныя подобно летучимъ масламъ и спиртнымъ веществамъ (11, 12), кои, сначала сильно побуждая чувствительность, наконецъ приводятъ оную въ ослабленіе. По сему какъ усып-
ляющія, такъ и спиртныя средства, производи-
пьяность, и постепенно возбуждая жизненную силу, поспѣшествуютъ тѣлеснымъ отдѣленіямъ и наво-
дятъ сонъ.

Многія изъ усыпительныхъ средствъ, имѣющія горько-тошноватое свойство, будучи полезны для людей, въ тѣлахъ животныхъ низшаго класса ча-
сто производятъ губительныя дѣйствія: такъ напр. квассія, горькій миндаль, полынь и т. п. умерщ-
вляютъ мухъ, птицъ, ящерицъ и рыбъ. Другія усыпительныя, имѣющія ядовитый запахъ и горь-
ко-острое начало, какъ-то: лавровишневое дерево — *r. laurocerasus*, красавица — *a. belladonna*, и целибуха — *s. nux-vomica*, по опытамъ *Пфафа*, *Вельтера* и *Еммерта*, суть весьма ядовиты и для людей. Свойство оныхъ зависитъ отъ щелочно-летучаго и азотнаго начала, разрушаемаго ки-
слотами (7).

Повѣйшіе химики открыли, что усыпительные яды, сверхъ горько—остраго вещества, содержатъ весьма летучую кислоту берлинской лазури—acid. borussic., и азотное начало—azoticum. *Гай-Люссакъ*. Изъ этого видно, что азотъ, соединенный съ водотворомъ и малымъ количествомъ кислотвора, сообщаютъ симъ средствамъ весьма летучее свойство и дѣйствіе оныхъ, сильно распространяющееся по всему тѣлу, и превосходящее спиртно—эфирныя вещества. *Шпренгель*.

Удивительно, что усыпительно—ядовитыя вещества дѣйствуютъ большею частію на нервы спиннаго хребта, уменьшая чувствешную силу и возбуждая раздражительную. Извнѣ будучи приложены къ нервамъ, чувствешную силу оглушаютъ, но въ мышцахъ производятъ особенную боль и раздражимость.

По сему очевидно, что усыпительныя средства преимущественно возбуждаютъ сердце и сосуды, отъ онаго пронсходящіе; умножаютъ крѣпость и скорость жилюбіенія (пульсы), побуждаютъ волосяныя сосудцы не только къ скорѣйшимъ отдѣленіямъ, но даже къ воспаленіямъ—*inflammationes*, разводятъ застои влагъ, и самую кровь дѣлаютъ жиже. Между тѣмъ чувствешная сила уменьшается и наконецъ вовсе исчезаетъ, особенно въ желудкѣ; если же и нервы вмѣстѣ поражаются, то дѣла-

ются трясенія, спазмы и жестокия боли. А потому заключить должно, что средства эти могутъ дѣйствовать нацѣлы й организмъ.

14. *Горько-экстрактныя вещества*—амаго-*extractiva*. Премногія растенія имѣютъ чистое горькое начало—*princip. amagum*, извлекаемое водою и виннымъ спиртомъ, которое даже однимъ вкусомъ открывается; однако надлежитъ хорошенько различать отъ предыдущихъ горько-усыщительныхъ средствъ.

Горько-экстрактное начало заимствуетъ свой вкусъ отъ полуокисленного угля—*carbo hemioxydatus*, которое притяженіемъ большого количества кислотвора дѣлается сладкимъ; и потому многія растенія такимъ образомъ получаютъ средній вкусъ между горькимъ и сладкимъ.

Горькое чистое начало удобнѣе растворяется въ винномъ слабомъ спиртѣ, а сладковато-горькое извлекается горячею водою, какъ видно изъ приготовления врачебныхъ настоекъ и наливокъ—*tingtura, infusa*. Сямъ способомъ можно отдѣлять мучное вещество даже изъ смолисто-горькихъ и острыхъ кореньевъ.

Синій цвѣтъ горькихъ растеній отъ кислотъ перемѣняется въ красный, отъ щелочей въ зеленый, а отъ желѣзнаго купороса въ оливковый.

Горькія средства доставляютъ постоянное и мѣстное побужденіе, въ особеннети желудку, коего силы укрѣпляются, равно и другіе смежныя органы, опредѣленные для отдѣленія, къ лучшему дѣйствию тоже побуждаются; а потому и называются *желудочными*—*stomachica*, или поправляющими желчь—*bilem corrigentia*.

Въ особеннети же средства сіи помогаютъ въ худомъ пищевареніи—*digestio læsa*, зависящемъ отъ слабости мышечныхъ волоконъ. Къ сему намѣренію служатъ болѣе горько-пряныя и вяжущія средства—*amago-aromatica*, *adstringentia* (16), содержащія нѣсколько литучаго масла, ежели примѣчается слабость во всемъ тѣлѣ. Ибо отъ укрѣпленія желудка и другихъ внутренностей, поправляются отдѣленія желчи, сока поджелудочной железы—*succus pancreaticus*, дѣлается смѣшеніе правильное соковъ, разводятся застои мокротъ, свободное движеніе крови, и возстановленіе правильныхъ дѣствий во всемъ организмѣ.

Что горькія вещества дѣйствуютъ на твердыя и жидкія части нашего тѣла; то первое подтверждается крѣпостію мышечныхъ волоконъ, получаемую отъ правильнаго смѣшенія питательнаго сока, и ускоряемаго отдѣленія посредствомъ мышцъ, дѣйствующихъ на жидкости. Второе доказывается тѣмъ,

что животныя, питающіяся горькими растеніями, получаютъ въ мясѣ, молокѣ и въ другихъ сокахъ такойже вкусъ; иногда же самое горько-красильное начало сообщается испражняемымъ влагамъ.

Сколько полезны горькія средства, не менѣе и вредны могутъ быть тогда, ежели пищеварительные органы страдаютъ не отъ слабости, но отъ засоренія оныхъ или нечистотъ—*sordes gastricae*.—Замѣчено также, что продолжительное употребленіе горькихъ веществъ производитъ опьяненіе или головокруженіе у людей слишкомъ нѣжныхъ и великою раздражимостью одаренныхъ; у полнокровныхъ причиняютъ приливъ къ важнѣйшимъ органамъ, одышку, прострѣлъ—*apoplexia* и водяную болѣзнь *hydrops*. *Кулленъ*.

15. Вяжущія чистыя — *adstringentia pura*. Вяжущій вкусъ растеній зависитъ отъ собственнаго начала именуемаго дубильнымъ—*princip. coctagium*, имѣющаго свойство животную студень сгущать и укрощать гнилость. Сверхъ онаго начала многія вяжущія средства содержатъ также кислоту чернильныхъ орѣшковъ—*acid. galic.*, имѣющую большее количество углетвора и водотвора, меньшую же кислотвора, который болѣе находится въ другихъ растеніяхъ кислаго свойства (6).

Вяжущее начало удобно растворяется въ винномъ спиртѣ и водѣ, желѣзными окисями—*oxyda*

ferrі осаждается въ видѣ чернаго, или темно-пурпуроваго цвѣта; отъ селитряной кислоты—acid. nitric. перемѣняется въ кисличную или сахарную кислоту—acid. oxalic.; ѣдкая щелочь—kali caustic., прибавляемая въ паливкѣ чернильныхъ орѣховъ, отпшмаетъ весь вяжущій вкусъ, и содѣлываетъ чистый экстрактъ. И самая природа вяжущее свойство незрѣлыхъ плодовъ перемѣняетъ въ мыльно-кислый пѣжный экстрактъ, когда оное при совершенной зрѣлости соединится съ кисличною и яблочною кислотами—acid. malic.

Пфафъ тоже замѣтилъ, что вяжущее горьковатое начало притяженіемъ большаго количества кислотвора дѣлается сладковатымъ; растворяется въ водѣ, и пѣнится подобно мылу; синій цвѣтъ растений перемѣняетъ въ красный; съ известковою водою зелѣветъ, синѣетъ и дѣлаетъ отсѣдъ розоваго цвѣта, которыя измѣненія зависятъ единственно отъ кислоты чернильно-орѣшковой.

Вяжущія средства по своему началу подобное дѣйствіе производятъ, какъ въ живомъ тѣлѣ, такъ и надъ мертвыми волокнами, что самое дубленіе кожъ доказываетъ. Ежели вяжущее начало сгущаетъ животный клей—gluten animale, то слѣдуетъ, что и соединеніе плотныхъ частей укрѣпляетъ, дѣлаетъ ихъ жесткими и твердыми, да и самыя влаги отъ умноженной связи створожива-

ются, какъ видно изъ мѣстнаго прикладыванія этихъ средствъ.

Дѣйствіе оныхъ не лзя отвергнуть и на отдаленныя части, производимое сочувствіемъ сжимающа, и переносимое кругообращеніемъ крови. Принятые внутрь, или снаружи приложенные, они въ короткое время укрощаютъ кровотеченіе, укрѣпляютъ слабыя части, останавливаютъ излишнее потѣніе, отражаютъ гнилость астеническихъ язвъ, поправляютъ сукровицу и поспѣшествуетъ заживленію оныхъ.

Полезны также вяжущія средства въ слабости всего тѣла—*atonia corporis*, зависящей отъ недостатка связи и упругости плотныхъ частей; при сильной вялости и недостаточномъ движеніи мышечныхъ волоконъ—*torpor fibrarum*, отъ чего дѣлаются не рѣдко застои влаги, поносы кровяные и сывороточные—*profluvia sanguinea et serosa*, маточныя кровотеченія у блѣдноцвѣтныхъ женщинъ, и упорное теченіе бѣлей—*leucorrhæa*; также въ мокротномъ теченіи, бывающемъ у обонхъ половъ—*hlenorrhæa muliebris et virilis*, которое зависитъ отъ одной только слабости железъ мочеваго канала; въ золотушномъ слезотеченіи—*epiphora sero-fulosa*, непомѣрномъ слюнотеченіи или плеваніи—*ptyalismus*, мокротномъ долговременномъ поносѣ,

выпаденіяхъ внутренностей, грыжахъ и вывихахъ, происходящихъ отъ великаго расслабленія—*laxitas*.

Въ астеническихъ сыпяхъ—*exanthemata atonica*, зависящихъ отъ великой нѣжности мышечныхъ волоконъ—*teneritas fibræ*, вяжущія средства тоже помогаютъ; но ежели оныя происходятъ отъ какой-нибудь остроты—*acrimonia*, не годятся; по сему и въ язвахъ острыхъ остерегаться должно! Напротивъ цынготныя язвы—*ulcera scorbutica*, золотушныя—*scrofulosa*, и происходящія отъ худаго питанія или худосочія—*cachexia*, средства эти, поправляя сукровицу—*sanies*, и поспѣшествуя отдѣленію хорошаго гноя, способствуютъ много къ заживленію.

Отеклыя опухоли или сыворотчныя—*tumores serosi*, иначе называемыя бѣлыми или холодными—*t. frigidi*, тоже требуютъ вяжущихъ средствъ. Впрочемъ, ежели какія-нибудь теченія—*profluvia*, сыпи и язвы, хотя бы казались астеническими—*passiva*, однако долговременностію сдѣлались безвредными, таковыя предоставить должно натурѣ, ибо уничтоженіе оныхъ, равно какъ и остановленіе обыкновеннаго пота, и закрытіе застарѣлыхъ язвъ, можетъ причинить не только худыя послѣдствія, но и ускорить смерть!

Еще напоминаю: слишкомъ долгое употребленіе вяжущихъ средствъ не можетъ остаться безъ вре-

да; ибо долговременнымъ сжиманіемъ дѣлаются грубыми и жесткими, гибкіе члены твердыми, пріятная молодость перемѣняется въ преждевременную старость. И самыя опухоли отъ этихъ средствъ, употребляемыхъ долѣе надлежащаго времени, такъ затвердѣваютъ, что наконецъ перемѣняются въ скіррную окрѣпность—*scirrhusitas*.

16. *Вяжущія-горькія* или *пряныя*—*adstringentia amaro-aromatica*. Растенія, имѣющія горько-вяжущій или пряный и бальзамическій вкусъ, свойство это получаютъ отъ внутренняго соединенія вяжущаго начала съ горькимъ экстрактомъ, летучимъ масломъ и смолистымъ бальзамомъ. Качества свои сообщаютъ какъ винному спирту, такъ и горячей водѣ.

Силу имѣютъ побуждать все органическія системы, укрѣпляя слабыя силы желудка, ободряя нервы, поощряя сосуды къ движенію, умножая кругообращеніе крови и животную теплоту, поспѣшествуя отдѣленіямъ и востановляя надлежащую крѣпость мышцъ, при ослабленномъ состояніи всего тѣла.

Употребляются преимущественно въ перемежающихся лихорадкахъ, нервныхъ и гнилыхъ; равно и другихъ астеническихъ болѣзняхъ, которымъ приличны средства, упомянутыя подъ №№ 9, 10,

11, 14, 15, при наблюдении тѣхже предосторожностей.

17. *Испражняющія смолисто-острыя*—*purgantia resinoso-acria*. Сюда принадлежатъ: всѣ слабительныя и рвотныя средства—*cathartica*, *emetica*, которыя, побуждая отдѣлительные органы къ испражненію, наконецъ ослабляютъ умноженную дѣятельность всѣхъ органическихъ системъ, какъ-то: первыхъ путей, кровеносныхъ сосудовъ, всасывающихъ, нервной и мышечной.

Легкія слабительныя—*laxantia mitiora*, побуждая червообразное движеніе кишечнаго канала, производятъ испражненіе безъ раздраженія. *Проносныя крѣпкія*—*purgantia fortiora, drastica*, имѣющія мыльно-смолистое свойство и острый вкусъ, сильно раздражая желудокъ и кишки, по сочувствію органическихъ нервовъ, производятъ умноженныя испражненія съ рѣзкомъ—*tortina*, болью и судорожными движеніями.

По этому слѣдуетъ съ большею осторожностью назначать приемы оныхъ, ограничивая преимущественно употребленіе въ долговременныхъ или нелихорадочныхъ болѣзняхъ—*m. diuturni s. apyret.*, гдѣ примѣчается большая слабость—*torpor* кишечнаго канала.

Польза оныхъ бываетъ огромная, ежели нужно сдѣлать какое-нибудь отвлеченіе—*revulsio* отъ важ-

нѣйшихъ частей къ кишкамъ; ежели надѣяться можно, что застарѣлыя кожныя болѣзни—*m. cutanei, chronici* могутъ быть облегчены, или совершенно истреблены помощію продолжительнаго кишечнаго испражненія, которымъ, не ослабляя силъ, чрезъ сочувственное раздраженіе, часто вылечиваются самыя упорныя болѣзни, какъ-то: водяная, параличъ, падучая и проч. (*).

Видъ, въ которомъ приличнѣе даются слабительныя средства, также наблюдать должно:—легкія—можно употреблять въ водяномъ растворѣ, или наливкѣ—*infusum laxativum*; смолисто-острыя удобнѣе растворяются въ вишѣ или спиртныхъ жидкостяхъ. По этому случаю дѣлаются спиртныя настойки—*tingturæ*: ревеня, колоцинтовъ, чемерицы и проч.

Такъ какъ послѣднія сильнѣе и продолжительнѣе раздражаютъ кишки, то оныя соединять должно съ клейкими веществами—*mucilaginosâ* (1, 2, 3, 4); или съ сахаромъ, яичнымъ желткомъ и нѣжными маслами—*olea blanda* (8). Дѣтямъ, по природѣ имѣющимъ особенную чувствительность и раздражимость,

(*) Древніе по этому случаю давали легкія слабительныя въ малыхъ приемахъ, продолжая повторительно и долго, называя оныя:—*purgantia per epuscrasin*. Матеріи Медики Ч. I. ст. 157.

приличнѣе давать въ молочныхъ растворахъ, или эмульсіяхъ.

Рвотныя средства—*emetica, vomitoria* составляютъ множайшія растенія, которыя содержатъ смолисто-экстрактное вещество. Многія изъ оныхъ долговременнымъ вареніемъ оказываютъ мочегонное дѣйствіе—*diuretica*. Оба эти свойства удобно укрощаются уксуомъ, и другими кислотами произрастений—*acida vegetabilia* (6, 7). Летучія части рвотныхъ средствъ вовсе теряются, ежели чрезъ долгое время будутъ находиться на открытомъ воздухѣ, или худо сберегаемы, что и о прочихъ разумѣется.

Сила оныхъ, въ особенности раздражая желудокъ и нервныя пучки онаго или сплетенія—*plexus pectoris*, производитъ сверхъ-естественное движеніе мышечныхъ волоконъ столь сильно, что дѣлается рвота, отъ которой и болѣзненное побужденіе кишекъ часто перестаетъ. А потому такимъ образомъ утоляются спазмы, боли, и самыя непомѣрныя кишечныя испражненія прекращаются чрезъ возбужденное сочувствіе нервовъ.

Въ малыхъ учащенныхъ приемахъ—*dosi refracta*, средства эти, производя одну только тошноту—*nausea*, и весьма легко побуждая желудочныя нервы, оказываютъ большую пользу: въ чревныхъ за-

валахъ—*stases abdominales*, спазмахъ и другихъ болѣзненныхъ припадкахъ.

Такимъ образомъ вылечиваются поносы, происходящіе отъ простуды, ревматизма, маточные судорожные припадки, непомѣрные астеническія кровотеченія, грудныя мокротныя болѣзни, мокротная чахотка—*phthisis pituitosa*, долговременная одышка—*asthma*, зарожденіе грудной водяной болѣзни—*hydrothorax incipiens* и воспаленія, сопровождаемыя спазмами, коимъ подвержены бывають роженицы—*peritonitis puerperalis*. Въ соединеніи съ экстрактомъ бѣлены — *extract. hyosciami* и мятнымъ сахаромъ—*eleosaccharum menthae*, укрощается судорожный кашель—*tussis ferina*, или коклюшь. *Вейкардъ, Шпренгель.*

Изъ русскихъ ядовитыхъ растений: корень подлѣсника или копытника—*rad. asari e.*, по опытамъ *Г. Каменецкаго*, есть самое надежнѣйшее средство. Дается въ порошокъ, водяной и винной наливкѣ. См. при описаніи онаго на своемъ мѣстѣ.

18. *Разъѣдающія смолисто-острыя вещества*—*rodentia resinoso-acria*. Многія чрезвычайно острыя или ѣдкія растенія, собственное начало получаютъ отъ смолистаго вещества, соединеннаго, кажется, съ ѣдкою щелочью—*kali caustic.*, см. ниже подъ № 19, по которымъ жгущая сила оныхъ умножается. Будучи приложены къ кожѣ или

шимъ тѣлеснымъ частямъ, производятъ въ оныхъ воспаленія, отдѣленія верхней кожицы, растравленіе сосудовъ и извлеченіе сукровицы или пасоки; по прошествіи же раздраженія, оказываютъ хорошее нагноеніе—*suppuratio* (9). По такому дѣйствію называются средства эти *нарывными и разьдающими*—*vesicatoria, escharotica*; въ худосочныхъ тѣлахъ производятъ иногда опасное воспаленіе, переходящее въ антоновъ огонь—*gangraena*.

Употребляются снаружи какъ отвлекающія — *revellentia*, для уничтоженія внутренняго воспаленія важнѣйшихъ частей, для извлеченія острой пасоки чрезъ кожу, и для травленія мясной дичи—*caro fungosa*, зараждающейся въ астеническихъ язвахъ — *ulcera atonica*. Нарывныя средства не только мѣстно дѣйствуютъ, но, по всеобщему возбужденію твердыхъ ослабѣвшихъ частей, ускоряя болѣзненные отдѣленія—*secretiones morbosae*, и возвышая жизненныя силы, поспѣшествуютъ перелому болѣзней—*crisis morborum* (*).

Острыя или ѣдкія смолистыя вещества, употребляемые внутрь, требуютъ большой осторожности: даютъ

(*) О средствахъ, истощающихъ кровяную сыворотку—*depletia seri*, подробно излагается въ I Ч. Матеріи Медики, стр. 195—202.

ся же въ самыхъ малыхъ приемахъ, въ соединеніи съ клейкомасяными или смягчительными средствами, притупляющими ѣдкое свойство оныхъ—*involutia* (1—8) и подь № 17 упомянутыми. По содержанию смолистаго начала, удобнѣе растворяются въ крѣпкомъ винномъ спиртѣ — *alcohol* (12), и по этому свойству средства эти причислить можно къ № 9.

19. *Щелочныя вещества—alcalina*. Щелочь, поташъ, или травяная соль—*kali, potassa, sal herbarum*, получается изъ золы многихъ деревъ и травъ, извлекаемая горячею водою, и вышареніемъ приводимая въ соляные кристаллы. Нечистый поташъ—*cineres clavellati*, имѣющій черноватый цвѣтъ, содержитъ экстрактивное вещество растений, которое еще не совершенно пережжено. По чему нѣкоторые особенную силу приписываютъ полынной соли—*sal absinthii*, кудряваго волчца—*s. cardui bened* и проч.

Должно согласиться, что, по различной почвѣ земли, многія растенія содержатъ также поташъ, соединенный съ селитряною, или соду съ соляною кислотою. Въ первомъ случаѣ образуется селитра—*nitras potassæ*, во второмъ обыкновенная повареная соль—*murias potassæ*, находимая преимущественно въ приморскихъ растеніяхъ, именуемыхъ солянками—*salsola kali, s. soda salicornia herbacea l.* и проч.

Поташъ, напитанный винокламенною кислотою, составляетъ вино-щелочную соль—*supertartras potassæ* или креморъ-тартаръ.

Очищенный поташъ и сода имѣютъ одинакія свойства: первый принадлежитъ царству растений, вторая минеральному или ископаемому. Изобилуютъ азотомъ, преимущественно примѣчаемымъ въ летучей щелочѣ—*ammonium*, имѣющей сродство съ тѣлами животныхъ. Вкусъ имѣютъ собственный щелочный, въ водѣ удобно растворяются, кислотворъ весьма скоро притягиваютъ изъ воздуха, съ жидкими кислотами образуютъ среднія соли—*salia neutra*. Силіе соки растений перемѣняютъ въ зеленый цвѣтъ; желтый—въ темно-красный и фіялковый.

Въ тѣлѣ животныхъ дѣйствуютъ химически, разлагая кислоту не только въ первыхъ путяхъ, но и въ отдаленнѣйшихъ органахъ; соединяясь съ мочевою кислотою—*acid. uric.* растворяютъ камни—*calculi, urolithi*, уничтожаютъ подагрическіе и лотные фосфорно-известковые наросты и металлическія окиси—*oxuda*, особенно свинцовыя и ртутныя, принятыя внутрь; притяженіемъ кислотвора, уничтожаютъ ядовитое оныхъ дѣйствіе (20).

Поташъ, напитанный угольною кислотою—*kali carbonicum*, имѣетъ не столь острое свойство, какъ пережженный—*k. purum*, которые, побуждая всасывающіе и волосяныя сосуды, и самыя железы—

glandulæ, умножаютъ отдѣленія, всасываніе, и уничтожаютъ пасочные застои—*stases lymphaticæ*. Новыя наблюденія *Гумбольдта* и другихъ подтверждаютъ, что щелочныя средства, вбирая желудочную кислоту, укрощаютъ спазмы и другіе нервные припадки, зависящіе отъ матеріальной причины, побуждающей чувственную силу къ сверхъестественнымъ движеніямъ—*motus abnormes*.

Въ соединеніи съ горькими веществами, уничтожаютъ желудочную щемоту или изжогу—*cardialgia*, *pyrosis*, желчную рвоту и зеленый дѣтскій поносъ—*alvus viridis infantum*, происходящій отъ окисанія желудочнаго сока—*succus gastric. acensens*. Полынная соль или поташъ, въ соединеніи съ водяною наливкою ревеня—*infus. rhei kalinum*, величайшую пользу доставляетъ младенцамъ; винная поташная настойка горечавки—*tinctura kalina gentianæ*, принимаемая по столовой ложкѣ по утру и въ вечеру, помогаетъ болѣе взрослымъ.

Въ повальномъ кровавомъ поносѣ—*dysenteria popularis*, сопряженномъ съ кислотою и промозглою отрыжкой, или съ желчною зеленоватою рвотою—*vomitus prasinus*, упомянутыя средства съ прибавленіемъ вишневаго клея—*gummi cerasorum* или другихъ клейкихъ средствъ—*mucilaginoso* (1—4), служатъ для сего лучшими лекарствами. Поташъ въ соединеніи съ сѣрою, разрушаетъ ядовитыя окиси

свинца, ртути и мышьяка—*oxuda venenata plumbi, hydrargyri, arsenici* (20). *Митчиль* давалъ это средство съ успѣхомъ въ началѣ злокачественныхъ лихорадокъ—*f. malignæ*, для уничтоженія гнилости; или тлѣтворной кислоты—*acid. septic.*

Поташъ, отсырѣвшій на воздухѣ—*liquor kali carbonici*, побуждая нѣжно кишки и чревные сосуды, разводитъ густыя мокроты, уничтожаетъ завалы—*obstructiones*, гонитъ мочу и растворяетъ каменную дресву—*lithiasis*; принимая по 10—20 и 30 капель съ чистою водою, и продолжая ежедневно въ теченіи мѣсяца, я имѣлъ случай этимъ средствомъ многихъ страждущихъ мочевыми камышками—*uroliti*, освободить (*). Для такого случая весьма полезна вода щелочно-углекислая—*aqua merphitica alcalina* или по методу *Маскани*: растворивъ 2 драхмы угле-кислаго поташа—*kali carbonic.* въ 1 фунтѣ зельцерской воды—*aqua selterana*, принимать 3 раза въ день по чайной чашкѣ.

Угле-кислый поташъ, дѣйствуя на пасочную систему, поправляетъ кислую порчу пасоки, разводитъ золотушныя опухоли или застои—*stases systematicis lymphatici*. Поташный растворъ внутрь и извнѣ

(*) По сему предмету писанныя мною практическія наблюденія упомянуты при описаніи бобовъ турецкихъ—*phaseolus vulgaris* l.

употребляемый, разводитъ молочные переносы—*metasyncrises lactæ*, твердыя комотныя опухоли—*tophi arthritici*, водяныя отеки, и уничтожаетъ кожныя долговременныя сыпи—*impetigines, exanthemata*. По опытамъ *Руста*, въ соединеніи съ горькими экстрактами—*extracta amara*, излечиваетъ золотушныя застарѣлыя язвы—*ulcera scrofulosa*, и вторичное мокротное теченіе изъ мочевого канала—*bleorrhœa secundaria*.

Наконецъ, перемежное употребленіе то поташа, то усыпительныхъ средствъ—*narcotica* (13) *Штицъ* рекомендуетъ: въ судорожныхъ корчахъ, судорожномъ сведеніи челюсти—*trismus*, столбнякъ—*tetanus*, истерикъ и желудочныхъ спазмахъ; даже страшная водобоязнь—*hydrophobia*, происходящая отъ угрызенія бѣшеныхъ животныхъ, укрощается и вовсе уничтожается: ежели 2 скрупула углекислаго поташа, растворивъ въ 2 унціяхъ воды, принимать каждыя 2 часа по 2 столовыхъ ложки, давая попеременно по 1 грану опія, или экстракта бѣлены—*extract. hyosciami*, по 2 гр. и больше, притомъ посадить больного въ ванну, изъ зольнаго щелока приготовленную—*balneum lixivii*, и поставить промывательное—*clystma*, изъ того же щелока съ мыломъ составленное.

Съ уменьшеніемъ опасности, продолжать одинъ поташный растворъ, состоящій: изъ 1 скрупула по-

таша, раствореннаго въ 6 унц. мятной или ромашечной паливки—*infus, menthæ, v. chamomillæ*, подслащенной сиропомъ, или медомъ.

Поташъ, вареніемъ съ пережженною известью—*calx usta*, составляетъ *ѣдкій щелокъ*—*lixivium caustic*, который имѣетъ жгучій вкусъ—силу чрезвычайно раздражающую органическія части и уничтожающую яды животныхъ (20), бѣшенство—*gambies*, и венерическую болѣзнь—*syphilis*. Основываясь на этомъ, многіе врачи заключили, что всѣ ѣдкія вещества изъ растений (17,18), суть героическія средства, служащія къ разрушенію венерическаго яда (*), бѣшенныхъ животныхъ, и другихъ ядовъ.

Еганъ Бланъ и Фордисе, ѣдкій поташъ—*kali caustic*. единственнымъ средствомъ поставляютъ къ растворенію камня въ мочевыхъ путяхъ. Секретныя средства *Жюрина* и *Шиттика* состояли въ томъ, что давали ѣдкій поташъ отъ 1—3 гранъ, разведши въ крѣпкомъ овсяномъ или ячменомъ отварахъ. *Байли* (**). Масляное мыло, составленное изъ ѣдкаго щелока и жирнаго масла *sapo oleosus*, *Ганеманнъ* почитаетъ надежнѣйшимъ средствомъ въ отравленіяхъ мышьякомъ, и другими

(*) Мысль о семь Г. Жилиберта см. при описаніи молочная болотнаго *euphorbia palustris* l.

(**) *Practical essays on medical. subjects. Lond. 1773.*

острыми металлическими окисями—oxyda metallica, растворивъ сего мыла фунтъ въ 4 фунтахъ воды, и давать каждую четверть часа по столовой ложкѣ, пока окажется спасительная рвота (*).

Снаружи ѣдкимъ поташемъ истребляются бородавки, очищаются мозолеватыя дурнаго свойства язвы—ulcera callosa, cacoëtha, и венерическія получаютъ гораздо лучший видъ, нежели отъ ртутныхъ средствъ. *Дюссосу* вприскиваніемъ и закладываніемъ кнотовъ, напитанныхъ растворомъ ѣдкаго поташа, истреблялъ мясную грыжу—sarcocoele; въ мозолистыхъ свищахъ fistulæ callosæ, производитъ хорошее загноеніе—suppuratio benigna; ломотныя опухоли, намачиваемыя этимъ растворомъ, приходятъ въ разрѣшеніе. *Фонъ—Свитенъ*.

Ежели 1 драхму ѣдкаго поташа растереть съ 2 частями масла, и прибавить 1 унцію воды, то этимъ средствомъ умягчаются поршивые струпы и удобно отдѣляются—tinea capitis, равно и члены, лишенные чувства—membra resoluta отъ параличнаго расслабленія нервовъ возбуждаются таковымъ втираніемъ. При венерическомъ долговременномъ теченіи—blenorrhœa syphilitica, полезно вприскивать растворъ, состоящій: изъ 1 грана ѣдкаго поташа и 1 унціи чистой воды. *Гренъ, Гекеръ*.

(*) См. его же: über die Arsenik Vergiftung, p. 121.

Наконецъ ванны, съ ѣдкимъ щелокомъ приготовляемыя—*balnea lixiviosa*, растворяя 2 унціи ѣдко-щелочнаго камня—*lapis caustic.* въ обыкновенномъ щелокаѣ, изъ воды приготовленномъ—*lixivium e cineribus lignorum*, весьма полезны для возбужденія органическихъ нервовъ, при судорожномъ состояніи ихъ конечностей. Ванны эти, повторенныя одинъ или два раза въ день или черезъ день, сажая больнаго на нѣсколько минутъ, дѣйствительными оказались въ судорожномъ сведеніи всего тѣла или столбнякѣ—*tetanus*, корчномъ трясеніи *chorea*, и въ другихъ жестокихъ нервныхъ припадкахъ. *Шпенгль*. *Пленкѣ* похваляетъ въ оцепенѣлости отъ ранъ—*tetanus traumatic.*, водобоязненномъ бѣшенствѣ—*hydrophobia*, и гнилости костей запястья—*caries metatasi*. Въ столбнякѣ, бывающемъ у лошадей—*tetanus equorum*, одно омываніе этимъ растворомъ помогаетъ, но волоса послѣ онаго лезутъ.

20. *Противудныя средства*—*alexiteria, antidota*, суть такія противудѣйствующія вещества—*reagentia*, которыя ядовитое свойство растительныхъ ядовъ, животныхъ и минеральныхъ, не только поправляютъ, но и разрушаютъ вредныя оныхъ дѣйствія въ тѣлѣ человѣческомъ.

1. *Яды усыпительныхъ растеній*—*venena narcotica* (13), укрощаются:

а. Укусомъ и другими кислотами произрастеній
acida vegetabilia: 6, 7.

б. Крѣпкою наливкою вяжущихъ средствъ—*infusa saturata adstringentia*: 15.

в. Рвотными средствами, и испражняющими прѣвными промывательными — *emetica, enemata irritantia*: 17.

г. Изобильнымъ питьемъ теплой или холодной воды, молока, и клейко-масляныхъ веществъ — *mucilaginoso, oleoso*: 1—8.

е. Щелочными средствами—*alcalina*: 19.

ф. Укусною нефтью—*partha aceti*: 12.

2. *Яды животныхъ*—*venena animalia*, отъ угрызенія змѣй, бѣшеныхъ собакъ и насѣкомыхъ, укрощаются употребленіемъ:

а. Красавицы—*a. belladonna*; ясеня — *fraxinus excelsior*; горечавки—*gentiana l.* и выжатыхъ жирныхъ маселъ—*olea pinguis*: 8.

Полезны также:

б. Сладко-сахарныя средства—*dulcia, saccharina*: 5.

в. Кислыя—*acida*: 6, 7.

г. Щелочныя—*alcalina*: 19.

е. Прижиганіе—*adustio*, и вырѣзываніе—*excisio*, или растравленіе помощію ѣдкихъ средствъ—*gudentia*: 18.

f. Притупляющія—клейкія—obvolventia, mucilaginosa: 1—4.

g. Рвотныя—emetica: 17.

3. Яды минеральныя или ископаемыя—venena mineralia, требуютъ:

a. Вяжущихъ средствъ—adstringentia: 15.

b. Усыпительныхъ—narcotica: 13.

c. Клейкихъ и масляныхъ—muciaginosa, oleosa: 1—4, 8.

d. Рвотныхъ—emetica, и масляныхъ слабительныхъ промывательныхъ—enemata cathartico-oleosa: 17.

e. Щелочныхъ средствъ—alcalina: 19.

4. Яды щелочно-гнилыя—venena alcalino-merphitica, поправляются:

a. Возобновленіемъ чистаго воздуха—aër purus.

b. Укусными парами—vapores aceti.

c. Кислотами—acida: 6, 7.

d. Спиртными средствами—spirituosa: 12.

e. Углемъ древеснымъ—carbo ligni.

Всѣ эти средства изчислены въ слѣдующемъ Расположеніи врачебныхъ растеній, подъ классами.

РАСПОЛОЖЕНІЕ

ОТЕЧЕСТВЕННЫХЪ ВРАЧЕБНЫХЪ РАСТЕНІЙ ПО ГЛАВНЫМЪ СОСТАВНЫМЪ НАЧАЛАМЪ И ДѢЙСТВІЮ ОНЫХЪ НА СИСТЕМУ НАШЕГО ОРГАНИЗМА (*).

К Л А С СЪ I.

ПИТАТЕЛЬНЫЯ СРЕДСТВА—NUTRIENTIA, которыя, вознаграждая потерю животной матеріи, въ большемъ или меньшемъ количествѣ, сохраняютъ органическія дѣйствія въ естественномъ состояніи.

I. МУЧНЫЯ—FARINOSA.

Бобы, *vicia faba*.

—— турецкіе, фасоль, *phaseolus vulgaris*.

Горохъ, *pisum sativum*.

Гречиха, гречка, дикуша, *polygonum fagopyrum*.

Калужница, хлѣбница болотная, *Callapallustris*.

Картофель, *solanum tuberosum*.

* Каштанъ дикій, *aesculus hippocastanum*.

* Миндаль дикій, бобовникъ, *amygdalus nana*.

(*) Означенныя звѣздочками, по опытамъ прежнихъ и новѣйшихъ врачей, признаны дѣйствительнѣйшими въ пользованіи разнородныхъ болѣзней, и помѣщены въ Фармакопеехъ Гг. Вилліе и Карпинскаго.

* Овесъ, *avena sativa*.

Просо, боровое пшено, *panicum milliaceum et italicum*.

Пшеница яровая и озимая, *triticum aestivum et hybernum*.

Пшеничка турецкая, кики, *zea maus*.

* Рожь, жито, *secale cereale*.

Торица, *spargula arvensis*.

Чечевица, *eryum lens et ervilla*.

Чилимъ, водяные орѣхи, *trapa natans*.

* Ячмень, *hordeum dysticum et vulgare*.

II. КЛЕЙКО-СЛИЗИСТЫЯ—MUCILAGINOSA.

* Вишня, *prunus cerasus*.

* Квиты, айва, *pyrus cydonia*.

* Мохъ исландскій, *lichen islandicus*.

—— степной, *l. esculentus*.

* Просвирки, калачики, *malva rotundifolia*.

* Просвирнякъ большой, *althaea officinalis*.

* Роза, *alcea rosea*.

* Салець, кокушица, *orchis morio*.

III. БѢЛОЧНЫЯ—ALBUMINOSA.

Артышокъ, *synaga scolymus*.

Борщъ широколистый, *heracleum spondylium*.

* Вероника ручейная, *veronica beccabunga*.

Капуста заячья, *sedum telephium*.

—— огородная, *brassica oleracea*.

- * Кервель, *scandix cerefolium*.
- Козелецъ, ужомникъ, *scorzonera humilis*.
- Козлобородъ луговой, чертова борода, *tragopogon pratense*.
- Крапива большая, *urtica dioica*.
- бѣлая глухая, *lamium album*.
- малая, *urtica urens*.
- Ландышъ многоколѣнчатый, купено, *convallaria polyopatum*.
- Лебеда садовая, *atriplex hortensis*.
- Маргаритка, скороспѣлка, *bellis perennis*.
- Марь красная, *chelopodium rubrum*.
- * Марь треугольная, *chelopodium botrys*.
- * Молодиль большой, *sempervivum tectorum*.
- Огуречникъ, *borrago officinalis*.
- Огурецъ, *cucumis sativus*.
- * Одуванчикъ, кульбабка, *leontodon taraxacum*.
- Осотъ, молочай огородный, *sonchus oleraceus*.
- * Пеонія, Марьянъ корень, *paeonia officinalis*.
- Первоцвѣтъ, баранчикъ, *primula veris*.
- * Песочная осока, *carex arenaria*.
- * Петрушка, *apium petroselinum*.
- Портулакъ, *portulaca oleracea*.
- * Пырей, *triticum repens*.
- * Рѣпейникъ, лапушникъ, *arctium lappa*.
- Рѣпа, *brassica rapa*.
- Салатъ, *lactuca sativa*.

Сельдерей, *apium graveolens*.

Снять, дягица, *aegopodium podagraria*.

Спаржа, *asparagus officinalis*.

* Цихорій, *cichorium intybus*.

Шпинатъ, *spinacia oleracea*.

IV. КЛЕЙКО-ПРЯНЫЯ—MUSCULAGINOSO-AROMATICA.

* Морковь, *daucus carotta*.

Пастернакъ, *pastinaca sativa*.

Синеголовникъ полевой, *eryngium campestre*.

Труфель, *lycorerdon tuber*.

V. СЛАДКО-САХАРНЫЯ—DULCIA, SACCHARINA.

Арбузь, каунъ, *cucurbita citrullus*.

Бѣреза, *betula alba*.

* Виноградъ, *vitis vinifera*.

Кленъ, асер *platanoides*.

Груши сладкія, *pyrus communis*.

Абрикозы, морели, *prunus armeniaca*.

Свекла бѣлая, свекловица, *beta cicla*.

Свекла красная, бураки, *beta vulgaris*.

* Солодковый корень, *glycyrrhiza glabra*.

* ————— черный, *polypodium vulgare*.

Черешня, *prunus avium*.

* Черносливъ, *p. domestica*.

* Шелковица, тутовое дерево, *morus alba et nigra*.

Яблоки сладкія, *pyrus malus*.

VI. КИСЛО-СЛАДКІЯ—ACIDODULCIA.

Ежевика, *rubus fruticosus*.

* Земляника, *fragaria vesca*.

* Княженица, *rubus arcticus*.

Крыжовникъ, *ribes grossularia*.

* Малина, *rubus idaeus*.

* Морошки, г. *chamaemorus*.

* Смородина красная, *ribes rubrum*.

* ——— черная, г. *nigrum*.

Чашковое дерево, *mespilus germanica*.

VII. КИСЛЫЯ—ACIDA.

* Барбарисъ, *berberis vulgaris*.

* Брусника, *vaccinium vitis idææ*.

* Бузина черная, *sambucus nigra*.

* Вишня, *prunus cerasus*.

Калина, *viburnum opulus*.

Кислица рогатая, *oxalis corniculata*.

* ——— щавельная, о. *acetosella*.

* Клюква, *vaccinium oxycoccos*.

Рябина, *sorbus aucuparia*.

* Тернъ, *prunus spinosa*.

* Черника, *vaccinium myrtillus*.

* Щавель кислый, *rumex acetosa*.

VIII. МАСЛЯНЫЯ ЖИРНЫЯ—OLEOSA PINGUIA.

Арбузное сѣмя, *semen cucurbitæ citrulli*.

Дынное сѣмя, *cucumis melo, semen*.

- * Конопля, *cannabis sativa*.
- * Кунжутъ, *sesamum orientale*.
- * Ленъ, *linum usitatissimum*.
- * Макъ бѣлый, *papaver album somniferum*.
- Огуречное сѣмя, *cucumis sativus*.
- * Орѣхъ волоскій, *juglans regia*.
- лѣсной, *coryllus avellana*.
- Подсолнечникъ, *helianthus annuus*.
- * Сурѣпица, дикая рѣпа, *brassica napus*.
- Тыковное сѣмя, *semen cucurbitæ peponis*.

К Л А С Т Ъ II.

ПОБУЖДАЮЩІЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО—INCITANTIA POSITIVE,

которыя, умножая дѣятельность органическихъ системъ, возстановляютъ потерянное равновѣсіе, или правильность во всемъ организмѣ.

I. УГЛЕКИСЛЫЯ СРЕДСТВА—CARBONICA,

т. е. постоянно побуждающія систему нервную, или чувствительную—*incitantia-permanentia systematis nervosi*.

1. СМОЛИСТЫЯ—RESINOSA.

- * Клещевина, турецкая конопля, *ricinus communis*.
- * Колоцинты, горькая тыква, *cucumis colocynthis*.
- Повилица, *convolvulus sepium*.
- Придорожная иголка, *rhamnus catharticus*.

2. ОСТРЫЯ—ACRIA.

* Авранъ дикій, *gratiola officinalis*.

* Баранья трава, *arnica montana*.

* Бедренецъ каменистый, *pimpinella saxifraga*.
 ————— черный, *p. magna*.

Бѣреза, *betula alba*.

* Безвременный цвѣтъ, *colchicum autumnale*.

Блошница ѣдка, *erigeron acris*.

Борщъ широколистный, медвѣжья лапа, *heracleum
sphondylium*.

Бузникъ, красная бузина, *sambucus ebulus*.

Вороній глазъ, Паридова трава, *paris quadrifolia*.

Вшивопрудное сѣмя, кавалерская шпора, *del-
phinium staphysagria*.

* Вѣтренница прострѣльная, сонъ, *anemone pra-
tensis*.

————— лѣсная, *a. nemorosa*.

Горецъ водоперечный, *polygonum hydropiper*.

———— почечуйный, *p. persicaria*.

Горчичникъ, хвостовая трава, *peucedanum offi-
cinale*.

* Горчица бѣлая, *sinapis alba*.

* ————— садовая бѣлая, *brassica eruca*.

* ————— черная, *sinapis nigra*.

* Гулявица чихотная, *achillea ptarmica*.

Девясиль меньшей, *inula dysenterica*.

* Жабникъ вредный, болотный, ranunculus sceleratus.

* ————— огненный, r. flammula,

* ————— полевой, r. arvensis.

* ————— узлокоренной, r. bulbosus.

————— чистотѣльный, r. ficaria.

* ————— ѣдкій, r. acris.

* ————— язычный, r. lingua.

* Жеруха, крессъ водяной, sisymbrium nasturtium.

————— струйчатая, s. sophia.

Зеленика, баранецъ, lycoperidium selago.

* Зубной корень, cactris odontalgica.

Каперсовый кустъ, capparis spinosa.

Катранъ, scambe orientalis.

* Клещеница, змѣй трава, arum maculatum.

* Конскій чеснокъ, teucrium scordium.

* Копытень, подлѣсникъ, asarum europæum.

Косатикъ болотный, сабельникъ, iris pseudacorus.

————— сибирскій пѣтушокъ, iris sibirica.

————— синій, i. germanica.

Крессъ садовый, lepidium sativum.

* Курослѣпъ меньшей, anagallis arvensis.

Ластовичный корень, струковатое зѣлье, asclepias vincetoxicum.

Левкои, *cheiranthus cheiri*.

* Ложечная трава, *cochlearia officinalis*.

* Ломанось, жигунецъ, *clematis erecta*.

Конопельникъ, конская грива, *eupatorium cannabinum*.

* Лукъ, цибуля, *allium sera*.

Молодилъ острый, *sedum acre*.

Молочай болотный, *euphorbia palustris*.

———— плащевый, *e. replis*.

Молочай придорожный, *e. lathyris*.

———— солнечный, *e. helioscopia*.

* Мыльная трава, *saponaria officinalis*.

Нищая трава, *clematis vitalba*.

Ноготки, *calendula officinalis*.

Порочникъ водяной, *scrophularia aquatica*.

———— узлокоренный, *s. nodosa*.

* Ольха, *betula alnus*.

Омела, *viscum album*.

* Орѣхъ грецкій, *juglans regia*.

* Папоротникъ женскій, *polypodium filix foemina*.

* ————— мужской, *p. f. mas*.

* Пасленъ сладкогоркій, *solanum dulcamara*.

Переступень, параличная рѣпа, *hyponia alba*.

* Перець волчій, волчье лыко, *daphne mezereum*.

Персикъ, шептала, *amygdalus persica*.

* Плаунъ, *lucorodium clavatum*.

Подмаренникъ мягкій, *galium mollugo*.

————— настоящій, *g. verum*.

Подмаренникъ шероховатый, *g. aparine*.

* Пулавка огненная, *anthemis pyrethrum*.

Рѣдка, *garbanus sativus*.

* Рѣпейникъ, лапушникъ, *arctium lappa*.

Свирѣзка аптечная, *erysimum officinale*.

————— варварина, *e. barbarea*.

————— чесночная, *e. alliaria*.

Сердечникъ луговой, полевой крессъ, *cardamine pratensis*.

Синеголовникъ полевой, *eryngium campestre*.

Солянка травяная, *salicornia herbacea*.

Роса солнечная круглолистная, *drosera rotundifolia*.

* Татарникъ, *onopordium asanthium*.

* Фіалка пахучая, *viola odorata*.

————— собачья, *v. canina*.

* ———— трицвѣтная, *v. tricolor*.

* Хрѣнь, *cochlearia armoracia*.

* Чемерица, геллеборъ черный, *helleborus niger*.

Чемерица бѣлая, *veratum album*.

* Чеснокъ, *allium sativum*.

* Чистотѣль большой, *chelidonium maius*.

Шерошница гортанная, *asperula cynanchica*.

————— дустая, ясменникъ, *a. odorata*.

Шлемовникъ, *scutellaria gallericulata*.

Ярушка полевая, клопецъ, *thlaspi arvense*.

3. ПРЯНО-ДУШИСТЫЯ—AROMATICO-AETHEREA.

* Анисъ, ганусъ, *pimpinella anisum*.

Базилникъ, васильки, *osimum basilicum*.

* Божіе дерево, *artemisia abrotanum*.

* Бузина, самвикъ, *sambucus nigra*.

Буквица бѣлая, первоцвѣтъ, *primula veris*.

* Вероника, *veronica officinalis*.

Гвоздика полевая, *dyanthus plumarius*.

* Донникъ, буркунъ, *trifolium melilotus*.

* Донской, или козацкій можжевельникъ,
iniperus sabina.

* Душица, материнка, *origanum vulgare*.

* Ель, *pinus abies*.

Естрагонъ, драгунъ трава, *artemisia dracunculus*.

Жизненное дерево, *thuja occidentalis*.

Золотоцвѣтъ Ивановъ, *chrysanthemum leucanthemum*.

* Иръ, косатикъ душистый, *acorus calamus*.

* Кадило, пахлунъ, *teucrium chamaepitys*.

Калуферъ, *tanacetum balsamita*.

* Кирказонъ, кокорникъ, *aristolochia clematidis*.

* Кишнець, коляндрa, *coriandrum sativum*.

* Кминъ, *cuminum cumium*,

Коперь французскій, *laserpitium gallicum*.

Крапива глухая, *lamium album*.

Лилея бѣлая, кринъ, *lilium album*.

Лица, *tilia europaea*.

* Лиственница *pinus larix*.

* Маіоранъ кошечій, *teucrium marum*.

* Можжевельникъ, яловець, *juniperus communis*.

Нефорощъ бѣлая сибирская, *artemisia rupestris*.

————— черная, а. *contra*.

Осина, *populus tremula*.

Осокоръ душистая, *populus balsamifera*.

* Очанка, дубровка, *teucrium chamaedrys*.

* Перець струтчатый, турецкій, *capsicum annuum*.

* Петрушка, *apium petroselinum*.

* Пижма, дикая рябинка, *tanacetum vulgare*.

Пихта, *pinus picea*.

* Полынь, *artemisia absinthium*.

Пол. римской, а. *pontica*.

Пулавка вонючая, *anthemis cotula*.

Ромашка маточная, *matricaria parthenium*.

* ——— простая, *m. chamomilla*.

* ——— римская, *anthemis nobilis*.

- * Рута, пиганъ, *ruta graveolens*.
- . Сосна боровая, *pinus sylvestris*.
- . Тимонъ, полевой анисъ, *carum carui*.

Теревинфъ, фисташковое, терпентинное дерево,
pistacia terebinthus.

Тополь, *populus alba et nigra*.

- * Укропъ волосскій, *anetum foeniculum*.
- * Фіалка пахучая, *viola odorata*.

Цытварное сѣмя, *artemisia contra*.

Чернобыльникъ обыкновенный, *a. vulgaris*.

————— полевой, *a. campestris*.

Чернушка, *nigella sativa*.

Чистецъ, горный укропъ, *seseli annuum*.

II. ВОДОТВОРНЫЯ СРЕДСТВА—HYDROGENICA,

побуждающія летучія систему чувственно-жиль-
ную—*incitantia difusidilia systematis nervosi*.

1. ПРЯНО-КАМФОРНЫЯ—AROMATICO-CAMPHORATA.

* Богородская трава, *thymus serpyllum*.

Буквица, *betonica officinalis*.

Бѣлокопытникъ чумный, *tussilago petasites*.

* Дягиль, *angelica, archangelica*.

————— лѣсной, *a. sylvestris*.

Змѣголовникъ молдавскій, *dracoscephalum mol-
davicum*.

* Зоря, любистикъ, *legusticum levisticum*.

* Императорскій корень, *Imperatoria, ostruthium*.
 Камфорная трава, *camphorosma monspeliensis*.

* Лавенда, *lavendula spica*.

Ландышъ, конвалея, *convallaria majalis*.

* Маіоранъ, *origanum maiorana*.

* ————— кошечій, *teucrium marum*.

* Марь благовонная, *chenopodium ambrosioides*.

* Маунъ, буддырьянъ, *valeriana officinalis*.

* Мелисса, пчельникъ, *melissa officinalis*.

* Мята водяная, *mentha aquatica*.

—— кошечья, *pereta cataria*.

—— кудрявая, *mentha crispa*.

—— лѣсная, *m. sylvestris*.

* — перечная, *m. piperita*.

* Полей, *m. pulegium*.

Пуховникъ безстебельный, *carlina acaulis*.

* Розмаринъ, *rosmarinus officinalis*.

* Оимьянъ, тимьянъ простой, *thymus vulgaris*.

Чаберъ, чебрець, *satureja hortensis*.

* Ясенець, бадьянъ дикій, *dictamnus albus*.

2. СПИРТНЫЯ—SPIRITUOSA.

* Винный спиртъ, *spiritus vini gallicus*.

* Вино бѣлое, *vinum album*.

* — красное, *v. rubrum*.

Грушовка, *v. rugaceum*.

Хлѣбный спиртъ, водка, *spiritus frumenti*.

* Яблонька, сидръ, *v. pomaceum*.

3. УСЫПИТЕЛЬНЫЯ—NARCOTICA.

* Багуиъ, клоповникъ, *Iedum palustre*.

Бѣлена, *hyosciamus albus*.

* Блекота черная, *h. niger*.

Бузникъ, *sambucus ebulus*.

* Дурманъ, *datura stramonium*.

———— малый, дурнишникъ, *xanthium strumarium*.

* Кашкара, пьяная трава, *rhododendron chrysanthum*.

Кервель лѣсной, дикая петрушка, *cherophyllum sylvestre*.

Колосница лѣсная, змѣнная трава, *stachis sylvatica*.

* Красавица, сонная одурь, *atropa belladonna*.

Кушинчики, водяныя маковки, *nymphaea alba et lutea*.

* Лавровишневое дерево, *prunus laurocerasus*.

Ландышъ, *convallaria majalis*.

Лютикъ волкобойный, *aconitum lycoctonum*.

* Лютикъ, прострѣльная трава, *a. napellus*.

Макъ полевой, *papaver rhoeas*.

* — садовый, *p. somniferum*.

* Мухоморъ, *agaricus muscarius*.

Мяхунка, *physalis alkekengi*.

* Паперсточная трава, наперстокъ красный, *digitalis purpurea*.

Омегъ малый, бѣшеница водяная, *cicuta virosa*.

* Омегъ пестрый, болиголовъ, *conium maculatum*.

Паридова трава, *paris quadrifolia*.

* Пасленъ сладкогорькій, *solanum dulcamara*.

Пахучка сухоягодная, *myrica gale*.

* Пеонія, *paeonia officinalis*.

Покрикъ, адамова голова, *atropa mandragora*.

Пасленъ черный, пенки, *solanum nigrum*.

Пролѣска, куръ-зелье, *mercurialis annua et perennis*.

* Салатъ ядовитый, дикій лаштукъ, *lactuca virosa*.

Собачникъ, песій языкъ, *synoglossum officinale*.

Тисъ, красное дерево, *taxus baccata*.

* Табакъ, тютюнъ, *nicotiana tabacum et rustica*.

* Укропникъ водяной, *phellandrium aquaticum*.

* Хмѣль, *humulus lupulus*.

* Шафранъ, *crocus sativus*.

III. КИСЛОТВОРНЫЯ СРЕДСТВА—OXUGENICA,

побуждающія систему мышечную, или раздражительную *incitantia systematis musculosi*.

1. КИСЛОТЫ РАСТЕНИЙ—ACIDA VEGETABILIA.

Кл. I. Разрядъ 6. 7.

2. ГОРЬКІЯ ЭКСТРАКТИВНЫЯ АМАРА EXTRACTIVA.

* Брусничная трава, *vaccinium vitis idaea*.* Будра ползучая, *glecoma hederacea*.* Волчець кудрявый, *centaurea benedicta*.* Волчокъ, хелишникъ, *oponis arvensis et spinosa*.* Горечавка желтоцвѣтная, *gentiana lutea*.* Гулявица тысячелстная, деревей, *achillea millefolium*.* Девясиль большой, усманъ, *inula helenium*.Дрокъ, *genista tinctoria*.Дымница, земляной дымъ, *fumaria officinalis*.——— орѣшистая, *f. bulbosa*.* Звѣрбой синій, иссопъ, *hyssopus officinalis*.* Золототысячникъ, *gentiana centaureum*.Золотоцвѣтъ, Ивановъ цвѣтъ, *chrysanthemum leucanthemum*.* Изтодь горькій, *polygala amara*.Конопельникъ, конская грива, *eupatorium cannabinum*.Львинохность, сердечная трава, *leonurus cardiaca*.Лишай грудной, *lichen pulmonarius*.* ——— исландскій, *l. islandicus*.——— сплетенный, *l. plicatus*.

— Червецноносный, *l. cocciferus*.

Маргаритка, бѣльцы, *bellis perennis*.

Молодиль большой, живучка, *sempervivum tectorum*.

— острый, *sedum acre*.

Нефорощь, бѣлая, сибирская, *artemisia rupestris*.

Ноготки, *calendula officinalis*.

Персиковые листы, *amygdalus persica*.

Повилица, крапивная малина, *cuscuta europaea*.

* Пырей, *tricum repens*.

Ревень черенковый, *rheum rharonticum*.

* Р. красноватый сибирскій, *r. undulatum*, et *eruentum*.

Свербежница, одышная трава, *scabiosa arvensis*.

Самшитъ, *buxus sempervirens*.

Свербежница подкушенная, дявольское окуше-
ніе, *s. succisa*.

Татарникъ Марьяинъ, *carduus marianus*.

* Толокнянка, *arbutus uva ursi*.

* Хасимъ, одуванчикъ, *leontodon taraxacum*.

Хвощъ обыкновенный, *equisetum hyemale*.

Хвощъ полевой, *e. arvense*.

* Хмѣль, *humulus lupulus*.

* Цихорей, *cichorium intybus*.

Чертополохъ лоскутный, *centaurea phrygia*.

— хохлатый, *s. calcitrapa*.

* Шандра бѣлая, *marubium vulgare*.

3. ВЯЖУЩІЯ—ABSTRINGENTIA, STYPTICA.

* Вахта, трилистникъ водяной, *menyanthes trifoliata*.

Вербейникъ полусечный, луговой чай, *lysimachia nummularia*.

Вербовникъ, плакунъ вербный, *lythrum salicaria*.

* Вивишникъ болотный, *geum rivale*.

Горецъ птичій, спорышъ, *polygonum aviculare*.

* ——— сердечный, змѣевикъ, *p. bistorta*.

Груша, *pyrus communis*.

Грушовка дикая, *pyrus rotundifolia*.

Губка листовничная, *boletus laricinus*

——— пахучая вѣтловая, *b. salicis, suaveolens*.

* Дождевикъ, *lycoperdon bovista*.

* Дубъ, *quercus robur*.

Желтникъ, кожевненное деревцо, *rhus coriaria*.

Журавлинникъ, Робертовъ, *geranium Robertianum*.

* Завязникъ, завязной корень, *tormentilla erecta*.

* Земляничный корень, *fragaria vesca*.

Змѣевикъ двудомный, кошечья лапа, *gnaphalium dioicum*.

——— кустарный, *g. stoechas*.

* Ильмъ, берестъ, *ulmus campestris*.

Каперсовый кустъ, *sapparis spinosa*.

Крушина, *rhamnus frangula*.

* Марена, крапъ, *rubia tinctorum*.

Могильница, барвенка, *vinca minor*.

Подмаренникъ желтый, сывороточная трава, *galium verum*.

————— шероховатый, *g. aparine*.

Попутникъ, *plantago major*.

Пятилистникъ, *potentilla reptans*.

Росникъ, львиная лапа, *alchemilla vulgaris*.

Рябина, *sorbus aucuparia*.

Савина стрѣла, бедренець Италийскій, *poterium sanguisorba*.

* Сальный корень, лошаково ухо, *symphytum officinale*.

Селезеночникъ рѣдковолоосый, *asplenium trichomanoides*.

Снить боярская круглолистая, *burpleurum rotundifolium*.

Сокольникъ волосатый, мышье ушко, *hieracium pilosella*.

Таволга шишковислая, лабазникъ, *spiraea filipendula*.

* Терновникъ дикій, острокровъ, *ilex aquifolium*.

* Тернь, *prunus spinosa*.

* Трутъ древесный, *boletus igniarius*.

* Тутовое черное дерево, *morus nigra*.

Чашковое дерево, *mespilus germanica*.

* Червеница, воловикъ красильный, *anchusa tinctoria*.

* Черника, *vaccinium myrtillus*.

* Чернильные орѣхи, *quercus cerris*.

Черноголовъ, *prunella vulgaris*.

Чистоустъ царскій, *osmunda regalis*.

* Щавель водяной, *rumex hydrolapathum*.

————— конскій, остролистный, *r. acutus*.

————— кудрявый, *r. crispus*.

————— туполистый, *r. obtusifolius*.

Яворъ, чинарь, *platanus orientalis*.

* Ясень, *fraxinus excelsior*.

4. ВЯЖУЩІЯ-ПРЯНЫЯ—СТУРТИСО-АРОМАТИСА.

* Верба бѣлая, ветла, *salix alba*.

————— козья, *s. caprea*.

* ——— ломкая, *s. fragilis*.

* ——— пятимужная, ива, *s. pentandra*.

Глазница, очная помощь, *euphrasia officinalis*.

Глухая крапива, *lamialbum*.

* Гравилать, гвоздичникъ, *geum urbanum*.

Дубровка пирамидная, *ajuga pyramidalis*.

Золотушникъ, золотая розга, *solidago, virga aurea*.

* Каштанъ дикій, *aesculus hippocastanum*.

Линнея сѣверная, *linnaea borealis*.

Рѣшникъ благовонный, *agrimonia eupatoria*.

* Роза бѣлая, *rosa centifolia*.

* Дикая, *r. canina et sylvestris*.

* ——— красная *r. gallica*.

Розовый корень, *rhodiola rosea*.

Сирень, бузокъ, *syringa vulgaris*.

Таволга илемная, царица луговъ, *spiraea ulmaria*.

Черемха, *prunus padus*.

* Шалфей, *salvia officinalis*.

К Л А С С Ъ III.

ПОБУЖДАЮЩІЯ ОТРИЦАТЕЛЬНО—INCITANTIA NEGATIVE,

которыя уменьшаютъ умноженную дѣятельность органическихъ системъ, ослабляя оныя непосредственно, или посредственно.

1. СРЕДСТВА, ОСЛАБЛЯЮЩІЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО или непосредственно—*debilitantia positiva, directa*.

A. МУЧНЫЯ.

B. СЛИЗИСТЫЯ.

C. КИСЛЫЯ, И

D. УСЫПИТЕЛЬНЫЯ,

которыя предложены въ I и II классахъ.

2. ОСЛАБЛЯЮЩІЯ ПОСРЕДСТВОМЪ УМЕНЬШЕНІЯ, или изпражненія тѣлесныхъ жидкостей—*debilitantia indirecta, s. evacuantia*.

A. СЛАБИТЕЛЬНЫЯ ЛЕГКІЯ — *LAXANTIA, CATARTICA*.

Золотуха желтая, *thalictrum flavum*.

* Клещевина, турецкая конопля, *ricinus communis*.

Лебеда садовая, *atriplex hortensis*.

- * Ленъ слабительный, *linum catharticum*.
- Марь трехугольная, *chenopodium bonus henricus*.
- Персиковые цвѣты, *flores amygdali persicae*.
- Плоды кисло-сладкіе, *fructus acidulo-dulces*.
- * Терновые цвѣты, *flor. pruni spinosae*.
- * Черносливъ, *prunus domestica*.
- * Шиповникъ, *rosa canina*.
- Шпинатъ, *spinacia oleracea*.

В. ПРОНОСНЫЯ КРѢПКІЯ—PURGANTIA DRASTICA.

- * Авранъ дикій, *gratiola officinalis*.
 - * Безвременный цвѣтъ, *colchicum autumnale*.
 - Бузина красная, *sambucus ebulus*.
 - * ——— черная s. *nigra*.
 - Зеленика, баранецъ, *lycopodium selago*.
 - * Колоцинты, горькая тыква, *cucumis colocynthis*.
 - Крушина, *rhamnus frangula*.
 - иголчатая, придорожная иголка, г.
- cathartica*.
- Лиственничная губка, *boletus laricinus*.
 - Переступень, *bryonia alba*.
 - Повилица, *convolvulus sepium*.
 - Полѣска, *mercurialis annua*.
 - * Ревень, *reum undulatum et rharonticum*.
 - Фіалка трицвѣтная, *viola tricolor*.
 - * Чемерица бѣлая, *verathrum album*.
 - * ——— черная, *helleborus niger*.

С. РВОТНЫЯ—ЕМЕТИСА.

- * Авранъ дикій, *gratiola officinalis*.
- Буквичный корень, *betonicae officin. radix*.
- * Жабникъ огненный, *ranunculus flamula*.
- * ——— язычный, *r. lingua*.
- * Копышенъ, подлѣсникъ, *asarum europaeum*.
- * Табакъ, *nicotiana, tabacum*.
- * Фиалка пахучая, *viola odorata*.
- собачья, *viola canina*.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ВѢСЪ И МѢРА,

ДЛЯ ВѢРНОСТИ КОЛИЧЕСТВА ПРИЕМОВЪ, ПРИ ОПИСАНІИ
ВРАЧЕБНЫХЪ РАСТЕНІЙ И СОСТАВНЫХЪ ДѢЙСТВИТЕЛЬ-
НѢЙШИХЪ ЛЕКАРСТВЪ ОЗНАЧЕННЫЯ.

Гранъ—*granum j*, равняется тяжести переч-
наго или ячменнаго зерна; когда же дѣлится на
 $\frac{1}{2}$ или $\frac{1}{4}$ часть грана, то и зерно оное можно
раздѣлить на 2 или на 4 части.

Скрупулъ—*Эj*, содержитъ въ себѣ 20 гранъ
или $\frac{1}{4}$ золотника.

Драхма—*Зj*, состоитъ изъ 3 скрупуловъ, или
60 гранъ, или $\frac{3}{4}$ золотника.

Унція—*Зj*, содержитъ 8 драхмъ, или $\frac{1}{2}$ ло-
тамъ, или 6 золотникамъ.

Фунтъ—*Лб*, содержитъ 12 унцій, или 24 ло-
та или $\frac{1}{2}$ золотникамъ.

Пучокъ сухихъ травъ—*fasciculus*, равняется вѣ-
су 1-й унціи, или $\frac{1}{2}$ лотамъ.

Горсть—manipulus = $\frac{1}{2}$ унцій, или = 1 лоту или = 3 золотникамъ.

Щепоть—rugillus = 1 драхмъ, или = $\frac{3}{4}$ золотника.

Столовая ложка—cochlear обыкновенной величины, для принятія жидкостей, равна $\frac{1}{2}$ унцій, или = 1 лоту, или = 3 золотникамъ.

Малая ложка—cochlear parvum, или десертная, вмѣщаетъ 1 драхму, или = $\frac{3}{4}$ золотника.

Чайная ложка, вмѣщаетъ легкаго травянаго порошка, $\frac{1}{2}$ драхмы, или $\frac{5}{8}$ золотника. Спиртныхъ жидкостей: отъ 1 скрупула, до полдрахмы;—сиропа, кашки и прочихъ смѣшеній: отъ 1—2 драхмъ, или = $\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ золотника.

Капля спиртныхъ настоекъ равна вѣсу 1-го грана, или перечнаго зерна.

Чайная чашка, или малый стаканъ—vasculum вмѣщаетъ отъ 7—8 столовыхъ ложекъ жидкости, т. е. водяной наливки, отвара, микстуры и проч. или отъ 3—4 унцій.

Рюмка—cyathum содержитъ отъ $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ унцій, или = 3—5 лотамъ.

Примѣч. Каждое лекарство сначала давать надлежитъ всегда въ маломъ приѣмѣ, и потомъ восходить постепенно до тѣхъ поръ, пока наконецъ достигаетъ надлежащаго дѣйствія. Первое и всеобщее опредѣленіе приѣмовъ зависитъ отъ возраста, которые Г. Гуфеландъ означаетъ числами въ слѣдующей таблицѣ:

А. ТАБЛИЦА ДЛЯ ТОЧНѢЙШАГО ОПРЕДѢЛЕНІЯ ПРИЕМОВЪ.

Годы. 25, 20, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8.

Колич. 40, 35, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23 гр.

Годы. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Мѣсяцы. 11.

Колич. 22, 21, 20, 18, 16, 13, 10, ——— 9, —

Мѣсяц. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, $\frac{1}{2}$.

Колич. — 8, — 7, — 6, — 5, 4, 2, 1.

В. ТАБЛИЦА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ МЕДИЦИНСКІЙ ФУНТЪ, РАЗДРОБЛЕННЫЙ И СРАВНЕННЫЙ СЪ РОССІЙСКИМЪ ФУНТОМЪ.

Аптечный вѣсъ.					Россійскій.			
Фунт.	унціи	драхмы.	скрупулы	гранны.	Фунты.	лот.	золотник.	осьм. зол.
1	12	96	288	5760	$\frac{3}{4}$	24	72	576
$\frac{1}{2}$	6	48	144	2880	$\frac{3}{8}$	12	36	288
$\frac{1}{4}$	3	24	72	1440	$\frac{3}{16}$	6	18	144
	1	8	24	480	»	2	6	48
		1	3	60	»	»	$\frac{3}{4}$	6
			1	20	»	»	$\frac{1}{4}$	2
			$\frac{1}{2}$	10	»	»	»	1

С. ТАБЛИЦА ПОКАЗЫВАЮЩАЯ ПРИЕМЫ ЛЕКАРСТВЪ, СО-
ОБРАЗНЫЕ ВОЗРАСТАМЪ.

Возрастъ.	Общее колич. 1 драхма.	Приемы по воз- расту.
7-недѣльный	.. $\frac{1}{12}$ 4 гран.
7-мѣсячный.	.. — 5 —
14 ————— $\frac{1}{3}$ $7\frac{1}{2}$ —
28 ————— $\frac{1}{3}$ 12 —
3- лѣтъ $\frac{1}{3}$ 15 —
5 ————— $\frac{1}{4}$ 20 —
7 ————— $\frac{1}{4}$ 30 —
14 ————— $\frac{2}{3}$ 40 —
21 ————— 1 60 —
63 ————— $\frac{11}{12}$ 55 —
77 ————— $\frac{5}{6}$ 50 —
100 ————— $\frac{4}{6}$ 40 —

Планъ описанія.

Отечественныя врачевныя растенія, въ простран-
нѣйшемъ государствѣ Россійскомъ произрастающія
дика и садовыя, качествами своими могущія, от-
части или совершенно, занять чужеземныя, во
врачеваніи употребляемыя, въ *Рускомъ Лечебномъ*
Травникѣ описаны слѣдующимъ порядкомъ:

1. При каждомъ растеніи означены руссійское
и латинское систематическое названіе.

2. Природное мѣсто произрабленія, продолженіе ихъ
растительной жизни и способная почва земли, на
которой въ большемъ количествѣ произрастаютъ.

3. Качества, чувствамъ подверженныя, или химически открытыя.

4. Сила и употребленіе во внутреннихъ и внѣшнихъ болѣзняхъ какъ человѣческихъ, такъ и животныхъ, подтверждаемые наблюденіями прежнихъ и новѣйшихъ достойныхъ вѣроятія врачей.

5. Количество для приемовъ, сообразныхъ возрастамъ, и видъ, въ которомъ приличнѣе внутрь и снаружи употребляются, съ присовокупленіемъ примѣрныхъ таблицъ, подъ литерами: А. В. С. на стр. 80 и 81.

6. Аптечныя дѣйствительнѣйшія приготовленія по Россійской В. Фармакопееѣ *Г. Велліе*, и простыя домашнія лечебныя средства, въ народѣ употребляемыя, служащія для поселянъ, въ отдаленности живущихъ, гдѣ нѣтъ врачей и аптекъ.

7. Нужныя предосторожности, касательно ядовитыхъ растений, съ показаніемъ испытанныхъ противудѣйствующихъ средствъ.

8. Экономическія замѣчанія и новыя открытія, полезныя для всѣхъ состояній, какъ Россійскихъ академиковъ, такъ и другихъ ученыхъ мужей въ Европѣ.

9. Правила касательно собиранія, храненія и приготовленія лечебныхъ травъ, для составленія самонужнѣйшей домашней аптеки, съ присовокупленіемъ предварительныхъ понятій о свойствахъ и

дѣйствию вѣчебныхъ средствъ, взимаемыхъ изъ царства растеній.

Многіе молодые врачи стануть, можетъ быть, упрекать и въ томъ, что между прочими помѣщены здѣсь такіа вѣчебныя растенія, которыя давно уже забыты, или вышли изъ употребленія—*obsoleta, exoleta*. Виновать! прошу снисхожденія, что я оными почитаю и уважаю опытность древнихъ врачей, оказавшихъ потомкамъ важнѣйшія услуги, нежели новая секта трансцендентальныхъ философовъ, заводящая легковѣрныхъ въ лабиринтъ заблужденія своими нелѣпыми выдумками (*).

По словамъ *Г. Пекена*, знаменитаго Московскаго врача, долгъ цѣлителя, коему болящій ввѣряетъ драгоцѣннѣйшее свое сокровище, т. е. здравіе и жизнь, состоитъ не въ слѣпомъ послѣдованіи новымъ ученымъ предположеніямъ и толкамъ; но въ точномъ познаніи существа болѣзни, изслѣдованіи первоначальныхъ причинъ, произведшихъ оную, и въ избраніи такихъ цѣлебныхъ средствъ, коихъ дѣйствительность и благотворная польза утверждены

(*) Г. издатель журнала: С. О. 1816 года 42, стр. 138, предложилъ для любопытства новѣйшія премудрыя открытія нѣмецкой философіи (*farinae Schellingianae*), которыя едва ли кто понимаетъ; да и самъ глубокомысленный авторъ съ тѣмъ намѣреніемъ писалъ, по его собственному признанію.

многолѣтними испытаніями и вѣрными наблюденіями. Ученыя же, глубокомысленныя и превыспренныя умствованія часто совращаютъ молодыхъ, не искусившихся врачей съ пути истинны, и оттуда происходящія заблужденія и погрѣшности сопровождаются гибельными для болящаго слѣдствіями (*).

Другой истинный философъ-врачъ *Г. Бурдахъ*, въ своей изящнѣйшей фармакологической системѣ, вотъ что говоритъ: къ достиженію желаемой цѣли, каждому просвѣщенному врачу потребно знать весь кругъ цѣлебныхъ средствъ; ему должны быть извѣстны не только употребительнѣйшія лекарства, или принятія въ Фармакопеехъ; но также и простонародныя, или въ общежитіи употребляемыя, по всей справедливости заслуживаютъ равное вниманіе, дабы могъ здраво судить объ ихъ употребленіи, и пользоваться наблюденіями прежнихъ врачей, основывающихся на опытности (**).

Тоже подтверждаетъ и нашъ сл. русскій *Цельсъ*, что въ случаѣ недостатка дорогихъ иноземныхъ

(*) См. въ превосходномъ его твореніи, о сохраненіи здравія и жизни. М. 1812 года, ч. 1, стр. VII.— Цицеронъ въ своихъ рѣчахъ тоже пишетъ: „Medico diligenti, priusquam conetur ægro adbibere medicinam, non solum morbus eius, cui mederi volet, sed etiam consuetudo valentis et natura corporis cognoscenda est.“

(**) System der Arzneimittellehre II. B. Y. s.

лекарствъ, или находясь въ отдаленности отъ городскихъ аптекъ, можно оныя удобно замѣнять отечественными природными произведеніями, гдѣ какія обрѣтаются, на которыя нынѣ всѣ просвѣщенные націи обратили вниманіе: *satius enim coria pemei, quam repagia!* т. е. лучше имѣть изобиліе врачебныхъ припасовъ, чѣмъ претерпѣвать недостатокъ въ оныхъ (*).

Одна опытность можетъ удостовѣрить cadaго, что часто самыя простыя, или діететическія средства, удобнѣе излечиваютъ хроническія или закоренѣлыя болѣзни, нежели извѣстные химико-фармацевтическіе составы—*præparata chemico-pharmaceutica*, о дѣйствіи которыхъ на тѣло человеческое мы можемъ судить, и выводить однѣ только заключенія, или вѣроятныя догадки, основанныя на разумѣ.

Почему весьма неблагоразумно дѣлаютъ тѣ, кои по одному только пристрастію къ какой-нибудь новой системѣ забываютъ и почитаютъ бесполезными наблюденія древнихъ опытныхъ врачей (**)

(*) *Pharmacop. castr. Ruth. Praefat.* p. XII,—на которой я основываясь, упомянулъ здѣсь на стр. I.—Другія основательныя доказательства Гг. Реманна, Евеста и Каменецкаго приведены выше.

(**) Изъ сей точки зрѣнія писалъ я Русскій Лечебный Травникъ, основываясь на опытахъ и наблюденіяхъ искуснѣйшихъ врачей, отъ Иппократа, до

Напротивъ, онѣ заслуживаютъ особенное наше вниманіе и признательность; потому что опыты во врачебномъ искусствѣ служатъ наилучшими руководителями: *Гуфелантъ*. (*) — слѣдовательно опытность всему научаетъ, — *experientia facit artem!*

нашихъ времянь; не имѣя пристрастія ни къ какому образу ученія, уважая болѣе сокровища, оставленныя намъ предками, и не почитая преимущественно ту или другую систему, но избирая изъ оныхъ все изящное въ возможное единство, я на ономъ расположилъ планъ сего сочиненія.—Такова была цѣль и сл. Гуфеланда, въ основаніи.

(*) Системы практической врачебной науки, перевед. съ пѣмецкаго Г. докторомъ Левитскимъ. Москва. 1811, ч 1. стр. 512, 513.

О П И С А Н І Е

ОТЕЧЕСТВЕННЫХЪ ВРАЧЕБНЫХЪ РАСТЕНІЙ,

ЦѢЛЕБНЫМИ КАЧЕСТВАМИ ЗАМѢНЯЮЩИХЪ
ЧУЖЕЗЕМНЫЯ, И УПОТРЕБЛЯЕМЫХЪ ДЛЯ ЛЕ-
ЧЕНІЯ ВНУТРЕННИХЪ И НАРУЖНЫХЪ БОЛѢЗ-
НЕЙ, ОСНОВАННОЕ НА НАБЛЮДЕНІЯХЪ ПРЕЖ-
НИХЪ И НОВѢЙШИХЪ ОПЫТНЫХЪ ВРАЧЕЙ,
СЪ ПРИСОВОКУПЛЕНІЕМЪ СОСТАВНЫХЪ ДѢЙ-
СТВИТЕЛЬНѢЙШИХЪ ЛЕКАРСТВЪ, И ЭКОНО-
МИЧЕСКИХЪ ЗАМѢЧАНІЙ, ДЛЯ ВСѢХЪ СОСТОЯ-
НІЙ ПОЛЕЗНЫХЪ,

РАСПОЛОЖЕННЫХЪ

АЗБУЧНЫМЪ ПОРЯДКОМЪ.

А.

АВРАНЪ ДИКІЙ, ИЛИ ЛИХОРАДОЧНАЯ ТРАВА; БЛАГОДАТЬ;
КОНЕВЫЙ ТРУТЬ—*gratiola officinalis*.

МѢСТО. Растеніе многолѣтное, во всей Рос-
сіи произвольно растущее на мокрыхъ лугахъ
и болотныхъ мѣстахъ; изрѣдка находится и
около Петербурга.

Качества. Содержитъ въ себѣ, кромѣ водоторнаго остраго начала, большое количество экстрактнаго смолистаго вещества.

Запаху трава со цвѣтами, herba с. floribus, собираемая въ іюнѣ и іюлѣ мѣсяцахъ, не имѣетъ.

Вкусъ, свѣжей травы — весьма горькій, острый, тошнотавый, сушеной — слабѣе.

Сила — рвотная, крѣпкая слабительная — drastica, водогонная, противуглистная.

Употребленіе. Въ брюшной водяной болѣзни, и въ ножныхъ водяныхъ отекахъ, похваляютъ: *Гельмонтъ*, *Бульдюкъ*, *Іоэль*, *Менхъ*; въ сумашествіи (mania) *Бульдюкъ*, *Лентинъ*; въ глистныхъ припадкахъ helminthiasis, для истребленія мокротнаго ихъ гнѣздилища въ кишкахъ, и умерщвленія тесемочной глисты — tænia, одобряютъ: *Венферъ*, *Бульдюкъ*, *Менхъ*, *Горнъ*, *Бурдахъ*; въ венерической болѣзни и застарѣлыхъ язвахъ: *Костржевскій*, *Вендтъ*, *Штоль*, *Цабель*, *Мецлеръ*; въ желчныхъ, часто отрывающихся лихорадкахъ, и упорныхъ четырёхдневныхъ трясукахъ febres quartanæ, особенно осеннихъ, *Бергій*. Въ перемежныхъ лихорадкахъ и болѣзняхъ пасочной системы, *Додоней* тоже давалъ съ успѣхомъ, но только въ малыхъ приемахъ. — *Лавинъ* свидѣтельствуетъ многими наблюденіями о пользѣ этого средства въ излеченіи кожныхъ

болѣзней. Свѣжая толченая трава приклады-
вается для разведенія ломотныхъ опухолей,
грудныхъ отъ створожившагося молока, и къ
ушибамъ, сопряженнымъ съ подкожнымъ кро-
воизліяніемъ—*ecchymosis*: *Муррай*, *Пленкъ*,
Менхъ.

Количество. Сухая трава дается въ по-
рошкѣ: отъ 2—5—10 гранъ; для слабительнаго
дѣйствія и водогоннаго по 20 гранъ; сумашед-
шимъ до полдрахмы; отъ плоской глисты, до
2 скруполовъ. Для настойки полагается одна
драхма травы на 4 унціи кипящей воды; или
3 драхмы наливаются 6 унц. горячей сыво-
ротки. Эта наливка, принятая въ 2 или 3 при-
емахъ, довольно слабитъ отъ 4—6 разъ.

Экстрактъ дикаго аврана—*extractum*
gratiolæ, приготовляемый чрезъ отвариваніе въ
водѣ и выпареніе, почитается весьма дѣйстви-
тельнымъ средствомъ: въ венерическихъ опу-
холяхъ костей, костоѣдѣ, застарѣлыхъ и ра-
ковыхъ язвахъ, затвердѣніи железъ и ядеръ;
въ твердыхъ паховикахъ (бубонахъ), венериче-
скомъ долговременномъ теченіи бѣли—*leucorrhœa*
venerea, ломотѣ, темной водѣ—*amaugosis*, и злой
или упорной чесоткѣ—*scabies maligna*.

Костржевскій, Вепдтъ и другіе тоже
давали средство это во многихъ кожныхъ бо-
лѣзняхъ, или въ болѣзняхъ пасочной системы—

morbi systematis lymphatici: *Лавинь* (*). Въ венерической закоренѣлой болѣзни—*syphilis radicata*, *Штолль* одобряетъ въ соединеніи съ сулемою *ochymurias hydrargyri*, смѣшивая 3 граны оной съ 3 драхмами этого экстракта, въ видѣ пилюль.

Количество. Для разводящаго дѣйствія дается одинъ экстрактъ: отъ 2—4 гранъ, по утру и въ вечеру въ пилюляхъ; или отъ 6—10 гранъ, растворивъ въ мятной, или другой ароматической водѣ, принимая по столовой ложкѣ; для проноснаго въ водяной болѣзни, по 10 гранъ въ пилюляхъ; въ сумашествіи: отъ 20—30 гранъ, и до полдрахмы: *Бурдахъ*.

Примѣчанія 1. Свѣжая трава этого растенія оказываетъ слабительное и рвотное дѣйствіе; сухая же только слабить, а потому можетъ замѣнить александрійскій листь—*cassia senna*; ялпный корень—*convolvulus lalappa*; сабуръ—*aloë perfolata*, и желтую камедь—*stalagmitis sambogioides*.

2. Сухой корень дикаго аврана, принятый до 2 скрупуловъ, дѣйствуетъ наподобіе ипекакуанны—*psychotria emetica*, s. c. *ipescacuana*: *Крамеръ*, *Бергій*. Равнымъ образомъ и въ кровавомъ поносѣ не уступаетъ ипекакуаннѣ: *Морелль*, *Булльдюкъ*;

(*) См. *Commentatio de gratiola officinali, eiusque usu in morbis cutaneis.*

въ перемежныхъ лихорадкахъ, по совѣту *Бергил*, дается съ горечавкою желтою—*gentiana lutea*, по 10 грановъ, каждыя 2 часа.

3. Сибирскіе жители и армяне почитаютъ авранъ дикій всеобщимъ домашнимъ лекарствомъ; первые парятъ съ квасомъ, а послѣдніе, отваривъ въ водѣ, пьютъ оную. Сильное испражнение, бывающее рвотою, или низомъ, или уриною, освобождаетъ ихъ часто отъ усилія разнородныхъ болѣзней: *Фальксъ*.

4. Замѣчено, что лошади отъ этого растенія получаютъ поносъ и дѣлаются тощими или сохнутъ; почему надлежитъ опое отъ сѣна хорошо отдѣлять; другая же скотина аврана не трогаетъ: *Гледичъ*.

анисъ, или ганусъ—*pimpinella anisum*.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, сѣемое въ украинѣ изобильно.

Качества. Сѣмена содержатъ въ себѣ летучее, но не острое масло; *вкусъ* сладковато-пряный.

Запахъ, тоже ароматный, собственный.

Сила—побуждающая, вѣтрогонная, разводящая, грудная.

Употребленіе. Въ слабости желудка и кишекъ, грудныхъ мокротныхъ припадкахъ, и

вѣтряной коликѣ, или раздутости живота отъ вѣтровъ. *Плмнй* похваляетъ анисъ для дѣтей одержимыхъ родимчикомъ—*infantes comitiales* *Геурнй* давалъ новорожденнымъ младенцамъ отъ рѣза въ кишкахъ—*tormina*, и для испражнения перваго чернаго кала.

Количество. Въ порошокъ дается отъ 10 гранъ до полдрахмы; для наливки полагаются 4 драхмы на 12 унцій воды, которая можетъ служить и для промывательнаго вѣтрогоннаго—*bysma carminativum*.

Въ аптекахъ готовится:

Анисовое гнанное масло—*oleum p. anisi destillatum* (*), похваляемое въ упомянутыхъ болѣзняхъ, которое дается на сахаръ отъ 5—10 капель; или 2 драхмы, смѣшавъ съ 2 унціями свѣжаго льнянаго масла, дается въ металлической коликѣ, происходящей отъ свинца или мышьяка, каждый часъ по столовой ложкѣ. Снаружи однимъ анисовымъ масломъ натираютъ животъ, раздутый вѣтрами, твердыя холодныя опухоли, страдающія части ревматизмомъ и для разведенія багровыхъ ушибовъ. Анисовая помада, или одно масло, втираемое

(*) *Pharmacopoeia castrensis ruthena*, auctore: Iacobo Wylie, Petropoli. 1812, p. 291. ; 2

по нѣскольку капель въ волоса, истребляетъ вшей: *Пленкъ*.

Примѣчаніе. Обыкновенный анисъ качествами своими можетъ замѣнить китайскій, называемый иначе бадьяномъ—*illicium anisatum* l. и кардамонъ—*amomum cardamomum*, l.

АРБУЗЪ, или КАУНЪ—*cucurbita citrullus*.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, въ полуденной Россіи ежегодно сѣмое въ огородахъ изобильно.

Качества. Арбузные сѣмена имѣютъ *вкусъ* масляно-сладковатый; *силу*—прохлаждающую, смягчающую, питательную.

Употребленіе. Сѣмянное молоко или оршадъ даютъ въ воспалительныхъ лихорадкахъ, сопутствующихъ съ большими ранами и воспалительными опухолями, такъ же въ моче-рѣзѣ, вмѣсто питья.

Количество. 1 унцію арбузныхъ, или дынныхъ, или тыковыхъ, или огуречныхъ сѣмянъ истолокши, растираютъ съ 12 унціями холодной воды, и даютъ пить больнымъ чрезъ 2 часа по чайной чашкѣ. Это простое сѣмянное молоко можетъ въ нуждѣ замѣнить *милдальную эмульсію*—*emulsio amygdalarum* (*).

(*) *Pharmacop. Rossica (civilis)*, auctore: N. Karpinsky, Petrop. 1798, p. 208.

Примѣчаніе. Умѣренное употребленіе арбузовъ въ лѣтнее знойное время доставляетъ пріятную прохладу крови, разводитъ густоту влагъ, притупляетъ остроту желчи и гонитъ мочу; но излишество или объяденіе производитъ пученіе живота, рѣзь въ кишкахъ—*tormina*, желчный поносъ съ рвотою—*cholera*, иногда же кровавый—*dysenteria*, либо водяную болѣзнь—*hydrops*: *Лаботь*.

АРМУДЪ или квити; гуни; айва; пигва—*pyrus cidonia* l.

Мѣсто. Дерево, произвольно растущее на берегахъ Дуная, при Терекѣ, и въ Украинѣ въ садахъ.

Качества. Плоды имѣютъ пріятный *запахъ*.

Вкусъ—кисло-вяжущій, винный, сѣмянъ—клейкій. По химическому разложенію квити содержатъ яблочную кислоту—*acid. malic*. Сѣмена изобилуютъ слизью.

Сила плодовъ—вяжущая, прохлаждающая, противугнилостная; сѣмянъ—умягчающая, обволакивающая.

Употребленіе. Свѣжіе плоды похваляются въ желчно-гнилыхъ болѣзняхъ и цынгѣ; сѣмена, налитыя кипячею водою, даютъ довольно слизи—*mucilago*, которую прикладываютъ къ ожогамъ, трещинамъ на сосцахъ, сухому воспаленію глазъ, къ болящимъ почечуйнымъ шишкамъ, въ молошницѣ, и гортанной боли вмѣ-

сто полосканья; въ потугахъ на низъ tenesmi, и кровавомъ поносѣ, вмѣсто промывательнаго.

Количество. Выжатый сокъ изъ плодовъ дается по столовой ложкѣ; печеные плоды излегка слабятъ, которые можно давать больнымъ кушать, когда одержимы будутъ запорами.—Сѣмянъ 1 драхма наливается 6 унц. кипячей воды, которая дѣлается клейкою, на подобіе яичнаго бѣлка.

Примѣчанія. 1. За неизмѣнѣмъ Аравійской камеди—*gummi mimosæ niloticae* L.—можно эту клейкую жидкость—*mucilago sem. cydoniorum* во всѣхъ случаяхъ употреблять, гдѣ она похваляется. Одна часть квитовыхъ сѣмянъ, налитая 8 част. холодной воды, даетъ склизъ, подобную Аравійской камеди.

2. Изъ зрѣлыхъ плодовъ готовится сидръ, служащій здоровымъ питьемъ, замѣняющимъ бѣлое волосское вино: *Розве* (*).

Артишокъ—*scypara scolymus*.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее садовое, въ сѣверной Россіи въ парникахъ, въ полуденной въ огородахъ разводится изобильно.

Качества. Сочные листы и мякоть головки имѣютъ *вкусъ* сладковато-травяной, подобный спаржѣ.

(*) О пользѣ сидра и яблочнаго вина упомянуто при описаніи грушъ—*pyrus communis*, и яблокъ—*p. malus*, L.

Сила—легкая, питательная, отверзающая, мочегонительная.

Употребленіе. Артишокамъ приписываетъ *Арбутинотъ* побуждающее свойство.—Пища эта, удобоваримая въ желудкѣ, полезна особенно для одержимыхъ частыми запорами мочи, любострастнымъ мочерѣзомъ, и водяною болѣзною: *Лангъ*, *Шведіоръ*.—Въ цынгѣ и въ упомянутыхъ болѣзняхъ, *Бурдахъ* рекомендуетъ принимать выжатый сокъ изъ всего растенія, смѣшанный по равной части съ хорошимъ винограднымъ виномъ.

Количество. По 2 или 3 унціи нѣсколько разъ въ день; или отъ 3—5 столовыхъ ложекъ по утру и въ вечеру.—При воспалительныхъ припадкахъ дается водяной отваръ артишочныхъ головокъ, или варятъ въ супѣ вмѣстѣ съ зеленымъ горохомъ.

Примѣчанія. 1. Пивной отваръ, или супъ изъ артишоковъ, съ прибавленіемъ свѣжихъ растертыхъ яичныхъ желтковъ, служитъ превосходнымъ домашнимъ лекарствомъ: отъ чревныхъ заваловъ—обструкціи и желтухи.

2. Слишкомъ потливые люди, или когда прѣтеть подъ мышками, отъ чего бываетъ не рѣдко противный духъ, пользуются виннымъ отваромъ артишоковъ, полагая 2 лота на 2 стакана виноград-

наго краснаго вина, и кипятятъ въ покрытомъ сосудѣ, пока третья часть выкипитъ.—Отваръ этотъ холодный пьютъ по рюмкѣ нѣсколько разъ въ день.

Свѣжіе толченые листья прикладываются къ пупку младенцамъ не безъ успѣха, для умерщвленія глистовъ.

Б.

БАГУНЪ, или БАГУЛЬНИКЪ; КЛОПОВНИКЪ—*Iedum palustre*.

Мѣсто. Растеніе кустоватое, въ умѣренной и сѣверной Россіи произвольно растущее по мягкимъ, влажнымъ, болотнымъ и лѣсистымъ мѣстамъ.

Качества—сильныя, зависящія отъ усыпительнаго масла, соединеннаго съ горьковязущимъ экстрактымъ веществомъ: *Шведіоръ*.

Запахъ травы и цвѣтовъ тяжелый, усыпительный — *narcoticus*; *вкусъ* — горьковато-пряный и нѣсколько вязущій.

Сила—усыпительная, потогонная, разводящая, мочегонительная, очищающая, истребляющая вшей—*rphthiriaca*.

Употребленіе. Водяная наливка багуна похвѣляется въ кровавомъ поносѣ, судорожномъ кашлѣ, ломотныхъ членовныхъ боляхъ,

злой чесоткѣ, шелудяхъ и шишковатой проказѣ: *Одеміи*, *Вестрингъ*, *Пленкъ*.

Количество. 3 или 4 драхмы травы варятъ въ 12 унціяхъ воды; либо полъ-унціи травы наливаютъ 1 фунтомъ горячаго молока, или сыворотки, которую, настоявъ и процѣдивъ, принимать нѣсколько разъ въ день по чайной чашкѣ. Водяной отваръ служитъ также для полосканія горла въ жабѣ—*angina*, и для омыванія паршивыхъ частей; мытье головы истребляетъ вшей.

Примѣчанія. 1. Въ конскомъ и коровьемъ падежахъ, листы багуна можно по немногу давать, стерши съ кормомъ, и прибавить также нѣсколько селитры, дабы произвести въ скотинѣ потъ и испражненіе, и тѣмъ избавить оную отъ ядовитыхъ соковъ.—Его отваромъ полезно также омывать коростовую и вшивую скотину; моль и клопы также пропадаютъ отъ багуна: *Муррай*, *Соболевскій*. Крѣпкимъ отваромъ этого растенія, брызгая стѣны и кровати, истребляются клопы.

2. Всѣ части онаго служатъ для дубленія кожъ: *Фрибе* (*).

(*) См. егоже *Oekonomisch-technische flora*, Riga, 1805 p, 66.

БАЗИЛИКЪ, или ВАСИЛЬКИ—*osimum basilicum*, L.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, во всей Россіи садовое.

Качества. Запахъ свѣжей и сухой травы благовонный, *вкусъ* пряный; сѣмянъ клейкій, зависящій отъ летучаго масла и экстрактнаго начала.

Сила—нервная, укрѣпляющая, разбивающая.

Употребленіе. Въ наливкѣ похваляется для укрощенія рвоты, въ слабости желудка, ревматизмѣ, и запорѣ мѣсячныхъ кровей отъ простуды. *Иппократъ* предписывалъ средство это внутрь и для нервическихъ ваннъ (*). Сухая трава, истертая въ порошокъ, возбуждаетъ чиханіе и облегчаетъ головную боль отъ долговременнаго насморка; склизъ, извлеченная горячею водою изъ сѣмянъ, прикладывается къ воспаленнымъ глазамъ и трещинамъ на сосцахъ: *Пленкѣ*. Летучее масло базилика, отъ головной сочувственной боли—*serhalalgia sympathica* служитъ драгоценнымъ средствомъ: *Рокѣ*.

(*) Травные сборы нервоукрѣпительные и головные—*species nervinae, serhalicae* состояются изъ равныхъ частей: базилика, мяты и шалфея, которыя въ упомянутыхъ болѣзняхъ можно пить вмѣсто чая, съ медомъ, сыропомъ, или съ сахаромъ.

Количество. 1 или 2 драхмы травы наливаютъ 4-ю унціями горячей воды, и пьютъ вмѣсто чая.—Существенное масло дается на сахарѣ отъ 3—10 капель въ день. Снаружи трава служитъ для разбивающихъ припарокъ и ароматныхъ ваннъ; истертая въ порошокъ прикладывается для разведенія отековъ;—нюхая вмѣсто табаку, уничтожаетъ долговременный насморкъ; въ цоварняхъ тоже употребляется для приправы кушанья, какъ благовонная пряность.

Примѣчаніе. Базиликъ можетъ занять мѣрь Мексиканскую—*chenopodium ambrosioides*, ваниль и гвоздику.—Такихъ же качествъ и дикій базиликъ—*thymus vulgaris et t. acinos*, I.

БАРАНЬЯ ТРАВА—*arnica montana*.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, въ южной Сибири произвольно растущее; изрѣдка находится около С.-Петербурга на влажныхъ мѣстахъ и открытыхъ лугахъ; цвѣтетъ въ іюль и августѣ мѣсяцахъ.

Качества. Баранья трава и цвѣты содержатъ въ себѣ, сверхъ остраго вещества, много смолисто-экстрактнаго, и нѣсколько существеннаго масла. Свѣжіе имѣютъ запахъ нѣсколько противный, тяжелый; высушенные—бальза-

мическій и нѣсколько пряный; растертые въ рукѣ при нюханіи возбуждаютъ чиханіе.

Вкусъ—горьковато-острый; корень тоже пряно-острый, поелику содержитъ острое начало, соединенное съ пряностію:

Сила—побуждающая, разбивающая, мочу и крови мѣсячная гонящая, потогонная; въ большомъ количествѣ—рвотная.—Корню приписываютъ укрѣпляющую, разрѣшающую, противугниlostную и отчасти рвотную силы—*subemetica*.

Употребленіе. Во всѣхъ лихорадкахъ и горячкахъ, сопряженныхъ съ слабостію жизненныхъ силъ; также въ перемежныхъ трясуцахъ, произведшихъ завалы во внутренностяхъ, и въ мокротныхъ болѣзняхъ легкаго, сопряженныхъ съ кровохарканіемъ: *Когаузенъ*, *Брункеръ*, *Колмиъ*; въ гнилой горячкѣ—*typhus*, гнилыхъ поносахъ и самой чумѣ—*pestis*, также въ антоновомъ огнѣ, послѣдовавшемъ отъ злокачественной лихорадки, похваляютъ: *Герсоніусъ*, *Штоль*, *Пленкъ*; въ ревматизмахъ, параличѣ, запорѣ мочи, помраченіи зрѣнія, послѣдовавшихъ отъ ушиба: *Бухнеръ*, *Скополи* и *Колмиъ* многими опытами подтверждаютъ; въ запорѣ мѣсячныхъ кровей, истерикѣ, спазмахъ и другихъ нервныхъ астеническихъ припадкахъ, весьма дѣйстви-

тельными средствомъ поставляютъ: *Юнкеръ, де-ла-Маршъ, Ешенбахъ и Коллинъ*.—Въ судорожныхъ болѣзняхъ и параличномъ разслабленіи членовъ—*morbiconvulsivi, paralytici: Галлеръ, Лемпфъ*.—Для разбитыхъ людей, или упавшихъ съ высокаго мѣста, и чрезъ то получившихъ кровохарканіе, чахотку, или недвижимость какихъ-либо членовъ, баранья трава съ цвѣтами почитаеся первымъ спасительнымъ средствомъ—*rapasea lapsorum: Фогель, Картейзеръ*.—*Феръ и Скополи* подтверждаютъ также цѣлебное таковое дѣйствіе многочисленными примѣрами.—Наружное употребленіе тоже одобряется въ ушибахъ, съ подкожнымъ кровоизліаніемъ сопряженныхъ, застарѣлыхъ гнилыхъ язвахъ, и помертвѣлости—*sphacelus: Меллинъ, Шведіоръ*.

Количество. Въ порошокъ даютъ отъ 5—10 и 20 гранъ съ медомъ, или лучше въ видѣ горячей наливки, полагая 1 или 2 драхмы сухихъ цвѣтовъ на 12 унцій кипячей воды, которую настоявъ, процѣдить и принимать чрезъ 2 часа по чайной чашкѣ.—Снаружи служатъ разбивающею примочкою, особенно въ багровыхъ ушибахъ—*sugillationes, et suffusiones*.—Корень дается въ порошокъ отъ 5—10 и 20 гранъ; и въ наливкѣ, полагая 1 унцію на фунтъ кипячей воды, которую даютъ три или четыре раза въ день по 2 столовыхъ ложки.

Примѣчанія. 1. Цвѣты бараньей травы и корень—*flores et radix arnicæ* m. надлежитъ употреблять всегда съ осторожностію, наблюдая, дабы больной не имѣлъ слишкомъ большаго раздраженія и полнокровія; неумѣренное же количество приѣмовъ нерѣдко производитъ жестокую рвоту, боль въ желудкѣ, тоску, рѣзъ въ кишкахъ, кровотеченіе, обмороки и проч. *Гмелинъ*, *Когаузенъ*, *Шпильманъ* — Въ приключеніи таковыхъ припадковъ, *Г. Виліе* полезнымъ противудѣйствующимъ средствомъ полагаетъ уксусъ (*).

Въ аптекахъ цвѣты бараньей травы идутъ въ составленіе грудныхъ наборовъ — *species restorales* (**).

2. Перуанскій корень калагвалы—*gab. calagvalæ, s. polypodium crassifolium* L. въ грудныхъ болѣзняхъ по опытамъ *Галлетта*, *Унцера* и *Корминати* съ бараньею травою и корнемъ оказываетъ одинаковыя дѣйствія, и по сему мы оныя природнымъ своимъ растеніемъ удобно замѣнить можемъ: *Янъ*.

3. Корень бараньей травы очень полезенъ для скота отъ кровавой мочи; истерши 8—9 малыхъ корешковъ, и наливъ кварту подогрѣтаго пива, къ

(*) *Pharmacop. castrons. Ruthena edit. 2. p. 33.*

(*) Тамъ же стр. 345.

которому прибавивъ темного коровьяго или по-
стнаго масла, давать ежедневно; отъ чего болѣзнь
эта въ скорости проходитъ: *Фрибе*.

БАРБАРИСЪ; кислица—*berberis vulgaris*, L.

Мѣсто. Деревцо, растущее въ южныхъ
странахъ Россіи и Сибири произвольно въ
лѣсахъ на сухой и песчаной почвѣ, и въ са-
дахъ вездѣ удобно разводится.

Качество. Ягоды, созрѣвшія въ глубокую
осень, имѣютъ *вкусъ* очень кислый, пріятный;
средней древесной корки—горькій; при же-
ваніи слюна дѣлается желтою.

Сила ягодъ—прохлаждающая, противугни-
лостная, корки—укрѣпляющая, красильная,—
корня и сѣмянъ слабительная.

Употребленіе. Ягоды похваляются въ
воспалительныхъ, желчныхъ и гнилыхъ лихо-
радкахъ. *Алтинъ* съ успѣхомъ пользовалъ жел-
тую горячку, сопряженную съ гнилымъ поно-
сомъ, свирѣпствовавшую въ Египтѣ поваль-
нымъ образомъ; въ кровавомъ изнурительномъ
поносѣ и цыготныхъ припадкахъ, гдѣ оче-
видно изтаеваются больнои; свѣжіе и сухіе пло-
ды, отваренные въ водѣ, употребляемой вмѣсто
питья, похваляетъ *Паумъ*.—Корка полезное
дѣйствіе оказываетъ въ желтухѣ, теченіи бѣли,

и водяной болѣзни: *Клузій, Фонз-Свитенъ, Рай, Пейриль.*

Качество. Выжатаго сока изъ ягодъ 2 или 3 унціи полагаютъ на полкружки воды; сухія ягоды варятъ такъ, какъ и кислыя вишни, въ похлебкахъ, составляющихъ для больныхъ здоровую пищу.—Корка по 1 унціи употребляется въ водяной наливкѣ или въ винномъ настоѣ, съ 12 унц. жидкости.

Въ аптекахъ готовятъся:

Варенье и сиропъ барбарисовый.—*goob et syrup. berberum* (*), которые тоже одобряются въ горячкахъ, поносахъ и цынгѣ, для утоленія жажды и несноснаго жара.

Количество. Примѣшиваютъ къ питью, или къ другимъ приличнымъ лекарствамъ отъ 1—2 унцій.

Примѣчанія. 1. Барбарисный сокъ въ медицинѣ и экономіи можетъ совершенно замѣнить лимонный, и потому многіе употребляютъ для приправы кушанья, въ желе и въ пуншѣ.—1 часть этого сока, 2 части сахару, 3 араку и 6 частей горячей воды составляютъ пріятный пуншъ: *Фрибе.*—Изъ ягодъ готовятъ хорошій уксусъ и водку.

(*) Pharmacop. Rossica N. K. p. 241, 258.

2. Барбарисная корка и корень окрашиваютъ дерево и кожу желтымъ цвѣтомъ, которые на Терекѣ изрубивъ сушатъ, и продаютъ для крашенія бумаги, шелка и сафьяна: *Севергинъ*.

3. Многіе собираютъ листья и пьютъ сушеные вмѣсто чая.—Сушеный корень полкуютъ и, размѣшавъ въ теплой водѣ, даютъ скоту пить отъ мыта: *Мейеръ*.

БЕДРЕНЕЦЪ КАМЕНИСТЫЙ, или ЧЕРНОГОЛОВНИКЪ; КАМНОЛОМЪ,—*priminella saxifraga*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, во всей Россіи произвольно растущее по сухимъ и гористымъ лугамъ, около Петербурга: на Поклонной горѣ, на Пулковской, и вездѣ въ подобныхъ мѣстахъ.

Качества заключаются въ смолисто-остромъ началѣ корня; *вкусъ* довольно-острый, горячительный, зависящій отъ летучаго масла.

Запахъ—свѣжаго корня благовонный.

Сила—разводящая густыя мокроты, разбивающая застой влаги, желудочная, потъ, мочу и мѣсячныя крови гонящая.

Употребленіе. Въ мокротныхъ болѣзняхъ легкаго и желудка, мокротной жабѣ, расслабленіи гортаннаго язычка, отвращеніи отъ пищи, удушѣ, долговременной хрипотѣ, запорѣ

кровей, истерикъ, и въ другихъ маточныхъ припадкахъ одобряютъ: *Шталь*, *Гофманъ*; въ припадкахъ, бывающихъ послѣ ртутнаго продолжительнаго леченія, и для изгнанія оставшагося ртути—*hydrargyrum* въ тѣлѣ, одобряютъ *Беррихii* и *Шульцъ*.

Количество. Въ порошокъ рѣдко дается до 20 гранъ, чаще употребляется въ видѣ водяной наливки, полагая 2 драхмы корня на 8 унцій кипячей воды; или тоже количество настаиваютъ въ 4 унціяхъ вина.—Водяная наливка служитъ также полосканьемъ въ упомянутыхъ болѣзняхъ; для сего намѣренія примѣшивать можно по равной части шалфей, ромашку, или бузиновый цвѣтъ.

Примѣчаніе. Траву эту ѣсть всякая скотина безвредно.—Въ домоводствѣ бедренцовую гонятъ водку, и употребляютъ корень на приправы.—Коровы получаютъ отъ этого растенія умноженіе молока.—Крестьяне, отваривъ траву съ корнемъ въ пивѣ, пьютъ отъ весенней лихорадки.

БЕДРЕНЕЦЪ ЧЕРНЫЙ—*rimpinella magna*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, по всей Россіи произвольно растущее на сухой почвѣ, также при рѣкахъ: Окѣ, Сурѣ, Волгѣ, Уралѣ и въ Сибири.

Качества — содержатся въ летучемъ масле корня.

Запахъ — пріятный; *вкусъ* — сладковатый и нѣсколько пряный.

Сила, подобная предыдущему бедренцу; притомъ почитается очищающею и ранозлительною.

Употребленіе. Въ чревныхъ завалахъ, водяной болѣзни, въ непомѣрныхъ кровотеченияхъ, особливо почечуйныхъ: *Краниъ*. Въ одышкѣ, ножныхъ водяныхъ отекахъ, шелудяхъ головныхъ или паршахъ — *тinea*, венерической опухоли ядеръ и рожъ, превратившейся въ язвы — *erysipelas exulceratum*: *Пленкъ*.

Количество. Полудрагмы толченаго корня, смѣшавъ съ медомъ, даютъ въ видѣ каши; либо 2 драгмы наливаютъ 8 унц. кипячей воды; травы 2 щепоти тоже наливаютъ 6 унц. горячей воды, которую настоявъ пьютъ вмѣстѣ съ чаемъ. — Свѣжее толченое растеніе прикладывается къ чистымъ ранамъ; сухимъ порошкомъ присыпаютъ раковыя язвы и другія, бывающія послѣ худыхъ нарывовъ.

Примѣчанія. 1. На Волгѣ, Уралѣ и въ Сибири жители пользуются этимъ растеніемъ въ упомянутыхъ болѣзняхъ; весной молодые листочки ѣдятъ вмѣсто салата: *Фалькъ*.

2. Овцы тоже пожираютъ оное, и тѣмъ въ своей худобѣ поправляются; но быки и лошади не трогаютъ: *Швеберъ*.

3. Растеніе это и выше писанное, по наблюденіямъ Яна, съравною пользою употребляютъ вмѣсто виргинской сенеги—*polygala senega*.

БЕЗВРЕМЕННЫЙ ЦВѢТЬ; ОСЕННІЙ ЦВѢТЬ; ЛУГОВОЙ ША-
 ФРАНЪ—*colchicum autumnale*, l.

МѢСТО. Растеніе многолѣтное, близъ Терека и въ другихъ мѣстахъ, по сырой глинистой почвѣ расущее.

Качества зависятъ отъ остраго начала; *запахъ* свѣжаго корня тяжелый, въ лѣтнее время отзывающійся козлинымъ; разрѣзаннаго: острый, раздражающій обояніе и дыханіе; сухой корень сходствуетъ съ морскимъ лукомъ—*scilla maritima*, l.

Вкусъ—острый и долго остающійся на языкѣ; но осенью дѣлается гораздо слабѣе и нѣсколько мучящій. Слишкомъ старый корень и безсочный вовсе недѣйствителенъ.

Сила—усыпительная, жестоко слабящая—*drastico-cathartica*, мочегонительная, иногда же рвотная; въ большомъ количествѣ—ядовитая!
Фонъ Свитенъ.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ разнородныхъ водяныхъ болѣзняхъ и отеклыхъ опухоляхъ, уду-

шьѣ, чревныхъ завалахъ, желтухѣ и жженіи мочи, или мочерѣзѣ: *Герицъ*, *Штеркъ*, *Колминъ*, *Планшонъ*. По наблюденіямъ *Штолля*, безвременный цвѣтъ гораздо тише дѣйствуетъ, нежели морской лукъ; *Обертейферъ* тоже замѣчаетъ: когда больной не можетъ терпѣть морскаго лука, или гдѣ оный употребляется безъ пользы, тамъ съ лучшимъ дѣйствіемъ можно замѣнять безвременнымъ цвѣтомъ. Турки винною настойкою цвѣтовъ этого растенія упиваются до безумія: *Кранцъ*.

Количество. Въ порошокъ рѣдко даютъ сухой корень по 1 грану; часто же употребляется настоянный въ хорошемъ ренскомъ уксуѣ—*acetum vini*, полагая одну часть корня на 6 частей крѣпкаго уксуу, который настоявъ въ тепломъ мѣстѣ чрезъ 3 дни, и процѣдивъ жидкость съ выжимкою, можно давать: отъ 1—2 и 4 драхмъ въ приличныхъ микстурахъ. Прибавленіемъ 2 частей меда на 1 часть уксуа, и поваривъ на легкомъ огнѣ до густоты сиропа, получишь: *уксомедъ кольхичный*—*oxmel colchicum* (*), который въ упомянутыхъ болѣзняхъ дается отъ 2—3 и 4 драхмъ въ приличныхъ декохтахъ, вмѣсто морсколуковаго уксомеда.

Примѣчанія. 1. Средство это, т. е. корень безвременнаго цвѣта—*radix colchici*, такъ

(*) *Rharmacop. Rossica*, p. 175, 233.

какъ онъ имѣеть ядовитое свойство, употребляютъ внутрь съ большою осторожностію! *Гаридель, Шьеръ и Галлеръ* приводятъ многіе несчастные примѣры отъ неблагоразумнаго употребленія оваго корня. Случившіеся жестокіе припадки отвращаются рвотными средствами, и парнымъ молокомъ;—уксусъ и другія кислоты растений тоже много помогаютъ.

2. Сушеніемъ теряется острота. Корень этотъ содержитъ въ себѣ много мучнаго или крахмальнаго вещества, которое извлекается предложеннымъ способомъ при описаніи калужницы, или хлѣбницы болотной—*calla palustris*, l.

3. Средство это по одинакимъ качествамъ и дѣйствию съ морскимъ лукомъ—*scilla m.* можетъ оный совершенно замѣнить: *Пеириль*.

БЪЛЕНА—*hyosciamus albus*, l.

Мѣсто. Растеніе однолѣтное и двулѣтное, въ южной Россіи и вездѣ дико растущее.

Качества, польза и употребленіе—слѣдующей бѣлены; но касательно усыпительнаго свойства тише дѣйствуетъ.

Въ аптекахъ готовится:

ЭКСТРАКТЪ ИЛИ СГУЩЕННЫЙ СОКЪ БЪЛЕНА—*extract. s. succus spissat. h.* (*) хорошъ

(*) *Pharmacop. castrens. R. p. 362.*

въ начальной слѣпотѣ, называемой глазнымъ подтекомъ—*cataracta incipiens*: *Соважъ*; но гораздо лучшее дѣйствіе оказываетъ въ соединеніи съ сладкою ртутью—*mercur. dulcis, s. murias hydrargyri oxudulat*: *Молинелли, Муррай*; въ судорожномъ кашлѣ рекомендуютъ *Штоль и Гельвецій*.

Количество. Дается въ пилюляхъ отъ 1—5 гранъ. *Пленкъ* замѣчаетъ, что пріемъ этого экстракта начинать должно отъ $\frac{1}{2}$ грана, и умножать исподволь, пока не будетъ чувствуема сухость въ горлѣ, или въ ноздряхъ. Полосканье, приготовляемое изъ сушеныхъ листовъ бѣлены и маковыхъ незрѣлыхъ головокъ, утоляетъ зубную боль, отъ гнилой порчи зубовъ оказавшуюся: *Саполовичъ*.

БѢЛЕНА ЧЕРНАЯ, или БЛЕКОТА—*hyosciamus niger*.

Мѣсто. Растеніе двулѣтнее, растущее произвольно во всей Россіи по каменистымъ мѣстамъ, по старымъ развалинамъ, въ огородахъ, около заборовъ, и по дорогамъ.

Качества ядовитыя, содержимыя въ усыпительномъ началѣ.

Запахъ свѣжихъ листовъ тоже усыпительный, противный; толченыхъ—табачный.

Вкусъ слабый, едва островатый.

Сила усыпительная, утѣляющая боль, противусудорожная, отверзающая, разбивающая, и во многихъ случаяхъ замѣняющая опій (сонное зелье); что дѣйствуетъ, не причиняя раздраженія въ тѣлѣ, волненія въ крови, и запоровъ на низъ. Въ неумѣренномъ количествѣ—ядовитая и временное бѣшенство наводящая!

Употребленіе. Внутрь одобряется въ параличѣ, меланхоліи, сумашествіи, судорогахъ, застарѣлой головной боли, головокруженіи, падучей болѣзни, трепетаніи сердца, истерикѣ, свинцовой коликѣ, кровотеченіяхъ, послѣдовавшихъ отъ раздраженія, и въ болѣзненной раздутости почечуйныхъ шишекъ: *Штеркъ, Коллинъ, Геснеръ, Виттъ*; во всѣхъ судорожныхъ припадкахъ, гдѣ опій отмѣнную приноситъ пользу, бѣлена имѣетъ особенное преимущество по вышеупомянутому ея дѣйствию: *Кулленъ*. Снаружи, свѣжіе толченые листы, смѣшанные съ виннымъ саяомъ на подобіе мази, прикладываются для разведенія золотушныхъ опухолей, скиррныхъ, раковыхъ, и раздутыхъ почечуйныхъ шишекъ. Вареные въ молокѣ и съ мякотью бѣлаго хлѣба составляютъ полезную припарку—cataplasma: въ воспалительной грудницѣ, отъ створожившагося молока послѣдовавшей, въ ломотныхъ опухоляхъ членосоединеній, затвердѣніи

ядеръ, и для утоленія конвульсій, бывающихъ при поврежденіи нервъ: *Бруссе, Ренардъ, Турнефортъ*. Порошокъ истертыхъ сухихъ листовъ, тоже дѣйствителенъ для присыпки застарѣлыхъ нечистыхъ язвъ; въ рожѣ воспалительной и въ язвы превратившейся, хвалить *Пленкъ*.

Количество. Въ порошокъ съ сахаромъ, или солодковымъ корнемъ, начиная отъ $\frac{1}{2}$ грана до 1, можно давать взрослымъ три раза въ день, и мало по малу возвышать пріемъ до 10 гранъ; привыкшіе и сумасшедшіе могутъ безвредно сносить большіе пріемы, младенцамъ особенно въ дѣтскомъ родимчикѣ—*esclampsia infantum*, и судорожномъ удушливомъ кашлѣ—*tussis ferina s. convulsiva*, дается $\frac{1}{4}$ грана сгущеннаго сока.

Надежнѣе же внутрь употребляется приготовляемый въ аптекахъ *экстрактъ бѣлены*, о которомъ было упомянуто выше. Принимать, какъ сказано тамъ же, (т. е. отъ 1—5—10—15 и 20 грановъ). Для *настойки*—*tinctura hyosciami n.* (*) полагается 1 унція сухихъ листовъ бѣлены на 8 унцій двойной водки, или спирта, которую по прошествіи 7 дней процѣдить, и хранить для употребленія. Она силою своею не уступаетъ дѣйствию опія.

(*) Pharmacop. castrens. 'R. p. 376.

Количество. Внутрь дается отъ 20—60 капель, и во многихъ наружныхъ болѣзняхъ употребляется вмѣсто настойки опія: *Вилліе*.

Примѣчанія. 1. Опытами дознано, что большіе приемы бѣлены для людей и скотовъ смертоносны. *Галлеръ* приводитъ многіе несчастные примѣры лишившихся жизни, по невѣдѣнію ядовитаго свойства бѣлены. Покойный профессоръ *Соболевскій* тоже подтверждаетъ опасность этого страшнаго яда примѣромъ, случившимся въ С.—Петербургѣ на Аптекарскомъ острову въ Ботаническомъ саду (*), когда по незнанію работницы вмѣсто настернака наѣлись корня бѣлены.

2. Окуриваніе, употребляемое чернью листьями или сѣмянами бѣлены, для утоленія зубной боли тоже опасно; ибо нерѣдко причиняетъ головокруженіе, бредъ и рвоту. Самое испареніе бѣлены столь вредно, что будучи положено въ банѣ, причиняетъ людямъ временное сумасшествіе и суточный сонъ. На этомъ основаніи цыгане куреньемъ бѣлены усыпляютъ куръ, и такимъ образомъ ихъ крадутъ.—Свиньи, наѣвшись этого корня, получаютъ сведеніе ногъ или волочатъ задъ. Сѣменами и корнемъ бѣлены можно травить мышей. Въ лѣтнее время, натирая свѣжею травою или отваромъ

(*) См. Санкт-Петербургскую Флору. 1801 г. Ч. I. стр. 120,

оной лошадей и рогатый скотъ, можно избавлять ихъ отъ плотоядныхъ мухъ и слѣпней: *Фрибе*.

3. Лучшія противудныя средства суть: уксусъ или клюковный сокъ; свѣжее масло; парное молоко; рвотное; слабительные клистиры и ванны.

4. Экстрактъ черной бѣлены, по свойству и дѣйствию, ближе всѣхъ наркотическихъ средствъ подходитъ къ опию; почему многіе врачи съ хорошимъ успѣхомъ и замѣняютъ оный бѣленою.

БѢРЕЗА—*betula alba*, L.

Мѣсто. Дерево, во всей Россіи не рѣдко растущее по лѣсамъ, прилѣскамъ и садамъ.

Качества. Молодые листы и зеленая корка *запахъ* имѣютъ бальзамическій; *вкусъ* горьковатый.

Силу—разводящую мочегонительную, очищающую и потогонную.

Употребленіе. Въ наливкѣ съ горячею водою одобряютъ листы, въ простудныхъ припадкахъ, цынготной ломотѣ, въ чесоткѣ и другихъ сыпяхъ, зависящихъ отъ нечистоты крови; снаружи крѣпкимъ отваромъ бѣрезовыхъ листьевъ тоже омывають нечистыя сыпи, припариваютъ водяныя и ломотныя опухоли; отваръ средней горьковатой корки полезенъ въ перемежныхъ лихорадкахъ и худосочныхъ язвахъ. Смолистыя почки, собранныя весною,

и настоянныя въ винномъ спиртѣ или водкѣ, составляютъ домашній ранозѣлительный бальзамъ.

Количество. 2 унціи листовъ или корки наливаются 3 фунтами воды, которую кипятить должно, пока останется 2 фунта отвара. На *пріемъ* давать по чайной чашкѣ нѣсколько разъ въ день; въ видѣ сухой припарки нагрѣтые листы прикладываются къ рожѣ.

Бѣрезовый сокъ—*lympha betulae*, весною выпускаемый просверливаніемъ дерева, имѣетъ сладковатый *вкусъ*; *силу* мочегонительную и противоцинготную.—Употребляется въ чесоткѣ, отъ песка въ мочевыхъ путяхъ, и мелкихъ глистовъ—*ascarides*: *Фонъ Гельмонтъ*.

Количество. Пьютъ по стакану натощакъ, продолжая нѣсколько недѣль и наблюдая приличную діету, какъ обыкновенно совершается весеннее леченіе, служащее къ поправленію соковъ; ежедневное умываніе лица этимъ сокомъ, не вытирая онаго, очищаетъ пятна: *Соболевскій*.

Бѣрезовое масло — *oleum betulinum*, иначе называемое чистымъ дегтемъ, *запахъ* имѣетъ непротивный; *вкусъ* масляно-островатый.

Силу—разбивающую, противуглистную, ранозѣлительную.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Отъ глистовъ, въ мочевыхъ припадкахъ, слѣпотѣ, раздутымъ поче-

чуѣ, раковыхъ, червивыхъ, и другихъ злокачественныхъ язвахъ, внутрь и снаружи рекомендуютъ *Ланге*, *Риснеръ*, *Пурманнъ*.

Внутрь, по методу *Штолля*, предписывается слѣдующимъ образомъ: возьми свѣжаго бѣрезоваго сока—*lympha betulae*, и дегтярной воды—*aqua rosea* (*) по 1 фунту; смѣшавъ, взрослый человѣкъ можетъ это количество ежедневно въ раздѣленныхъ приемахъ употреблять, для очищенія накожныхъ сыпей, золотухи, шолудей и проказы.

Чистый деготь, смѣшавъ съ бараньимъ или свинымъ саломъ по равной части, составляетъ мазь для бѣдныхъ, замѣняющую какъ базильную, такъ и дигестивную мази, которая при томъ истребляетъ дурныя кожныя сыпи и нечистыя пятна (**).

Примѣчанія. 1. Молодые бѣрезовыя почки даютъ перегонкою пріятное и здоровое масло, подобное копайскому бальзаму, коего свойства вышеупомянуты; изъ березовыхъ шишекъ можно вываривать родъ смолы, подходящей къ воску, изъ которой съ малою прибавкою сала можно дѣлать свѣчи.—Молодые листья служатъ здоровымъ кор-

(*) *Pharmacop. Bossica*, p. 190 и въ *Медико-хирург. Мат. мед. Кашинскаго*, ч. II, стр. 415.

(**) *Медико-Хирург. Мат. мед. Кашинскаго*, ч. II, стр. 416.

момъ овцамъ и козамъ; а съ квасцами даютъ желто-зеленую постоянную краску, годную для шерстяныхъ и полотняныхъ матерій.—Лежащая подъ бѣрестю корка употребляется на дубленіе кожъ; изъ бересты выгнанное черное масло или деготь служить домашнимъ средствомъ для излеченія паршивой скотины, или самой сильной чесотки; намазываніе дегтемъ служить также для очищенія и заживленія червивыхъ язвъ.—Внутренняя красноватая кора идетъ на дубленіе кожъ.

2. Бѣрезовыя дрова выгодны для топленья печей, потому что даютъ много жару, и угли долго остаются раскаленными (*).—Сажа изъ бѣрезовыхъ дровъ употребляется въ составъ типографскихъ чернилъ; зола даетъ много поташу и проч.

3. Изъ бѣрезоваго соку готовятъ напитокъ, подобный виноградному вину (**), о которомъ

(*) О врачебной пользѣ чистаго древеснаго угля—*carbō ligni*, см. при описаніи лицы—*tilia e.*

(**) См. Секретный экзномъ С. П. б. 1809, ч. I стр. 92. Или на 20 штофовъ свѣжаго сока, полагается 8 фунтовъ сахару, и варить, пока укипитъ 4 часть, снимая пѣну, потомъ, процѣдивъ тепловатую жидкость, влить въ боченокъ, которую заквасить 3 столовыми ложками чистыхъ свѣжихъ дрождей; когда начнетъ броженіе, прибавить 4 штофа хорошей французской водки и 4 лимона, тонко изрѣзанные, безъ зеренъ; по окончаніи броженія, закупоривъ неполный сосудъ, поставить на 4 недѣли въ погребъ.

см. при описаніи клена—асег р. Изъ онаго же дѣлають многіе уксусъ, и курять вино;—въ Камчаткѣ жители, оскобля корку у сыраго дерева, рубять мелко на подобіе лаши, и ѣдятъ оную съ сушеною икрою.—Этою же коркою квасятъ и бѣрезовый сокъ, который бываетъ отъ оной кислѣе и пріятнѣе.

блоница ѣдкая—erigeron asce, 1.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, въ умѣренной Россіи растущее на сухихъ лугахъ и возвышенныхъ лѣсистыхъ мѣстахъ, на островахъ Невы рѣки, на Поклонной горѣ, въ Паргаловѣ, и въ другихъ подобныхъ мѣстахъ.

Качества. Трава имѣетъ *вкусъ* острой, подобный горчицѣ.

Силу—побуждающую, противуцинготную.

Употребленіе. Свѣжая трава полезна въ цингѣ, употребляется въ видѣ салата, или консервы; снаружи, толченую и подогрѣтую съ коровимъ не соленнымъ масломъ, или съ какимъ-нибудь саломъ и мукою, прикладываютъ для назрѣванія твердыхъ нарывовъ, или разныхъ болячекъ и чирьевъ: *Соболевскій*.

Потомъ это искусственное вино слить въ бутылки и засмолить, наблюдая, чтобы не были совершенно полные иначе перелопаются: Фрибс.

БОБОВНИКЪ; КАЛМЫЦКІЕ ОРЪХИ, ДИКІЙ МИНДАЛЬ—
amygdalus nana, l.

Мѣсто. Дерево въ южныхъ странахъ Россіи и Сибири произвольно растущее: на поляхъ, въ Астраханскихъ степяхъ, также при Волгѣ, Донѣ и около Азова.—Въ Петербургѣ тоже удобно разводится.

Качества. Орѣхи содержатъ въ себѣ тучное постоянное масло—*oleum unguinosum*; *запаху* не имѣютъ; *вкусъ* горьковатый.

Сила—питательная, притупляющая остроты, смягчительная.

УПОТРЕБЛЕНІЕ—въ видѣ эмульсіи, при ранахъ, сопровождаемыхъ лихорадкою—*febris vulnegrata*, въ воспалительныхъ болѣзняхъ, мочеѣзѣ или жженіи мочи, припадкахъ почечныхъ, или мочеваго пузыря, отъ каменной болѣзни, и въ кровотеченіи отъ сильнаго волненія крови. Выжатое масло даютъ: въ сухомъ кашлѣ, перхотѣ, почечныхъ боляхъ, мочеѣзѣ, боляхъ послѣ родовъ, спазмахъ и коликахъ судорожныхъ, дѣтскомъ родимчикѣ, и отъ глистовъ: *Карпинскій*.

Количество.—2 унціи очищенныхъ орѣховъ растираютъ въ свѣжей чистой водѣ, мало по малу прибавляя оной до 2 фунтовъ съ половиною;—съ прибавленіемъ 1 или 2 драхмъ селитры, миндальная эмульсія болѣе холодить

и утоляетъ жажду. Свѣжее миндальное масло можно принимать по нѣскольку столовыхъ ложекъ.

Примѣчанія. 1. Бобовникъ можетъ дѣйстви-тельно замѣнить горькій и сладкій миндаль—*amygdalus communis dulcis et amara*, вмѣсто которыхъ у насъ въ аптекахъ часто употребляется. См. эмуль-сію миндальную—*emulsio amygdalarum* (*).

2. *Выжатое* или *битое* масло калмыцкихъ орѣховъ—*ol. express. a. papae*, готовится какъ миндальное *oleum amygdalarum* (**). Польза и употребленіе оныхъ сказаны выше. Съ сими толчеными ядрами можно гнать водку, подобную персиковой. Выжатое тучное масло, въ несчастныхъ случаяхъ, отъ поглощенія острыхъ минераль-ныхъ ядовъ, служитъ наилучшимъ средствомъ.

БОБЫ ПРОСТЫЕ—*vicia faba*, I.

Мѣсто. Растѣніе однолѣтнее, во всей Рос-сіи въ огородахъ и полямъ ежегодно насажи-ваемое.

Качества. Цвѣтовъ свѣжихъ *запахъ* бла-говонный; *вкусъ* зеленыхъ бобовъ сладковатый; сухихъ—мучной.

(*) Pharmacop. Rossica, p. 208.

(**) Pharmacop. Rossica, p. 231.

Сила—воды, перегнанной съ бобовыми цвѣтами, притирательная, или очищающая лицо—cosmetica; зеленыхъ бобовъ: питательная, но притомъ вѣтры раждающая—flatulenta; поташъ, выщелоченный изъ золы бобовыхъ стволовъ и листьевъ, имѣетъ мочегонительную и камене-разбивающую—lithontriptica: *Бартолиъ*, *Герснеръ*; бобовая мука: питательную, разводящую, смягчительную.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Вареные бобы *Діоскоридъ* хвалятъ для людей слабогрудыхъ и кашляющихъ; съ прибавленіемъ перца или иной пряности, *Пауль* этимъ средствомъ пользовалъ долговременный поносъ.—Бобовая мука, нагрѣтая, прикладывается вмѣсто сухой припарки къ рожѣ—fomentum siccum, опухоли грудной, ядеръ и мошонковой водяной грыжѣ—hydrocele; вареная съ водою или молокомъ, составляетъ смягчительную катаплазму, прикладываемую для назрѣванія воспалительныхъ опухолей, абсцессовъ (нарывовъ) и проч., съ прибавленіемъ равной части льняной муки—farina sem. lini, составляется лучшая *мягчительная*, или *домашняя припарка*—cataplasma emolliens, v. domesticum (*).

БОБЫ ТУРЕЦКІЕ, или ФАСОЛЬ—phaseolus vulgaris, l.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, вездѣ огородное.

(*) Pharmacop. castrens., R. p 230.

Качества имѣютъ предыдущихъ бобовъ:— фасоль содержитъ большое количество мучнаго вещества, соединеннаго съ малою частію экстрактаго.

Сила тоже питательная, но менѣе вѣтры раждающая: *Иппократъ*.

Употребленіе.—Зеленые молодые стручки, вареные въ супѣ, составляютъ здоровую пищу; съ этою цѣлю и въ прокъ оныя заготовляютъ, посоливъ и прибавивъ для пряности чеберъ—*satureia hortensis*, сухіе бобы и мука изъ оныхъ употребляются такимъ же образомъ, какъ и предыдущіе; съ медомъ замѣшанная лепешка служитъ для созрѣванія или нагноенія вередовъ: *Менхъ*; выщелоченная зола, или поташъ изъ стеблей и стручковъ, тоже полезны въ каменной болѣзни—*lithiasis*: *Линней*.

Примѣчаніе. Повѣйшіе опыты подтверждаютъ, что щелочная соль растений и ископаемыхъ—*sub-carbonas potassae et sodae*, составляютъ лучшія каменоразрѣшающія средства; ибо и самой химическій анализъ насъ удостовѣряетъ, что моча, избыливающая собственною кислотою—*acidum uricum*, въ соединеніи съ земляными частицами, образуетъ камень; но какъ оная мочева кислота большее средство имѣетъ со щелочными солями, нежели землею, то по сему и не удивительно, что очи-

щенная зола растений или поташъ—*cineres clavellati depurati*, растворяетъ камень въ мочевыхъ путяхъ, изгоняя оный въ видѣ дресвы, или песка (*).

Калборновъ методъ приготовления щелочно-углекислой воды—*aqua therpitica alcalina*, полезный въ каменной болѣзни, основывается тоже на вышеупомянутомъ химическомъ разложеніи (**).

Щелочная вода, пресыщенная углекислымъ газомъ—*aqua supercarbonatis sodae* тоже весьма дѣйствительна въ каменной болѣзни (***) . Воду эту ежедневно принимаютъ отъ $\frac{1}{2}$ до 1 фунта въ сутки; пилюли: по 2, 3 и 4, три раза въ день: *Willie*.

БОЖІЕ ДЕРЕВО—*artemisia abrotanum*, l.

Мѣсто. Полукустарникъ, въ Сибири произвольно растущій; въ полуденныхъ странахъ Россіи по горамъ тоже находится дикое, и въ садахъ вездѣ разводится.

Качества—хорошія, зависящія отъ существеннаго масла и экстрактаго начала;

(*) *Observationes medico-practicae sistentes Lithiaseos curam analyticam*, M. 1803, elaboratae a J. R.

(**) См: способъ составлять минеральныя цѣлительныя воды, стр: 113, 140.

(***) *Pharmacop. castrens. R. p. 224, 307.*—О слухъ средствъ упомянуто было на стр. 39—46.

запахъ свѣжей и сухой травы благовонный, пріятный; *вкусъ*—горьковато-пряный.

Сила—побуждающая, желудочная, отверзающая, мѣсячногонная, промывательная, разбивающая, противугнилотная.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ слабости желудка и трудномъ пищевареніи—*dyspersia*, худосочіи, запорѣ мѣсячныхъ кровей и теченіи бѣли; въ мокротныхъ припадкахъ легкаго, и отъ круглыхъ глистовъ—*lumbrici*, рекомендуютъ *Иппократъ*, *Галенъ*, *Етмюллеръ*.—Снаружи въ видѣ припарки и присыпки для разведенія багровыхъ ушибовъ, въ гнилыхъ язвахъ и антоновомъ огнѣ: *Пленкъ*.

Количество. 1 унція травы наливается 4 унціями горячей воды или вина;—снаружи свѣжая и сухая трава служитъ для разбивающихъ припарокъ, или ароматныхъ ваннъ.

Для этого же намѣренія въ аптекахъ приготавливаютъ: *зборы разрѣшительныя*—*species resolventes, s. aromaticae* (*).

Примѣчанія: 1. Киргизцы разминаютъ свѣжіе листья этого растенія, и смѣшиваютъ съ растопленнымъ бараньимъ саломъ, для составленія универсальной ранозѣлительной мази.

2. Сушеное кладутъ между платя для сбереженія отъ моли; равнымъ образомъ въ баняхъ и

(*) Pharmacop. Rossica, p. 248, et castrens. R. p. 346.

въ умываньѣ ногъ употребляютъ; крѣпкимъ отваромъ обливая стѣны, истребляютъ клоповъ.

3. Сушенныя верхушки, истерши въ порошокъ, даютъ съ овсомъ по горсти лошадямъ, продолжая цѣлый мѣсяцъ: отъ загрубенія железъ, и предохраненія отъ падежа, или заразительныхъ болѣзней:
Фрибе.

БОРЩЪ ШИРОКОЛИСТНЫЙ, или МЕДВѢЖЬЯ ЛАПА;
СЛАДКАЯ ТРАВА—*heracleum sphondylium*, L.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, во всей Россіи произвольно растущее по рощамъ и плодovitымъ лугамъ, также вездѣ въ садахъ, огородахъ и на поляхъ.

Качества. Корень имѣеть *вкусъ* сладковато-клейкій, нѣсколько-пряный, приторный; трава—сладковато-клейкій.

Сила—мягчительная, притупляющая.

Употребленіе. Въ Польшѣ траву и корень этого растенія нѣкоторые съ успѣхомъ употребляютъ отъ колтуновъ—*plisa polonica*; прикладываютъ также толченныя листы къ ожогамъ, и для заживленія свѣжихъ ранъ.—Молодую траву варятъ въ кушаньѣ, и вмѣсто шпината, которое можетъ служить пріятнымъ лекарствомъ, очищающимъ внутренности, и поправляющимъ острыя влаги.—По свидѣтельству

Гмелина, Сибирскіе жители гонятъ изъ этой травы простое вино и водку.

Количество. Полъ-унціи корня варятъ въ 8 унціяхъ воды, пока останется полфунта жидкости; для наливки полагаются 2 щепотки травы на унц. кипячей воды: снаружи прикладывается, какъ выше сказано.

Примѣчаніе. Траву эту ѣсть охотно всякая скотина; лошади не много. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи изъ этого растенія готовятъ водку: 100 фунтовъ однолѣтнихъ стволѣвъ даютъ 25 ф. довольно крѣпкой горѣлки. Въ Литвѣ дѣлаютъ для лѣта прохладительное питье, называемое борщемъ; листья, прибавляя къ пиву, доставляютъ оному пріятный вкусъ. Камчадалы и другіе Сибирскіе жители извлекаютъ изъ сего растенія сахаръ.

БРУСНИКА, или БРУСНИЦА—*vaccinium vitisidaea*, l.

Мѣсто. Растеніе, малымъ кустарникомъ растущее въ умѣренной Россіи, вездѣ въ лѣсахъ и сухихъ борахъ, также по открытымъ и гористымъ мѣстамъ.

Качества. Зрѣлыя свѣжія ягоды *вкусъ* имѣютъ пріятно-кислый.

Сила—холодящая, хорошо утоляющая жажду, противугниlostная, ободряющая; листьямъ брусничнымъ приписываютъ такое же дѣй-

ствіе въ каменной болѣзни, какъ и толокнянкѣ—*arbutus uva ursi* L.

Употребленіе. Въ горячкахъ и воспалительныхъ лихорадкахъ выжатый сокъ даютъ съ водою вмѣсто питья; также въ цынгѣ и гнилыхъ поносахъ брусничное варенье—*goob bass. v. vits ideae* многимъ пособляетъ. Паренныя ягоды въ собственномъ соку, и смѣшанныя съ толокномъ и медомъ, очень полезно кушать въ чахоткѣ и кровохарканіи: *Соболевскій*.—Листы, по своему вяжущему свойству, въ отварѣ употребляемые, служатъ отъ простаго и кроваваго поноса, а по мнѣнію нѣкоторыхъ и отъ каменной болѣзни (*).

Количество—2 унціи выжатого сока смѣшиваютъ съ 2 фунтами холодной воды для обыкновеннаго питья; такимъ образомъ даютъ больнымъ сиропъ и варенье.—Листовъ въ порошокѣ полдрахмы, 3 раза въ день; 2 драхмы полагаются на 8 унцій воды для отвара, который кипятить, пока останется полфунта жидкости, ежедневно принимаемой 3 раза въ день по 2 унціи.

Прочее домашнее употребленіе брусники всеѣмъ извѣстно.—Въ Сибири приготавливаютъ изъ ягодъ брусницы довольно пріятный винный напитокъ, который пѣнится подобно шампан-

(*) Его-же С. П. Б. Флора, ч. I. стр. 270.

скому, и нѣсколько лѣтъ сохраняется безъ порчи: *Георгій*. Листы могутъ служить вмѣсто чернаго чаю;—цѣлое растеніе употребляется для дубленія кожъ: *Фрибе*.

БУДРА ПОЛЗУЧАЯ, ИЛИ ПЛЮЩИКЪ, КРОТОВИКЪ, ДУШИСТЫЯ КУДРИ—*glecoma hederacea*, 1.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, во всей Россіи и Сибири не рѣдкое, растущее около пашней, огородныхъ и садовыхъ заборовъ, близъ Петербурга: на поляхъ Красносельскихъ, Стрелинскихъ и островахъ Невы рѣки.

Качества. Трава растертая имѣетъ *запахъ* крѣпкій, пріятный; *вкусъ*: горьковатый и нѣсколько пряный, зависящій отъ летучаго масла и смолистаго экстракта.

Сила—отверзающая, грудная, укрѣпляющая мочу, гонящая, раноцѣлительная.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ застарѣлой простудѣ—*catharrhus atonicus*, упорномъ кашлѣ, мокротной чахоткѣ и кровохарканіи, одобряютъ: *Вельтъ*, *Мортонъ*; въ дѣтской сухоткѣ, накопленіи песку въ мочевыхъ путяхъ, и въ водяной болѣзни: *Паули*, *Рейснеръ*, *Этмюллеръ*.—Въ желтяницѣ и коликѣ, въ видѣ чая пьютъ съ медомъ; въ каменной болѣзни: *Муррай*; снаружи свѣжая толченая трава прикладывается

къ цынготнымъ ранамъ и другимъ гнилымъ язвамъ съ большою пользою: *Соболевскій*.

Количество. Выжатый сокъ, особенно весною употребляемый, даютъ по 1 унціи дважды въ день; сухой травы въ порошокъ, или въ видѣ каши съ медомъ, до полудражмы; для наливки полагается щепоть травы на 4 унціи кипячей воды.—Снаружи крѣпкая настойка служитъ для смыванія и примочки упомянутыхъ ранъ.

Въ аптекахъ траву будры—*herba hederæ terrestris* употребляютъ въ сборы грудныя—*species pectorales* (*).

Примѣчаніе. Будру овцы ѣдятъ охотно; лошади мало; коровы, козы и свиньи не трогаютъ. Отваръ этого растенія выгоняетъ червей у лошадей; выжатымъ сокомъ изъ травы, смѣшаннымъ съ простымъ виномъ, промываютъ глаза поутру и вечеромъ для истребленія бѣлыхъ пятенъ, или начинающагося бѣльма у лошадей.

БУЗИНА ЧЕРНАЯ, ИЛИ ДЕРЕВЯННАЯ; БОРЪ ДЕРЕВО—
sambucus nigra, l.

Мѣсто. Дерево, въ южной Россіи произвольно растущее, и въ садахъ вездѣ разводится; даже въ Петербургѣ удобно переносить

(*) Pharmacop. Rossica, p. 247.

зиму; на Терекѣ и на Кавказскомъ хребтѣ во множествѣ растеть дикое, особенно на жирной почвѣ.

Качество. Запахъ средней зеленой корки и цвѣтовъ крѣпкій, непріятный; *вкусъ* горьковатый, приторный; ягодъ пріятно-кислый.

Сила—свѣжей корки: проносная, водогонная, и отчасти рвотная; сухихъ цвѣтовъ: потогонная, умножающая молоко въ грудяхъ—*lactifera*, разбивающая; ягодъ—прохлаждающая и потогонная.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Корка средняя или лубовая—*cortex medianus*, одобряется въ водяной болѣзни и ножныхъ отекахъ: *Рейнеръ*, *Брукманъ*, *Галлеръ*. Бузинные листы тоже полезны для одержимыхъ водяницею—*hidropici*, и роженицъ, имѣющихъ трудное родовое кровоочищеніе: *Иппократъ*; толченые прикладываемые въ видѣ катаплазмы, разводятъ ножные отеки, смягчаютъ подагрическія боли и почечуи: *Рудольфъ*, *Вельшъ*, *Кранцъ*; цвѣты одобряются въ простудномъ кашлѣ, грудныхъ мокротныхъ припадкахъ и колотѣхъ, особенно при трудномъ отдѣленіи мокротъ, въ ревматизмѣ, членовой ломотѣ, накожныхъ сыпяхъ и въ рожѣ.—*Вермофъ*, при продолжительномъ употребленіи бузинныхъ цвѣтовъ, отваренныхъ въ молоко, замѣтилъ, что кормилица, одержимая хроническою рожею—*egu-*

sipelas chronicum, не только освободилась отъ болѣзни, но притомъ получила еще и умноженіе молока въ грудяхъ.—Бузинные цвѣты, производя обильную испарину, весьма удобно отвращаютъ слѣдствія простуды; въ кори—*morbilli*, краснухѣ—*scarlatina*, и другихъ кожныхъ сыпяхъ—*exanthemata*, помогаютъ не только скорому выходу оныхъ наружу, но и вступившія внутрь побуждаютъ къ выступленію на поверхность тѣла: *Виліе*.

Свѣжія и сухія ягоды *Иппократъ* хвалятъ въ водяныхъ опухоляхъ, маточныхъ и простудныхъ.

Количество. Отъ $\frac{1}{2}$ —1 унціи свѣжей корки полагается на фунтъ воды, отвариваемой, пока останется 8 унцій жидкости; цвѣтовъ 2 или 3 драхмы наливаютъ 12 унц. воды, которую настоявъ, пьютъ вмѣсто чая съ медомъ или сахаромъ; въ видѣ сухой припарки, въ мѣшечкахъ, прикладываютъ къ рожѣ, ломотнымъ и подагрическимъ опухолямъ.—*Шевалиеръ* и *Гіернъ* припарку изъ цвѣтовъ, отваренныхъ въ молокѣ, отлично рекомендуютъ для утоленія подагрическихъ болей и раковыхъ язвъ—*carcinoma exulceratum*.—Ягоды въ видѣ варенья даются, въ простудныхъ лихорадкахъ: отъ 1—2 унцій въ приличныхъ микстурахъ, или съ бузиннымъ чаемъ.

ВЪ АПТЕКАХЪ ПРИГOTOВЛЯЮТЪ:

1. Кисель бузинный—*coob sambuci* (*), одобряется въ помянутыхъ болѣзняхъ, котораго на *пріемъ* даютъ по 1 унціи.

2. Полосканье квасцовое—*sargarisma aluminosum* (**), употребляемое отъ жабы и ранъ гортанныхъ—*angina ulcerosa*.

Примѣчанія. 1. Деревенскіе жители молодые бузинные верхушки—*turiones*, при наступленіи весны, употребляютъ съ другими травами вмѣсто салата, который сильно слабитъ, и гонитъ воду; они же пользуются отъ водяной болѣзни выжатымъ сокомъ изъ зеленой корки и свѣжихъ листовъ, принимая съ простымъ виномъ поутру и вечеромъ по столовой ложкѣ; коренныя стружки тоже варятъ въ водѣ и пьютъ съ пользою, сѣмя по 1 золотнику принимаютъ вмѣсто слабительнаго.

2. Ягоды употребляются для крашенія хлопчатой бумаги и шелка чернымъ цвѣтомъ, съ примѣсомъ зеленаго купороса—*ferrum sulfuricum*. Съ квасцами даютъ синюю краску; для куръ онѣ ядовиты. Изъ соку сихъ ягодъ, съ прибавленіемъ малаго количества квасцовъ и уксуса, дѣлаютъ синія чернила.

(*) *Pharmacop. Rossica*, p. 242.

(**) ———— *castrens. R.* p. 262.

Сельскія красавицы однимъ сокомъ чернятъ себѣ брови. Толченые свѣжіе листы прикладываютъ къ ранамъ, и разводятъ оными опухоли, особенно водяныя. Изъ соку ягодъ, приведеннаго въ винное броженіе, перегонкою извлекается водка.

3. Бузиновые цвѣты, прибавляемые къ бѣлому виноградному вину и уксусу, доставляютъ онымъ мушкатный вкусъ: *Рокъ*.

БУЗНИКЪ, или СЕЛЕНИКЪ—КРАСНАЯ БУЗИНА, *sambucus ebulus*.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, въ южной Россіи произвольно растущее на поляхъ и обработанной почвѣ; на Терекѣ близъ теплицъ, и въ Украинѣ изобильно.

Качества. Листы, цвѣты, свѣжія ягоды, сѣмя, средняя корка и корень имѣютъ подобныя предыдущей бузины.

Польза и употребленіе тѣже.

Примѣчанія. 1. Все растеніе испускаетъ сильный неприятный запахъ, который прогоняетъ крысъ и мышей съ гуменъ.

2. Ягоды красной бузины, съ уксусомъ и квасцами, придаютъ синій цвѣтъ пряжѣ и кожамя. Изъ сѣмянъ, смоченныхъ теплою водою и крѣпко выжатыхъ, получается масло, разбивающее мо-

кротные застои влагъ, и водяные опухоли: *Северинъ*.

3. Цвѣты черной и красной бузины могутъ, по своему потогонному свойству, замѣнить баккаутъ—*lignum guaiaci offic.* кисель изъ ягодъ служить вмѣсто тамариндовъ, сенны и касси.

4. Бузиными вѣтками и цвѣтами выгоняють мышей изъ хлѣбныхъ копенъ; куреніемъ выводятъ таракановъ и домашнихъ сверчковъ. По противному запаху и вкусу, ни одна скотина этого растенія не трогаетъ.

БУКВИЦА ЧЕРНАЯ—*betonica officinalis*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, въ умѣренной Россіи произвольно растущее въ лѣсахъ и по гористымъ мѣстамъ; въ С-Петербургской округѣ у рѣки Волхова, и у Луги находится въ довольномъ количествѣ; цвѣтеть въ Іюнѣ мѣсяцѣ.

Качества. Трава и цвѣты имѣютъ *запахъ* противный, нѣсколько ароматный; *вкусъ* тоже непріятный, горьковатый; корня—тошноватый, зависящій отъ экстрактаго вещества и малаго количества летучаго масла: *Левисъ*.

Сила—разводящая, чихотная, укрѣпляющая; корня—рвотная.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Трава съ цвѣтами одобряется въ слабости нервовъ, головныхъ при-

падкахъ и судорожныхъ болѣзняхъ: *Галенъ*; въ простудной ломотѣ: *Гильданъ*; въ поврежденіи легкаго и почекъ, буквица, употребляемая вмѣсто чая съ медомъ, оказываетъ раноцѣлительное дѣйствіе: *Кранцъ*. У древнихъ Римлянъ трава эта была въ большомъ употребленіи (*). *Бургавъ* пользу оной чрезвычайно распространилъ: отъ маточныхъ припадковъ, обмороковъ, головной боли, подагры, онѣмѣлости членовъ, тѣгры или боли въ вертлугахъ, въ чревныхъ завалахъ, желтухѣ, мокротной чахоткѣ; другіе же врачи, какъ таинственное средство — агсапш, буквицу, подваренную съ краснымъ виномъ, давали въ цинготныхъ и другихъ изнурительныхъ поносахъ—*diarrhæa colliquativa*. Сушеные листья, истерты въ порошокъ, нюхаютъ для извлеченія мокротъ, въ долговременномъ насморкѣ и головной боли. Буквичный корень имѣетъ слабительное и рвотное дѣйствіе; а потому нѣкоторые употребляютъ оный въ отварѣ, подсладивъ медомъ, какъ проносное; а въ наливкѣ и въ большомъ количествѣ, какъ рвотное, очищающее желудокъ и кишки отъ загустѣвшихъ мокротъ.

(*) А потому и Итальянцы чрезвычайно привержены къ буквицѣ по известной ихъ пословицѣ: *vende la tonicam, e compare le betonicam*.

Количество. 1 унція, или горсть сухой травы, наливается 12 унц. горячей воды. Снаружи отваренная въ водѣ, служитъ разбивающею припаркою, и примочкою для ранъ; корень въ порошокъ отъ 20 гранъ до полдрахмы дается съ медомъ, какъ рвотно-слабительное лекарство, —emetico-purgans.

Примѣчанія: 1. Траву собирать должно во время ея разцвѣтанія, и высушивъ на солнцѣ, беречь въ сухомъ и закрытомъ мѣстѣ, которая въ домашнемъ быту служитъ вмѣсто чая, особливо вмѣстѣ съ шалфеемъ, гораздо здоровѣе китайскаго чернаго чая.

2. Деревенскіе лекари буквичный корень употребляютъ вмѣсто ипекакуаны и ревеня, т. е. какъ рвотно-слабительное лекарство.

3. Простой народъ припариваетъ болящія ядра буквицею, вареною съ виномъ. Мокшанцы парятъ буквицею чахлыхъ дѣтей. Бледноцвѣтныя дѣвки пьютъ въ винной настойкѣ, для полученія въ лицѣ румянца. Буквицу, отваренную въ молокѣ, даютъ рогатому скоту отъ воспаленія кишекъ, ежели оно послѣдовало отъ ядовитой или острой съѣденной травы.

4. Листы съ цвѣтными верхушками, шерсть, приготовленную съ висмутомъ, окрашиваютъ темно-оливковымъ постояннымъ цвѣтомъ. Буквичные листы курятъ нѣкоторые вмѣсто табаку.

БЪЛОКОПЫТНИКЪ, или МАТЬ И МАЧИХА; МАТЕРНИКЪ;
ПОДЪБЪЛЬ; ДВОЕЛИСТНИКЪ:—*tussilago farfara*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, растущее во всей Россіи на глинистой почвѣ, по берегамъ рѣкъ и ручьевъ, на мокрыхъ лугахъ и въ лѣсахъ на тучной землѣ; около Петербурга, въ Стрелиной, на Пулковской горѣ, около фарфоровыхъ и кирпичныхъ заводовъ, у пороховыхъ Охтенскихъ, на островахъ Невы, и проч. Цвѣтетъ въ Апрѣлѣ и Маѣ мѣсяцахъ.

Качества. Всѣ части этого растенія имѣютъ *вкусъ* клейкій, горьковатый, и нѣсколько вяжущій; *запахъ* слабый. Упомянутыя свойства зависятъ отъ камедно-смолистаго экстракта.

Сила — грудная, разводящая, очищающая, особенно свѣжаго корня.

Употребленіе. Сокъ изъ корней и листовъ, выжимаемый весною, похваляется въ золотушныхъ болѣзняхъ: *Кулленъ*, *Фуллеръ*, *Мейеръ*, *Бодардъ*. Травя свѣжая и сухая во всякое время одобряема была въ грудныхъ припадкахъ, отъ кашлю, мокротной одышки, золотушной чахотки и сухотки; многіе, употребляя сухіе листы бѣлокопытника, вмѣсто курительнаго табаку, избавились отъ удушливаго кашлю и одышки—*орторнжа*, *Диоскоридъ*, *Галенъ* и *Плиній* въ томъ свидѣтельствуютъ;

Шпилманъ рекомендуетъ въ зубной простудной боли; въ почечныхъ припадкахъ, и гное-течении изъ дѣтородныхъ частей, въ отварѣ съ водою хвалить *Соболевскій*. Снаружи кладутъ цѣлые листы, или лучше толченые, на раны и язвы съ хорошимъ успѣхомъ.

Количество. Горсть травы съ цвѣтами наливаютъ 12 унц. горячей воды; корня 1 унцію варятъ въ томъ же количествѣ воды; выжатаго сока по 2 или 3 унц. въ день даютъ съ медомъ или сахаромъ дѣтямъ. Въ золотушной чахоткѣ, продолжительное употребленіе этого сока рекомендуетъ *Гуфеландъ*. Въ аптекахъ бѣлокопытникъ идетъ въ составленіе грудныхъ сборовъ—*species pectorales* (*), котораго 1 унцію съ половиною варятъ въ 2 фунтахъ воды, пока останется полтора фунта, и подсластивъ медомъ, даютъ въ упомянутыхъ болѣзняхъ по чайной чашкѣ, нѣсколько разъ въ день.

Примѣчаніе: 1. Козы и овцы ѣдятъ его охотно, коровы тоже любятъ; лошади и свиньи не трогаютъ.

2. Растеніе это особенно рекомендуется въ падежѣ овецъ; листы онаго, съ примѣсомъ малаго количества сажи, сваривъ въ молокѣ, и процѣдивъ

(*) Pharmacop. castrens. R. p. 346.

даютъ пить тепловатую жидкость по полкварти, повторяя нѣсколько разъ: *Фрибе*.

Бѣлокопытникъ чумный, или подбѣлъ; чумный корень; девесильный лапушникъ—*tussilago petasites*.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, растущее на влажныхъ лугахъ и по глинисто-мергеловымъ берегамъ рѣкъ, особенно около рѣки Луги, и у деревни Говской, на тучнымъ мѣстахъ.

Качества. Корень и листы противно пахнутъ; *вкусъ* горькій, острый; высушенные на огнѣ издають искры и вспыхиваютъ.

Сила—грудная, потогонная, противудѣйствующая заразѣ чумной—*alexipharmaca*, ранозѣлительная.

Употребленіе. Въ простудномъ кашлѣ, удушѣ и чумномъ повѣтріи рекомендуютъ: *Бухвальдъ*, *Форестъ*; въ ипохондрии, истерикѣ и падучей болѣзни: *Фонъ-Свитенъ*.—Снаружи толченые листы прикладываются къ чумнымъ паховикамъ—*bubones pestilenciales*, или въ видѣ катаплазмы: *Галлеръ*; листы, приложенные къ ногамъ, разводятъ водяные отеки, и въ подагрѣ великое облегченіе дѣлають; нечистыя раны и гнилыя язвы тоже съ успѣхомъ оными покрываются: *Рай*, *Вудъ*.

Количество. Въ порошокъ даютъ съ медомъ по 1 драхмѣ; но чаще корень въ отва-

рѣ пьютъ съ прибавленіемъ уксуса и меда, полагая 1 унцію на фунтъ воды; или въ видѣ наливки, полъ-унціи корня наливаютъ 4 унціями горячаго вина или уксуса, которую принимаютъ чаще по столовой ложкѣ,

В.

ВАХТА ТРИЛИСТНАЯ, или трилистникъ водяной; бровица; стрѣла; павунъ—*menyanthes trifoliata*.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, во всей Россіи и Сибири произвольно растущее на болотныхъ мѣстахъ и озерахъ.

Качества—зависятъ отъ горькаго экстрактно-смолистаго и вяжущаго начала.

Запахъ листовъ нѣсколько затхлый; *вкусъ*—очень горькій.

Сила—укрѣпляющая, отражающая гнилость, противуглистная, противулихорадочная, желудочная, отверзающая, мочегонительная; — въ большомъ количествѣ производитъ рвоту, и слабитъ низомъ.—Молоко у коровъ и у кормилицъ при продолжительномъ употребленіи травы вахты дѣлается горькимъ, и для грудныхъ младенцевъ не безвреднымъ! *Пленкѣ*.

Употребленіе. Въ слабости желудка, трудномъ пищевареніи, кислой отрыжкѣ, удушья завалѣ чревныхъ органовъ и желтухѣ, одоб-

ряетъ *Бокельманъ*; въ худосочи и бледной немочи—*chlorosis*,—*Менхъ*; въ мокротной обрюзглости, водяныхъ отекахъ, и въ водяной болѣзни: *Шроеръ*, *Долеусъ*; въ ревматизмѣ, членовой ломотѣ и подагрѣ: *Бургавъ*, *Паули*, *Шульцъ*; въ перемежной трясучкѣ, цынгѣ, сведеніи и бездѣйствіи членовъ: *Виллій*, *Франкъ*, *Виридетъ*, *Тиссотъ*; въ ножныхъ струповатыхъ сыпяхъ, лишаяхъ, паршахъ, чесоткѣ, золотухѣ, застарѣлыхъ язвахъ и рытикахъ: *Буханъ*, *Вилмсъ*.—Въ Англіи деревенскіе жители восною выжатымъ сокомъ изъ свѣжей травы пользуютъ себя въ упомянутыхъ болѣзняхъ; также и отъ глистовъ даютъ дѣтямъ не безъ успѣха.—Снаружи, промываютъ цынготныя раны и другія застарѣлыя язвы крѣпкимъ отваромъ водянаго трилиственника; а свѣжими листьями или сухими, размочеными въ теплой водѣ, перекадываютъ оныя, и счастливо вылечиваютъ (*).

Количество. Для наливки 1 унція сухой травы наливается 2 фунтами горячей воды, и вскипятивъ, процѣженный отваръ принимать по чайной чашкѣ 3 раза въ день; изъ свѣжей травы выжатый сокъ дается по столовой ложкѣ съ сывороткою нѣсколько разъ въ день. Въ порошокъ, или въ видѣ каши съ медомъ, полдрахмы. Можно также, по ме-

(*) См. Acta Hafniensia, Vol. III. N. 76.

тому *Кемпфа*, употреблять въ клистирахъ, одобряемыхъ особенно въ чревныхъ завалахъ или обструкціяхъ—*physconia abdominalis*.

Въ аптекахъ готовятъ:

1. Горькій экстрактъ—*extractum amari* (*), который какъ для хорошаго пищеваренія, такъ и для подкрѣпленія желудка дается отъ 10—20 гранъ.

2. Противоцинготные сборы—*species antiscorbuticæ* (**), употребляемые въ отварѣ, полезномъ въ цинготныхъ припадкахъ.

Примѣчанія. 1. Англичане, при вареніи пива и портера, вмѣсто полфунта хмѣля—*humulus lupulus*, кладутъ по два лота листовъ вахты, которая доставляетъ пріятную горечь, подобную квасцу—*quassia agræ*. Съ примѣсомъ душицы или материнки—*origanum vulgare*, пиво гораздо пріятнѣе бываетъ.

2. Ея свѣжую траву ѣдятъ охотно козы и овцы, которымъ она служитъ полезнымъ средствомъ отъ сухотки: *Рай*. Въ сѣверной Лапландіи коренья вахты сушатъ для зимняго корма скотинѣ. И сами Лапландцы принимаютъ этотъ корень въ порошокъ по золотнику, какъ слабительное лекарство. Для овецъ

(*) *Pharmacop. castrens.* R. p. 254.

(**) Тамъ же, стр: 346.

и коровъ слабительное лекарство. Для овецъ и коровъ сильно кашляющихъ, или чахлыхъ, готовятъ изъ ржаной муки отваръ, который, посоливъ, прибавляютъ горсть истертой травы для коровъ; овцамъ же дается полгорсти того же порошка.

3. Трилистникъ водяной качествами своими весьма близко подходитъ къ квассии—*quassia amara excelsa*, и корню колюмбы—*rad. columbae*, вмѣсто которыхъ съ равною пользою употребляется въ Германіи: *Янъ*.

ВЕРБА БѢЛАЯ, ИЛИ ВЕТЛА; ИВА—*salix alba* l.

—— ПЯТИМУЖНАЯ, ИЛИ ЧЕРНОТАЛЬ—*salix pentandra*, l.

—— ЛОМКАЯ, ИЛИ ИВА ХРУПКАЯ—*salix fragilis*, l.

МѢСТО. Дерево въ умѣренной Россіи по лѣсамъ и вездѣ около деревень на влажныхъ мѣстахъ растущее.

Качества. Всѣ упомянутыя породы вербы, подобно хинѣ содержатъ въ коркѣ большую часть вяжущаго вещества, и малую—существеннаго масла. *Буиллионъ-Лагранжъ*, сверхъ упомянутыхъ началъ полагаетъ: клей и экстрактно-горькое вещество.

Запахъ—вербой корки, взимаемой изъ тонкихъ вѣтвей, пріятно-душистый; *вкусъ* горько-вяжущій и нѣсколько бальзамическій.

Сила укрѣпляющая, вяжущая, противугни- лостная, и прогоняющая лихорадки—*febrifuga*, особенно въ соединеніи съ горечавкою—*gentiana lutea*: *Пинель*.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ перемежныхъ лихорад- кахъ, и въ другихъ болѣзняхъ, гдѣ хина—*cinchona offic.* одобряется; вербой корка съ успѣхомъ заступаетъ мѣсто оной—*ut succedaneum cinchonæ*: *Стоне, Клоссиусъ, Гюницъ, Герардъ*; въ слабости желудка и чахоткѣ, происходящей отъ ранъ въ легкомъ, одобряетъ *Вельшъ*; въ цынгѣ и застарѣлыхъ гнилыхъ язвахъ, бывающихъ нерѣдко на ногахъ, про- лежняхъ, сопряженныхъ съ антоновымъ огнемъ, гнилой жабѣ и порчѣ зубовъ отъ гнилости: *Гюницъ, Штолль, Пленкъ*; крѣпкій отваръ вербой корки весьма хорошо противудѣйст- вуетъ гнилости, а потому во всѣхъ гни- лыхъ ранахъ и самомъ антоновомъ огнѣ можетъ служить для промыванія оныхъ и примочки: *Ремеръ*. По свидѣтельству *Кам- пера*, онымъ же отваромъ подкисленнымъ сѣр- ною кислотою—*decoctura acido sulphurico acidu- lata*, былъ пресѣченъ скотскій падежъ, особен- но у коровъ свирѣпствовавшій. *Галлеръ* совѣ- туетъ употреблять въ ваннѣ, полезной для

дѣтей, имѣющихъ слабость въ ногахъ, или одержимыхъ сиднями—*infantes rachitici*. *Бертрандъ* вербовною коркою съ хорошимъ успѣхомъ пользовалъ 3-дневныя лихорадки желчнаго астеническаго свойства (*). *Косте, Виллеметъ и Дессесартъ* тоже свидѣтельству- ютъ о пользѣ ея во многихъ перемежныхъ лихорадкахъ, одобряя преимущественно взимаемую изъ бѣлой вербы или ветлы—*s. alba* l.

Количество. Въ порошокъ даютъ зеленую корку тонкихъ вѣтвей, отъ 20 гранъ до 1 драхмы; для отвара полагаются 2 унціи корки на 2 фунта воды, которую кипятятъ, пока останется 16 унцій жидкости. Снаружи въ видѣ примочки и ваннъ.

Въ аптекахъ готовятъ:

1. Экстрактъ вербовой корки—*extractum cort. salicis*, (**) дается въ тѣхъ же бо- лѣзняхъ отъ 10—40 гранъ; для наружнаго употребленія растворяютъ въ горячемъ винѣ, или горѣлкѣ: *Горнъ*.

2. Отваръ корки сложной — *decocatura salicis composita* (***), замѣняющій отваръ хины.

(*) См. *Journal de medicine*, Т. 31, р. 274.

(**) *Pharmacop. castrens. R.* р. 255.

(***) Тамъ же, стр. 248

3. Порошокъ сложный—*pulvis cort. salicis composita* (*), употребляемый въ лихорадкахъ, и въ другихъ болѣзняхъ вмѣсто хины.

Примѣчанія. 1. Кору снимать должно съ молодыхъ деревьевъ весною; однако 5 или 8-лѣтнія меньше имѣютъ вяжущей силы, нежели кора старыхъ деревьевъ. Лапландцы корою бредины—*salix carnea*, во всемъ сходствующею съ предыдущими, выдѣлываютъ кожи, и ею замѣняютъ дубовую. Уголь этого дерева годенъ для дѣланія пороха;—зола даетъ хорошій поташъ.

2. Вербные цвѣты пчеламъ очень пріятны, изъ коихъ онѣ много собираютъ душистаго меду. Изъ пушистыхъ брюнковъ дѣлаютъ хлопчатую бумагу; а изъ сушеныхъ листьевъ вывариваютъ желтую краску, употребляемую по фабрикамъ для крашенія разныхъ матерій. Корень, долгое время отвариваемый въ водѣ, даетъ изрядную красноцвѣтную краску.

3. Овцы и козы ѣдятъ эти листы охотно; о другой скотинѣ неизвѣстно. Листы 5-мужней вербы или чернаго тальника—*s. pentandra* служатъ лекарствомъ для хилыхъ или чахлыхъ овецъ.

ВЕРБЕЙНИКЪ обыкновенный—*lysimachia vulgaris*, 1.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, растущее во многихъ мѣстахъ умѣренной Россіи, на бе-

(*) *Pharmacop. castrens. R. p. 325.*

регахъ болотъ и рѣкъ, на Каменномъ островѣ, въ Екатерингофѣ, и почти вездѣ по тѣнистымъ лѣсамъ.

Качества. Трава имѣетъ *вкусъ* вяжущій.

Силу—сжимательную и ранозѣлительную.

Употребленіе. Въ видѣ чая или наливки употребляемая, одобряется въ кровохарканіи, кровавомъ поносѣ, и непомѣрномъ теченіи мѣсячныхъ кровей: *Діоскоридъ*, *Галенъ*; въ долговременномъ стволловомъ теченіи и въ женскихъ бѣляхъ: *Цоризъ*; въ глазныхъ ранахъ, ушибахъ и хроническомъ воспаленіи оныхъ: *Галлеръ*, *Паркинсонъ*. — Снаружи толченая трава прикладывается для остановленія носоваго излишняго кровотеченія; также и къ ранамъ, при поврежденіи небольшихъ кровеносныхъ сосудовъ; выжатый сокъ изъ свѣжей травы еще болѣе къ сему намѣренію служитъ: *Галенъ Гамперинъ* (*). Отваръ этого растѣнія, подслащенный медомъ и подкисленный уксусомъ или слабою сѣрною кислотою—acid. sulphuric. dilut. служитъ хорошимъ полосканьемъ отъ молошницы, или маленькихъ язвъ во рту—aphthæ oris: *Роке*.

Количество. Въ порошокъ дается по драхмѣ и болѣе; для наливки полагается 1 унц.

(*) De viribus plantarum. Upsaliae, 1737.

травы на фунтъ горячей воды, которую, вскипятивъ однажды чрезъ $\frac{1}{2}$ часа, процѣдить, и холодную принимать каждыя 2 или 3 часа по половинѣ чайной чашки; снаружи въ видѣ промывательнаго и шпринцовки. Свѣжевыжатый сокъ, принимаемый по ложкѣ, тоже удивительное дѣйствіе оказываетъ въ астеническихъ кровотеченіяхъ, простыхъ и кровавыхъ поносахъ—profluvia atonica: *Гамперинъ*.

Примѣчанія. 1. Изъ листовъ этого растенія достаютъ желтую краску, годную для крашенія шерстяныхъ матерій; корень даетъ темноцвѣтную.

2. Траву онаго коровы и козы ѣдятъ охотно; лошади, овцы и свиньи не трогаютъ.

ВЕРБЕЙНИКЪ ПОЛУШЕЧНЫЙ, или ПОЛУШЕЧНАЯ ТРАВА; ЛУГОВОЙ ЧАЙ; ДЕНЕЖНИКЪ—*lysimachia nummularia*.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, растущее на влажныхъ мѣстахъ, мокрыхъ лугахъ и въ тѣнистыхъ рощахъ: въ Екатерингофѣ, въ Стрѣльнѣ, по Ладожскому каналу, и около рѣки Волхова.

Качества. Трава имѣетъ *вкусъ* кисловатый и нѣсколько вяжущій.

Сила и употребленіе сходныя съ предъидущимъ.

Примѣчаніе. Овцамъ, козамъ и коровамъ служить здоровою пищею; лошади и свиньи не ѣдятъ.

ВЕРБИШНИКЪ БѢЛЫЙ, или ЦАРСКІЙ СКИЩЕТРЪ; МЕДВѢЖЬЕ УХО; КОРОВЬЯКЪ—*verbascum thapsus*.

Мѣсто. Растеніе двулѣтнее, произвольно вездѣ растущее на пустыхъ и каменистыхъ мѣстахъ, около Ладожскаго канала, на Дудоровой горѣ, и въ другихъ сухихъ пещаныхъ мѣстахъ; цвѣтетъ въ Іюлѣ и Августѣ мѣсяцахъ.

Качества—травы и цвѣтовъ клейкія, горьковатая; *запахъ* свѣжихъ цвѣтовъ пріятный; *вкусъ* медовой.

Сила: травы и цвѣтовъ смягчительная, припуляющая, болеутолительная.

Употребленіе. Отваръ листьевъ и цвѣтовъ хвалятъ въ кашлѣ, грудныхъ простудныхъ припадкахъ и чахоткѣ: *Лиє, Шпильманнъ*; въ кровавомъ поносѣ, и притомъ долговременномъ съ рѣзью въ животѣ; также для смягченія болящихъ геморроидальныхъ шишекъ. *Пленкъ* одобряетъ въ видѣ промывательнаго и припарки.

Количество. 1 унція травы наливается 12 унц. кипячей воды; цвѣтовъ 1 и 2 драхмы наливаютъ 4 унц. горячей воды, которую

наливку принимать по чайной чашкѣ нѣсколь-
ко разъ въ день.—Снаружи листы и цвѣты,
отваренные въ молоко, служатъ смягчительною
и разводящею припаркою; этотъ же молочный
отваръ въ потугахъ и болѣзненномъ жилищѣ—
tenesmi, въ видѣ клистира употребляемый весь-
ма полезенъ.—Иные къ почечуйнымъ шиш-
камъ прикладываютъ свѣжіе толченые цвѣты:
Матіоль, Шомель.

Въ аптекахъ трава съ цвѣтами вербишника
употребляется для составленія *мягчительныхъ*
сборовъ—species emollientes (*).

Примѣчанія. 1. Въ Италіи сѣмяна этого расте-
нія, имѣющія усыпительное свойство—semina nar-
cotica, употребляются для ловленія рыбы руками:
ибо брошенные въ воду и съѣденные рыбою,
приводятъ ее въ одуреніе, а потому *Линней* за-
мѣчаетъ, дабы по сему опыту врачи имѣли осто-
рожность, касательно употребленія этихъ сѣмянъ.—
Впрочемъ нѣкоторые увѣряютъ, что куры отъ этого
растенія жирчѣе становятся: *Севергинъ*; но никакая
скотина его не ѣстъ: *Соболевскій*;—и для овецъ
почитается вредною.

2. Листы и цвѣты этого вербишника служатъ
болеутолительною припаркою для закованныхъ ло-
шадей, или повредившихъ копыта отъ занозы.—

(*) Phaimacop. Rossica, p. 248.

Порошкомъ оныхъ присыпаютъ нечистыя язвы.—
Корень дается съ великою пользою чахлomu ро-
гатуму скоту.—Цвѣты, настоянные въ водкѣ, со-
ставляютъ раноцѣлительный бальзамъ.

ВЕРБИШНИКЪ ЧЕРНЫЙ, или ЦАРСКІЙ СКИПЕТРЪ; ЧЕРНЫЙ
БЫКОВНИКЪ; КОШЕЧНИКЪ—*verbascum nigrum*, 1.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, въ умѣрен-
ной Россіи въ тѣнистыхъ и сухихъ мѣстахъ
растущее; также въ довольномъ количествѣ
на Дудоровой горѣ и возвышенныхъ берегахъ
Невы рѣки выше пороговъ.

Качества. Корень имѣетъ *вкусъ* клейкій,
приторный; трава и цвѣты сходствуютъ съ пре-
дыдущимъ; сѣмя болѣе усыпляетъ или одурь
наводитъ: *Соболевскій*.

Сила смягчительная.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Трава, цвѣты и корень,
въ отварѣ, служатъ смягчительнымъ полоскань-
емъ, промывательнымъ, и припаркою, одобряе-
мою въ ногтоѣдѣ—*ragonuchia*: *Шведіоръ*.

Количество: какъ предыдущаго.

Примѣчаніе. Сѣмя его можетъ служить также
для рыбьей ловли безъ невода; свернутые листы
въ палочку и высушенные могутъ употребляемы
быть въ маслянныхъ лампахъ вмѣсто свѣтильни:
Соболевскій.

ВЕРОНИКА АПТЕЧНАЯ, или ЛЕЖАЧАЯ—*veronica officinalis*.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, вездѣ по травянистымъ рощамъ, сухимъ и гористымъ лугамъ во многихъ мѣстахъ Россіи и Сибири растущее.

Качества. Запаху трава не имѣеть; *вкусъ* горьковатый и легко вяжущій.

Сила—грудная, укрѣпляющая, раноцѣлительная.

Употребленіе. Вмѣсто чаю употребляемая одобряется: въ простудномъ кашлѣ, мокротной одышкѣ и чахоткѣ, происходящей отъ поврежденія внутренностей: *Гофманъ*, *Галлеръ*; въ почечныхъ припадкахъ отъ камня, и кровавомъ мочеиспражненіи: *Ельснеръ*; въ несносномъ зудѣ и чесоткѣ: *Гофманъ*. Снаружи свѣжая толченая трава прикладывается къ ху-досочнымъ язвамъ—*ulcera sasoëtica*: *Паум*.

Количество. 3 драхмы сухой травы полагается на 8 унцій горячей воды для наливки; выжатый сокъ изъ свѣжей травы даваемый по 2 унціи въ день, *Бургавъ* рекомендуетъ въ подагрѣ.

Въ аптекахъ готовятъ съ вероникою: *грудной сборъ*—*species pro infuso theaeformi* (*)

(*) Pharmacop. Rossica, p. 248.

которой въ упомянутыхъ болѣзняхъ пьютъ вмѣсто чаю.

Примѣчаніе. Траву эту по веснѣ употребляютъ чахотные въ бульюнѣ; а высушенная болѣе прочихъ европейскихъ травъ ближе подходитъ къ настоящему чаю: *Шильманъ*.—Листы, отваренные съ желѣзнымъ купоросомъ—*sulfas ferri*, даютъ чернило.—Въ соединеніи съ шалфеемъ, гораздо полезнѣе китайскаго чернаго чаю. *Пеириль*.

ВЕРОНИКА РУЧЕЙНАЯ, или ИБУНКА, КОЗІЙ РОСТЪ;
КОЗЬЯ МОРДА; ЦЫНГОТНАЯ ТРАВА; ПОТОЧНИКЪ,—*vegonica bessabunga*.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, во всей Россіи произвольно растущее, по мокрымъ лугамъ и ручьямъ: около Царскаго Села, и на Аптекарскомъ островѣ изрѣдка.—Она любитъ болѣе текущую воду; находится чаще подлѣ ключей, колодезей и во рвахъ.

Качества. Содержитъ въ себѣ весьма много соку, подобнаго яичному бѣлку, и горькое начало.

Вкусъ—свѣжей травы горьковатый, травяной, нѣсколько къ молодой жерухѣ подходящій.

Сила—разводящая, противуцынготная.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Свѣжая трава, въ видѣ салата употребляемая, или выжатый сокъ, хвалить въ цынгѣ *Гофманъ*; но гораздо большую пользу оказываетъ употребляемая вмѣстѣ съ ложечною травою—*hb. cochleariæ offic.* или съ вахтою—*menyanthes trifoliata.*—*Шомель* совѣтуетъ выжатый изъ сихъ травъ сокъ давать цынготнымъ вмѣстѣ съ сывороткою.—*Фогель*, въ завалахъ внутренностей.—*Бургавъ* тоже испыталъ, и рекомендуетъ подагрикамъ.—Снаружи толченая трава съ успѣхомъ прикладывается къ цынготнымъ ранамъ; *Паули* этою одною травою, вареною съ пивомъ, прикладывая къ цынготной язвѣ, объявшей вею почти голень, удачно вылечилъ.

Количество. 1 или 2 горсти свѣжей травы наливаются 12 унц. сыворотки, которую вскипятивъ и процѣдивъ, даютъ по 2 унціи нѣсколко разъ въ день; сверхъ упомянутыхъ болѣзней: въ желтухѣ, кожныхъ сыпяхъ и членовыхъ боляхъ *arthodyhia*, *Кранцъ* употреблялъ выжатый сокъ отъ 2—3-хъ унц. тоже съ молочной сывороткою, или съ цыплячьею похлебкою.

Въ аптекахъ готовятъ:

Противуцынготные соки — *succus ad scorbuticos* (*), выжимаемые весною изъ свѣ-

(*) *Pharmacop. Rossica*, p. 256—*et castrensis R.* p. 361.

жихъ травъ: жерухи—*s. nasturtium*, ложечной травы—*sochlearia offic.*, чистянка—*fumaria offic.* щавеля—*rumex acetosa*, и ручейной вероники—*v. bescabunga*, которые, для поправленія тѣлеснаго худосочія—*cachexia*, ежедневно принимаютъ по 1—2 и 4 унцій, два или три раза въ день.

Примѣчаніе. Трава эта, въ недостаткѣ ложечницы—*sochlearia offic. l.*, превосходно оную замѣняетъ, употребляемая въ пищу, салатахъ и другихъ кушаньяхъ.

Виноградъ—*vitis vinifera, l.*

Мѣсто. Растеніе кустоватое, воздѣлываемое въ умѣренныхъ краяхъ Россіи, особенно въ Херсонѣ Таврическомъ, на Дунаѣ, въ Астра-ни и Терекѣ, гдѣ приготавливаютъ также лучшее виноградное вино, называемое чихиремъ.— Высушенныя виноградныя ягоды называютъ: изюмомъ, или розинками—*uvæ siccatae, s. pas-sulæ maiores.*

Качества. Зрѣлый виноградъ *вкусъ* имѣетъ сладко-кисловатый, пріятный; изюма тоже сладкій и нѣсколько кисловатый; виноградный листъ слабо вяжетъ; во Франціи начали изъ винограда извлекать сахаръ; потому зрѣлые виноградныя ягоды содержатъ сахарное начало, клейкое, и винный камень.

Сила—зрѣлыхъ ягодъ утоляющая жаръ и жажду, питательная, притупляющая остроту

желчи, противугнилостная, отверзающая и легко слабящая. Изюмъ имѣетъ силу разводящую мокроты, противожелчную и противуцынготную.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Зрѣлый виноградъ, употребляемый умеренно, служить лучшими осенними плодами, полезными: въ кашлѣ, сухоткѣ, брюшныхъ завалахъ, желтухѣ, желчныхъ горячкахъ, мочерѣзѣ и цынгѣ, въ чахотной лихорадкѣ, сопряженной съ упорными запорами *obstipationes rebelles*, хвалитъ *Бертеле*, въ злокачественныхъ горячкахъ, свѣжія ягоды и варенныя рекомендуютъ: *Генъ*, *Фонъ-Сви-тенъ*, *Бургавъ* и *Штоль*; въ поносахъ гнилаго свойства: *Денгеръ*, *Прингле*, *Циммермамъ*.—Изюмъ, вареный въ водѣ, тоже полезенъ: въ грудныхъ мокротныхъ припадкахъ, железняхъ, и воспалительныхъ лихорадкахъ.—Виноградные листы одобряются для полосканья въ жабѣ—*angina*: *Пленкъ*.

Количество. Зрѣлыя ягоды кушаютъ, сколько угодно, выбрасывая изъ рта кожицу и сѣмяна, которыя весьма тягостны для желудка.—Изюмъ дается въ отварѣ, полагая 1 унцію на фунтъ воды, которую кипятятъ, пока останется 8 унц. жидкости; въ процеженный прибавляется известное количество виннаго камня—*super-tartras potassæ*, или селитры—*nitras potassæ*; въ желчныхъ и воспалительныхъ лихорадкахъ

можно давать оный по чайной чашкѣ нѣсколь-
ко разъ въ день.

Въ аптекахъ приготовляютъ съ изюмомъ:
грудной простудный отваръ — decoctura
altheæ offic. (*), который въ упомянутыхъ груд-
ныхъ болѣзняхъ можно употреблять до 2 фун-
товъ въ день, въ раздѣленныхъ приѣмахъ.

Примѣчанія. 1. Излишнее употребленіе вино-
града, а особенно у непривыкшихъ, производитъ
жестокій изнурительный поносъ, нерѣдко сопря-
женный со рвотою для самыхъ крѣпкихъ людей;
однако для меланхоликовъ и сумасшедшихъ людей
средство это иногда служитъ спасительнымъ ле-
карствомъ: *Кранцъ*.

2. Изъ зрѣлыхъ ягодъ посредствомъ выжимки,
броженія и перегонки приготовляютъ: виноградное
вино, ренскій уксусъ и французскую водку (**),
какъ выше упомянуто было на стр. 28.

3. Изъ сладкаго винограда, Французскіе химики
Пристъ и *Функъ* недавно изобрѣли способъ со-
составлять сахаръ.

Волоское бѣлое и красное вины—vinum album
& rubrum привозятъ къ намъ ежедневно въ боль-
шомъ количествѣ изъ Молдавіи.

(*) Pharmacop. castrens. Ruthena, p. 240.

(**) О семъ подробно излагается въ продолженіи
Трудовъ Вольнаго Экономическаго Общества, часть XV,
и другія.

Качества—бѣлаго вина; *запахъ* и *вкусъ* собственный, спиртно-кисловатый, пріятный.

Сила — укрѣпляющая слабый желудокъ, возбуждающая аппетитъ, помогающая пищеваренію, одобряющая весь организмъ, умножающая теплоту въ тѣлѣ, утоляющая жажду, противудѣйствующая гнилости, умножающая испарину, и по кислому своему свойству въ особенности мочегонительная.

Употребленіе. Внутрь, въ болѣзняхъ, зависящихъ отъ слабости первыхъ и вторыхъ путей, въ нервной и гнилой горячкѣ—*turphus stupidus et putridus*, сопровождаемыхъ безъ полнокровія и воспаленія, въ нервныхъ или чувственожилныхъ припадкахъ безъ сопряженія желудочной кислоты, въ антоновомъ огнѣ, розовой угреватости лица, и въ слабости силъ выздоравливающихъ послѣ болѣзней.—Снаружи, въ видѣ примочки, одобряется въ воспаленіяхъ, внѣшнимъ насиліемъ причиненныхъ, какъ-то: при ушибѣ, растяженіи составовъ, и поврежденіи костей; также въ хроническомъ воспаленіи глазъ; въ видѣ купѣли: новорожденныхъ младенцевъ, находящихся въ глубокомъ обморокѣ послѣ трудныхъ родовъ, обмываютъ теплою водою, смѣшанною съ бѣлымъ виномъ, или обвиваютъ ихъ полотенцами, напитанными теплымъ виномъ.

Количество. Въ вышеупомянутыхъ болѣзняхъ дается внутрь по 2 унц. одно, или въ микстурахъ, нѣсколько разъ въ день.

Качества краснаго вина. Сверхъ вяжущаго вкуса, имѣеть *силу*, болѣе укрѣпляющую, побуждающую, и запоры производящую—*alvum obstipans*.

Употребленіе. Вънутрь рекомендуютъ для людей слаботѣлыхъ склонныхъ къ поносу, и имѣющихъ расслабленный желудокъ.—Снаружи, въ видѣ укрѣпляющихъ примочекъ и полосканья: въ расслабленіи гортаннаго язычка, маточнаго рукава, заднепроходной кишки, въ дѣтскихъ грыжахъ и расслабленіи членосоединеній; красное вино съ дубовою коркою—*cortex quercus* г. вареное, служить весьма хорошимъ средствомъ.

Количество. Одно дается по нѣсколько унцій, 3 или 4 раза въ день; для отвара полагается 1 унц. дубовой корки на 12 унц. краснаго вина; см. дубъ—*quercus* г.

Винные дрожжи или подонки — *feces vini* имѣють *силу* тоже укрѣпляющую, противугнилоствую и разбивающую.

Употребленіе. Снаружи одобряются разведененныя равнымъ количествомъ воды, какъ лучшее противувоспалительное средство: при ушибахъ, вывихахъ, поврежденіяхъ мягкихъ частей и переломахъ костей, въ контузіяхъ и

насилъственномъ потрясеніи мозга; безъ воды прикладываются для укрѣпленія разслабленныхъ членосоединеній, и укрощенія влажнаго антонова огня—gangræna humida: *Пленкъ*.

Французская водка—spiritus vini gallicus, получаемая перегонкою винограднаго вина, тоже служить побуждающимъ и ободряющимъ средствомъ для слабыхъ больныхъ.—Наилучшимъ образомъ предписывается въ видѣ пунша:—aqua cardiaca (*).

Виноградный уксусъ—acetum vini получается окисаніемъ, или вторичнымъ броженіемъ вина, стр. 21.

Качества. Запахъ и вкусъ кислый собственный; сила разводящая, потогонная, противугнилотная, противудѣйствующая усыпительнымъ ядамъ—antinarcotica, и поправляющая гнилой воздухъ и другія гнилыя испаренія—antimerphitica, стр. 52—54.

Употребленіе. Въ воспалительныхъ лихорадкахъ, желчной рожѣ, антоновомъ огнѣ, чумномъ огневицѣ—carbunculus, при поглоте-

(*) Pharmacop. castrens. Ruth. p. 219.—Способъ готовить искусственный портвейнъ, тамъ же, стр. 386—венгерское вино; шампанское; бишофъ, и проч. См. Секретный Экономъ. Ч. II. стр. 258, 259, 260.—Объ искусственномъ винѣ предложено было на стр. 119. О пуншѣ стр. 105.

ній усыпительныхъ ядовитыхъ растений, рвотѣ, и для поправленія гнилыхъ испареній;— въ видѣ паровъ одобряется: въ жабѣ, воспаленіи легкихъ, опухолѣ ядеръ, гнилости язвъ, и чумномъ повѣтрій.—Уксусъ, разведенный водою—*oxusgatum*, въ видѣ клистира и впрыскиваній, одобряется въ маточномъ кровотеченіи, заднепроходномъ, и брюшныхъ завалахъ; въ видѣ омыванія и примочки: въ чумной заразѣ—*pestis*, гнилыхъ горячкахъ, гнилой оспѣ, гнилыхъ и раковыхъ язвахъ, лишаяхъ, ушибахъ, багровыхъ опухоляхъ, вывихахъ, растяженіи составовъ и ознобленіяхъ.

Количество. Внутрь дается по 1 унціи съ водою и медомъ; снаружи: въ видѣ паровъ, примочки и впрыскиваній—*injectiones*.

Въ аптекахъ готовятъ:

1. Уксомедъ простой—*oxumel simplex* (*), употребляемый въ горячкахъ: отъ 1—2 унц. съ ячвымъ отваромъ, или въ микстурахъ; разведенный водою служитъ противовоспалительнымъ полосканьемъ—*gargarisma diaphlogisticum*.

2. Уксусное противуядное куреніе—*vapores acidi acetici, s. liquor alexiterius acetosus* (**), употребляемое для поправленія гнилаго воздуха

(*) *Pharmacop. castrens. Ruth.* p. 299.

(**) ————— p. 390.

и предохраненія отъ заразы: въ гошпиталяхъ, тюрьмахъ, казармахъ, корабляхъ и проч.

Вилліе.

3. УКСУСНАЯ РАЗБИВАЮЩАЯ ПРИМОЧКА — *fomentum ammoniæ* (*), прикладываемая въ упомянутыхъ виѣшнихъ поврежденныхъ посредствомъ намоченныхъ полотенецъ.

4. УКСУСНАЯ НЕФТЬ, — *perhtha aceti v. aether acetic.*, о которой упомянуто было на стр. 32.

ВИШНЯ САДОВАЯ; ВИШНИКЪ, — *prunus cerasus*, l.

Мѣсто. Дерево, въ южныхъ мѣстахъ Россіи изобильно растущее въ садахъ.

Качества — зрѣлыхъ красныхъ вишенъ, *вкусъ* сладковато-кислый.

Сила — прохлаждающая, противугнилотная, отверзающая; въ большомъ количествѣ: слабительная и мочегонительная.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ воспалительныхъ лихорадкахъ, желчной горячкѣ, цынгѣ, завалахъ внутренностей, и сумасшествіи. *Фонъ-Сви-тенъ* въ послѣднемъ случаѣ давалъ натошакъ больнымъ кушать по нѣскольку фунтовъ ежедневно; — *Фернелій* отваромъ сухихъ вишенъ тоже пользовалъ многихъ сумасшедшихъ.

(*) *Pharmacop. castrens. Ruth. p. 256.*

Количество. Зрѣлыя ягоды даютъ кушать больнымъ по желанію; варенье и сиропъ вишневый, тоже по нѣскольку унцій, примѣшиваютъ къ питью больныхъ; отваръ сушеныхъ вишенъ служить также здоровымъ питьемъ въ горячкахъ и лихорадкахъ.

Примѣчанія: 1. Въ Украинѣ изъ вишней, налитыхъ водкою съ прибавленіемъ меда, посредствомъ закисанія, готовятъ: а) весьма пріятный напитокъ, наз. *вишневкою*, которая можетъ замѣнить дорогіе иностранныя ликеры; б) *ратафій* (*). Листы молодые, высушенные въ тѣнѣстомъ мѣстѣ, могутъ служить вмѣсто чая.—Прибавляемые къ курительному табаку, даютъ пріятный запахъ. См. табакъ.

2. Вишневый клей—*gummi cerasorum* имѣетъ всѣ свойства аравійской камеди—*g. mimosæ piloticæ*, вмѣсто которой можетъ употребляемъ быть во всѣхъ случаяхъ, гдѣ она одобряется, на прим.

Въ аптекахъ готовятъ:

1. Отваръ клейкій—*decoctura mucilageinea* (**), полезный въ простомъ и кровавомъ

(*) О приготовленіи оныхъ, см. въ Секретномъ Экономѣ Ч. II. стр. 354.

(**) *Pharmacop. castrens. R.*, p. 246.

поносахъ, припадкахъ мочевыхъ путей, мочерѣзѣ, кашлѣ, хрипотѣ, и проч. На *пріемѣ* дается: отъ 1—2 фунтовъ въ день, по чайной чашкѣ каждый разъ.

2. Клейкое промывательное—*clyster mucilaginosus*, имѣющее такія же свойства и дѣйствіе, какъ приготовляемое изъ крахмала—*clyster amyli*, которое употребляется въ кишечныхъ боляхъ, жиленьѣ, жестокихъ поносахъ, и почечуѣ (*).

ВОЛОВИКЪ АПТЕЧНЫЙ, или воловій языкъ; вологодка; червяница ТРАВА; КРАСНЫЙ КОРЕНЬ—*anchusa officinalis*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, растущее по старымъ развалинамъ, въ огородахъ и садахъ. Цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іулѣ мѣсяцахъ. — Въ Сибири имѣетъ сначала желтые цвѣты, но напоследокъ дѣлаются подобными червецу.

Качества. Корень, листы и цвѣты имѣютъ *вкусъ* клейкій; *силу* прохладительную, смягчительную, отверзающую.

Употребленіе. Древніе врачи одобряютъ въ ипохондрии, меланхоліи, отъ кашля, удушья и во всѣхъ гдрудныхъ мокротныхъ болѣзняхъ:

(*) Тамъ же, стр. 237.

Галенъ.—Выжатый сокъ изъ всего растенія, содержащій въ себѣ селитру подобно огуречнику—*borrago officinal.* полезенъ въ воспаленіи мочевыхъ путей, и мокротномъ мочерѣзѣ—*bleorrhagia: Рокъ.*

Количество. Полъ-унціи корня полагается на 8 унц. воды для отвара; траву и цвѣты по горсти кладутъ на 12 унц. горячей воды, которую, настоявъ, пьютъ съ медомъ вмѣсто чаю.—Молодые листы весною варятъ въ похлѣбкахъ, которые составляютъ пріятную и здоровую пищу. Выжатый сокъ пьютъ съ ячнымъ отваромъ, или съ молочною сывороткою отъ 3—4 унцій въ день.

Примѣчаніе. 1. Выжатый сокъ изъ цвѣтовъ, и отваренный съ квасцами, даетъ зеленую краску. — Траву эту ѣсть охотно всякая скотина

2. Корнемъ подкрашиваютъ водку, масло, воскъ и помады розовымъ цвѣтомъ.

3. Въ деревняхъ отваромъ онаго лечатъ поносы и дѣтскую молошницу.

ВОЛОВИКЪ КРАСНЫЙ, или ЧЕРВЯНИЦА ТРАВА; КРАСНЫЙ КОРЕНЬ; ОБРАЗКИ; ОСЛОВЫЯ УСТА—*anchusa tinctoria, l.*

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, на сухихъ мѣстахъ произвольно растущее въ южной Россіи

изрѣдка находится на пещаныхъ лугахъ и около Ямбурга.

Качества. Корень запаху не имѣеть; *вкусъ* затхлый, въ отварѣ горьковатый.

Сила—красильная, разводящая.

Употребленіе. Корень, отваренный въ красномъ винѣ, и съ прибавленіемъ свѣжаго сливочнаго масла, пьютъ разшибенные люди, для разведенія кровавыхъ застоевъ, и исцѣленія внутреннихъ поврежденій.—Снаружи порошкомъ корня присыпаютъ старыя мокнуція язвы—*ulcera inveterata*: *Бургавъ*.

Количество. 1 унція сухаго корня полагается на фунтъ воды, пива, или вина для отвара.

Примѣчанія. 1. Корень этотъ употребляютъ въ аптекахъ для подкрашиванія спиртныхъ настоевъ и губной помады пріятно-розовымъ цвѣтомъ.

2. Онъ замѣняетъ кошениль—*coccus cacti*, 1. и годится для крашенія шелковыхъ, шерстяныхъ и другихъ матерій.

волчець кудрявый, или стоголовникъ; осоть; чертополохъ—*centaurea benedicta*.

Мѣсто. Растеніе садовое однолѣтнее, въ умѣренной Россіи и въ нашихъ ботаническихъ садахъ изобильно разводимое.

Качества—полезныя, зависящія отъ экстрактаго весьма горькаго начала; *запахъ* свѣжей травы непріятный, который сушеніемъ теряется; *вкусъ* очень горькій, непротивный; *сбнянь*: сладко-клейкій.

Сила—желудочная, противукислотная, противуглистая, потъ и мочу гонящая, очищающая.

Употребленіе. Въ худомъ пищевареніи, худосочіи, ревматизмѣ и ломотѣ, рекомендуетъ *Бергій*; въ злокачественныхъ горячкахъ и чумѣ: *Палмарій*; въ перемежныхъ лихорадкахъ, весеннихъ и осеннихъ: *Жилиберъ*; въ заваляхъ брюшныхъ, желтухѣ и зажной водяницѣ: *Кранцъ*, *Шведіоръ*; въ простудномъ колотѣ, мокротномъ кашлѣ и удущѣ: *Селигъ*, *Бурдахъ*.—Снаружи, свѣжіе толченые листы, и въ видѣ припарки, прикладываются, для разведенія ушибовъ, и подкожныхъ кровоизліяній—*есшута*; порошкомъ листовъ присыпаются худосочныя и раковыя язвы: *Виллановъ*, *Бауганъ*; отваромъ примачиваются ознобленныя части: *Фриндъ*.

Количество. 2 драхмы сухой травы полагаются на 4 унц. хододной воды; горячая же наливка извлекаетъ непріятную горечь, производящую тошноту.

ВЪ АПТЕКАХЪ ПРИГОТОВЛЯЮТЪ:

ЭКСТРАКТЪ КУДРЯВАГО ВОЛЧЦА—*extractum sag-
dui benedicti* (*), который даютъ: отъ 10—20
гранъ, и до полудрахмы.

Примѣчаніе. Виноградная настойка листьевъ
этого растенія, принимаемая по 1—2 столовыхъ
ложки по утрамъ и вечерамъ, пользуется застарѣ-
лые ревматизмы, и боли въ членахъ.

ВОРОНЕЦЪ, или вороній глазъ; ПАРИДОВА ТРАВА —
paris quadrifolia, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, растущее въ
тѣнистыхъ мѣстахъ, рощахъ, на островахъ
Невы рѣки, около Царскаго Села, и во всей
сѣверной Россіи до Иртыша: *Фалькъ*.

Качества. Трава и ягоды имѣютъ *запахъ*
вонючій, противный; *вкусъ* сладко-пряный.

Сила — разводящая, противусудорожная,
усыпительная; въ большомъ количествѣ рвотная.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ малыхъ приемахъ поль-
зуется въ судорожныхъ припадкахъ, удушли-
вомъ кашлѣ, коликахъ, поносахъ и сумасше-
ствіи—*mania*: *Шведіоръ*, *Бурдахъ*.—Снару-
жи, листья и ягоды, толченые, прикладываются

(*) Pharmacop. Rossica—civilis, p. 209.

въ видѣ катаплазмы: къ чумнымъ паховикамъ, злокачественнымъ нарывамъ, опаснымъ воспалениямъ глазъ, и къ ногтоѣдѣ: *Турнефортъ*, *Соболевскій*;—последній замѣчаетъ, что корень этого растенія имѣетъ самую легкую рвотную силу, и дѣйствиємъ своимъ можетъ замѣнить дорогую перувианскую ипеакауанну, когда принимаютъ его въ порошокъ: отъ 40 гранъ до полдрахмы, и при позывѣ на рвоту запиваютъ довольномъ количествомъ теплой воды или чаемъ ромашки.—Таковымъ дѣйствиємъ своимъ облегчаетъ желудокъ при излишествѣ мокротъ, причиняющихъ невареніе пищи, и тягость въ груди; дается также для очищенія желудка въ желчныхъ лихорадкахъ, въ подозрѣніи принятаго яда, или иной ядовитой и неудобоваримой пищи, каковую составляютъ грибы.

Количество. Для разводящаго дѣйствія дается корень въ порошокъ съ сахаромъ, или сладковымъ корнемъ: по 1 или 2 грана, каждые два часа; для рвотнаго: отъ 40 гранъ до полудрахмы, и 3 скрупуловъ, запивая теплою водою или чаемъ, какъ выше сказано; для наливки полагаются 2 драхмы на 6 унцій кипячей воды, которую принимаютъ каждый часъ по столовой ложкѣ. — Въ клистарахъ употребляемый, помогаетъ въ подвздошномъ колотѣ, именуемомъ завивною грыжею—volvu-

lus.—Трава и ягоды снаружи прикладываются въ видѣ сырой катаплазмы и припарки.

Примѣчанія. 1. Растеніе это для многихъ животныхъ служитъ смертельнымъ ядомъ; однако козы и овцы траву онаго ѣдятъ безвредно; другая скотина не трогаетъ.

2. Корень онаго въ недостаткѣ можетъ замѣнить обыкновенный рвотный корень ипекакуанны—*psychotria emetica*: *Соболевскій*.

3. Листы даютъ довольно—желтую краску, собираемые при разцвѣтаніи.—Окрашиваемую матерію предварительно приготовить должно посредствомъ квасцовой воды.

ВѢТРЕНИЦА ЛѢСНАЯ, или ЛѢСНОЙ ОДНОМѢСЯЧНИКЪ—
aconone nemorosa, L.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, въ рощахъ, по краямъ лѣсовъ и между кустарниковъ на островахъ Невы рѣки, и вездѣ во множествѣ растущее весною;—цвѣтеть въ Маѣ мѣсяцѣ.

Качества—ядовитыя, отъ остраго летучаго начала зависящія.

Запахъ—травы и цвѣтовъ слабый; *вкусъ*—острый, жгущій.

Сила—ѣдкая, натягивающая пузыри—*vesi-
caps.*

УПОТРЕБЛЕНІЕ—наружное. Свѣжіе толче-
ные листья, въ весеннихъ лихорадкахъ во вре-
мя знобленія прикладываются, по совѣту *Бер-
гга* къ плечу, или къ пястью руки—*ab car-
pum*;—въ шелудяхъ и полуголовой долгопро-
должительной боли (мигрень—*hemigranium*) *де-
Шесно* совѣтуетъ прикладывать къ страдаю-
щей части; въ спинной ломотной боли—*rheu-
matismus dorsalis*, полагается между плечъ: *Мел-
линъ*; въ бедренной и членовой ломотахъ—
arthrodynia rheumatica, тоже къ страдающимъ
частямъ прикладывается вмѣсто шанскихъ
мухъ: *Шведіоръ*.—По замѣчанію *Менха* и
Соболевскаго: не надобно долго держать на
тѣлѣ этого средства, а только пока кожа въ-
сколько возвысится и покраснѣетъ; ибо натя-
нутые пузыри весьма долго не заживаютъ, и
превращаются не рѣдко въ язвы. По наблюде-
ніямъ *Кранфа*, жабникъ огненный и остросоч-
ный—*ganunculus flammula et r. acris*, имѣютъ
такія же врачевныя свойства, и при томъ
гораздо надежнѣе могутъ быть прикладываемы
во время лихорадочныхъ приступовъ къ
рукамъ и ногамъ, вмѣсто горчичника—*syna-
rismus*; см. жабникъ.

Примѣчанія. 1. Въ Сибирскихъ степяхъ съ-
мянной пухъ этого растенія можно собирать пудами

и обрабатывать оный какъ хлопчатую бумагу. Г. Фалькъ видѣлъ тамъ же шапки и перчатки, изъ этого пуха сдѣланныя.

2. Голодные коровы и другой скоть, наѣвшисъ этого растенія, получаютъ кровавое мочетеченіе, воспаленіе внутренностей, и не рѣдко кровавый поносъ, отъ чего и умирають.—Надлежитъ въ такомъ случаѣ давать имъ по стакану свѣжаго постнаго масла, смѣшаннаго пополамъ съ уксу-сомъ, 2 или 3 раза въ день, и поить отваромъ пшеничныхъ отрубей (*).

ВЪТРЕННИЦА ПЕЧЕНОЧНАЯ, или ТРИЛИСТНИКЪ ЧИСТЫЙ;
завитки—*anemone hepatica*, L.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, въ тѣнис-тыхъ мѣстахъ и на горахъ растущее, какъ-то: на Пулковской и Дудоровой горахъ, на Волгѣ, Камѣ, и въ другихъ каменистыхъ мѣ-стахъ.—Цвѣтеть въ исходѣ Апрѣля и въ на-чалѣ Мая.

Качества—слабыя; трава и цвѣты *запа-ху и вкусу* не имѣють.

Сплу—слегка вяжущую, раноцѣлительную.

(*) Я на опытѣ видѣлъ пользу этихъ средствъ въ Лиф-ляндіи, во время скотскаго падежа 1798 года, свирѣпст-вовавшаго въ Іюнѣ и Іюль мѣсяцахъ.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Ея траву съ цвѣтами пьютъ вмѣсто чая: полагая 1 унцію на фунтъ горячей воды, отъ внутреннихъ заваловъ, желтjаницы, капельнаго мочетеченія, теченія гною изъ мочеваго пузыря, въ кровохарканіи и поносахъ; *снаружи*: въ видѣ полосканья въ гортанной жабѣ, промыванія и примачиванія старыхъ смрадныхъ язвъ; или свѣжіе толченые листы прикладываются на раны вмѣсто катаплазмы: *Фогель, Турнефортъ.*

Примѣчаніе. Овцы и козы ѣдятъ охотно это растеніе; коровы, лошади и свиньи не трогаютъ: *Соболевскій.*—Пчелы первое весеннее питаніе получаютъ изъ цвѣтовъ онаго.

ВЪТРЕНИЦА ПРОСТРѢЛЬНАЯ, или сонъ—*anemone pratensis, l.*

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, весеннее, въ умѣренной Россіи и Сибири растущее въ необработанныхъ поляхъ, по засѣкамъ близъ С.-Петербурга, и во многихъ другихъ мѣстахъ.—Цвѣтетъ въ Маѣ мѣсяцѣ.

Качества—ядовитыя, зависящія отъ остраго и экстрактнаго начала, соединеннаго съ камфорнымъ масломъ: *Гейеръ.* Запаху свѣжая трава и цвѣты не имѣютъ: *вкусъ* острый, жгущій, и долго остающійся.

Сила—ѣдкая, раздражающая, разводящая, мочегонительная, глазная.

УПОТРЕБЛЕНИЕ: Въ начинающей слѣпотѣ, или глазомъ подтекѣ—cataracta incipiens, пятнахъ роговидной оболочки, и въ другихъ глазныхъ болѣзняхъ; одобряется также: въ бездѣйствии членовъ или параличѣ, и въ венерическихъ припадкахъ, какъ-то: въ ночныхъ члено-составныхъ боляхъ, опухоляхъ костей, нечистыхъ язвахъ, затвердѣннн ядеръ, шишкахъ около прохода (condylomata) и въ костоѣдѣ:
Штеркѣ.

Количество. Сухой травы съ цвѣтами, отъ 1—3 драхмъ наливаютъ 12 унц. горячей воды, которую, настоявъ чрезъ четверть часа въ покрытомъ сосудѣ, процѣдить, и принимать ежедневно три раза: отъ 2—4-хъ унцій; — снаружи прикладывается вмѣсто примочки.

Въ аптекахъ готовятъ:

Экстрактъ простерльной вътреницы (extract. pulsatillæ nigricantis (*)), въ упомянутыхъ болѣзняхъ дается на *пріемъ*: отъ 2—6 гранъ, два или три раза въ день, и мало по малу возвысить можно до 8, 20 и 40 гранъ, въ пилюляхъ, или въ порошокѣ съ сахаромъ.

(*) Pharmacop. Rossica civilis, p. 211.

Примѣчанія. 1. Изъ ея цвѣтовъ выжимають сокъ, и дѣлають съ квасцами хорошую зеленую краску, для писанія и рисовки годную.

2. Траву эту козы и овцы ѣдятъ безвредно, а другая скотина не трогаетъ.

3. Свѣжіе толченые листы могутъ служить вмѣсто испанскихъ мухъ, натягивая пузыри въ кожѣ (*vesicantia*).

Г.

ГВОЗДИЧКА ПОЛЕВАЯ, или пушистая—*dianthus plumarius*, 1.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, растущее въ умѣренной Россіи, также около устья Невы рѣки, и на песчаныхъ берегахъ между Петергофомъ и Ораніенбаумомъ.—Цвѣтетъ въ Іюнь и Іюль мѣсяцахъ.

Качества. *Запахъ* пріятно-душистый.

Сила—побуждающая, нервная.

Употребленіе. Въ видѣ консервы одобряется какъ ободряющее средство, полезное въ обморокахъ, дѣтскомъ родимчикѣ, и въ другихъ чувственно-жильныхъ припадкахъ, происходящихъ отъ слабости нервовъ: *Соболевскій*.

Количество. По чайной ложкѣ, дѣтямъ даютъ нѣсколько разъ въ день; взрослымъ, отъ 1 — 2 унцій.

ГЛАЗНИЦА АПТЕЧНАЯ, или очная помощь; очная ТРАВА: СВѢТЛИКЪ—*euphrasia officinalis*, l.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, вездѣ по сухимъ лугамъ, полямъ и прилѣскамъ во множествѣ растущее, также на островахъ Невы рѣки, и на Поклонной горѣ.

Качества. Трава *запаху* не имѣетъ; *вкусъ* горьковатый и слабо-вяжущій.

Сила—разводящая, укрѣпляющая.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Рекомендуютъ въ глазныхъ болѣзняхъ, какъ-то: въ летаніи облачковъ, или мушекъ предъ глазами, затмѣніи, начальной слѣпотѣ и пятнахъ, застилающихъ зрѣніе; выжатый сокъ изъ свѣжихъ листовъ, смѣшанный съ бѣлымъ виномъ и медомъ, впускаемый по немногу въ глаза ежедневно, оказываетъ желаемую пользу: *Франкъ*. Исландцы тоже съ успѣхомъ употребляютъ выжатый сокъ, какъ лучшее глазное средство: *Ола-Фзенъ*; *Берій* тоже подтверждаетъ. — *Гильданъ*, *Ланзонъ* и *Виллановъ* пользовали удачно 70-лѣтнихъ стариковъ этимъ растеніемъ, имѣвшихъ помраченное зрѣніе, или темноту въ глазахъ (*caligo*), настоявъ оное въ бѣломъ виноградномъ винѣ,

которое давали внутрь, и снаружи помощью питанных полотенец прикладывали. — *Бур-гавъ* подтверждаетъ, что кромѣ этого, и порошокъ сушеныхъ листовъ, понемногу вдуваемый въ глаза, тоже полезенъ; винную наливку этого растенія *Гофманъ* хвалитъ въ завалахъ печени и желтухѣ.

Количество. 3 драхмы варятъ съ 6 унціями воды, или винограднаго вина; снаружи, какъ сказано выше.

Примѣчаніе. Ее пожираетъ всякая скотина, кромѣ свиней.

ГОЛУБКИ, или ПАВЛИНЫЕ ОЧКИ; ВОДОБОРЬ; ОРЛКИ; КОЛОКОЛЬЧИКИ; ОКСАМИТЬ—*aquilegia vulgaris*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, растущее въ садахъ и по краямъ лѣсовъ: въ Стрѣлиной и въ Паргаловѣ. — Цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюль мѣсяцахъ.

Качества—острыя; сѣмянъ: клейко-масляныя.

Сила травы побуждающая, потъ и мочу гонящая, отверзающая.

Употребленіе.—Трава, употребляемая въ отварѣ и винной настойкѣ, помогаетъ въ грудныхъ мокротныхъ припадкахъ, остановленіи мѣсячныхъ кровей, желтухѣ и вѣтряной ко-

ликѣ: *Шрицеръ, Паули*; выжатый сокъ изъ свѣжаго растенія служитъ къ поправленію цынготной порчи соковъ (*sachexia scorbutica*), и другихъ т. п. *Ейзель, Шубертъ*; въ кожныхъ болѣзняхъ, особенно для пособленія высыпанію оспы и кори у дѣтей: *Паули, Паулини*; въ холодности любви, или для возбужденія похоти: *Соболевскій*.

Количество. Цвѣты въ видѣ консервы и сиропа даются по 1 унціи; трава и корень даются въ порошокѣ по драхмѣ съ виномъ; или одна унція полагается на фунтъ воды для настойки и отвара.

Примѣчанія. 1. Сельскіе лекаря даютъ сѣмя этого растенія малымъ дѣтямъ отъ родимца, въ порошокѣ $\frac{1}{4}$ золотника также: и женщины въ тяжелыхъ родахъ принимаютъ оное съ винограднымъ виномъ по 1 золотнику.

2. Изъ этихъ цвѣтовъ пчелы собираютъ медъ;— цвѣтные лепестки, налитые горячею водою, даютъ изрядную спнюю настойку, которая отъ кислоты краснѣетъ, а отъ щелочи зеленѣетъ; а потому годятся для синей краски и химическихъ опытовъ.

ГОРЕЦЪ АПТЕЧНЫЙ, ИЛИ СЕРДЕЧНЫЙ КОРЕНЬ; ЗМѢВИКЪ; УЖОВНИКЪ; ПЕСТИКЪ; ГОРЛЕЦЪ *polygonum bestorta*, 1.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, въ умѣренныхъ краяхъ Россіи и Сибири на влажныхъ

лугахъ во множествѣ растущее, также по лугамъ у Ладожскаго канала и между рѣками: Назією, Лавою и Обью.

Качества зависятъ отъ вяжущаго начала, избытка въ корнѣ.

Запахъ—свѣжаго корня жерухою отзывается; сухой не имѣетъ; *вкусъ* сильно-вяжущій.

Сила—вяжущая, укрѣпляющая.

Употребленіе. По совѣту *Куллена*, вмѣстѣ съ горечавкою—*gentiana lutea*, полезно давать: въ перемежныхъ лихорадкахъ, въ долговременныхъ поносахъ: *Ганеманнъ*; въ астеническихъ кровотеченіяхъ, теченіи бѣлей, и мокротномъ теченіи изо ствола (*blepogrhæa*): *Шведіоръ*, *Бурдахъ*. — Снаружи, въ видѣ полосканья и впрыскиваній: въ шатаніи зубовъ, флюсѣ, цыготной порчѣ десенъ, выпаденіяхъ проходной кишки, или маточнаго рукава, и для промыванія мокнущихъ язвъ—*ulsera laxa, atonica*.

Количество. Въ порошокъ дается отъ 20 гранъ до полдрахмы; въ поносахъ, отъ 5—10 гранъ съ аравійскою камедью, или съ вишневымъ клеемъ въ пилюляхъ; для отвара: 2 драхмы на 6 унц. воды, которую кипятить, пока останется 4 унціи жидкости. Снаружи

служить полосканьемъ и примочкою. Толченые листы прикладываются для остановленія крови, и заживленія поверхностныхъ ранъ.—Корни, отвариваемые въ водѣ, полезны для укрѣпляющихъ ваннъ.

Примѣчанія: 1. Траву эту скотина ѣсть охотно. — Отъ ужаленія змѣй, ужей и другихъ ядовитыхъ гадницъ, въ деревняхъ прикладываютъ свѣжій толченый корень къ угрызенному мѣсту не безъ успѣха; отъ чего и названіе заимствуетъ.

2. Корни этого растенія годятся для составленія чернилъ, черной краски и для дубленія кожъ.— Пчелы изъ цвѣтовъ собираютъ много воску и меду.

ГОРЕЦЪ ВОДОПЕРЕЧНЫЙ, или водяной перецъ; ТРАВА чечина; почечуйникъ—*polygonum hydropiper*, L.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, во всей Россіи произвольно растущее, во рвахъ, на мокрой почвѣ; въ С.-Петербургской губерніи по берегамъ Невы рѣки, по болотамъ; около водяныхъ каналовъ, на Волгѣ, на Тому, и проч.

Качества. Трава *запаху* не имѣеть; *вкусъ* острый, жгущій.

Сила—мочегонительная, ѣдкая и воспаляющая кожу—*tubefaciens*.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Снаружи прикладывается толченая къ ножнымъ водянымъ опухольямъ, также для разведенія твердыхъ холодныхъ опухолей, очищенія шелудивыхъ струшьевъ: и отдѣленія помертвѣлости — sphacelus: *Турнефортъ*. — Внутри, по причинѣ ѣдкости, принимать опасно; хотя нѣкоторые и рекомендуютъ въ почечуѣ и каменной болѣзни; однако въ этихъ случаяхъ надежнѣе употреблять можно горець почечуйный — *polygonum persicaria*, L., который различествуетъ отъ предыдущаго листьями пятнистыми и снизу бѣловатыми. Растетъ вездѣ по влажнымъ мѣстамъ.

Количество. Свѣжовыжатый сокъ изъ всего растенія 2 унціи, разведши 2 фунтами молочной сыворотки, пьютъ отъ водяной за-
кожной болѣзни — *anasarca*, по чайной чашкѣ, каждые 2 часа: *Роке*.

Примѣчанія. 1. Изъ обоихъ вывариваютъ желтую краску, годную для крашенія шерсти, которую предварительно напитываютъ квасцами. —

2. Простолудины прикладываютъ листья этой травы къ почечуйнымъ шишкамъ; откуда и названіе заимствуетъ. — Въ Германіи нѣкоторые начали употреблять это растеніе вмѣсто обыкновеннаго перца.

3. Свѣжая толченая трава прикладывается домашнимъ животнымъ для очищенія червивыхъ и другихъ худосочныхъ язвъ.

ГОРЧИЧНИКЪ АПТЕЧНЫЙ, или ХВОСТОВАЯ ТРАВА; ЖЕЛТО-
 ЛЕНЬ; свиной хвостъ—*peucedanum officinale*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, по болотнымъ и тенистымъ мѣстамъ во многихъ мѣстахъ Россіи растущее, именно: между рѣками Руссою и Систою, около Царскаго Села, и по Выборгской дорогѣ за Поклонную горою.

Качества. Корень наполненъ бѣловатымъ сокомъ; *запахъ* имѣеть тошноватый; *вкусъ* сладковато-пряный, пріятный.

Сила—побуждающая, разводящая, мочегонительная, грудная, очищающая.

Употребленіе. Въ мокротномъ удушѣ, *Кранцъ*; въ головной боли и грудныхъ припадкахъ, простудою причиненныхъ, *Соболевскій*; въ нервныхъ маточныхъ припадкахъ и запорѣ мѣсячныхъ кровей, *Аппократъ*, *Галенъ*; въ зубной боли, цынготной чесоткѣ и гнилыхъ язвахъ, отваръ этого корня служить полосканьемъ и примочкою: *Делій*, *Вагнеръ*, *Бурдахъ*.

Количество. 1 унція полагается на фунтъ воды для отвара; сухой корень кладутъ на зубы для утоленія боли; въ такомъ случаѣ и полоскать отваромъ полезно.

горохъ—*pisum sativum*, L.

Мѣсто. Растеніе огородное, ежегодно съ-
емое въ огородахъ и на поляхъ.

Качества—мучныя.

Сила—питательная, мочегонительная; го-
роховой муки—разбивающая.

Употребленіе. Зеленыя молодыя стручки
варять въ похлебкахъ, составляющихъ легкую
и питательную пищу; сухой горохъ, растертый
въ супѣ, тоже питателенъ, но производитъ
пученіе живота отъ вѣтровъ. Гороховый от-
варъ сильно дѣйствуетъ на мочевые пути, и
гонитъ каменную дресву изъ почекъ и моче-
ваго пузыря, что самое подтверждають: *Иппо-
кратъ*, *Галенъ*, *Евгеній*, *Лаврембергъ*. По
наблюденіямъ *Діоскорида* и *Турнефорта*:
гороховый отваръ производитъ жестокия боли,
ежели въ почкахъ и мочевомъ пузырьѣ будутъ
находиться большіе камни или язвы—*exulcera-
tiones*. Впрочемъ, при долговременномъ употреб-
леніи онаго отвара, *Фонъ-Свитенъ* ничего
не замѣтилъ. — Гороховая мука—*farina ciceris*,
въ видѣ сухой припарки прикладываемая, весь-
ма хорошо разводитъ твердыя опухоли грудей
и ядеръ: *Шцильманъ*.

Примѣчанія. 1. Посредствомъ гороха, мочена-
го въ хорошемъ укусѣ цѣлые сутки, можно ло-

вить птицъ руками; ибо, поѣвши онаго, упадаютъ и дѣлаются какъ мертвыя.

2. Опытный экономя г. *Дандоло* нашель, что горохъ, обжариваемый на умѣренномъ огнѣ около 20 минутъ, и потомъ, измолоть 2 части, смѣшать съ 1 частию цикорнаго кофе, выходитъ весьма вкусный напитокъ, замѣняющій индійскій и леванскій кофе (*). Стебла гороховыя зеленыя и высушенныя служатъ хорошимъ кормомъ для коровъ, умножающимъ молоко.

ГОРЧИЦА БѢЛАЯ САДОВАЯ, или ГОРУШИЦА—*brassica
equis*, I.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, въ садахъ, на поляхъ въ южной Россіи произвольно растущее.

Качества зависятъ отъ острой летучести; *запахъ* сѣмянъ тяжеловатый; *вкусъ* острый, горячительный, пронизательный, но слабѣе черной горчицы.

Сила, подобная черной горчицѣ—*sinapis
nigra*, I.

(*) Для этого преимущественно избирается такъ называемый сахарный горохъ, который, высушивъ по совершенномъ его созрѣніи, какъ сказано, употребляютъ. Сѣверной Почты № 24, 1811 г.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ цынгѣ, мокротной одышкѣ, водяной болѣзни и для возбужденія похоти, *Галенъ* рекомендуетъ флегматикамъ или мокротнымъ людямъ (*); въ параличѣ языка, *Кранцъ* совѣтуетъ жевать горчичное сѣмя, или полоскать ротъ винною наливкою.

Количество. Въ порошокъ сѣмя дается отъ 10—15 гранъ и болѣе; для наливки полагается 1 унц. на фунтъ бѣлаго вина, или варять съ молокомъ; процѣженную сыворотку пьютъ ежедневно по 6 унцій. — Погруженіе дѣтороднаго уда въ винную наливку пользуется бездѣйствіемъ онаго, — *impotentia virilis*: *Франкъ*.

ГОРЧИЦА ЧЕРНАЯ—*sinapis nigra*, L.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, въ умѣренной Россіи произвольно растущее на поляхъ, и въ садахъ изобильно сѣется, особенно въ Астрахани.

Качества. Сѣмяна содержатъ великое количество остраго вещества, соединеннаго съ летучимъ масломъ и нѣсколько жирнымъ.

Запахъ слабый, при треніи издаетъ пронизательно-острый; *вкусъ* тоже острый, горьковатый.

(*) *Excitat ad venerem tardos eruca maritos* (Columel)

Сила превосходнѣе предыдущей, побуждающая, раздражающая, поспѣшествующая пищеваренію, разводящая мокроты, противуцынготная, отвращающая запоры и мочегонительная въ меньшемъ количествѣ; въ большомъ возбуждающая рвоту.

Употребленіе—обыкновенное для правы кушаньевъ, которая пряностью своею не только усиливаетъ аппетитъ, но притомъ, побуждая желудочныя волокна, поспѣшествуетъ пищеваренію, и разводитъ густыя мокроты: *Иппократъ*, *Колумелла*, *Бауминъ*; а потому и въ другихъ астеническихъ болѣзняхъ, зависящихъ отъ слабости организма, одобряется горчица, какъ-то: въ цынгѣ и мокротномъ удушѣ: *Шомель*; въ перемежныхъ весеннихъ лихорадкахъ, завалахъ чревныхъ, водяной болѣзни и параличѣ: *Меадъ*, *Гофманъ*, *Галлеръ*, *Берий*; въ простудныхъ злокачественныхъ лихорадкахъ и мокротномъ кашлѣ безъ воспаления, въ застарѣломъ шумѣ въ ушалѣ, круженіи головы, глухотѣ, хроническомъ ревматизмѣ, частыхъ запорахъ, ипохондрическихъ припадкахъ, въ цынготной разслабленности—*sachexia scorbutica*, и слабомъ выступленіи наружу оспы или кори: *Розенъ*, *Пленкъ*.—Нѣкоторые въ упомянутыхъ болѣзняхъ давали истертое сѣмя въ порошокъ, и

смѣшанное съ бѣлымъ виномъ; а другіе предписывали цѣльное принимать ежедневно, по утру и въ вечеру по столовой ложкѣ.

Снаружи. Толченое сѣмя, вареное въ водѣ, служить банею, и примочкою въ простудной ломотѣ—*arthrodinia rheumatica*, и ознобленіяхъ—*perniones*: *Тиссотъ*; погруженіе дѣтороднаго уда въ горчичный отваръ, умѣренно теплый, пользуется невстаниху—*anarthrodisia*, и параличное расслабленіе онаго—*paralysis penis*: *Соважъ*, *Гмелинъ*, *Гесперъ*; жеваніе сѣмянъ завернутыхъ въ полотенцо, пользуется зубную боль, и параличъ языка: *Пленкъ*. Въ видѣ горчичника—*synarismus*, или катаплазмы, состоящей изъ кваснаго тѣста, и тертой горчицы прикладывается къ икрамъ или подошвамъ ногъ, какъ отвлекающее средство: въ лихорадочномъ бредѣ, головной боли, ревматизмѣ, вступившей внутрь падагрѣ, параличѣ или бездѣйствіи членомъ; также къ скуловымъ опухолямъ, и паховикамъ—*parotides et bubones*, весьма медленно приходящимъ въ нагноеніе; для натягивающаго дѣйствія — *scorpe tubefaciente*; *Бертеле* совѣтуетъ прибавлять толченый чеснокъ, и тертый хрѣнъ въ горчичной катаплазмѣ, которую однако болѣе 2 или 4 часовъ не держать на тѣлѣ; *Ружемонтъ*, повторенными таковыми прикладами между плечъ, по-

дуразслабленныхъ и параличныхъ — hemiplegici et paralytici, отъ апоплексическаго удара — apoplexia, удачно пользовалъ.

Количество. Цѣльное сѣмя дается по драхмѣ, или въ порошокѣ, каждыя 2 часа; для приправы кушанья и салата: толченое сѣмя до 4 драхмѣ смѣшивается съ уксусомъ и сахаромъ; для наливки полагается отъ $\frac{1}{2}$ — 1 унціи на фунтъ воды, или молочной сыворотки.

Въ аптекахъ приготавливаютъ:

1. Горчичную сыворотку — serum lactis sinapinum (*), которая полезна: въ астенической ломотѣ, разслабленности нервной системы, параличѣ и въ чревныхъ мокротныхъ болѣзняхъ. Принимаютъ къ ночи по 6 унцій: *Вилліе*.

2. Противуцынготное горчичное пиво — cerevisia antiscorbutica (**), употребляемое съ пользою: въ скорбутѣ, параличѣ и водяной болѣзни, отъ половины до одного фунта въ день.

3. Горчичное полосканье — gargarisma sinapinum (***), которое въ мокротной жабѣ —

(*) Pharmacop. castr. Ruth. p. 344.

(**) Тамъ же p. 235.

(***) P. 259.

angina pituitosa, разслабленіи гортаннаго язычка и параличъ языка, оказываетъ полезное дѣйствіе.

4. Горчичная катаплазма острая и слабая—*cataplasma sinapium acre et mite* (*). Конхъ польза и употребленіе упомянуты выше.

Примѣчанія. 1. Изъ сѣмянъ приготовляютъ такъ наз. французскую горчицу, т. е. обыкновенную горчицу, съ уксусомъ, или съ иною кислотою мелютъ на мельницѣ, чрезъ что щелочная летучесть оной ослабѣваетъ, и такимъ образомъ для приправы мясныхъ и рыбныхъ кушаньевъ годною дѣлается.—Иныя предварительно подвергаютъ броженію съ бѣлымъ виномъ, или съ винограднымъ уксусомъ, или эстрагоннымъ.

2. Горчичное масло, выжимкою приготовляемое, въ общежитіяхъ употребляютъ: въ ломотныхъ опухоляхъ, недвижности составовъ, и въ каменной болѣзни; въ послѣднемъ случаѣ смѣшанное по равной части съ лимоннымъ сокомъ, или съ слабою селитряною кислотою—*acidum nitric. dilut.* особенную пользу оказываетъ.

3. Бѣлая и черная горчицы, пряностію своею, привозной иноземной не уступаютъ.

(*) Р. 232, 233.

ГОРЧИЦА ПОЛЕВАЯ, ИЛИ СВЕРБЛГУЗКА ПАШЕННАЯ—
sinapis arvensis, L.

Мѣсто. Растеніе однолѣтное, во всей Рос-
 сіи произвольно растущее; изрѣдка находится
 около Ямбурга, Пулковской горы и въ Пар-
 галовѣ.

Качества, сходныя съ обыкновенною гор-
 чицею, но нѣсколько слабѣе оной.

Употребленіе. Толченое сѣмя, съ уксу-
 сомъ смѣшанное, полезно употреблять въ пи-
 щѣ постной и скоромной цынготнымъ людямъ;
 а особенно для морскихъ служителей, кои
 принуждены питаться соленымъ и копченымъ
 мясомъ.—Свѣжіе листы весною можно варить
 во щахъ вмѣсто капусты, и въ случаѣ нужды,
 посоливъ заготовлять въ прокъ, такъ какъ
 это растеніе многіе употребляютъ съ пріятно-
 стію въ кушаньяхъ.—Изъ сѣмянъ выжимаютъ
 масло, годное для всякаго домашняго употреб-
 ленія, которое можетъ совершенно замѣнить
 деревянное масло и конжутное — *oleum sem.*
sesami orientalis (*).—100 фунтовъ этихъ сѣ-
 мянъ даютъ 30 ф. масла: *Фрибе*.

Траву эту ѣсть домашняя скотина весьма
 охотно: *Соболевскій*.

(*) Pharmacop. castrens. R. p. 157.

ГРАВИЛАТЬ АПТЕЧНЫЙ, или ГРЕБНИКЪ; ГВОЗДИЧНИКЪ;
ЧИСТЕЦЪ—*geum urbanum*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, изобильно растущее въ Россіи около заборовъ, и въ тѣнистыхъ мѣстахъ, также около Охтенскихъ заводовъ, въ Стрѣлиной, и въ окружности Петергофа; въ Ингерманландіи, при Ладожскомъ каналѣ, и въ другихъ тучныхъ мѣстахъ.

Качества зависятъ отъ вяжущаго начала, соединеннаго съ малымъ количествомъ летучаго масла (*). Свѣжій корень, собираемый весною на сухой почвѣ, *запахъ* имѣетъ гвоздичный; сухой теряетъ; *вкусъ* пряный, горьковато-вяжущій.

Сила — побуждающая, укрѣпляющая, противугниlostная и совершенно замѣняющая хину—*præstans cort. Peruviani succedaneum*: *Бурдахъ, Карпинскій*.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Во всѣхъ случаяхъ, гдѣ одобряется перувианская корка—*cinchona officinalis*.

(*) Дюнканъ изъ полъ-унціи этого корня извлекъ: смолистаго экстракта 30 гранъ, и камедьно-вяжущаго 20 гр. Содержится также начало, подобное росно-ладонной кислотѣ — *acid. benzoic.*, ароматная смола и вяжущее вещество. Буильонъ-ла-Гранжъ нашелъ въ этомъ гравилатѣ тѣже начала, кои содержитъ лучшая перувианская корка, или хина.

nal., гравилатный корень оказываетъ желаемую пользу; а особенно въ упорныхъ перемежныхъ лихорадкахъ, и другихъ болѣзняхъ астеническаго свойства: *Бурдахъ*, *Балдингеръ*, *Менхъ*, *Гезеніусъ*; средство это почитали и древніе врачи: *Рай*, *Турнефортъ* и *Шомель* надежнымъ противулихорадочнымъ—*specificum febrifugum*; въ Германіи и Швеціи повторенные опыты надъ нѣсколькими сотнями лихорадокъ, происходящихъ отъ слабости—*febres atonicæ*, гдѣ часто хина оставалась бездѣйственной, этимъ единственно новымъ противулихорадочнымъ корнемъ удачно пользовались: *Ганъ*, *Кохъ*, *Веберъ*, *Горнъ*, *Бертеле*; одобряется также въ слабости желудка и трудномъ пищевареніи, поносѣ, запорѣ мѣсячныхъ кровей, блѣдноцвѣтіи—*chlorosis*, теченіи бѣлей—*leucorrhœa*, *bleporrhœa*, истерикѣ, судорожномъ кашлѣ, долговременныхъ кровотеченіяхъ, водяной болѣзни, чахоткѣ; и въ хроническихъ дѣтскихъ болѣзняхъ, какъ-то: въ сухоткѣ, золотухѣ, сидняхъ или аглинской болѣзни—*rhachitis*, и проч.: *Шведіоръ*, *Будрахъ*, *Пленкъ*. Снаружи отваръ корня употребляется для укрѣпляющихъ примочекъ, омываній и полосканья, въ цынготной гнилости десенъ, гнилыхъ язвахъ и рытикахъ, испускающихъ тонкую смрадную матерію—*ulcera ichor diffluentia*: *Кранцъ*; онъ же одобряетъ наливку свѣжихъ листовъ въ подагрѣ.

Количество. Корень дается въ порошокъ отъ $\frac{1}{2}$ —1—2 и 3 драхмъ съ медомъ, въ видѣ кашки; для отвара полагается 1 унція на фунтъ воды, которую надлежитъ кипятить въ покрытомъ сосудѣ, пока останется 6 унцій жидкости, принимаемой по чайной чашкѣ; винная наливка дается каждыя 2 часа по 2 столовыя ложки.—*Крейсмъ* въ пользованіи лихорадокъ и гнилыхъ горячекъ совѣтуетъ прибавлять къ отвару гравилатнаго корня Гофмановы капли — æther. sulphuric. alcoholisat. или винный спиртъ.

На этотъ конецъ по методу *Бухлава* можно готовить гравилатную настойку — *tinctura rad. gei. urbani*, наливъ 2 унц. толченаго корня 4 фунтами Французской водки, или виннаго спирта—*alcohol dilutum*, которую, настоявъ въ тепломъ мѣстѣ нѣсколько дней, процѣдить.— Въ весеннихъ и осеннихъ трясучкахъ дается съ наилучшимъ успѣхомъ $\frac{1}{2}$ унціи на приемъ, 2 или 3 раза въ день.—Настойку эту и порошокъ, замѣняющій хину—*pulvis sichonæ succedaneus*, одобряетъ также *г. Виліе* (*). О составленіи *зубнаго порошка*, см. при описаніи завязнаго корня—*tormentilla erecta*, 1.

(*) Pharracop. castrens. R. p. 241, 422.

Примѣчанія. 1. Корень выкапывать должно въ Апрѣлѣ или Маѣ мѣсяцахъ, который, очистивъ и высушивъ, хранить въ покрытыхъ сосудахъ: *Бургавъ*. Новые опыты удостовѣряютъ, что этотъ корень не только замѣняетъ хину, но также ангустурную корку и персидскіе лавровые бобы — *laurus peschurim*.

2. Въ Швеціи, по свидѣтельству *Линнея*, гравилатнымъ корнемъ настаиваютъ пиво, которому онъ даетъ гвоздичный запахъ и пріятный вкусъ, и предохраняетъ отъ окисанія.

3. Положенный въ сундукъ или шкапъ, между платья, сообщаетъ пріятный запахъ, и прогоняетъ моль.—Молодые листья можно кушать вмѣсто салата.

ГРАВИЛАТЪ РУЧЕЙНЫЙ, или ВЫВИШНИКЪ БОЛОТНЫЙ—
geum rivale, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, по мокрымъ лугамъ и болотнымъ мѣстамъ, вездѣ изобильно растущее; также по островамъ Невы рѣки, около водяныхъ каналовъ и по лѣсистымъ мѣстамъ.

Качества—изрядныя, подобныя предыдущему, но нѣсколько слабѣе онаго; *вкусъ* кор-

ня горьковатый, вяжущій; *запахъ* слабый, тинистый, или затхлый.

Сила—вяжущая, укрѣпляющая, противулихорадочная, противукислотная—*antacida*: *Соболевскій*.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ слабости желудка, долго-продолжительныхъ поносахъ, маточныхъ и почечуйныхъ непомѣрныхъ кровотеченіяхъ, весеннихъ перемежныхъ лихорадкахъ: *Карпинскій*.

Количество. Въ порошокъ дается отъ 2 скрупуловъ до 1 драхмы; снаружи присыпаются венерическія язвы: *Шведіоръ*; для отвара полагается полъ-унціи корня на фунтъ воды.

Примѣчанія. 1. Коренья собираются весною и, высушивъ, хранятъ ихъ въ закрытомъ сосудѣ.

2. Траву его козы и овцы ѣдятъ охотно; коровы, лошади и свиньи не много.

3. По опытамъ *Бергя*, гравилатный корень весьма способенъ для дубленія кожъ, и гораздо дѣйствительнѣе, нежели дубовая корка.

Противулихорадочный порошокъ — *pulvis antifebrilis*, для бѣдныхъ можно съ пользою предписывать слѣдующимъ образомъ:

R. pulv. rad. gei urbani, s. g. rivalis drachmas sex,
 ——— ——— gentianæ luteæ, vel

R. pulv. rad. acori calami drachmas duas,
m. divid. in. VIII partes æquales.—S. (*).

Въ небытности лихорадки—extra raгохузмим, принимать по 1 порошку съ водою; дѣтямъ, смѣшавъ съ медомъ, давать въ видѣ кашки, по чайной ложкѣ. Такого же свойства *противулихорадочный отваръ* предложень на стр 201.

ГРАНАТНИКЪ; ГРАНАТОВОЕ ДЕРЕВО—*punica granatum*, l.

Мѣсто. Дерево въ южныхъ краяхъ Россіи дико растущее, особливо на Кавказской линіи, по морскимъ берегамъ Херсона между Балаклавы и Ялты; также въ разныхъ мѣстахъ разводится по садамъ на Терекѣ.

Качества. Гранатные цвѣты—*balaustiorum flores*, и корка плодовъ—*malicorium*, имѣють *вкусъ* вяжущій, горьковатый, зависящій отъ дубильнаго и экстрактнаго начала — *taninum*: *Рейсъ*.—Сокъ зрѣлыхъ плодовъ кисло-сладкій, пріятный.

Сила—цвѣтовъ меньше вяжущая, нежели яблочной корки, которая оказываетъ болѣе

(*) Т. е. возьми порошку гравилатнаго корня, и горечавки желтой, каждаго по 6 золотниковъ; или вмѣсто горечавки ирнаго корня 2 золотника. Смѣшавъ, раздѣли: первое смѣшеніе на 12, а второе на 8 равныхъ частей.

укрѣпляющую, противулихорадочную и противуглистную.—Сокъ гранатовыхъ яблокъ холодить, утоляетъ жажду, и укрощаетъ остроту желчи; а потому одобряется въ воспалительныхъ лихорадкахъ, желчныхъ, рвотѣ и цынгѣ.
Пленкѣ.

Употребленіе. Цвѣты, въ видѣ водяной или винной наливки, составляютъ укрѣпляющее полосканье, при расслабленіи гортаннаго язычка, и въ мокротной жабѣ; также для вприскиванья и примочки: въ мокротномъ стволномъ теченіи, бѣляхъ и расслабленіяхъ маточнаго рукава, или задняго прохода.—Однако отваръ яблочной корки—*decoc. malicogii*, въ упомянутыхъ случаяхъ, также и внутрь употребляемый, для укрощенія кровотеченій и мокротныхъ поносовъ — *profluvia sanguinea et serosa*, гораздо большую пользу оказываетъ.— Корка эта, по вяжущему своему началу—*princip. scytodermicum*, не уступаетъ дѣйствию хины, въ пользованіи перемежныхъ лихорадокъ, которая, по свидѣтельству *Г. Реманна*, будучи употребляемая внутрь, въ соединеніи съ горькими веществами, какъ-то: съ корнемъ горечавки—*rad. gentianæ l.* или съ экстрактомъ вахты—*extract. menyanthidis trifol.* и т. п. сильнѣе дѣйствуетъ.

Количество. Корка эта дается въ порошокѣ по 1 драхмѣ каждый часъ, въ нелихора-

дочный день;—цвѣтныхъ лепестковъ: отъ половины до $1\frac{1}{2}$ драхмы.—Для наружнаго употребленія, полагается 1 унція цвѣтовъ, или корки яблочной на фунтъ воды, или краснаго вина для отвару, служащаго полосканьемъ, впрыскиваньемъ и примочкою въ сказанныхъ болѣзняхъ.

СОСТАВНЫЯ ЛЕКАРСТВА.

1. Отваръ, замѣняющій хину—*decoc-tura cinchonæ succedanea*, составляемый: изъ 2 лотовъ отборной гранатныхъ плодовъ корки, истолченной въ порошокъ, и полъ-драхмы толченой аравійской камеди, которая варить должно въ фунтъ воды, пока останется 6 унцій; процѣдивъ прибавить коричной, или иной ароматной воды полъ-унцій, и столько же инбирнаго сиропа.

Приемъ. Взрослымъ дается полъ-чайной чашки каждый часъ; малолѣтнымъ по столовой ложкѣ. Средство это весьма пріятное и полезное для нѣжныхъ особъ и дѣтей (*).

2. За неимѣніемъ этой корки, я давалъ мѣнѣе армейскимъ больнымъ при Полоцкомъ госпиталѣ 1812 и 13 годовъ, слѣдующій про-

(*) Pharmacop. castrens. R. p. 419.

тивулихорадочный отваръ, простѣе и дешевле приготовляемый.

Изъ вербовой и ясеновой крупно толченыхъ корокъ, каждой по 1 унціи, ирѣнаго корня и горечавки, обоихъ по полуунціи, которыя наливъ рѣчною или ключевою водою, мѣрою 2 бутылки, варить въ покрытомъ сосудѣ, пока укипитъ половина жидкости, и потомъ процѣдить отваръ.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Во время лихорадочной перемежки—*аругехіа*, принимать каждые 2 часа, или чрезъ 3, по чайной чашкѣ.—Ежели у иныхъ дѣлалась тошнота, или рвота: въ такомъ случаѣ, прибавляя къ каждому приему по 5—10 капель сѣрной ароматной кислоты—*acid. sulphuric. aromatic. (*)*, укрощается.

Примѣчанія. 1. Корка гранатовыхъ плодовъ, по опытамъ многихъ врачей, учиненныхъ въ пользованіи перемежныхъ лихорадокъ, можетъ дѣйствительно замѣнять хину;—также и корень коломбы—*rad. colombo*; *menispermum palmatum, l.*, для укрощенія долговременныхъ поносовъ одобряемый.

2. Корка плодовъ дикаго гранатника, гдѣ это дерево растеть во множествѣ, употребляется на дубленіе кожъ.—Отвариваемая съ желѣзнымъ купоросомъ даетъ превосходную черную краску.

(*) Тамъ же, стр. 201.

3. Корка дубовая и чернильные орѣшки, по вяжущему свойству, могутъ употребляемы быть съ равною пользою: *Пеириль*.

ГРЕЧУХА, или ГРЕЧКА; дИКУША—*polygonum fagopyrum*, L.

Мѣсто. Растеніе азіатское, ежегодно на поляхъ сѣмое въ умѣренной Россіи изобильно.

Качества—сѣмянъ мучныя.

Сила—питательная, разводящая.

УПОТРЕБЛЕНІЕ.—Гречвая крупа служитъ питательною пищею; *Павій* рекомендуетъ оную старикамъ, подверженнымъ частымъ запорамъ—*alvus adstricta*; мука одобряется для припарокъ, разбивающихъ и смягчительныхъ: *Кранцъ*; выжатый сокъ изъ свѣжаго растенія полезенъ въ сухомъ воспаленіи глазъ: *Кратонъ*.

Примѣчанія. 1. Изъ сѣмянъ гречухи приготавливаютъ въ Смоленскѣ мелкую крупу, называемую манною.

2. Сѣмя, необдѣланное, служитъ для откармливанія домашнихъ птицъ.—Солома коровамъ и лошадямъ дается вмѣсто сѣна; замѣчено, что овцы отъ ней хвораютъ.—Посредствомъ гноенія, приготавливаютъ изъ гречушной соломы голубую постоянную краску.

3. Въ деревняхъ гречневою мукою присыпають изопрълыя мѣста—*intertrigo*, *excoriatura* у дѣтей.

ГРЫЖОВНИКЪ, или КИЛЬНАЯ ТРАВА; МЕТЛА—*herniaria glabra*, l.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, растущее на сухихъ и пещаныхъ мѣстахъ, отъ Москвы до Урала рѣки.

Качества. Трава *запаху* не имѣеть; *вкусъ* солоноватый, и нѣсколько вяжущій.

Сила — разбивающая, мочегонительная.

Употребленіе. Древніе врачи XVII-го столѣтія давали внутрь выжатый сокъ, и снаружи прикладывали свѣжую траву къ запертой или ущемленной грыжѣ — *hernia carcerata*; похваляется также въ завалахъ внутренностей и водяныхъ опухоляхъ: *Шомель*; для изгнанія мелкихъ камешковъ, и песка изъ мочевыхъ путей: *Кранцъ*; въ притупленіи зрѣнія или тусклости глазъ—*caligo*, отъ чтенія послѣдовавшей: *Грульмантъ*.

Количество. Горсть сухой травы наливаютъ 12 унц. горячей воды, которую пьютъ вмѣсто чая; выжатый сокъ изъ свѣжей травы принимаютъ одинъ, или съ бѣлымъ виномъ по 1 унціи, 3—4 раза въ день. — Снаружи: въ видѣ припарки и примочки глазной.

Примѣчаніе. Скотные врачи даютъ отъ запору мочи домашнимъ животнымъ, по стакану выжатаго сока изъ всего растенія; или 3 горсти онаго варятъ въ 1 бутылкѣ воды, пока укишитъ половина жидкости.

ГРУША, или дуля; глива—*pyrus communis*, l.

Мѣсто. Дерево, во всей Россіи изобильно растущее въ садахъ.

Качества. Зрѣлыя груши имѣютъ *вкусъ* кисло-сладкій, пріятный, зависящій отъ сахарнаго вещества.

Силу—питательную, прохлаждающую.

Употребленіе. Вареная и печеная груши, особенно сочныя, сходствующія съ сладкими яблоками, *Иппократъ* давалъ больнымъ вмѣсто пищи: въ чахоткѣ, простудѣ, удущьѣ и запорахъ.—Снаружи прикладывалъ къ печучуйнымъ шишкамъ для утоленія боли.— Мякотъ печеныхъ грушъ служитъ также полезною припаркою при воспаленіи глазъ — *ophthalmia*:
Кранцъ.

Количество. Свѣжія зрѣлыя груши даютъ больнымъ по желанію; сухія варятъ по нѣсколько унцій въ водѣ, или похлебкѣ, которая служитъ прохладительною пищею, и питьемъ, утоляющимъ жажду.—Овсяный, или

ячный отваръ, съ сушеными грушами приготовляемый, даютъ пить въ гнилыхъ горячкахъ и поносахъ того же рода.

Примѣчанія. 1. Изъ выжатыхъ зрѣлыхъ плодовъ приготовляютъ грушовку — *pygaceum*, или родъ вина, подобнаго сидру — *sydre*, *Apfelwein*, которая перебродивъ получаетъ запахъ и вкусъ винный, кислотовато-сладкій; въ пользованіи морской цыгги — *scorbutus navalis* не уступаетъ померанцевому и лимонному соку, одобряется также въ чесоткѣ, проказѣ и каменной болѣзни: *Пленкъ* (*).

2. Приготовляютъ также изъ сочныхъ сладкихъ грушъ пріятный сиропъ, удобно замѣняющій сахаръ, который можетъ съ пользою быть употребляемъ: въ лекарствахъ, для подслащенія кушанья, вина, пива, кофе, разныхъ прохладительныхъ напитковъ, и для всякаго домашняго употребленія весьма годенъ.—Опытъ приготовленія этого сиропа г. *Цыра* предлагаетъ въ 34 № Сѣверной Почты, 1811 года.

3. Дерево дикой груши весьма хорошо для столярной работы, и способно для очерненія; па-

(*). Объ этомъ напитокѣ упомянуто также при описаніи яблокъ — *pyrus malus*, I.

туральный цвѣтъ живѣе дѣлается посредствомъ известковой воды.

ГРУШОВКА КРУГЛОЛИСТНАЯ, или дикая грушица—
pyrola rotundifolia, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, растущее вездѣ по тѣнистымъ мѣстамъ и лѣсамъ на мокрой почвѣ.

Качества. Трава *запаху* не имѣетъ; *вкусъ* вяжущій, горьковатый.

Сила—укрѣпляющая, очищающая; ранозѣлительная.

Употребленіе. Въ поносахъ, кровотеченіяхъ и слишкомъ гнойныхъ язвахъ; снаружи прикладывается къ фонтанелямъ вмѣсто пластыря: *Пленкъ*, когда оныя надобно заживить.

Количество. 2 щепоти сухой травы наливается 8 унціями горячей воды, которую пьютъ вмѣсто чая; крѣпкій отваръ служитъ полосканьемъ, примочкою и омываніемъ для гнилыхъ ранъ; свѣжая толченая трава тоже прикладывается на гнилыя раны, съ великою пользою: *Соболевскій*.—Въ порошокъ, людямъ дается по 6 гранъ; животнымъ, по 1 золотнику, снаружи: въ видѣ присыпки.

ГУБКА ДРЕВЕСНАЯ, или ТРУТЬ—*boletus igniarius*, L.

Мѣсто. Выростаетъ на гниющихъ пняхъ дубовыхъ, бѣрезовыхъ, вязовыхъ и липовыхъ.

Качества. Запаху и вкусу не имѣеть.

Сила—механически останавливающая кровь, закупоривая поврежденные кровеносные сосуды.

Употребленіе. Первый *Броссардъ* Французской хирургъ началъ употреблять труть для остановки кровотеченій изъ разсѣченныхъ артерій, или венъ небольшихъ. — Во время прикладыванія стараться должно, дабы пластинки мягкой губки непосредственно касались къ разсѣченному сосуду, на которую другія накладываются постепенной величины. Наконецъ, покрывъ сложеннымъ полотенцемъ, укрѣпляются круговою повязкою. — *Рихтеръ* замѣчаетъ, что, при сильномъ кровотеченіи, надлежитъ предварительно посредствомъ жомы—*tognasilum* остановить кровотеченіе, и очистивъ рану до суха, потомъ уже прикладывать упомянутый шампонъ изъ трута, который, прижавъ повязкою, не снимать до тѣхъ поръ, пока сама не отпадетъ. — Впрочемъ, при поврежденіи большой артеріи, какъ изъ опытовъ видно, одинъ труть не надеженъ; но лучше всегда перевязать оную посредствомъ нитки,

и иглы, нарочно для этого употребляемой:
Виллие (*).

Примѣчаніе. Трутѣ бѣрезовой, дубовой и проч. употребляется обыкновенно для высѣканія огня; для этого, и хирургическаго употребленія отдѣляютъ внѣшнюю твердую корку и трубчатое существо, потомъ разрѣзанную губку молотомъ разбиваютъ до тѣхъ поръ, пока сдѣлается мягкою и удобно раздѣляющеюся на меньшія пластинки. — Если губку эту, помочивъ сутки (24 часа) въ селитряномъ растворѣ, потомъ высушить; то она весьма скоро загарается.

Губка пахучая, или вербная—*boletus suaveolens*, l.

Мѣсто. Растеніе грибовидное бѣлое, отрастающее на вербѣ, или ивѣ.

Качества. Запахъ имѣетъ благовонный, пріятный.

Вкусъ — горьковатый.

Сила — противучахотная, противусудорожная.

Употребленіе. Въ чахоткѣ, сопряженной съ изнурительнымъ потѣніемъ, судорожномъ

(*) См. краткое наставленіе о важнѣйшихъ хирургическихкихъ операціяхъ, С. П. Б. 1806, стр. 1. а, 5. в.

удушьѣ и въ ипохондріи: *Пленкъ, Шведіоръ, Бурдахъ.*

Количество. Въ порошокъ дается отъ $\frac{1}{2}$ —2 драхмъ, по утру и въ вечеру, съ сахаромъ, медомъ, или съ молочною кашею.

Примѣчаніе. Губку эту и собираемую съ липовыхъ деревъ, истерши въ порошокъ, даютъ скотинѣ въ пойлѣ, для предохраненія отъ падежа.

ГУБКА ЛИСТВЕННИЧНАЯ—*boletus laricis, l.*
boletus purgans, jacq.

Мѣсто. Бѣлый грибъ, выростающій на лиственницѣ — р. *larix*, во множествѣ растущей въ Сибири и Астраханской губерніи.

Качества. Запаху не имѣеть; *вкусъ*: сначала сладкій, послѣ тошновато-горькой, остающій нѣкоторую остроту на языкѣ. — Свойство это зависитъ отъ смолисто-остраго начала.

Сила — въ большомъ количествѣ слабительная и иногда рвотная; въ меньшемъ, уменьшающая потѣніе — *antisudatoria*.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Рекомендуютъ въ изнурительномъ потѣ чахотныхъ людей, и для испражненія поглощенныхъ пьявицъ, или другихъ инородныхъ тѣлъ; *Галенъ* давалъ съ пользою

въ завалахъ внутренностей.—Какъ слабительное средство, одобряетъ *Фогель*.

Количество. На ночь дается въ порошокъ по 2 грана съ водою; для слабительнаго дѣйствія, отъ $\frac{1}{2}$ — 1 драхмы; или въ наливкѣ, полагая 2 драхмы на 4 унціи горячей воды, подслащенной медомъ.—Снаружи: въ видѣ присыпки, оставляющей кровотечение и очищающей язвы: *Шведіоръ*.

Примѣчанія. 1. Коновалы въ Сибири, порошокъ листовяничной губки засыпаютъ у лошадей и коровъ червивыя язвы, для очищенія и заживленія оныхъ: *Пленкъ*.—Иные употребляютъ вмѣсто яланшы—*convolvulus jalappa*.

2. Губка эта служитъ вмѣсто мыла, для чистенія платья; ибо съ водою пѣнится и вымываетъ грязь: *Севергинъ*.

3. Бѣлую листовяничную губку надлежитъ собирать зимою, и давая внутрь, прибавлять должно вишневыи клей или иныя слизистыя вещества для избѣжанія рѣзи въ кишкахъ: *Белмонъ*.

4. Скотные врачи часто употребляютъ это средство для животныхъ: какъ слабительное, отвезающее и мочегонное лекарство, давая въ водяной или пивной наливкѣ отъ 1—2 лотовъ; или въ порошокъ: по 1—2 золотника, съ приличною жидкостью: *Розье*.

ГУЛЯВИЦА БЛАГОВОННАЯ; ПИЖМА; ТЫСЯЧЕЛИСТНИКЪ КРАСНОЦВѢТНЫЙ; ДУШИСТАЯ ГРЕЧА—*achillea nobilis*, L.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, въ южныхъ мѣстахъ Россіи и около Волги произвольно растущее.

Качества имѣетъ сходныя съ слѣдующею *a. millefolium*; а по тому предлагается въ тѣхъ же случаяхъ. *Менхъ* предпочитаетъ благовонную гулявицу по ея особенной проницательности и пряности. *Галлеръ* особено рекомендуетъ во всѣхъ внутреннихъ болѣзныхъ судорожнаго свойства—*morbi spasmi*.

ГУЛЯВИЦА ТЫСЯЧЕЛИСТНАЯ, ИЛИ ТЫСЯЧЕЛИСТНИКЪ; РЯБИНКА; ДЕРЕВЕЙ; ГРЕЧА; КРОВАВИКЪ; КАШКА—
achillea millefolium, L.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, по всей Россіи по сухимъ полямъ, лугамъ и вездѣ по дорогамъ растущее.

Качества зависятъ отъ экстрактно-смолистаго начала, находящагося болѣе въ листахъ и корнѣ; цвѣты содержатъ болѣе ароматности, зависящей отъ летучаго масла, отзывающагося камфорою.

Запахъ—травы и цвѣтныхъ верхушекъ нѣсколько пряный; *вкусъ*—горьковато-пряный и нѣсколько вяжущій.

Сила—слегка побуждающая, укрѣпляющая, противусудорожная, очищающая.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ кровоплеваниі, почечуіномъ и маточномъ непомѣрныхъ кровотеченіяхъ; также въ чревныхъ завалахъ, вѣтряной коликѣ, непорядочномъ родовомъ кровоочищеніи и судорожныхъ боляхъ послѣ родовъ: *Шталь*, *Гофманъ*; въ чахоткѣ и внутреннихъ язвахъ, выжатый сокъ изъ свѣжаго растенія хвалитъ *Шомель*; въ ночномъ сѣмянотеченіи — pollutio, застарѣлыхъ бѣляхъ, и долговременномъ стволловомъ теченіи—gonorrhœa et leucorrhœa habitualis: *Пленкъ*, *Менхъ*; въ воспаленіи почекъ отъ каменной болѣзни, и въ другихъ каменныхъ припадкахъ—affectiones calculosæ, деревей, употребляемый продолжительно вмѣсто чая, многимъ доставилъ желаемую пользу: *Гофманъ*, *Цимара*; рекомендуютъ также и въ болѣзняхъ, сопряженныхъ съ высыпями добраго свойства—exanthemata benigna: *Мелмиъ*.—Снаружи прикладывается толченая трава, или выжатый сокъ для заживленія ранъ и язвъ.

Количество. Отъ 2-3-хъ драхмъ полагается травы съ цвѣтами на фунтъ горячей воды для наливки; но гораздо дѣйствительнѣе крѣпкій настой, полагая 2 унц. сухой травы съ верхушками на 16 унц. кипячей воды, которой дать $\frac{1}{4}$ часа постоять въ покрытомъ

сосудѣ, и принимать по чайной чашкѣ, 3 раза въ день.—Снаружи служить промываньемъ и примочкою.

Въ аптекахъ готовятъ:

1. ТРАВНЫЕ ПРОТИВУЦЫНГОТНЫЕ СБОРЫ—species antiscorbuticæ (*), употребляемые въ отварахъ.

2. ГНАННОЕ МАСЛО ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА,—ol. destill. a. millefolii (**), подходящее къ ромашечному, которое похвывается какъ хорошее болеутолятельное, противусудорожное и вѣтрогонное средство: *Карпинскій*. Въ непомѣрномъ почечуйномъ теченіи, съ кисличною солью—acid. oxalic. и сахаромъ давалъ *Селле*, съ хорошимъ успѣхомъ.

На *пріемъ* одно это масло дается отъ 3—6 капель на сахарѣ, или въ холодномъ вышеупомянутомъ настоѣ.

Примѣчанія: 1. Корень тысячелистника качествами подходитъ къ виргинскому змѣевнику — a. serpentaria. *Келихенъ* нѣкогда употреблялъ въ злокачественныхъ горячкахъ и для предохраненія отъ чумы—pestis; *Шведіоръ* новыми опытами подтверждаетъ, что, въ недостатокѣ виргинскаго корня, можно замѣнить тысячелистнымъ.—Оный же дѣ-

(*) Pharmacop. castrensis ruthena, p. 346.

(**) — — — — — p. 291, гдѣ показанъ и способъ приготовленія существенныхъ маселъ.

даетъ не нужною и дорогую контраерву — *dorstenia contraierva*.

2. Траву его пожираетъ всякая скотина охотно. — Выжатый сокъ, сплавленный съ воскомъ и саломъ, составляетъ домашній раноцѣлительный пластырь. — Цвѣтные верхушки, настоянные съ водкою, дѣлаютъ бальзамъ такого же свойства.

3. Растеніе это годится и для дубленія кожъ. — Въ Швеціи кладутъ оное въ пиво, для доставленія крѣпости, или большей пьяности. — Въ Сибири съ этими цвѣтами гонють синецвѣтную водку: *Гмелинъ*.

гулявица чихотная, или чихотная трава — *achillea ptarmica*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, во всей Россіи по влажнымъ лугамъ, лѣсамъ и по краямъ полей растущее; въ С.-Петербуржскомъ округѣ и до Урала, такъ же въ Сибири до Оби.

Качества — корня и цвѣтной травы зависятъ отъ смолистаго горькаго начала. *Запахъ* свѣжихъ цвѣтовъ тошноватый, сухіе не имѣютъ; *вкусъ* корня острый, жгущій, подходящій къ зубному жигунцу — *a. pyrethrum*.

Сила. Корень при жеваніи возбуждаетъ слюнотеченіе; въ порошокъ истертый и втя-

нутый въ ноздри, производитъ чиханіе; такого же свойства сухая трава и цвѣты.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Корень въ отварѣ одобряютъ для полосканья въ зубной боли, мокротной жабѣ, и параличѣ языка: *Пленкъ*, *Шведіоръ*. — По свидѣтельству *Гмелля*, въ Сибири употребляютъ отъ кровавой мочи и маточнаго кровотеченія; отъ слабости желудка и колики въ животѣ, густыми мокротами причиняемой: *Соболевскій*. Траву съ цвѣтами, истерши въ порошокъ, нюхаютъ: отъ насморку и головной простудной боли — согуза, gnavedo. — Свѣжая толченая трава, прикладываемая снаружи, очищаетъ гнилыя язвы, разводитъ затвердѣлыя опухоли и помогаетъ въ начинающемся ракѣ.

Количество. 2 драхмы корня полагаются на 6 унц. воды для отвара; или жуютъ по 1 драхмѣ въ упомянутыхъ случаяхъ.

Примѣчанія. 1. Корень чихотной гулявцы можетъ замѣнить зубной жигунецъ, или слюногонъ, — *anthemis rugethrum*, растущій въ Левантѣ, и въ другихъ жаркихъ странахъ южной Европы: *Пейраль*.

2. Сибирскіе жители взваръ этой травы и корня пьютъ отъ кроваваго поноса, маточнаго кровотеченія и кровавой мочи — *mictus cruentus s. hæmaturia*: *Гмелль*.

Д.

ДЕВЯСИЛЬ БОЛЬШОЙ, или УМАНЬ; ДЕВЯСИЛЬНИКЪ.—
inula helenium, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное во всей Рос-
сіи произвольно растущее, такъ же по садамъ и
вездѣ около огородовъ удобно распложается.

Качества—корня превосходныя, зависящія
отъ летучаго камфорнаго масла и экстракт-
наго начала: *Боле*.

Запахъ—сухаго благовонный, фіялкою от-
зывающійся. **Вкусъ**—пряный, островато-горь-
кій.—Вывариваніемъ этого корня извлекается
бѣлый порошокъ своего рода, который *Том-
сономъ* названъ— inulinum (*)

Сила—побуждающая, разводящая густыя
мокроты, грудная, мѣсячногонная, противуче-
сотная, противуглистная.

Употребленіе. Въ повальныхъ упорныхъ
кашляхъ, мокротномъ удушѣ и чревныхъ
завалахъ: *Галенъ*. Въ чесоткѣ и другіихъ бо-
лѣзняхъ, сопряженныхъ съ накожными высыпя-

(*) Въ соединеніи съ селитряною кислотою образуетъ
сахарную к.—acid. oxalic. См. Thomson systeme de chime-
rtad. franc. T. VIII.

ми: *Шильманъ*, *Шомель*, *Брикманъ*,—
 Въ блѣдной немочи, теченіи бѣлей и трясе-
 ній членовъ, отъ неумѣреннаго употребленія
 ртутныхъ средствъ: *Кранцъ*; онъ же приво-
 дитъ ученыя Ниревбергскія вѣдомости, гдѣ
 подтверждается, что наливка девясилаго кор-
 ня, употребляемая 13 дней сряду, пре-
 дохраняетъ отъ каменной болѣзни.—Въ древ-
 нія времена корень сей, по свидѣтельству *Рая*
 и *Димербрека*, съ успѣхомъ употребляли:
 въ злокачественныхъ горячкахъ, и для предо-
 храненія отъ чумной заразы; нынѣ же чаще
 предписывается: въ худосочіи, цынготной ло-
 мотѣ, астеническихъ лихорадкахъ и мокрот-
 номъ почечуѣ: *Шведіоръ*.—Снаружи толченые
 листы прикладываются: для разведенія твер-
 дыхъ опухолей, утоленія ломотныхъ болей,
 очищенія гнилыхъ язвъ и заживленія ранъ;
 смѣшанные съ свѣжимъ коровьимъ масломъ
 или свинымъ саломъ употребляются съ успѣ-
 хомъ отъ чесотныхъ и золотушныхъ сыпей:
Соболевскій.—Порошокъ корня, въ видѣ мази
 употребляемый, такую же пользу оказываетъ:
Фогель, *Виліе*.

Количество. Въ порошокъ дается отъ
 $\frac{1}{2}$ —1 драхмы; въ наливкѣ: 2 драхмы толче-
 наго корня на 6 унц. горочей воды или бѣ-
 лаго вина.

Галле, для составленія *противучесотной мази*, совѣтуетъ полфунта свѣжаго очищеннаго и мелко изрѣзаннаго корня варить въ 3 фунтахъ воды, пока превратится въ склизь, которую, прожавъ, смѣшать съ 6 унц. свѣжаго несоленого коровьяго масла.—На ночь намазываютъ страждущія части и по утру обмываютъ теплою водою съ мыломъ, дабы кожныя поры не засорились.—Такимъ образомъ онъ самую злую чесотку въ короткое время вылечивалъ, употребляя при томъ и внутрь выше упомянутую водяную наливку девясилаго корня.

Въ аптекахъ приготавливаютъ:

1. *Травные грудные сборы*—species pectorales (*), коихъ полторы унціи варятъ въ двухъ фунтахъ воды, пока останется полтора фунта отвара, принимаемаго по чайной чашкѣ, нѣсколько разъ въ день.

2. *Девясильную мазь*—unguentum j. helenii (**), одобряемую въ кожныхъ болѣзняхъ.

Примѣчанія. 1. Истертый сухой корень, брошенный на раскаленные угли, прогоняетъ блохъ,

(*) Pharmacop. castrens. R. p. 345.

(**) — — — — — p. 384.

мухъ и комаровъ: *Шульцз.*—Въ отварѣ дается лошадямъ отъ коросты—Изъ онаго же приготовляютъ съ уриною и поташомъ превосходную синюю краску: *Фрибе.*

2. Траву его лошади и козы ѣдятъ охотно, а прочая скотина не трогаетъ.—Паршивой скотинѣ свѣжій корень дается въ наливкѣ или отварѣ, полагается онаго 8 лотовъ на 1 штофъ жидкости; или въ порошокъ сухой корень даютъ по 1 лоту: *Розье.*

3. По врачевнымъ качествамъ, не уступаетъ въ дѣйствиіи корню синегі; также ангустурной и синарубной коркамъ: *Янз.*

ДЕВЯСИЛЬ МЕНЬШІЙ, или КРОВОПОНОСНЫЙ—*inula dysenterica, l.*

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, растущее по краямъ рововъ и берегамъ рѣкъ, на островахъ Невы рѣки, и около садовъ по каналамъ.

Качества. Трава имѣетъ *запахъ* слабый, пріятный; *вкусъ* островато-горькій.

Сила — вяжущая, разбивающая, кровочистительная.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ простомъ и кровавомъ поносахъ, повально свирѣпствующихъ:

Гофманъ, кровотеченiяхъ, чесоткѣ и другихъ кожныхъ нечистыхъ сыпяхъ. — Снаружи толченые листы, или въ видѣ припарки, очищаютъ гнилыя раны и разводятъ твердыя опухоли.

Количество. Какъ выше упомянутого девясила. — Корень сего растенiя, имѣя преимущественную силу, дается по 1 драхмѣ въ порошокѣ, или въ видѣ винной наливки: *Роке*.

Примѣчанiе. Траву его коровы ѣдятъ охотно; козы, овцы и другой скотъ не трогаютъ. — Цвѣты и листья, приготовленную шерсть съ квасцами, окрашиваютъ блѣдно-желтымъ, или палевымъ цвѣтомъ, — съ висмутомъ, окрашиваютъ темно-оливковымъ и притомъ постояннымъ.

дождевикъ, или земляная губка; волчье яйцо; бездушка—*lycoperdon bovista*, l.

Мѣсто. Растенiе грибовидное, растущее по полямъ безплоднымъ и гористымъ лугамъ: въ въ Августѣ, Сентябрѣ и Октябрѣ мѣсяцахъ.

Качества. *Запаху* и *вкусу* не имѣетъ.

Силу — сильно всасывающую, сгущающую кровь, и закупоривающую разрѣзанные кровеносные сосуды: *Бауинъ*, *Бергiй*, *Нуккѣ*.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Наружное, для остановленія кровотеченій прикладывается такимъ же образомъ, какъ и губка древесная или трутъ — *boletus igniarius*. — *Ла-Фоссъ* при ножныхъ ампутаціяхъ могъ дождевикомъ останавливать кровотеченіе, т. е. накладывая на устья разсѣченныхъ сосудовъ тамповъ, и нажимая сверху обыкновенною повязкою; порошкомъ сухаго дождевика тоже присыпаются поверхностныя кровотечения изъ разорванныхъ небольшихъ сосудовъ, и мокрыя язвы; для унятія носоваго кровотечения, закладывается кусокъ сухаго дождевика вмѣсто турунды — Впрочемъ нужно съ нимъ обходиться осторожно, чтобы сухая пыль не попала въ глаза, причиняющая сильную боль и воспаленіе; а потому *Пленкъ* совѣтуетъ порошокъ дождевика, смѣшанный съ яичнымъ желткомъ, намазавъ на корпейный свертокъ, закладывать въ ноздри; въ почечуйномъ излишнемъ кровотеченіи закладывается цѣльный сухой дождевикъ, какъ обыкновенная закладка — *pessarium*, въ задній проходъ: *Фогель*.

Примѣчанія. 1. По разсказамъ *Виката*, итальянцы ѣдятъ молодые дождевики безвредно вмѣсто шампіоновъ; но старые ядовиты, а особенно пыль ихъ, для глазъ и легкихъ, весьма вредна, причиняя воспаленіе.

2. Слѣдуетъ сушить ихъ на открытомъ воздухѣ противъ солнца; ибо въ закрытомъ мѣстѣ превращаются въ жидкость, и гниютъ.—Кожца ихъ служитъ хорошимъ трупомъ унимающимъ, кровотеченія, и для высѣканія огня.

ДРОКЪ, ШИЛЬНАЯ ТРАВА—*genista tinctoria*, l.

Мѣсто. Растеніе кустоватое, растущее въ полуденной Россіи въ тѣнистыхъ лѣсахъ, и на пещаныхъ необработанныхъ мѣстахъ.

Качества. Трава, цвѣты и сѣмена *запаху* не имѣютъ; *вкусъ* горькій, тошноватый.

Сила—мочегонительная, слабительная, кра- сильная.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ водяной болѣзни *Жофруа* и *Меррингъ* рекомендуютъ все растеніе настоящее бѣлымъ виномъ; въ такомъ случаѣ золу этого растенія—*cinis genistæ*, настоящую тѣмъ же виномъ, полагая оной 2 унц. на бутылку, давали пить по рюмкѣ нѣсколько разъ въ день: *Минсихтъ* и *Сиденгамъ*.—Сѣмя тоже гонитъ мочу, и легко слабитъ; *Рай* давалъ оное въ водяной наливкѣ съ медомъ—*hydromel*; *Кранцъ* рекомендуетъ эту наливку въ каменной болѣзни, давая съ оною по полудрахмѣ толченаго сѣмени, 2 или 3 раза въ день.

Количество. Полунціи цвѣтныхъ вер-хушекъ или сѣмянъ наливаются 16 унц. горячей воды, которую кипятятъ въ покры-томъ сосудѣ, пока останется 1 фунтъ жид-кости; процѣженный отваръ принимать по 1 унц. или по 2 столовыхъ ложки, каждые 2 часа, пока станетъ слабить, или гнать мочу; таковыя приемы чрезъ день должно повторять:
Кулленъ.

Примѣчанія. 1. Цвѣты даютъ хорошую жел-тую краску.—Съ мѣломъ, известковою водою и квасцами, дѣлается краска ярче.

2. Изъ стволловъ и вѣтвей этого растенія мож-но выдѣлывать пряжу такъ, какъ изъ конопли и большой крашвы приготавливаютъ.

3. Сушеная трава съ цвѣтами дается живот-нымъ, какъ мочегонное лекарство, полагая 2 горсти на 1 бутылку жидкости, и варя, пока укипитъ половина; сѣмянъ полагаютъ 2 золотника на пол-бутылки горячей воды, которую, настоявъ, даютъ для слабительнаго дѣйствія, или отъ запору:
Розье.

ДУБЪ—*quercus robur*, L.

Мѣсто. Дерево, въ южной и умѣренной Россіи растущее, въ лѣсахъ, около Дудеровой горы и по садамъ.

Качества. Всѣ части дуба, какъ-то: корка, листья и жолуди *запаху* не имѣютъ; *вкусъ*: горьковато-вяжущій, зависящій отъ большого количества дубильнаго начала — *taninum*, и примѣтной кислоты своего рода — *acid. gallic.*

Сила—тоже вяжущая, укрѣпляющая, запоры производящая, противугнилостная.

Употребленіе. Дубовая корка въ порошокѣ и отварѣ дается вмѣсто хины, въ перемежныхъ лихорадкахъ; *Кулленъ, Вилліе.* — Водяной отваръ и другіе врачи употребляли съ успѣхомъ въ болѣзняхъ, происходящихъ отъ слабости органовъ, а въ особенности мокротномъ почечуѣ, теченіи бѣлей и маточныхъ кровотеченіяхъ: *Иппократъ, Галленъ.* Дубовыя жолуди — *glandes quernæ*, поджаренные и вмѣсто кофе употребляемые, полезны въ золотушныхъ затвердѣніяхъ железъ, дѣтской сухоткѣ, чахоткѣ, англійской болѣзни, простудной ломотѣ и подагрѣ: *Марксъ, Боме, Менхъ*; въ рождѣ — *erysipelas*, толченые жолуди варятъ съ пивомъ, и пьютъ, какъ потовое средство въ постелѣ, которое въ теченіи 12 часовъ исчезаетъ: *Ланге.* Снаружи кора дубовая и листья служатъ для укрѣпляющихъ ваннъ въ дѣтской сухоткѣ и англійской болѣзни: *Геннингъ.* Свѣжіе толченые листья прикладываются къ цынготнымъ язвамъ; крѣпкій водяной отваръ

листовъ, съ прибавленіемъ виннаго спирта и меда, служить полосканьемъ въ мокротной упорной жабѣ, и расслабленіи гортаннаго язычка: *Дарелль*. Отваръ корки, съ прибавленіемъ краснаго вина или квасцовъ, полезенъ для примочки и впрыскиванія: въ выпаденіи задней кишки, или маточнаго рукава, въ мокротныхъ истеченіяхъ изъ дѣтородныхъ частей, и для промыванія застарѣлыхъ грибовидныхъ язвъ. Онымъ же примачиваются расслабленныя членосоединенія послѣ вывиховъ, и мокротныя астеническія опухоли: *Шпретель*. Порошокъ дубовой коры, зашитый въ суконный рѣдкій мѣшечекъ и моченный нѣкоторое время въ красномъ винѣ, прикладывается на грыжное мѣсто, и сверху извѣстнымъ бандажемъ прижимается. *Дессесартъ* этимъ способомъ, повторяя перевязку ежедневно, въ теченіи 14 дней выпользовалъ совершенно килу у младенца; а у взрослога, въ продолженіи одного мѣсяца. *Витетъ* тоже свидѣтельствуетъ о хорошемъ успѣхѣ отъ этого средства. Въ видѣ катаплазмы, съ прибавленіемъ нашатыря и уксуса, укрощаетъ антоновъ огонь — gangraena; но гораздо дѣйствительнѣе съ терпентиннымъ масломъ — oleum destill. pini laricis, vel p. sylvestris смѣшивается порошокъ коры на подобіе размазни. Отваръ дубовой коры съ примѣсомъ сладкой ртуты — mercurius

hydrargyri oxydulatus, служить хорошою примочкою для шанкероувъ и другихъ венерическихъ язвъ: *Пленкѣ*.

Количество. Въ порошокъ дается отъ 20—30 гранъ, съ примѣсомъ римской ромашки, или горечавки, или касатика; для отвара полагается 1 унція толченой коры на фунтъ воды, или краснаго вина, который внутрь дается по столовой ложкѣ, и снаружи прикладывается, какъ выше сказано. — Обжаренныхъ жолудей и смолотыхъ на подобіе кофе 2 или 3 драхмы наливаютъ 8 унціями горячей воды, и вскипятивъ однажды, процѣженную жидкость пьютъ по чайной чашкѣ; истертыя въ порошокъ желудныя чашечки — *pulvis sicolæ glandis*, даются вмѣсто хины, по полдрахмѣ; — также отъ кроваваго долговременнаго поноса не только людямъ, но и домашнимъ животнымъ. — Последнимъ, особенно коровамъ, по 3 столовыя ложки, поутру и вечеромъ.

Въ аптекахъ готовятъ:

1. Отваръ дубовой коры съ квасцами — *decoctura cort. quercus alumimosa* (*), который дается внутрь по 1 унціи, 3 или 4 раза въ день, и служить полосканьемъ въ выше-

(*) Pharmacop. castrens. R. p. 247.

сказанныхъ болѣзняхъ.—Одинъ крѣпкій отваръ рекомендуетъ *Фрибе* для примочки въ антоновомъ огнѣ. Для этого должно варить 12 лотовъ толченой дубовой корки въ 12 фунтахъ рѣчной воды, пока останется 1 фунтъ жидкости, которую, процѣдивъ и напитавъ этимъ отваромъ вчетверо сложенное полотенце, приложить къ гнцлой язвѣ, перемѣняя каждые полчаса; этимъ средствомъ вскорости останавливается антоновъ огонь.—Этотъ же крѣпкій отваръ, въ видѣ полосканья употребляемый, укрощаетъ боль зубовъ и цыготную порчу десенъ;—въ видѣ впрыскиванья въ маточный рукавъ — *vagina uteri*, помогаетъ отъ долговременнаго теченія бѣлей, и изнурительнаго маточнаго кровотеченія — *profluvia uterina*:
Дарель.

2. Противулихорадочный порошокъ, замѣняющій хину (*)—*pulvis cort. quercus et anthemidis n.* Въ перемежныхъ трясучкахъ дается на пріемъ: отъ двухъ скрупуловъ до 1 драхмы, чрезъ 2 или 3 часа, въ нелихорадочный день.

Примѣчанія. 1. Дубовое дерево, въ продолженіи времени находясь подъ водою, такъ сказать, каменѣеть; а потому весьма выгодно для строеній.

(*) Тамъ же. р. 824.

Дубовая корка и всѣ части онаго служатъ для выдѣлыванія кожъ; на этотъ конецъ снимаютъ ее весною, а обнаженное дерево срубаютъ въ слѣдующую весну, отъ чего дерево крѣиче бываетъ.

2. Изъ желудныхъ чашечекъ и коры, съ прибавленіемъ зеленаго купороса дѣлаютъ чернила для крашенія кожъ и проч. Листья въ домашнемъ быту кладутъ въ соленые огурцы и проч.

3. Дубовые жолуди служатъ для откармливанія свиней, и могутъ употребляемы быть вмѣсто чернильныхъ орѣшковъ—*gallæ quercinæ*: *Бергій*. Желудныя чашечки, истолченныя въ мелкій порошокъ, деревенскіе лекаря до ползолотника даютъ внутрь: отъ излишняго теченія кровей, бѣлей, желудочной изжоги, долговременной рвоты, поносовъ и трясушекъ: *Фогель*.—Въ тѣхъ же болѣзняхъ, и кровавомъ поносѣ — *dysenteria*, *Скополи* совѣтуетъ принимать этотъ порошокъ съ краснымъ виномъ, 3 раза въ день.—Обжаренные жолуди на подобіе кофе, многіе пьютъ ежедневно съ хорошимъ успѣхомъ отъ затверденій въ легкихъ и брюшныхъ завазовъ: *Герсз—Боле*.

4. Дубовая вытолочка, кожевниками выбрасываемая, служитъ для садовъ и оранжерей наилучшимъ навозомъ, какъ для согрѣванія парниковъ,

такъ и для удобренія земли: *Соболевскій, Северинъ*.

ДУБРОВКА БѢЛАЯ—*teucrium polium*, L.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное кустоватое, растущее произвольно на Дону, на мѣловыхъ холмахъ, на Терекѣ и Медвѣдицѣ.

Качества—травы, собираемой съ верхушками, довольно пряны; *вкусъ*: острый, горькій.

Сила—побуждающая, мочегонительная.

Употребленіе. Цвѣтныя верхушки *Галенъ* предписывалъ вмѣсто чаю: въ мокротныхъ завалахъ внутренностей, задержаніи мочи и непорядкѣ мѣсячныхъ кровей; снаружи свѣжую толченую траву прикладывалъ для заживленія язвъ.

Количество. 2 или 3 драхмы верхушекъ наливаются 12 унціями горячей воды.

Примѣчаніе. Итальянцы растеніе это съ венецейскимъ терпентиномъ долгое время употребляли, какъ особенное средство отъ подагры — *specific. antipodagric.*; нынѣ же чаще употребляется ими въ составленіи Митридатова теріака: *Бодардъ*.

ДУБРОВКА или очанка; РОСТРОГЪ — *teucrium chamaedrys*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, въ южной Россіи произвольно растущее въ лѣсахъ, на горныхъ сухихъ мѣстахъ и по сухимъ берегамъ на Терекѣ.

Качества — травы хорошія: *запахъ* нѣсколько благовонный; *вкусъ* горько-пряный, зависящій отъ камедно-смолистаго начала и летучаго масла: *Жюсье*.

Сила — побуждающая, потогонная, отверзающая, очищающая, укрѣпляющая.

Употребленіе. Въ худосочіи, блѣдной немочи, запорѣ кровей и въ ипохондрическихъ завалахъ внутренностей: *Галенъ*, *Рай*; въ застарѣломъ кашлѣ, мокротной одышкѣ и кровоплеваніи: *Кратонъ*, *Цельсъ*; въ перемежныхъ лихорадкахъ, ломотѣ и подагрѣ: *Риверій*, *Визалій*, *Шомель*. Извнѣ, въ видѣ катаплазмы или припарки, для разведенія водяныхъ опухолей и очищенія язвъ: *Пленкъ*.

Количество. 1 или 2 драхмы сухой травы наливаютъ 6 унціями горячей воды; снаружи прикладывается свѣжая.

Примѣчанія. 1. Въ соединеніи съ золототысячникомъ и римскою ромашкою, оказалась гораздо

дѣйствительнѣе въ леченіи перемежныхъ весеннихъ лихорадокъ и другихъ астеническихъ болѣзней:

Роке.

2. Въ простудномъ ревматизмѣ и иныхъ ломотахъ, можетъ отчасти замѣнять баккаутъ: *Бодардъ.*

3. Животнымъ дается отъ заднепроходныхъ червей—*ascarides*, наливая 1 горсть сушеной травы горячимъ пивомъ полбутылки: *Розье.*

ДУБРОВКА ПИРАМИДНАЯ ИЛИ ВОЛОГЛОДКА; ЖИВУЧАЯ ТРАВА; СИНЯЯ ГОРЛЯНКА—*aiuga pyramidalis*, l.

Мѣсто. Растеніе двулѣтнее, растущее по тѣнистымъ лугамъ, гористымъ лѣсамъ, и въ садахъ подъ деревьями. Покойный *Соболевскій* находилъ въ Императорскомъ лѣтнемъ саду между травою въ куртлинахъ.

Качества. Трава *запаху* почти не имѣетъ; *вкусъ* горькій и нѣсколько вяжущій.

Сила — отверзающая, укрѣпляющая, ранозѣлительная.

Употребленіе. По своему горько-вяжущему свойству, употребляется въ простомъ и кровавомъ поносѣ, излишнемъ теченіи мѣсячныхъ кровей, отъ женскихъ бѣлей, кровохарканія, и въ грудныхъ чахотныхъ припадкахъ: *Соболевскій*; въ завалахъ печени: *Додо-*

ней;—въ язвахъ легкаго, наружныхъ ранахъ, ожогахъ, цыготныхъ поврежденіяхъ десенъ, молошницѣ во рту, и гортанной жабѣ: *Мамюень, Етмюллеръ, Бурдахъ.*

Количество. Внутрь дается въ отварѣ, полагая 1 унцію сухой травы на фунтъ воды, которую, кипятятъ до 8 унцій, процѣдивъ и подсластивъ медомъ, пьютъ холодной по чайной чашкѣ; снаружи служитъ полосканьемъ и впрыскиваньемъ. — Свѣжая толченая трава прикладывается, въ видѣ катаплазмы. — Въ видѣ полосканья, служитъ отъ гортанной жабы — *angina*, или воспаленія миндалевидныхъ железъ: *Фогель.*

Примѣчанія. 1. Траву эту козы, овцы и коровы ѣдятъ; лошади и свиньи не трогаютъ. —

2. Оную же снаружи сельскіе врачи употребляютъ въ венерическихъ паховикахъ (бубонахъ), гнилыхъ язвахъ и отъ рака.

ДУБРОВКА ТРИЛИСТНАЯ ИЛИ КАДИЛО; ПАКЛУНЪ; ПАРАЛИЧНАЯ ТРАВА — *teucrium chamœpitys*, L.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, въ южной Россіи растущее на мѣловыхъ горахъ и пещаныхъ поляхъ, на Дону, около Волги отъ Симбирска до Камышинска.

Качества. *Запахъ* травы благовоный, бальзамный; *вкусъ* пряный, горьковатый, къ розмарину подходящий; по химическому испытанію зависять отъ летучаго масла.

Сила — укрѣпляющая и болѣе побуждающая, нежели очанка — t. chamædrys, мѣсячногонная, разбивающая.

Употребленіе. Рекомендуются въ тѣхъ же болѣзняхъ, какъ выше упомянутая дубровка; по сказанію *Кранца*, Парижскіе врачи съ успѣхомъ пользовали этимъ растеніемъ простудный ревматизмъ и членовныя боли—arthrodynia rheumatica; *Шведіоръ* тоже подтверждаетъ.— Многіе, при долговременномъ употребленіи внутрь и снаружи трилистной дубровки, пользовали себя отъ начальной подагры и шіатики, или вертлужной ломоты — malum ischiadic.: *Кранцъ*; въ ломотныхъ боляхъ и желтухѣ особеннымъ средствомъ поставляетъ *Фернель*.

Количество. Для наливки полагаются 2 или 3 драхмы на фунтъ горячей воды; снаружи, въ видѣ припарки или ванны. Пары, къ страждущимъ членамъ допускаемые, тоже хорошо утоляютъ боль, и разводятъ ломотныя опухоли.

Примѣчанія. 1. Трава этого растенія входитъ въ составленіе противуломотнаго порошка, и въ подагрѣ одобряемаго *Дюкомъ Портландскимъ*, который состоитъ изъ равныхъ частей: дубровки трилистной, золототысячника и корня горечавки желтой.—Принимаютъ этотъ порошокъ по 1 драхмѣ по утру и въ вечеру, продолжая 3 мѣсяца; потомъ слѣдующіе 3 мѣсяца продолжаютъ принимать по 2 скрупула, и такимъ образомъ, по свидѣтельству *Куллена*, астеническіе подагрики освобождаются отъ жестокихъ параксизмовъ этой мучительной болѣзни. По мнѣнію *Клефана*, хотя этотъ порошокъ дѣйствуетъ медленно, но надежно, и въ теченіи двухъ лѣтъ излечиваетъ больныхъ совершенно (*). Въ видѣ наливки, съ прибавленіемъ соды, можно ожидать гораздо лучшей пользы: *Бартезъ* — О семь упомянуто при описаніи горечавки, или стародубки желтоцвѣтной — *gentiana*, l.

2. Трава эта, употребляемая вмѣсто чаю, въ подагрѣ оказываетъ большую пользу, нежели прочія рекомендуемая средства: *Жилиберъ*.—Свѣжая, истолченная, прикладывается къ худосочнымъ язвамъ вмѣсто поддѣльныхъ иностранныхъ бальзамовъ: *Бодардъ*.

(*) См. *Medical. observat. aut inquir.* vol. 1. p. 126 seq.

ДУШИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ ИЛИ МАТЕРИКА—*origanum vulgare*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, во всей Россіи произвольно растущее на холмахъ и по краямъ лѣсовъ; также по высокимъ берегамъ Невы рѣки, въ Парголовѣ, на Дудеровыхъ горахъ, въ Гатчинѣ, и у рѣки Луги.

Качества — травы зависятъ отъ изобилія летучаго остраго масла; *запахъ* свѣжей и сухой травы благовонный, къ маіорану подходящій; *вкусъ* пряный, горьковатый, при жеваніи нѣсколько острый и языкъ окрашивающій.

Сила — побуждающая, нервная, разбивающая, мѣсячногонная.

Употребленіе. Для разведенія густыхъ мокротъ, укрѣпленія ослабленныхъ органовъ и исцѣленія внутреннихъ поврежденій, особенно легочныхъ и маточныхъ, *Иппократъ* съ успѣхомъ употреблялъ; новѣйшіе врачи тоже рекомендуютъ: въ кашлѣ, удущѣ и мокротной чахоткѣ безъ сопутствующей лихорадки, также въ блѣдной женской немочи, происходящей отъ непорядочнаго очищенія или запора мѣсячныхъ кровей — *ataxia menstruorum*. — Снаружи, для разбивающихъ припарокъ и укрѣпляющихъ ваннъ—*balnea roborantia*, въ отекахъ

и другихъ вышнихъ болѣзняхъ, зависящихъ отъ слабости частей, трава эта предпочитается по своей пряности нѣкоторымъ иностраннымъ.

Количество. 2 драхмы сухой травы наливаются 6 унц. горячей воды, которую пьютъ съ медомъ вмѣсто чая: снаружи въ видѣ припарки прикладывается для разведенія грудныхъ опухолей, въ простудномъ колотѣ и брюшной коликѣ отъ вѣтровъ. — Траву съ цвѣтными верхушками, истертую въ порошокъ, нюхаютъ отъ насморку и головной боли—*gravedo*.

Въ аптекахъ готовятъ:

1. *Ароматные травяные сборы* — *species aromaticaë* (*), употребляемые для вышеупомянутыхъ ваннъ и припарокъ.

2. *Гнильное душичное масло*—*oleum destill. origani vulg.* (**), употребляется для утоленія зубной боли, происходящей отъ гнилости—*odontalgia cariosa*, также и въ костоѣдѣ—*caries*, весьма хорошо укрощаетъ гнилость: *Ланге*.— Внутрь принятое отъ 3.—5 капель унимаетъ икоту: *Шульцъ*.

Примѣчанія. 1. Трава эта, по пріятной пряности своей, употребляется съ пользою для припра-

(*) *Pharmacop. castr. Ruth.* p. 346.

(**) ————— *Rossica (civil.)* p. 229.

вы кушанья; поджаренная на сухой сковородѣ, служитъ вмѣсто настоящаго чая.

2. Изъ ея цвѣтныхъ верхушекъ вывариваютъ хорошую и постоянную пурпуровую краску, годную для крашенія шерстяныхъ матерій.— Душица, положенная въ пиво при первомъ броженіи, умножаетъ онаго пьяность; при закисаніи, укрощаетъ кислое броженіе: *Нималль*.

3. Пчелы изъ этихъ цвѣтовъ много собираютъ меду.

ДУРМАНЪ или дурнишникъ большой—*datura stramonium*, L.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, въ умѣренной Россіи растущее произвольно на жирной почвѣ близъ домовъ и на пустыхъ необработанныхъ мѣстахъ.

К а ч е с т в а—свѣжей травы и сѣмянъ ядовитыя, зависящія отъ остраго усыпительнаго начала. *Запахъ*: растертыхъ листовъ тоже ядовитый, усыпительный—*parcoiticus*, *вкусъ*: тошновато-горькой; сѣмяна не имѣютъ.

С и л а—листовъ, снаружи въ видѣ катаплазмы прикладываемыхъ, болеутолительная, смягчительная, разбивающая; но въ излишество употребляемые наводятъ пьяность или безуміе—*dementia*; сѣмянъ—тоже ядовитая!

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Свѣжіе толченые листы прикладываются къ грудницѣ, для разведенія сгустившагося молока въ грудяхъ, и смягченія твердыхъ воспалительныхъ опухолей, железъ: *Пленкѣ*; сѣмяна, прикладываемая къ зубамъ, или въ видѣ куренія употребляемая для утоленія боли, производятъ головокруженіе, бредъ, конвульсіи и помѣшательство ума: *Бухнеръ*, *Крамеръ*, *Лобштейнъ*; однако по опытамъ *Гуфеланда*, въ видѣ спиртной настойки—*tinctura narcotica Hufelandi*, полезны въ сумасшествіи.

Количество. Предписывается слѣдующимъ образомъ: R. seminis d. stramonii unc. 2, infund. spirit. vini gallici unc. 5, m. digere per aliquot dies; tunc exprime, et filda,—т. е. 4 лота зрѣлыхъ сѣмянъ дурмана наливаются 10 лот. виннаго спирта, которые, настоявъ нѣсколько дней въ закупоренномъ сосудѣ, процѣдить и выжать. S. на *приемъ* дается отъ 6—20 капель.—Толченые сѣмяна, или растертые со сметаною, или съ свѣжимъ коровьимъ масломъ, прикладываются къ болящимъ почечуйнымъ шишкамъ, и къ распухшимъ или затвердѣлымъ железамъ.—Траву даютъ въ видѣ сгущеннаго сока или экстракта—*extractum d. stramonii*, приготовляемаго въ аптетакъ (*), ко-

(*) Pharmacop. Rossica, p. 210.

торый въ маломъ количествѣ употребляется: въ судорогахъ, падучей болѣзни и сумасшествіи—*mania*; разведенный въ известковой водѣ—*aqua calcis*, прикладывается къ раковиднымъ язвамъ, твердымъ между-проходнымъ шишкамъ и глубокимъ ожогамъ. *Штеркъ*, *Веденбергъ* и *Рефъ* имѣли щастливые опыты въ пользованіи сумасшедшихъ этимъ экстрактомъ; *Оделій*, *Вальбомъ*, *Гредингъ* и *Бергій* тоже приводятъ примѣры, что въ Стокгольмѣ повторены были опыты надъ 14 больными, страдавшими падучею болѣзнію и сумасшествіемъ, изъ коихъ 8 совершенно выздоровѣли, 5 получили облегченіе и 1 остался неизлѣчимъ; *Виттъ* и *Штолъ* одобряютъ въ конвульсіяхъ или судорожныхъ корчахъ и судорожномъ кашлѣ; въ глубокой меланхоліи или умоизступленіи: *Аллионъ*, *Грандидіеръ*, *Маретъ*, и въ другихъ нервическихъ болѣзняхъ—*neuroses*, сопряженныхъ съ чрезвычайнымъ раздраженіемъ: *Роке*. *Г. Бергій* замѣтилъ, что сумасшествіе скорѣе излечивается этимъ средствомъ, ежели притомъ сдѣлана будетъ заволока на затылкѣ—*setaceum puchæ*.

Количество. На приемъ дается: отъ $\frac{1}{2}$ —1 грана 2, 3 или 6 разъ въ день, въ порошокъ съ мауномъ—*valeriana offic.* или въ пюляхъ съ горькимъ экстрактомъ—*extract. ama-*

gum, постепенно возвышая до 12 гранъ въ сутки.—Когда же зрачокъ примѣтно разширится—*pupilla dilatata*: то приемы обратно уменьшать должно.

Примѣчанія. 1. Это ядовитое растеніе скоту и пчеламъ вредно; мнимые колдуны даютъ его въ пиво, когда надъ кѣмъ подшутить хотять; злоупотребленіе опасное!

2. Лучшія противудѣйствующія средства суть: уксусная или другая кислота, рвотное, молоко и клистиры смягчительные.

3. Выжатымъ сокомъ по равной части съ терпентиннымъ масломъ заливаютъ у скота червивыя язвы.

4. Растеніе это можетъ замѣнить целибуху—*strychnos nux vomica* L.: *Бодардъ*.

ДУРМАНЪ МЕНЬШІЙ ИЛИ ДУРНИШНИКЪ: ДУРКАМАНЪ;
ЖЕЛТОВАЛОВНИКЪ—*xanthium strumarium*, L.

Мѣсто. Растеніе однолѣтное, въ теплыхъ краяхъ Россіи повсюду растущее вдоль дорогъ, и на влажныхъ пещаныхъ поляхъ, начиная отъ Клязмы.

Качества. Свѣжіе листы и сѣмена—*folia recentia, semina*, *запаху* не имѣютъ; *вкусъ*: островато-горькій.

Сила—разводящая, мочегонительная, направляющая худосочіе—alterans, противузолотушная—antiscrophulosa.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Выжатый сокъ изъ свѣжей травы, равно и сѣмяна употребляются въ золотухѣ, зобѣ или подбородочной вилѣ—brachocela, лишаяхъ, рожѣ и отекрыхъ опухоляхъ: *Иленкѣ*, *Шведіорѣ*.—По свидѣтельству *Линнея* (*), въ Швеціи сѣмя этого растенія даваемо было внутрь: отъ 1—4 драхмъ отъ рожи—erysipelas, какъ нѣкоторое секретное средство!—Снаружи, свѣжіе толченые листы служатъ катаплазмой, разводящею золотушныя и другія твердыя опухоли.—Выжатый сокъ для того же намѣренія дается внутрь отъ 1—4 унцій, съ молочной сывороткою: *Турнефортѣ*.

Примѣчанія. 1. Сѣмя, употребляемое съ бѣлымъ виномъ, хорошо гонить мочу.

2. Трава, цвѣты и плодъ имѣютъ свойство желтокрасильное—luteo-tinctoria.

3. Растеніе это не имѣетъ усыпитильнаго свойства, какъ предыдущее.

(*) Linne Flora Swecica, N. 364.

ДЫМНИЦА АПТЕЧНАЯ ИЛИ ЗЕМЛЯНОЙ ДЫМЪ; ЧИСТЯКЪ;
ПОЛЕВАЯ РУТА; КОКОРЫШЪ; ДЫМЯНКА—*fumaria officinalis*, 1,

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, въ умѣренной Россіи растущее во многихъ мѣстахъ: по пашнямъ и обработаннымъ землямъ, въ Паргаловѣ, Осиновой рошѣ, около Стрѣлиной, Краснаго села и Петергофа;—цвѣтетъ во все лѣто.

Качества. Свѣжая трава *запаху* не имѣетъ; *кусъ* горькій, непріятный, солоноватый, зависящій отъ поташа, напитаннаго соляною кислотою—*murias potassæ*, и вяжущаго начала—*taninum*.—*Адансонъ* нашелъ въ оной настоящую селитру—*nitras potassae*.

Сила—желудочная, противуцынготная, отверзающая, очищающая.

Употребленіе. Въ слабости желудка, желчной рвотѣ и желтухѣ, *Риверій*; совѣтуютъ въ завалахъ брюшныхъ—*infarctus viscerum*, а особенно печени: *Галенъ*, *Пленкъ*, *Рожерсонъ*; въ цынгѣ и цынготной порчѣ соковъ, откуда раждаются: зудъ, чесотка, лишай и другія нечистыя кожныя болѣзни—*vitia cutanea*. *Гофманъ*, *Паули*, *Страндбергъ*. *Лейденфростъ* и *Томсонъ* соками этого растенія и одуванчиковъ—*leontodon taraxacum*, вылечили

проказу—*Jerга*; *Биккеръ* рекомендуетъ въ каменныхъ припадкахъ; *Линней* въ ломоть; *Линдернъ* отъ плоской глисты.

Количество. 2 драхмы наливаются 12 унц. молочной сыворотки; или 1 горсть травы варятъ съ 2 фунтами пива, которое, процѣдивъ и выжавъ, пьютъ по чайной чашкѣ нѣсколько разъ въ день; выжатаго соку отъ 2—4 унцій даютъ съ сывороткою два раза въ день; пускаемый сокъ въ глаза по каплѣ разбиваетъ темную воду и укрѣпляетъ зрѣніе: *Соболевскій*.

Въ аптекахъ готовятъ:

1. Противуцынготные соки (*), которые употребляются обыкновенно весною для поправленія худосочія—*sasochumia*, въ цынгѣ и проч. Принимаютъ ихъ съ сывороткою, зельцерскою водою и съ пивомъ, какъ выше сказано.

2. Противуцынготные сборы—*species antiscorbuticae* (**), употребляемые въ отварѣ, полезномъ въ томъ же случаѣ.

Примѣчанія. 1. Свѣжее растеніе весною, для очищенія тѣлесныхъ соковъ, наливаютъ горячею сыкороткою, полагая 2 горсти на бутылку жидкос-

(*) Pharmacop. Ross., p. 256, et castr. R. p. 361.

(**) Pharmacop. castrens. R. p. 346.

ти; свѣжевыжатый сокъ съ оноюжь пьютъ въ Норвегiи, и тѣмъ избавляются отъ лютой проказы—*radesyge*: *Демантонъ*, *Каллизенъ*.—Консерва и сушеная трава тоже не теряютъ своего дѣйствiя.—Противуцынготными качествами не уступаетъ винтерской коркѣ—*wintera aromatica*, l.: *Бодардъ*.

2. Коровы и овцы ѣдятъ траву эту охотно; козы мало, лошади и свиньи не трогаютъ. — Она даетъ превосходную желтую краску; въ соединенiи съ вайдою — *isatis tinctoria*, спiную, подобную индиго.

ДЫМИЩА ОРЪШИНСТАЯ; ЗЕМЛЯНЫЕ ОРЪШКИ; ДЫМЧАТКА
ЛУКОВИЧНАЯ—*fumaria bulbosa*, l.

Мѣсто. Растенiе многолѣтнее, въ умѣренной Россiи растущее въ тѣнистыхъ мѣстахъ и гористыхъ лѣсахъ, какъ-то: на Пулковской и Дудеровой горахъ, около Гатчины, деревни Колодцы, и въ другихъ влажныхъ долинахъ.

Качества. *Вкусъ* корня и всей травы горькiй, островатый.

Сила—побуждающая мочу и потъ гонящая.

Употребленiе. Въ слабости желудка одобрается, такъ какъ и всѣ горькiя растенiя: *Трагъ*, *Картейзеръ*; въ запорѣ мочи, и мѣсячныхъ кровей, также въ непорядочномъ кро-

воочищеніи послѣ родовъ, желтухѣ, цынгѣ и чесоткѣ, оказываетъ такую же пользу, какъ и вышеупомянутая дымница. Снаружи: корень и трава, отваренные въ водѣ, служатъ поло-сканьемъ, уничтожающимъ гнилость во рту; толченая свѣжая трава одобряется для очищенія и заживленія цыготныхъ ранъ; вареная въ припаркахъ прикладывается въ подагрической боли и для разведенія опухлыхъ частей отъ ушиба.

Количество. Сушеный корень дается въ порошокѣ полдрахмы и болѣе, 2 или 3 раза въ день; снаружи трава служить для припарки. Выжатый сокъ изъ всего растенія, подслащенный медомъ, принимаютъ отъ 1—2 унцій.

Примѣчаніе. Траву эту коровы и козы ѣдятъ охотно; надъ другимъ скотомъ еще не замѣчено.

дыня или меліоны—*cucumis melo*, l.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, огородное.

Качества. Мякоть дыни имѣетъ *вкусъ*: сладко-клейкій, пріятный, иногда съ мускусомъ запахомъ; сѣмянъ сладковатомасляный.

Сила—прохлаждающая, притупляющая.

Употребленіе. Плоды эти, въ лѣтнее знойное время умѣренно употребляемые, полезны

снаружи для сухихъ и слабыхъ людей, особливо для цынготныхъ, меланхоликовъ и сумасшедшихъ: *Фонъ-Свитенъ, Краицъ.*—*Борелль* приводитъ примѣръ одного чахотнаго, который выздоровѣлъ, кушая дыни.—*Ланге*, вмѣсто турунды, закладывалъ кусокъ дыни въ задній проходъ, для остановленія почечуйнаго излишняго кровотеченія.—Изъ сѣмянъ готовятъ оршатъ, или прохладительное молоко, такимъ же образомъ, какъ изъ арбузовъ—*cucurbita citrullus*, замѣняющее миндальную эмульсію.

Примѣчанія. 1. Молоденькія незрѣлыя дыни солятъ такъ, какъ и арбузы, вмѣсто огурцовъ, которые служатъ пріятнымъ кушаньемъ.

2. Излишнее употребленіе дынь, по опытамъ *Санкторія*, уменьшаетъ испарину, сильно гонитъ мочу, производитъ поносъ, рѣзь въ кишкакъ, и прочіе припадки, упомянутые при описаніи арбузовъ; при употребленіи оныхъ надобно посыпать не много перцемъ.

3. Дышныя сѣмена менѣе всѣхъ молочныхъ сѣмянъ повреждаются насѣкомыми; а потому удобнѣе можно оныя сохранять для эмульсіи и оршадъ, кои лѣтнее время служатъ весьма пріятнымъ прохладительнымъ питьемъ; также въ атеническихъ кровотеченіяхъ и мочерѣзѣ.

3. Дыши особенно вредны для стариковъ и всѣхъ, имѣющихъ холодное или мокротное сложеніе: *Роке*.

4. Дышныя сѣмена имѣютъ удивительную способность къ своему произращенію, и чѣмъ старѣе, тѣмъ лучше для сѣянія. *Тривальдъ* видѣлъ, что сѣмена эти, сохраняемыя 42 года, будучи посѣяны, произрастили плодъ (*).

ДЯГИЛЬ АПТЕЧНЫЙ, или ДЯГИЛЬНИКЪ; КОРОВНИКЪ и КОРОВОШНИКЪ—*angelica, archangelica, l.*

Мѣсто. Растеніе двухлѣтнее, растущее въ Россіи по разнымъ мѣстамъ, болѣе на горахъ, изрѣдка около Москвы, на Волгѣ и Исетѣ, также около береговъ Невы рѣки, въ Мурзинкѣ, по лѣсамъ и гористымъ лугамъ.

Качества—корня, листовъ и сѣмянъ зависятъ отъ летучаго масла и экстрактно-сахарнаго начала; *запахъ* этого растенія благовонный и пріятный; *вкусъ*: пріятный, острый, горячительный.

Сила—побуждающая, укрѣпляющая, желудочная, вѣтрогонная, потъ и мѣсячныя крови гонящая; травы, по опытамъ *Принглевыхъ*, противугнилотная.

(*) Philosophic. transact. vol. XLII, p. 115.

УПОТРЕБЛЕНИЕ. Въ астеническихъ болѣзняхъ, требующихъ побужденія, какъ-то: въ слабости желудка, вѣтряной коликѣ, мокротной жабѣ, разслабленіи язычка въ горлѣ, параличѣ, повальныхъ заразительныхъ болѣзняхъ, и нервныхъ гнилыхъ горячкахъ—*typhus nervosus, putris*, сопряженныхъ съ чрезвычайною слабостію жизненныхъ силъ—*vires prostratæ*; также въ простудныхъ лихорадкахъ и ревматизмахъ, гдѣ на кожные органы дѣйствовать должно возстановленіемъ испарины, посредствомъ летучихъ побуждающихъ средствъ; въ мокротныхъ припадкахъ легкаго, застарѣломъ кашлѣ и одышкѣ: *Шпильманъ, Кранцъ, Пленкъ, Бурдахъ*. — Сѣмяна тоже одобряются, какъ грудное, вѣтрогонное, мочу и мѣсячныя крови гонящее средство: *Фогель*.

Количество. Въ порошокъ дается сухой корень отъ 20 гранъ до полудрагмы; но чаще предписывается въ наливкѣ: полагая по 2 драгмы дягильнаго корня и мауноваго — *valegiana offic.* или касатика—*a. calamus*, на 8 унц. кипячей воды, которую, подсластивъ медомъ, принимать по 2 столовыхъ ложки; въ хроническихъ болѣзняхъ дается въ видѣ каши по 1 драгмѣ, нѣсколько разъ въ день.

Примѣчанія. 1. Такъ какъ дягиль имѣетъ составныя начала, сходныя съ виргинскимъ змѣевни-

комъ — *a. serpentaria*, и въ дѣйствиіи оказываетъ одинакую пользу: то оный совершенно можетъ замѣнить какъ этотъ, такъ и контраервы корень — *dorstenia dracæna*, и упомянутый виргинскій; также гвоздику — *d. caryophyllus* и китайскій гинзэнгъ — *rad. ginseng, s. panax quinquefolium* L. *Бодардъ* (*). Въ отварѣ наилучшимъ образомъ предписывается по методу г. *Вилліе*, предложенному въ Военной Фармакопее (стр. 271 и 272), гдѣ показаны также самыя дѣйствительнѣйшія примѣси, приличныя каждой болѣзни.

2. Лапонцы молодые облупленные стволы ѣдятъ съ удовольствіемъ, и главнымъ лекарствомъ почитаютъ въ слабости желудка, ворчаньи, и боли живота; сушоный же корень жуютъ отъ зубной боли, и цынга у нихъ никогда не бываетъ, хотя въ самой холодной сторонѣ живутъ. — Въ Норве-

(*) Онъ же предлагаетъ искусственное составленіе гинзэнга — *ginseng artificiel*. слѣд. образомъ: свѣже-очищенный и наскоро-высушенный солодковый корень — *rad. glycyrrhizæ* истереть въ порошокъ, и смѣшать съ равною частію дягильнаго корня тоже мелко, растертаго. — Порошокъ этотъ принимаютъ азіяты отъ 1 скрупула до 1 драхмы съ старымъ винограднымъ виномъ, при астеническомъ недостаткѣ похоти — *anaphrodisia asthenica*, и сухотной дряхлости — *marasms*. *Cours de Botanique medicale comparee*, Т. II. р. 290.

гин тоже употребляютъ молодые стволы вмѣсто спаржи.

3. Изъ сѣмянъ и корня дѣлаютъ пріятную настойку, и перегоняютъ съ водкою, которая подобно ирвной или любистной. Настойка эта—*tin-ctura angelicæ*, прикладываемая на хлопчатой бумагѣ, укрощаетъ зубную боль, отъ гнилой порчи происходящую,—*odontalgia cariosa*: *Фогель*. Однолѣтніе корни даютъ закваскою ароматную водку, отзываютсяюся мосхусомъ: *Галлеръ*; съ сахаромъ вареные составляютъ пріятный конфектъ, поправляющій пищевареніе желудка, и противный запахъ рта: *Бергій*.

дягиль лѣсной или луговой; коровошникъ; медвѣжьи пучки—*Angelica sylvestris*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, растущее по влажнымъ лугамъ и лѣсамъ, особливо по краямъ оныхъ, и по каналамъ около Царскаго и Краснаго сель, на тучной почвѣ; цвѣтеть въ Іюль мѣсяцѣ.

Качества и сила подобныя вышеописанному, но только слабѣе онаго; впрочемъ *Линней* замѣтилъ, что лѣсной дягиль даетъ смолистаго экстракта вдвое больше, нежели садовый — *a. sativa*; притомъ запахъ и вкусъ

имѣеть гораздо проникательнѣе.—А потому и этотъ можно употреблять, какъ дѣйствительное побуждающее средство, особенно въ мокротныхъ болѣзняхъ и слабости нервовъ; нѣкоторые хвалять въ падучей болѣзни: *Турнефортъ*.

Количество—прежде описаннаго дягиля.

Примѣчанія. 1. Молодые стволы дягильника, по содраниі наружной плены, крестьяне наши ѣдятъ сырые, для утоленія жажды.

2. Двухлѣтніе корни, какъ садоваго, такъ и дикаго дягиля, служатъ для домашняго скота предохранительнымъ средствомъ, которые даются въ порошкѣ съ пивомъ или инымъ пойломъ отъ 2—3 лотовъ: *Розье*.

3. Корень этого растенія и чернобыльника траву, изкрошивъ, по 1 горсти, варятъ въ 1 бутылкѣ воды, пока укипитъ половина, и пьютъ по малому стаканчику 3 раза въ день: отъ запору мѣсячныхъ кровей.

Е.

ЕЖЕВИКА, или ОЖИНА; ДЕРЕЗА; КАМАНИКА—*rubus fruticosus*, L.

Мѣсто. Растеніе деревянистое, почти на землѣ лежащее, въ южной Россіи на поляхъ и въ тѣнистыхъ рощахъ произвольно растущее, также въ окружности Петербурга, на Выборгской сторонѣ, около Поклонной горы, въ Осиновой рощѣ, и около Нарвы; плоды созрѣваютъ подъ осень.

Качества. Зрѣлыя ягоды подобны шелко-вицамъ.

Вкусъ—имѣютъ кисловато-сладкій; молодого стебла и листовъ: вяжущій; корня тоже.

Сила — плодовъ прохладительная, разводящая; — листовъ и стволловъ очищающая; корня мочегонительная.

Употребленіе. Ягоды, подобно малинѣ, утоляютъ жажду и жаръ; а потому даются съ пользою одержимымъ огневицами или воспалительными лихорадками: *Геснеръ*, *Бартолмнъ*; отваръ листовъ и стволловъ, хорошъ

для полосканья въ жабѣ и гортанныхъ ранахъ, также въ кровохарканіи, теченіи бѣлей и въ поносахъ.—Снаружи: толченныя прикладываются къ лишаямъ и старымъ язвамъ на ногахъ; въ видѣ катаплазмы, споспѣшествуютъ нагноенію упорной погтофды—*ragonuchia rebellis*.—Корень имѣетъ отверзающее и мочегонительное дѣйствіе, а потому полезенъ для страждущихъ водяною болѣзною: *Кранцъ, Соболевскій*.

Количество. Зрѣлыя ягоды даютъ больнымъ кушать по желанію; или въ видѣ варенья и сиропа примѣшиваютъ по 2 унціи къ питью; полъ-унціи сухаго корня полагается на 8 унцій воды для отвара.—Наружное употребленіе листовъ сказано выше.

Примѣчанія. 1. Листы этого растенія козы и овцы ѣдятъ охотно.—Изъ зрѣлыхъ ягодъ можно готовить искусственное вино, водку и укусуъ.—Деревцо кустарное, по вяжущему свойству, годится для дубленія.

2. Корень онаго, искрошивъ, варятъ 1 полную горсть въ бутылкѣ воды до половины, процѣдивъ отваръ съ выжимкою, прибавляютъ къ оному равное количество стараго краснаго вина, которой пьютъ по чайной чашкѣ 3—4 раза въ день, при сильныхъ кровотеченіяхъ, случающихся у обоихъ по-

ловъ; имъ же примачиваютъ и промываютъ разслабленныя дѣтородныя части.

3. Утверждаютъ, что коренья ежевики или каманки производятъ равное дѣйствіе съ сарсапарелью. Это заслуживаетъ испытанія? В. *Левшинъ*.

ель; ельникъ—*pinus abies*, l.

Мѣсто. Дерево въ сѣверной Россіи изобильно растущее, по влажнымъ лѣсамъ и по горамъ.

Качества—еловыхъ шишекъ или верхушекъ смолистыя; *запахъ* и вкусъ: бальзамный кислотовато-смоляной; еловой смолы, вытекающей произвольно изъ дерева, тоже пріятный, горьковато-смолистый.

Сила—побуждающая, потъ и мочу гонящая, противуглистная; однако слабѣе бороной сосны—*p. sylvestris*.

Употребленіе. Отваръ еловыхъ шишекъ употребляется: въ цынгѣ, летучей или непостоянной ломотѣ и кожныхъ долговременныхъ болѣзняхъ.—Зернистая сухая смола—*resina granulata abietina*, растираемая въ мѣлкій порошокъ и съ груднымъ декоктомъ даваемая въ видѣ эмульсіи, каждые 2 часа по малому стакану, превосходно замѣняетъ дегтярную воду—

aqua picca (*), полезную въ упорномъ чахотномъ кашлѣ, и гноевой чахоткѣ—*phthisis purulenta*: *Лангансъ*; другіе совѣтуютъ еловую смолу, сплавленную съ желтымъ воскомъ по равной части, бросивъ на раскаленные угли, глотать бальзамическій дымъ: *Бурдахъ*; для изгнанія песка изъ мочевыхъ путей и въ простудномъ кашлѣ, принимаютъ растертую съ яичнымъ желткомъ, величиною въ лѣсной орѣхъ: *Карпинскій*; расплавленная съ саломъ, служитъ мазью, очищающею проказу и паршивые струны: *Кулленъ*; также для поддержанія нагноенія послѣ нарывнаго пластыря, гдѣ потребуютъ обстоятельства.—Одна вязкая смола вмѣсто пластыря прикладывается между лапатокъ, какъ отвлекающее средство—*aqua tubefaciens*, въ разныхъ головныхъ и глазныхъ болѣзняхъ: *Пленкъ*.—Канифоль или сухая еловая смола—*colophonium*, въ видѣ присыпки употребляемая, служитъ для нагноенія, очищенія и заживленія ранъ и язвъ, а особенно сухожильныхъ, проникающихъ въ членосоединенія; одобряется также въ водяной мошонковой грыжѣ—*hydrocele*, мясныхъ опухоляхъ, и бѣлыхъ членовыхъ: *Фанъ-Листъ* (**).—Ку-

(*) Pharmacop. Rossica, p. 190.

(**) См. въ Медико-Хирургической Матеріи Медикъ И К. Ч. II. стран. 132.

реніе канифолью полезно: въ выпаденіи задней кишки, въ англійской болѣзни и отекающихъ опухоляхъ: *Арнеманнъ, Фонъ-Лиль.*

Количество. 2 драхмы еловыхъ верхушекъ полагаются на 6 унцій воды для отвара; смолы внутреннее и наружное употребленіе упомянуты выше. Она служитъ также по вязкости своей для составленія разныхъ мазей и пластырей, упомянутыхъ при описаніи сосновой смолы—*resina pini sylvestris*. См. сосна—*pinus s.*

Примѣчанія: 1. Изъ еловаго терпентина, перегоняють съ водою масло, называемое *скипидарнымъ* — *oleum terebinthinæ*, которое гораздо хуже соснового—*ol. destillatum p. sylvestris*; однако оно часто продается подложно вмѣсто этого.— Еловая смола, сплавленная съ желтымъ воскомъ и свѣжимъ цвѣтнымъ масломъ, составляетъ липкій пластырь, соединяющій свѣжія раны: *Саноловичъ.*

2. Еловое дерево очень легкое и способное для некоторыхъ музыкальныхъ инструментовъ. Лапландцы дѣлають изъ онаго лодки, которыя могутъ переносить; на головѣ отъ одной рѣпки до другой изъ длинныхъ и тонкихъ его корней плетутъ веревки и коробки. — Изъ молодыхъ весеннихъ отростковъ

съ солодомъ приготовляютъ пріятное и здоровое пиво: *Фрибе* (*). Канифоль входитъ въ составленіе лаковъ.

3. *Домашній пластырь для ранъ* составляется: изъ 1 фунта еловой или сосновой бѣлой смолы — *resina alba*, столько же желтаго воска и $\frac{1}{4}$ фунта постнаго масла, т. е. льнянаго, коноплянаго или сурѣшичнаго; распустивъ въ муравленомъ горшкѣ на угольномъ жару, варить, прибавляя по немногу изтертыхъ бѣлилъ или сурику, отъ 16 золотниковъ до цѣлаго фунта, мѣшая безпрестанно, пока не станетъ больше появляться пѣны; тогда, снявъ горшокъ съ огня, продолжать мѣшаніе, пока остынетъ масса. — Пластырь этотъ очень полезенъ отъ всѣхъ ранъ, какъ огнестрѣльныхъ, такъ и порубленныхъ, также отъ ссадинъ, нарывовъ и пролежней; равно для заживленія ожогъ и послѣ нарывныхъ пластырей язвъ.

4. Ежели спустить на огнѣ по $\frac{1}{4}$ фунта: бѣлой смолы, желтаго воска, меда и льнянаго масла, то этотъ составъ хорошо умягчаетъ затвердѣлость въ копытной раковинѣ, или когда лошадь въ дорогѣ подобьетъ ноги, намазавъ оный на лайкѣ или ветошкѣ, обвязать больную ногу.

(*) См. *Oeconomisch-technische Flora*, p. 25.

ЭСТРАГОНЪ, или ДРАГУНЪ ТРАВА; ДИКИЙ ПЕРЕЦЪ; ДУШИСТЫЙ ЧЕРНОБЫЛЬНИКЪ—*artemisia dracunculus* L.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, во всей Сибири произвольно растущее и разводится въ огородахъ.

Качества. Свѣжей травы хорошія, листья имѣютъ *вкусъ* острый, жгущій, но пріятный и нѣсколько пряный, зависящій отъ летучаго масла.

Силу—побуждающую, желудочную, отверзающую, мѣсячногонную, противуцынготную.

Употребленіе. Въ видѣ салата употребляемый, полезенъ: для цынготныхъ, жалующихся невареніемъ желудка—*dyspepsia*, въ завалахъ живота и запорѣ мѣсячныхъ кровей.

Колчество. 1 унція травы наливается 12 унціями горячей воды, которую пьютъ на подобіе чая; настоянная съ уксусомъ, служитъ полосканьемъ въ цынготной порчѣ десенъ.

Примѣчанія. 1. Эстрагонъ по большей части употребляется для приправы кушанья, какъ—то: въ салаты, въ уксусъ и огурчики нежинскіе, приготовляемые съ этимъ уксусомъ; кладется также и въ соленые огурцы, отъ чего оныя бываютъ пряны и весьма вкусны.

2. Во Франціи и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Германіи, готовятъ извѣстный эстрагонный уксусъ, который, бывъ настоянъ съ этою травою, имѣетъ все свойства эстрагона. — Принимая по столовой ложкѣ, большую пользу доставляетъ цынготнымъ: *Роке*.

3. Эстрагоннымъ крѣпкимъ отваромъ, вспрыскивая лошадей и другихъ животныхъ, можно избавлять отъ комаровъ, слѣпней и другихъ безпкойныхъ насѣкомыхъ.

4. Въ гнилыхъ горячкахъ съ пятнами—*f. petechiales*, я натиралъ эстрагоннымъ уксусомъ всю поверхность тѣла съ хорошимъ успѣхомъ, которую заразу намъ сообщили военно-плѣнные французы въ Полоцкѣ, 1813 года.

5. Въ Персіи траву эту свѣжую и сушеную употребляютъ, какъ пріятную приправу, во всехъ кушаньяхъ, для возбужденія аппетита: *де-ла-Валль*.

6. Свѣжее растеніе дается рогатому скоту, при потеряннн жвачки: *Розье*.

Ж.

ЖАБНИКЪ ВРЕДНЫЙ, ИЛИ БОЛОТНЫЙ; ЯДОВИТАЯ ПЪТУШЬЯ
 НОГА—*ganunculus sceleratus*, L.; ЖАБНИКЪ ОГНЕННЫЙ
 ИЛИ ПРЫЩЕНЕЦЪ; КУПАЛЬНИЦА—г. *flammula*; ЖАБ-
 НИКЪ ОСТРОСОЧНЫЙ, ИЛИ ЪДКИЙ; ЛЮТИКЪ—г. *acris*; ЖАБ-
 НИКЪ ПОЛЕВОЙ ИЛИ КУРИНАЯ СЛЪЗПОТА—г. *argensis*;
 ЖАБНИКЪ УЗЛОКОРЕННОЙ ИЛИ ЖАБИНЕЦЪ—г. *bulbo-*
sus (*); ЖАБНИКЪ ЯЗЫЧНЫЙ—г. *lingua*.

Растущіе вездѣ по влажнымъ лугамъ, тѣ-
 нистымъ роцамъ и по краямъ лѣсовъ, во
 всей Россіи.

(*) Растущій вездѣ по лугамъ и пастбищамъ. — Про-
 стонародье приготовляетъ изъ него отваръ—*decocctum*, ко-
 торымъ полощутъ горло для разбиванія жабы—*angina* или
 воспаления и опухоли частей, прилежащихъ гортани, по-
 лагая 1 лотъ свѣжей травы на бутылку пива. — Этотъ
 же отваръ даютъ по небольшому стаканчику поутру и
 вечеромъ отъ падучей болѣзни—*epilepsia* взрослымъ, что
 подтверждается: in Franc. Samml. I. B. 428. 5. — Жили-
 беръ хвалитъ отваръ этотъ въ удушѣ, долговремен-
 номъ стволловомъ теченіи—*gonorrhœa chronica* и язвахъ
 мочевыхъ путей, съ надлежащею осторожностію употре-
 ляемый.

Качества—оныхъ и *сила* ядовитыя, подобныя вѣтреницѣ лѣсовой—*anemone nemorosa*: *Карпинскій*.—По опытамъ *Турнефорта*, листы упомянутыхъ жабниковъ, снаружи приложенные, натягиваютъ пузыри на кожѣ, подобно шпанскимъ мухамъ, и гнанная изъ нихъ вода производитъ рвоту.—По свидѣтельству *Галлера*, самая застарѣлая ломота ѣдкихъ жабникомъ, снаружи къ страждущей части приложеннымъ, удачно вылечена была, которую тщетно другими средствами пользовали, *Фабрицій* и *Капивацкій*; въ шіятикѣ или вертлужной ломотѣ прикладывалъ *Баилевъ*.—*Вульфъ*, прикладывая къ плечу, соответствующему сторонѣ больнаго зуба, часто зубную боль съ успѣхомъ укрощалъ. *Шведіоръ* тоже повреждаетъ: что толченныя листы этихъ жабниковъ, снаружи прикладываемыя, полезны какъ въ членовой простудной ломотѣ, такъ и въ упорныхъ перемежныхъ лихорадкахъ. Въ послѣднемъ случаѣ прикладываются къ пястью руки—*ad carum*, за нѣсколько часовъ предъ параксизмовъ, или приступомъ лихорадки, и тамъ оставляются на 8 или 12 часовъ.—Въ долговременной головной боли, прикладывалъ къ затылку *Шесно*. Гнанная вода изъ огненного и язычнаго жабниковъ—*r. flammula, et r. lingua*, служитъ превосходнымъ рвотнымъ средствомъ *præstantissimum emeticum*: *Шведіоръ*,

которые по окончаніи своего дѣйствія, уничтожаетъ трясушки: *Пехлинъ*.

Примѣчанія. 1. Внутреннее употребленіе этихъ ядовитыхъ растеній, какъ для людей, такъ и для скота, смертоносно! — По вскрытіи собакъ и другихъ животныхъ, нарочно этимъ ядомъ умерщвленныхъ, оказалось, что ѣдкая острота жабниковъ, въ желудкѣ и въ прочихъ внутренностяхъ производитъ антоновъ огонь. — Для рогатаго скота, овецъ и лошадей, по остротѣ своей весьма вредны, особенно свѣжія травы; сушеніемъ теряютъ ядовитость и остроту.

2. *Диоскоридъ* противудѣйствующими средствами поставляетъ: теплую воду съ медомъ, или съ свѣжимъ масломъ, употребляемую въ большомъ количествѣ; также парное молоко, и внѣшнее натираніе жирными маслами живота. — По опытамъ *Кранфа*, оказалось, что одна чистая вода есть самое лучшее противуядное средство; потомъ выжатый сокъ изъ щавеля, изъ красной смородины, изъ клюквы, и даже уксусъ, разведенный водою. — *Соболевскій* хвалитъ конопляное масло и маковое—*oleum cannabis, et rapaveris a.*

3. Въ деревняхъ отваромъ острога и огненнаго жабниковъ обмываютъ чесотку и дѣтскіе шолуди; а свѣжую толченую траву прикладываютъ къ зобамъ—*struma*, и инымъ твердымъ опухолямъ же-

лезъ, для разведенія оныхъ; но въ этихъ случаяхъ и выше помянутыхъ, требуется великая осторожность: ибо долго оставленная на тѣлѣ трава разбѣдаетъ мягкія части и производитъ почти неизлечимыя раны! Надежнѣе въ упомянутыхъ случаяхъ употреблять можно въ видѣ мази: смѣшивая 1 лоть свѣжо-выжатаго сока съ 2 лот. коровьяго несоленого масла, или свиного сала. За неимѣніемъ шпанскихъ мухъ, гдѣ потребно будетъ прикладывать къ тѣлу нарывный пластырь, служить кислое тѣсто, примѣшавъ къ оному толченаго свѣжаго лютика, или остросочнаго жабника: *Камецецкій* (*).

4. Жабники ѣдкіе могутъ замѣнять: анакардъ восточный и западный, или слонововшное дерево—*anacardium orientale et occidentale* l. похваляемое отъ упорныхъ сыпей и лишаевъ: *Бодардъ*.

5. Всѣ вышеупомянутые жабники служатъ ядомъ для овецъ! *Турнефортъ*.

ЖАБНИКЪ ЧИСТОТѢЛЬНЫЙ, или РАНУНКУЛЬ ПОЧЕЧУЙНЫЙ, ЧИСТЯКЪ МЕНЬШОЙ—*ranunculus ficaria* l. f. *ranunculoides*: Roth.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, растущее въ умѣренной Россіи во рвахъ, и мокрыхъ мѣс-

(*) См. его же: Способъ лечить болѣзни простыми средствами, стр. 157, № 17.

тахъ около Невы рѣки, Волги и Камы, также въ тѣнистыхъ лѣсахъ, на Пулковской горѣ, въ Паргаловѣ, и въ другихъ т. п.

Качества—изъ всѣхъ породъ жабниковъ слабѣе; свѣжій корень *вкусу* почти не имѣеть.

Силу—мочегонительную, очищающую.

Употребленіе. Корень и листы пьютъ въ отварѣ для открытія почечуя и разведенія густыхъ мокротъ, особенно стуженной желчи соковъ, или иной остроты, кроющейся въ тѣлѣ: *Бурлава*.—Многіе весной употребляютъ молодую траву вмѣсто салата, и варятъ въ кушаньяхъ вмѣсто крапивы, считая оную кровоочистительнымъ средствомъ: *Линней*.—Въ золотухѣ совѣтуетъ *Цезальпинъ*; въ закрытомъ почечуѣ и чревныхъ завалахъ: *Додонеи*.—Снаружи прикладываются толченныя листы съ свѣжимъ коровьимъ масломъ, къ болящимъ, почечуйнымъ шишкамъ, съ хорошею пользою: *Соболевскій*.

Количество. 1 унцію свѣжаго корня съ травой варятъ въ 12 унціяхъ сыворотки, или похлебки, пока укипитъ половина жидкости; выжатаго соку тоже даютъ по столовой ложкѣ, каждыя 3 часа: отваромъ этого растенія можно полоскать ротъ, когда имѣется порча десенъ, или раны въ горлѣ, и промывать

венерическія язвы на дѣтородныхъ частяхъ:
Фогель, Крапфъ (*).

Примѣчанія. 1. Растеніе это въ садахъ иногда такъ распложается, что заглушаетъ все другія травы.—Козы и овцы ѣдятъ оное охотно; коровы и лошади не трогаютъ.

2. Цвѣтныя почки пѣкоторые готовятъ въ уксусъ вмѣсто каперсовъ.

3. Весною молодую траву полезно варить въ похлебкахъ для цыготныхъ: *Жофруа*; или выжатый сокъ давать съ молочной сывороткою: *Бергій*.

ЖЕЛТНИКЪ, или ЖЕЛТОЕ КОЖЕВЕННОЕ ДЕРЕВЦО; СУЛОХЪ; БАЛГА, *thus cotinus*, l.

Мѣсто. Деревцо это растетъ на Терекѣ, Кавказскомъ хребтѣ, и въ Рынпескахъ Калмыцкой степи.

Качества—корки, ягодъ и сѣмянъ сильно-вяжущія, зависящія отъ кислаго и вяжущаго начала—*ab acido gallico, et tanino*.

Сила—тоже вяжущая, укрѣпляющая.

(*) *Experimenta de ranunculorum nonnullorum qualitate, horumque externo et interno usu. Vindob. 1766.*

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Листы и сѣмена въ видѣ наливки, употребляются въ кровотеченіяхъ и бѣ-ляхъ: *Галленъ*.—Корка тоже полезна въ дол-говременныхъ поносахъ, астеническихъ кро-вотокахъ—*profluvia atonica*, и мокротномъ те-ченіи изъ дѣтородныхъ частей: *Роке*.

Количество. Въ порошокѣ даютъ отъ 20—40 гранъ; для наливки, полъ-унціи на фунтъ воды; которую, вскипятивъ однажды и про-цѣдивъ, давать по 2 или 3 унціи, три или четыре раза въ день. Снаружи въ видѣ всасы-скиванія и примочки.

Примѣчанія. 1. Дерево его служитъ для со-ставленія желтой краски, употребляемой для саф-яна и шелка, а листья на дубленіе кожъ. — Для овецъ это растеніе почитается ядовитымъ. *Се-вергинъ*.

2. Турки ягодами онаго одними, или съ солью и чеснокомъ смѣшанными, приправляютъ мясо жи-вотныхъ: *Бергій*.

ЖЕРУХА, или РЪЖУХА; КРЕССЪ ВОДЯНОЙ—*sisymbrium nasturtium*, I.

Мѣсто. Растеніе двулѣтнее, въ южной Рос-сіи произвольно растущее: у ручьевъ, источ-никовъ и текучихъ водъ, также около поро-

ховыхъ Охтенскихъ заводовъ, у Горѣлаго кабака, у рѣчки Дудеровки, и въ другихъ подобныхъ мѣстахъ.

Качества—свѣжей травы зависятъ отъ остраго летучаго начача, соединеннаго съ изотомъ, который особенно ощутителенъ бываетъ при гніеніе этихъ растеній—*plantæ sgu-ciferae*; *запахъ* растертой травы: летучій, собственный.

Вкусъ—горьковатый, нѣсколько острый.

Сила—разводящая, мочегонительная, противуцынготная.

Употребленіе. Въ цынгѣ и брюшныхъ мокротныхъ завалахъ: *Евгаленъ*; въ упорномъ кашлѣ, гнойной чахоткѣ, сопливой лихорадкѣ, и мокротномъ безчувственномъ храплѣніи—*carus pituitosus*: *Мушель*, *Цвингеръ*, *Боннетъ*, *Форестъ*; въ каменной болѣзни: *Галенъ*, *Ридлинъ*, *Гругеръ*.—Пользу этого средства снаружи въ цынготныхъ припадкахъ, лихорадкахъ и упорныхъ сыпяхъ, зависящихъ отъ худосочія, многими наблюденіями подтверждаютъ: *Сильвій*, *Пейриль* и *Летуа*; въ цынготной ломотѣ, и слабости желудка: *Фогель*.

Количество. Весною водяной крессъ ѣдятъ вмѣсто салата; выжатаго соку принимаютъ по 2 унціи съ сывороткою, или съ кисловатыми минеральными водами, какъ-то: съ

зельцерскою, кавказскою и другими тому подобными. — Пиво, настоянное съ жерухою и горьчицею, тоже весьма полезно давать цынготнымъ: отъ половины до одного фунта ежедневно. — *Фонъ-Свитенъ* совѣтуетъ прибавлять къ тому красную качанную капусту — *brassica capitata rubra*, которымъ питьемъ онъ многихъ вылечилъ (*).

Въ аптекахъ готовятъ:

Противуцынготные соки — изъ жерухи, ложечной травы, ибунки, дымницы, и щавеля, которыя слегка побуждаютъ ослабѣвшіе органы, гонють мочу, отвращаютъ запоры, и пользуются цынгу. — Принимаютъ ихъ отъ 1—2 и 4 унцій, два или три раза въ день: *Виллие* (**). — Таковыя же соки давали съ хорошимъ успѣхомъ: *Цвингеръ*, *Таллеръ*, *Картейзеръ* и *Виллебъ* отъ упорнаго кашля, одышки и брюшныхъ цынготныхъ заваловъ. — *Бодартъ* совѣтуетъ прибавлять равное количество свѣжей травы вахты, или водянаго трилистника. — Ежели отъ цынготной порчи десны пухнуть, трескаются и дѣлается изъ оныхъ кровотеченіе: то при употребленіи внутрь упомянутыхъ

(*) Eiusd. commentar. T. III.

(**) Pharmacop. castrens. R. p. 361.

соковъ, должно мазать чаще десны свѣжовыжатымъ сокомъ изъ жерухи, прибавивъ немного квасцовъ и меда, и послѣ выполаскивать ротъ медовою сытою, смѣшанною съ клюквеннымъ сокомъ, или съ уксусомъ.

Примѣчанія. 1. Отваръ жерухи полезенъ для рогатаго скота отъ чахотки.

2. Растеніе это можетъ совершенно замѣнить аглинскую кохлеарію или садовую ложечную траву — *cochlearia offic.* l.

ЖЕРУХА СТРУЙЧАТАЯ, или гулявникъ; мудрость лекарская—*sisymbrium sophia*, l.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, растущее вездѣ по сухимъ полямъ на нещанной почвѣ, по дорогамъ, окопамъ и у заборовъ.

Качества—травы и сѣмянъ зависятъ отъ остраго начала; *вкусъ* имѣютъ острый, горячительный, подобно горчицѣ.

Сила—побуждающая, противуглистная, очищающая, мочегонительная.

Употребленіе. Внутрь употребляется въ истерическихъ припадкахъ, поносахъ, кровохарканіи, маточномъ кровотеченіи и бѣляхъ; въ каменной болѣзни, водяной, и отъ глистовъ

совѣтуютъ: *Квинци*, *Шомель*.— Снаружи, прикладывается толченная трава къ цынготнымъ и другимъ нечистымъ язвамъ, которыя она очищаетъ и заживляетъ: *Соболевскій*, *Шведіоръ*, *Бурдахъ*.

Количество. Толченое сѣмя дается по драмѣ, чрезъ 2 часа съ водою; или въ видѣ горячей наливки съ медомъ, даютъ предъ приступомъ лихорадки: *Турнефортъ*.—Нѣкоторые совѣтуютъ употреблять слегка поджаренное сѣмя, особливо для изгнанія камня и остановленія кровотеченій: *Фогель*.

Примѣчанія. 1. Траву эту овцы и коровы ѣдятъ охотно; козы и лошади мало; свиньи не трогаютъ.

2. Сѣмя, смѣшанное съ 9 частями пороха, придаетъ ему больше силы, отъ заключающейся въ немъ селитры: *Севергинъ*.— Сѣмя, полезное для лошадей и рогатаго скота, отъ черней и поноса: *Фрибе*, давая толченое въ пойлѣ по 1 лоту.

ЖИЗНЕННОЕ ДЕРЕВО—*thuya occidentalis*, l.

Мѣсто. Дерево весьма подобное кипарису, растущее въ Сибири, особенно въ болотныхъ мѣстахъ, и на Кавказѣ, всегда зеленѣющее.

Качества—смолистыя; сучья и листья выпускаютъ въ окружности сильный запахъ.

Сила — разводящая грудныя мокроты, и потогонная.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Отваръ листовъ и дерева одобряется: въ простудномъ кашлѣ, ревматизмѣ, водяной болѣзни, перемежныхъ лихорадкахъ, и раздутости живота отъ вѣтровъ: *Шведіоръ*, *Бурдахъ*.

Количество. Въ порошокъ листы даются: отъ $\frac{1}{2}$ —1 драхмы два раза въ день; для отвара колагается 3 унціи листовъ, или древесныхъ стружекъ, на 3 фунта воды, которую кипятить, пока останется половинная часть жидкости, принимаемой по чайной чашкѣ нѣсколько разъ въ день.

Примѣчаніе. Дерево весьма прочное и годное на столбы, сваи и проч., также для обжиганія извести и въ другихъ случаяхъ: *Севергинъ*. — Стружки онаго, какъ потовое средство, замѣняютъ баккаутовое дерево—*lignum guaјасі officinal*.

жимолость козья, и благовонная, песій гроздь;—
lonicega carifolium et periclymenum, l.

Мѣсто. Растеніе кустоватое, завивающееся около деревьевъ, растущее на Терекѣ, въ лѣсахъ и садахъ.

Качества. Листы, стебла и цвѣты первой породы, *запахъ* и *вкусъ* имѣютъ противный; при жеваніи нѣсколько вяжутъ.

Сила—листовъ слегка вяжущая, очищающая; цвѣтовъ и ягодъ мочегонительная.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Свѣжіе толченныя листы и выжатый сокъ прикладываются къ нечистымъ язвамъ, лишаямъ и другимъ кожнымъ пятнамъ: *Шомель*; отваръ листовъ употребляется для полосканья въ жабѣ: *Гарданъ*; наливка цвѣтовъ, употребляемыхъ вмѣсто чаю, полезна для утоленія колотья и рѣза въ животѣ, бывающаго послѣ родовъ, при недостаточномъ очищеніи—*lochia suppressa*. Перегнанная съ цвѣтами вода пользуетъ загноеніе глазъ: *Виго*, *Турнефортъ*. — Въ непостоянной подагрѣ и припадкахъ мочевыхъ путей, наливку этого растенія хвалить *Этмюллеръ*.

Количество. 2 драхмы листовъ полагаются на 6 унцій воды для отвара; цвѣтовъ щепоть наливается тѣмъ-же количествомъ горячей воды. — Гнанная вода прикладывается посредствомъ напитанныхъ полотенцевъ.

Примѣчаніе. Крестьяне ягоды ѣдятъ для очищенія желудка рвотою или низомъ. — Уголь этого дерева годенъ для дѣланія пороха.

ЖУРАВЛИНИКЪ РОБЕРТОВЪ, или РОБЕРТОВА ТРАВА;
ЖУРАВЛИНЫЙ НОСОКЪ—*geranium robertianum*, L.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, въ умѣренной Россіи растущее по тѣнистымъ и крутымъ

горамъ, такъ же въ сухихъ лѣсахъ, около Паргалова и Стрѣлиной, по утесамъ и наметамъ отъ Камы къ Тоболу.

Качества. Трава имѣеть *запахъ* козлиный, *вкусъ* солоноватый и легко вяжущій.

Сила — вяжущая, разбивающая сгустившееся въ грудяхъ молоко, ранозѣлительная: *Шомель*.

Употребленіе. Въ наливкѣ съ горячею водою полезно нить: въ кровавомъ мочетеченіи, поносахъ и боляхъ въ животѣ, почкахъ, и поясницѣ. Снаружи, свѣжая толченая трава прикладывается для разведенія грудницы, раковыхъ затвердѣній, и заживленія язвъ на сосцахъ и дѣтородныхъ частяхъ: *Линней*, *Гилданъ*. Листы, подваренные съ винограднымъ виномъ, болѣе бываютъ дѣйствительны для примочки грудныхъ трещинъ и венерическихъ язвъ: *Соболевскій*.

Количество. 1 унція листовъ полагается на фунтъ воды или вина для отвара, употребляемаго внутрь и снаружи; въ порошокъ по 1 драхмѣ, — въ видѣ катаплазмы, для разведенія отекающихъ и другихъ холодныхъ опухолей: *Пейриль*.

Примѣчанія. 1. Трава эта, даваемая въ водяной наливкѣ, полезна для рогатаго скота въ кро-

вавой мочѣ; или въ порошокѣ по 1 лоту: *Розье*. Лошади и козы ѣдятъ оную охотно; овцы и свиньи не трогаютъ; о коровахъ не замѣчено.

2. Въ деревняхъ прикладываютъ эту свѣжую толченую траву къ грудямъ для разогнанія молока, послѣ отнятія младенца. — Свѣжо-выжатымъ сокомъ, смѣшаннымъ съ медомъ, излечиваютъ злокачественныя язвы: *Фогель*.

3.

завязникъ стоячій, или завязной корень; узикъ —
tormentilla erecta, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, во всей Россіи по мокрымъ лугамъ, лѣсамъ и тѣнистымъ мѣстамъ произвольно растущее, также на Выборгской сторонѣ, около Поклонной горы, на островахъ Невы рѣки, и вездѣ по сухимъ пажитямъ находится.

Качества—корня хорошія, вяжущія. По опытамъ *Нейманна*, смолистаго экстракта содержитъ: $\frac{3}{8}$, водянаго $\frac{5}{8}$; болѣе же зависятъ отъ изобилующаго экстрактно-вяжущаго начала, и чернильно-орѣшковой кислоты—*acid. gallic.*
Бодардъ.

Запаху—свѣжій и сухой корень не имѣть; *вкусъ*: вяжущій, горьковатый.

Сила—укрѣпляющая, вяжущая.

Употребленіе. По наблюденіямъ *Бартолина*, отваръ этого корня внутрь и снаружи полезенъ во всѣхъ болѣзняхъ, требующихъ сильнѣйшихъ вяжущихъ средствъ, какъ-то: въ сильныхъ мѣсячныхъ кровотеченіяхъ, маточныхъ долгопродолжительныхъ, поносахъ, и перемежныхъ лихорадкахъ. — *Кулленъ* хвалитъ въ соединеніи съ горечавкою. — Снаружи въ видѣ полосканья и примочки, *Парацельсъ* и *Сала* рекомендуютъ: въ цынготной расслабленности десенъ и шатаніи зубовъ, опаденіи и мокротной опухоли гортаннаго язычка—*uvula prolongata*, слабости членосоединеній, выпаденія внутренностей и дѣтскихъ грыжахъ.—Для предохраненія отъ изверженія младенца—*contra abortum* *Кранцъ* поставляетъ этотъ отваръ, какъ пріятное и надежное средство; также для промыванія мокнущихъ и вялыхъ язвъ—*ulcera laxa*: *Везалій*.

Количество: 3 драхмы полагается на 6 унц. воды для отвара, который большею частію служитъ для наружнаго употребленія; въ порошокъ дается внутрь отъ 20—40 гранъ съ горечавкою, или горькимъ экстрактомъ въ пилюляхъ.—*Жилиберъ* давалъ безъ примѣси по

1 драхмѣ, въ чахоткѣ, сопряженной съ кро-
вохарканіемъ, съ удачнымъ успѣхомъ. — Въ
видѣ каши — *electuar.*, замѣняющей хину, ко-
торая составляется: изъ порошка завязнаго
корня и цвѣтовъ Римской ромашки, взятыхъ
по 1 лоту, прѣнаго корня и мауна, каждого
по 2 золотника; что все смѣшавъ съ п. к.
меда, давать больнымъ въ нелихорадочный день,
каждые 2 часа по десертной ложкѣ: *Бодардъ*.

Въ аптекахъ готовятъ:

Экстрактъ завязнаго корня —
extract. rad. tormentillae erectae (*), который
дается на *пріемъ*: отъ 5—10, до 20 гранъ.
Экстрактъ этотъ, по опытамъ *Швенсона*,
можетъ служить для составленія искусствен-
ной гамской смолы, называемой кино —
gummi-resina kino artificialis, которую онъ со-
вершенно замѣняетъ, также и сухой камедь-
но-смолистый соевъ: катеху — *m. catechu* не-
нужнымъ дѣлаетъ. — Винный растворъ этого
экстракта, *Роке* совѣтуетъ въ упорныхъ по-
носахъ, и маточныхъ бѣляхъ — *profluvia mucosa*
rebella, полагая 1 драхму на 6 унц. вина.

Примѣчанія. 1. На Датскихъ островахъ ко-
рень завязной служитъ для выдѣлки кожъ, кото-

(*) *Pharmacop. castrens. R. p. 173, 255.*

рый оказался гораздо способнѣе, нежели дубовая кора, и собирается на зиму для корма свиней. — Эту траву пожираетъ охотно всякая скотина, кромѣ лошадей.

2. Лапландцы красятъ онымъ свои оленинныя кожи въ красную краску; корни, сваривъ съ калиною въ водѣ, красятъ также и сукно краснымъ цвѣтомъ, намочивъ оное напередъ въ квасцовомъ растворѣ: *Севергинъ*. — Наши простолюдины жуютъ этотъ корешокъ для укрѣпленія десенъ и остановленія поноса, отъ бѣлей даютъ по малому стаканчику по утру и въ вечеру отваръ завязнаго корня, приготовленный съ розмариномъ, дубовою омелою и сосновыми вѣтками. — Долговременное уротребленіе этого отвара дѣйствительно оказалось полезнымъ. — На штофъ воды полагаютъ по 2 лота cadaго, и варятъ, пока укипитъ половина жидкости. — Для скота полезенъ отъ кровавой мочи.

3. Корень въ соединеніи пополамъ съ ягодами калины, съ примѣсомъ квасцовъ, даетъ хорошую и постоянную красноцвѣтную краску. — Этимъ же корнемъ можно подкрашивать водку: *Фрибе*.

4. Свиньямъ это растеніе служитъ здоровымъ кормомъ: *Бартолинъ*.

5. Корень этого растенія можетъ замѣнять не только цейландскую коломбу, но и перувіанскую лихорадочную корку: *Бодардъ*.

6. Превосходный *зубной порошокъ* — *pulv. dentifricius*, укрѣпляющій шатаніе зубовъ, и отвращающій цынготную порчу десенъ, составляется: изъ равныхъ частей завязнаго корня, гравилатнаго и чистаго бѣрезоваго угля, которымъ слѣдуетъ тереть зубы ежедневно, промывая холодною водою. — Я могу смѣло увѣрить, что оный можетъ замѣнить всѣ модные зубные опіаты, какіе только существуютъ въ косметическихъ магазинахъ.

ЗВѢРБОЙ, или ЗВѢРБОЙНИКЪ; ЗАЯЧЬЯ КРОВЦА—
hyericum perforatum, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, во всей Россіи и Сибири растущее по влажнымъ лугамъ, рощамъ и лѣсамъ, также на островахъ Невы рѣки, на Поклонной горѣ и въ другихъ подобныхъ мѣстахъ. Цвѣтетъ въ Іюнь и Іюль мѣсяцахъ.

Качества. Цвѣтныя верхушки *запахъ* имѣютъ тяжеловатый; *вкусъ*—горьковатый, бальзамическій, зависящій отъ камедьносмолистаго, горьковатаго вещества.

Сила—разводящая, противуглистная, ранозѣлительная.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ чахоткѣ, кровохарканіи и кровавомъ мочетеченіи, происходящихъ отъ внутреннихъ язвъ: *Галенъ*, *Гофманъ*; отъ глистовъ особенно рекомендуетъ *Линней*; въ брюшныхъ завалахъ, истерическихъ и гипохондрическихъ припадкахъ, трясеніи членовъ и меланхолической задумчивости: *Бурдахъ*, въ судорожныхъ припадкахъ хвалятъ *Ліетодъ*, *Шомель*. Снаружи, по своему бальзамическому свойству, отличную оказываетъ пользу въ заживленіи ранъ и разведеніи ушибенныхъ опухолей, прикладывается по совѣту *Иппократа* свѣжая толченая трава, и въ припаркахъ тоже полезна.

Количество. Поль-унціи цвѣточныхъ верхушекъ наливаютъ 6 унц. горячей воды, которую пьютъ вмѣсто чаю; или по методу *Гелленія*: 1 горсть цвѣтныхъ верхушекъ варить въ 3 фунтахъ бѣлаго вина, пока останется 2 фунта жидкости, которую, процѣдивъ, совѣтуетъ давать по утру и въ вечеру по 3 унціи ежедневно, отъ чахотки (*). Снаружи въ видѣ катаплазмы или припарки. — Винную настойку цвѣтныхъ верхушекъ *Багмивъ* осо-

(*) Diss. de Hyperico, Præs. v. Linné. Upsal. 1776.

бенно рекомендуетъ въ ложномъ грудномъ колотьѣ—pleuritis spuria.

Примѣчанія. 1. Деревенскіе жители звѣробойные цвѣты настаиваютъ простымъ виномъ, полагая на бутылку: 2 — 3 горсти, которое получаетъ пурпуровый или багряный цвѣтъ; пьютъ они эту настойку по чаркѣ, отъ ушиба внутренностей, чахотки, и другихъ внутреннихъ поврежденій. — Иные пьютъ въ видѣ торячей водяной наливки вмѣсто чаю, отъ тѣхъ же болѣзней. — Ежели въ 1 фунтѣ водяной или винной звѣробойной настойки распустить 1 золотникъ поташу: то она снаружи, будучи прикладываема посредствомъ напитанныхъ полотенцевъ, хорошо разводитъ ушибы, затвердѣніе грудей, ядеръ, и другихъ частей скіррныя холодныя опухоли: *Левретъ, Бергій, Балдингеръ.*

2. Цвѣтными верхушками, собранными прежде разцвѣтанія, окрашиваютъ шерстяныя матеріи, напитанная квасцовою водою, въ желтую краску; съ желѣзнымъ купоросомъ, въ черную. — Оныя же цвѣтки придаютъ кислотамъ и масламъ красный цвѣтъ. — Масло звѣробойное считается домашнимъ раноцѣлительнымъ средствомъ, къ чему прибавляютъ нѣсколько скипидару. — Средство это и отъ ожогъ чрезвычайно полезно! Весьма хоро-

шая ранозѣлительная мазь составляется также: изъ свѣжихъ листьевъ звѣробоя, желтомолочника и шалфея, истоловши оныя со свѣжимъ свинымъ саломъ, прожать сквозь ветошку, и беречь для употребленія. — Она удивительно скоро излечиваетъ ссадны и раны у людей, и у всѣхъ скотовъ.

3. Пчелы собираютъ изъ оныхъ много меду и воску; а траву коровы и козы охотно пожираютъ; лошади и свиньи не трогаютъ.

ЗЕМЛЯНИКА ЛѢСНАЯ, или земляница; СУНИЦА; ПОЛУНИЦА — *fragaria vesca*, L., — *f. hortensis*, клубника.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, во всей Россіи растущее по пустымъ лугамъ и гористымъ лѣсамъ, также по открытымъ и безплоднымъ мѣстамъ.

Качества. Зрѣлыя ягоды *запахъ* имѣютъ пріятный; *вкусъ* кисловато-сладкій; травы и корня вяжущій.

Сила—ягодъ утоляющая жажду, прохлаждающая, ободряющая въ горячкахъ, возбуждающая аппетитъ, и отвращающая запоры; листовъ и корня отверзающая, мочегонительная.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Ягоды одобряются во всѣхъ лихорадочныхъ болѣзняхъ; *Шульцъ* многихъ оными пользовалъ въ чахотной лихорадкѣ; *Гофманъ* тоже вылечилъ чахотнаго, и *Жилиберъ* видѣлъ, что многіе чахотные отъ этого средства поправились.—*Фонъ Свитенъ* рекомендуетъ по нѣскольку фунтовъ въ день давать меланхоликамъ и сумасшедшимъ, коихъ онъ этими плодами отъ самаго сильнаго бѣшенства освободилъ. Знаменитый ботаникъ *Линней*, употребляя ежегодно землянику въ большомъ количествѣ, освободился отъ подагры.—Многіе кушаютъ оную съ молокомъ или сливками; но эта пища, свертываясь въ творогъ, весьма тягостна для желудка: *Штльманъ*. Ежедневное и продолжительное употребленіе этихъ ягодъ, весьма полезно для страждущихъ ломотою: *Бергій*; также въ каменной болѣзни и цынгѣ: *Линней*, *Бургавъ*, *Геснеръ*;—для растворенія камней въ мочевыхъ путяхъ—иголіті, *Лоббъ* рекомендуетъ, удостовѣрившись многими опытами; и я видѣлъ хорошій успѣхъ, растворяя 1 драхму поташа или соды, въ 6 унціяхъ земляничнаго сока, который давалъ страждущимъ по 4 столовыя ложки въ день, продолжая 20 дней (*).—Листы и корни, по опытамъ *Бар-*

(*) О семъ упомянуто было выше, на стр. 109.

толана, *Паули* и *Неболя*, много одобряются: въ чревныхъ завалахъ, желтухѣ, поносахъ, кровотеченіяхъ, и теченіи гнойной матеріи изъ дѣтородныхъ частей;—*Бодардъ* одобряетъ въ сыпяхъ, бѣляхъ, и отекахъ.— Пивной отваръ земляничнаго корня, умножаетъ недостатокъ молока у кормилицъ.

Количество. Свѣжія ягоды можно давать больнымъ, сколько пожелаютъ; выжатый сокъ, отъ 2—4 унцій. Полъ-унціи листовъ и корня полагается на фунтъ воды для отвара, которую кипятить, пока останется 6 унцій жидкости; принимать по 2 столовыя ложки чрезъ 2 часа.—На бутылку пива, полагается 1 унц. корня, которое варить до половины.—Снаружи листы прикладываются къ ножнымъ застарѣлымъ язвамъ: *Небель*.

Въ аптекахъ готовятъ:

Гнанную земляничную воду—*aqua fragariae* (*), которая составляетъ весьма пріятное ободряющее средство; предписывается обыкновенно въ микстурахъ.—Винная настойка, такихъ же качествъ: *Berrii*.—2 драхмы земляничныхъ сѣмянъ, настоянныя въ 6 унц. бѣлаго вина, которое принимая каждое утро

(*) Pharmacop. Rossica. p. 191.

по столовой ложкѣ, помогаетъ въ каменной болѣзни: *Бургавъ*.

Примѣчанія. 1. Большая почти бѣлая земляника родится на Тоболѣ; плодъ чрезъ закисаніе даетъ вино и спиртъ: *Акенъ*.

2. Листы ея козы и овцы ѣдятъ охотно, коровы не много, лошади и свиньи не трогаютъ.

3. *Фрециеръ* замѣчаетъ, что удобреніемъ земли, можно землянику довести въ грецкій орѣхъ. Она любитъ черную иловатую, не весьма сырую и не слишкомъ сухую почву, куда бы немного свѣтило солнце; такимъ образомъ дикую землянику пересаживаніемъ можно довести до величины шпанской клубники.

4. Трава земляники, въ началѣ весны собираемая, можетъ служить вмѣсто китайскаго зеленаго чаю.

5. Клубника садовая—*fragaria vesca hortensis* бѣлая и красная, имѣетъ одинакія качества съ земляникою; выжатый сокъ изъ этихъ ягодъ чрезъ броженіе, составляетъ пріятное вино.

6. Гнанная вода изъ этихъ ягодъ служитъ для дамъ косметическимъ средствомъ, доставляющимъ кожѣ свѣжесть и нѣжный цвѣтъ.

змѣвникъ двудомный, или кошечья лапка; горлянка; сушеница—*gnaphalium dioicum*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, растущее въ умѣренной Россіи въ долинахъ, и между горъ, также на островахъ Невы рѣки, на Поклонной горѣ, и вездѣ по сухимъ лугамъ. Цвѣтеть въ Маѣ и Іюнѣ мѣсяцахъ.

Качества. Цвѣты *запаху* не имѣютъ; *вкусъ* вяжущій. *Сила* тоже вяжущая, укрѣпляющая, грудная.

Употребленіе. Вмѣсто чаю, одобряются въ удушливомъ кашлѣ, кровохарканіи и чахоткѣ: *Бурдахъ*; также въ простудной ломотѣ, излишнихъ кровотеченіяхъ, женскихъ бѣляхъ, и теченіи слизи изъ мочеваго канала—*Венергхаа*, происходящихъ отъ ослабленія частей: *Соболевскій*. Въ поносахъ, глистныхъ припадкахъ, ломотѣ и судорожномъ кашлѣ—*tussis ferina*, рекомендуютъ: *Бокконе*, *Фогель*.—Снаружи прикладываемые къ ранамъ листы оныя осушаютъ и заживляютъ.

Количество. Цвѣтовъ полъ-унціи наливаютъ 6 унц. горячей воды, которую съ медомъ пьютъ, какъ чай.

Примѣчанія. 1. Растеніе это составляетъ большую часть Швейцарскаго травянаго набора, ко-

торый ежегодно рассылаютъ во Франціи подъ именемъ *фальтранка*; грудной этотъ наборъ всѣ пьютъ вмѣсто чаю, съ сахаромъ и молокомъ.—По опытамъ *Фогеля*, цвѣты этого растенія пользу оказываютъ подобную квасци, синарубной коркѣ и корню коломбы.

• 2. Траву его лошади, овцы и свиньи ѣдятъ охотно; козы и коровы не трогаютъ.—Цвѣтное растеніе, собранное въ Іюнѣ или Іюлѣ мѣсяцахъ, и высушенное въ тѣнистомъ мѣстѣ, служитъ также лекарствомъ для домашнихъ животныхъ отъ глистныхъ болѣзней, полагая онаго 2 горсти на бутылку горячей воды: *Бокконе* (*).

ЗМѢВНИКЪ КУСТАРНЫЙ, или КОМАРНИКЪ—*gnaphalium
agenarium, et stæchas, l.*

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, растущее на бесплодныхъ холмахъ, на Волгѣ, близъ Сызрана, въ Оренбургской степи и проч. Цвѣтеть въ Іюлѣ мѣсяцѣ.

Качества. Цвѣты имѣютъ *запахъ* благовоновый, нѣсколько москусомъ отзывающійся; *вкусъ*: пряный и слегка вяжущій.

(*) См. его же *Musee di Fisica e d' Esperienze. Venet. 2697, p 143.*

Сила—побуждающая, разводящая, укрѣпляющая.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ застарѣлой простудѣ, ломотѣ и судорожномъ кашлѣ, по совѣту *Линнея*, многіе пользуются: въ кровавомъ поносѣ, брюшныхъ боляхъ и желтухѣ, *Гмелинъ* совѣтуетъ; снаружи: толченая трава съ цвѣтами прикладывается къ ногтямъ: *Кранцъ*.

Количество — какъ выше описаннаго; пьютъ въ наливкѣ и отварѣ съ медомъ, особенно въ грудныхъ чахотныхъ припадкахъ, съ желаемымъ успѣхомъ (*).

ЗМЪЕГОЛОВНИКЪ молдавскій, или турецкая мелисса—*dracoccephalum moldavicum*, 1.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, произвольно растущее въ Молдавіи и Россіи: на Волгѣ, близъ Царицына, на Исеть и Тоболѣ; въ садахъ тоже разводится.

Качества—свѣжей травы хорошія; *запахъ* имѣеть благовонный, *вкусъ* ароматный, пріятный.

Сила — побуждающая, нервная, укрѣпляющая.

(*) *Craniz. materiae med. et chirurg. 1779, Т. II. р. 24.*

Употребленіе. Одобряется при всеобщей разслабленности, худосочиі, желудочныхъ спазмахъ, біеніи сердца и головной боли, боляхъ послѣ родовъ, мокротныхъ завалахъ и въ простудной ломотѣ: *Кранцъ, Шведіоръ*. — Снаружи, свѣжую толченую траву прикладываютъ для заживленія ранъ; выжатый сокъ и смѣшанный съ простымъ виномъ, тоже служитъ хорошею ранозѣлительною примочкою: *Турнефортъ*. — Въ видѣ катаплазмы съ мукою сдѣланной, излечиваетъ мозгоѣду — рапушіа: *Шульцъ, Фогель*.

Количество. Горсть травы наливаютъ 6 унц. кипячей воды, и подсластивъ пьютъ вмѣсто чаю, или наливаютъ бѣлымъ виномъ, и настоявъ процѣживаютъ съ выжимкою. — Настоявка эта гораздо дѣйствительнѣе водяной, которую можно принимать по 1, и по 2 столовыхъ ложки нѣсколько разъ въ день. — Снаружи въ видѣ припарки и примочки.

Примѣчаніе. Растеніе это качествомъ своимъ подходитъ къ мелиссѣ аптечной или садовой — *melissa officinalis*, вмѣсто которой можно употреблять оное съ равнымъ дѣйствіемъ, гдѣ и эта одобряется. — Такихъ же свойствъ и змѣеголовникъ Сибирскій — *dracoscephalum sibiricum*: *Палласъ*.

ЗОЛОТНИЧКА БОЛОТНАЯ, ИЛИ ПЕРЕЛОЙНАЯ ТРАВА—
parnassia palustris, L.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, по мокрымъ и болотистымъ лугамъ въ умѣренной Россіи растущее; также около Выборгской и Петербургской дороги, у Стрѣлиной, и въ другихъ подобныхъ мѣстахъ. — Цвѣтетъ въ Іюль и Августѣ мѣсяцахъ.

Качества. Трава и цвѣты *запаху* не имѣютъ; *вкусъ* горьковато-вяжущій.

Силу—тоже вяжущую, отверзающую.

Употребленіе. Траву и цвѣты пьютъ въ отварѣ, при астеническихъ кровотеченіяхъ, также отъ завала или затвердѣнія печени; снаружи полезно толченую траву прикладывать на наружныя раны, и къ больнымъ воспаленнымъ глазамъ. — Сѣмя ея гонитъ мочу, и рвоту утоляетъ: *Соболевскій*.

Количество. Цвѣтовъ двѣ щепоти наливаютъ 6 унц. кипячей воды; или полъ-унціи травы варятъ въ 8 унц. воды, пока останется полфунта отвара.

Примѣчанія. 1. Козы и лошади ѣдятъ траву охотно; коровы и свиньи не трогаютъ.

2. Когда она цвѣтеть, то служитъ знакомъ, что сѣно пора косить.

3. Въ Сибири этимъ растеніемъ пользуются отъ перелоя, или мокротнаго стволоваго теченія — *Menorrhagia*, приводящаго въ ослабленіе дѣтородныя части, и отъ непомѣрныхъ кровотоковъ.

ЗОЛОТОЦВѢТЬ, или ивановъ цвѣтъ; бѣлица; стоцвѣтъ; воловьѣ око — *chrysanthemum leucanthemum*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, растущее вездѣ по сухимъ лугамъ и полямъ; цвѣтеть въ Іюнѣ и Іюль мѣсяцахъ.

Качества. Трава и цвѣты *запахъ* имѣютъ слабый, *вкусъ* островатый, пронизательный, въ отварѣ перечный.

Сила — побуждающая, разводящая мочегонительная, очищающая.

Употребленіе. Въ удушья, и другихъ грудныхъ мокротныхъ болѣзняхъ: *Багливъ*; въ чахоткѣ: *Валдимитъ*; также въ головныхъ шолудяхъ, чесоткѣ и прочихъ накожныхъ нечистыхъ сыпяхъ. — Снаружи: разжеванную траву, или толченую кладутъ на зубы, для утоленія боли, при чемъ она сильно гонитъ слюну.

Количество. Горсть свѣжей травы съ цвѣтами варятъ въ десяти унціяхъ воды, пока останется жидкости полфунта; выжатый сокъ, подслащенный медомъ, дается по столовой ложкѣ.—Толченое растеніе, смѣшанное съ свѣжимъ коровьимъ масломъ, или съ свинымъ саломъ, употребляютъ снаружи вмѣсто очищающей мази.

Примѣчаніе. Цвѣты приготовленную шерсть съ квасцами окрашиваютъ темножелтымъ цвѣтомъ.

ЗОЛОТУХА ЖЕЛТАЯ, ИЛИ ЗАПЛИСА; ЛУГОВАЯ РУТА;

ЗОЛОТЕНЬ; ЖИВИТЕЛЬНАЯ ТРАВА; МАТРИОНКА—

thalictrum flavum, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, растущее по лѣсистымъ и мокрымъ лугамъ: около Краснаго села, Царскаго, и въ другихъ подобныхъ мѣстахъ.

Качества. Корень желтый, подобный ревеню; *вкусъ*—сладко-горьковатый и слегка вяжущій.

Сила—слабительная; только требуетъ приему втрое больше, чѣмъ Сибирскаго ревеня, наз. черенковымъ—*rheum rharonticum*.

Употребленіе. Совѣтуютъ отъ запоровъ, брюшныхъ заваловъ и желтухи: *Фогель*; ли-

сты ея полезны въ кровохарканіи, теченіи бѣлей, и въ другихъ женскихъ астеническихъ болѣзняхъ; выжатый сокъ изъ цвѣтной травы, принимаемый отъ 1—2 унцій; служитъ хорошимъ вяжущимъ средствомъ. Снаружи, отваромъ травы промываютъ цынготныя раны, гнилыя язвы, чесотку, и другія нечистыя накожныя сыпи. — Порошокъ корня, или сѣмянъ тоже полезенъ для присыпки астеническихъ язвъ; втягиваемый въ ноздри, останавливаетъ носовое кровотеченіе—epistaxis.

Количество. Какъ слабительное, корень дается въ порошокѣ отъ 2 — 3 золотниковъ; для разводящаго дѣйствія, отъ $\frac{1}{2}$ до 1 золотника; травы 1 унц. на фунтъ воды, для отвара, служащаго для наружнаго употребленія; налитая 1 горсть листовъ тѣмъ же количествомъ горячей сыворотки, служитъ слабытельнымъ питьемъ—rotio laxativa.

Примѣчанія. 1. Корень и листья даютъ хорошую постоянную желтую краску, годную для шерстяныхъ матерій и крашенія пряжи.

2. Трава эта составляетъ весьма хорошее сѣно; а потому всякая скотина ѣсть ее охотно: *Соболевскій*. Корень этого растенія ветеринарные врачи употребляютъ вмѣсто ревеня: для лошадей, коровъ и другаго скота, отъ запоровъ даютъ оный въ

порошкѣ по 2 лота, и болѣе; или 2 горсти су-
шеныхъ листовъ варятъ въ 1 бутылкѣ воды, пока
укипитъ половина.

3. Въ Орловской губерніи пользуются отваромъ
этого растенія отъ укушенія бѣшеной собаки (*).

ЗОЛОТУШНИКЪ ОБЫКНОВЕННЫЙ, или ЗОЛОТАЯ РОЗГА;
ЗОЛОТЕНЬ—*solidago virga aurea*, L.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, растущее
по сухимъ полямъ и лѣсистымъ горамъ, также
на Поклонной горѣ, въ Парголовѣ, на остро-
вахъ Невы рѣки, и вездѣ въ подобныхъ мѣ-
стахъ.

Качества. Трава имѣетъ *запахъ* слабый,
ароматный; *вкусъ* горько-вяжущій и слегка
пряный.

Сила—укрѣпляющая, мочегонительная, ра-
ноцѣлительная.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ каменной болѣзни по-
чекъ и мочевого пузыря, загноеніи этихъ внут-
ренностей и чахоточной лихорадкѣ, подтвержда-
ютъ собственными опытами: *Понтедера*, *Ско-*
поли и *Ливвицъ*; въ кровавомъ мочеиспраж-

(*) См. Всеобщій журналъ врачебной науки, изд. Им-
пер. М. Х. Академіею, 1816 года, No. II. стр. 191—195.

неніи, *Бургграфъ*; въ водяной болѣзни, особенно рекомендуетъ *Понтедера*; въ гортанныхъ ранахъ, и язвахъ какъ внутреннихъ, такъ и внѣшнихъ; также въ поврежденіи дѣтородныхъ частей при трудныхъ родахъ, и въ другихъ насильственныхъ разрывахъ мягкихъ частей—*partes laceratae*: *Рай*, *Букебаумъ*, *Теттельбахъ*.

Количество. 1 или 2 щепоти травы наливаютъ 8 унц. горячей воды; 2 или 3 драхмы сухой травы тоже наливаются бѣлымъ виномъ; *Герли*, давая сію наливку каждый часъ по столовой ложкѣ, выгналъ камень изъ мочевого пузыря въ теченіи 8 часовъ; въ порошокъ тоже дается по 1 драхмѣ, три раза въ день, — снаружи, въ видѣ полосканья, впрыскиваній и примочекъ. *Цоризъ* особенно рекомендуетъ экстрактъ этого растенія: въ каменномъ мочерѣзѣ, и кровавомъ мочетеченіи отъ язвъ, находящихся въ почкахъ, или въ мочевомъ пузырьѣ; дается на приемъ: отъ 2 — 5 и 10 гранъ. Въ расслабленіи кишекъ, задняго прохода, и маточнаго рукава, отваръ служитъ полезнымъ клистиромъ. *Снаружи* прикладываемая толченая трава хорошо очищаетъ цынготныя и другія гнилыя язвы; для сбереженія отъ цынготной гнилости десенъ, и для укрѣпленія шатающихся зубовъ, тоже полезно

жевать свѣжую траву, или чаще полоскать ротъ ея отваромъ: *Швенкфельдъ, Соболевскій.*

Примѣчаніе. Растеніе это всякая скотина ѣсть охотно.—Въ отвѣръ дается домашнимъ животнымъ съ хорошею пользою въ поносахъ и запорахъ мочи, отваривая 2 горсти этого растенія въ 1 бутылкѣ воды, до половины. Толченая трава прикладывается для заживленія ранъ и разведенія опухолей.—Листы и цвѣты даютъ хорошую желтую краску.

зоря, или любистокъ—*ligusticum levisticum*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, во всей Россіи растущее по садамъ, и само разводится по горамъ на Окѣ рѣкѣ.

Качества. *Запахъ* корня, травы и сѣмянъ довольно душистый, непріятный; *вкусъ*—пряно-острый, горячительный, къ дягилю подходящій; сѣмяна мочѣ даютъ черный цвѣтъ; изобилуютъ летучимъ ароматнымъ масломъ. *Сила* побуждающая, вѣтрогонная, мѣсячная и родовая крови гонящая, разводящая; — сѣмянъ: горячительная, потогонная, противуглистная: *Фозель.*

Употребленіе. Зорьный корень *Бурдахъ* особенно рекомендуетъ въ маточныхъ болѣз-

няхъ, при неправильномъ мѣсячномъ и родовомъ кровоочищеніи; въ Голландіи повивальныя бабки, корень и сѣмя этого растенія держали за великую тайну: для облегченія ослабѣвшихъ роженицъ, и удобнѣйшаго разрѣшенія въ трудныхъ родахъ; зорьяная трава, тоже въ упомянутыхъ случаяхъ, весьма полезна, употребляемая: въ баняхъ или ваннахъ, припаркахъ и клистирахъ, которые для утоленія боли въ животѣ и въ другихъ припадкахъ, въ случающихся послѣ родовъ, служатъ весьма полезными средствами; настойка листовъ и сѣмянъ, употребляемая внутрь, утоляетъ судороги, спазмы и истерическіе припадки. *Гамнеринъ*, для отвращенія истерическаго пароксизма, давалъ толченое сѣмя по 20 гранъ и болѣе съ бѣлымъ виномъ. — Впрочемъ сѣмя зорьяное имѣетъ сходныя качества съ волоскимъ укропомъ—*a. foeniculum*; а корень съ дягилемъ—*a. archangelica*, и императорскимъ корнемъ—*imperatoria ostruthium*; а потому можно оныя съ равнымъ успѣхомъ во веѣхъ тѣхъ случаяхъ употреблять, гдѣ упомянутыя рекомендуются. — Въ нервныхъ или астеническихъ лихорадкахъ, любистковый корень, въ видѣ наливки, рекомендуетъ *Бартезъ*.

Количество. 2 драхмы корня наливаются 6 унц. горячей воды или бѣлаго вина; въ

порошкѣ дается полдрахмы; трава употребляется снаружи въ видѣ припарки, ваннъ и промывательнаго; выжатый сокъ изъ свѣжихъ листовъ, принимаемый отъ 1—3 унцій, служитъ лучшимъ кровогоннымъ средствомъ: *Форестъ*; сѣмяна даются въ порошокѣ: отъ 15—20 гранъ.

Примѣчанія. 1. Зорьяная водка, или настойка корня и сѣмянъ, съ ordinarilyю водкою приготовленная, употребляемая предъ обѣдомъ и ужиномъ по рюмкѣ, укрѣпляетъ слабый желудокъ, и полезна особенно для меланхоликовъ, склонныхъ къ вѣтрамъ, спазмамъ, и для одержимыхъ глистами.— Выжатый сокъ изъ свѣжаго корня не уступаетъ дѣйствию камедьносмолистыхъ веществъ — *gummi-resinæ*, одобряемыхъ въ истерическихъ припадкахъ: *Бургавъ*.

2. Въ деревняхъ молодые стволы дѣти ѣдятъ, и тѣмъ отъ глистовъ избавляются.

3. Коровы, наѣвшись зорьяной травы, даютъ молоко вонючее, да и мясо ихъ получаетъ противный вкусъ; свиньи не трогаютъ (*). Зорьяный корень и сѣмена даются лошадямъ и рогатому

(*) См. Schwed. Abhandl. XII. В. р. 103.

скоту, какъ разводящее и кровочистительное лекарство; также отъ запора, бывающаго у этихъ животныхыхъ, въ порошокѣ отъ 1—2 лотовъ.—Свѣжіе толченые листы прикладываютъ для заживленія ранъ и язвъ.

4. Древніе Римляне, въ *Траяново* время, весьма уважали это растеніе, почитая оное особеннымъ даромъ природы: *Плиніи* (*).

II.

ИСТОДЪ ГОРЬКІЙ, или МНОГОМЛЕЧНИЦА; КРЕСТОВИКЪ;
ПОЛИГАЛА СИБИРСКАЯ — *polygala amara, l. sibirica*
(Pallas).

Мѣсто. Растеніе почти многолѣтное, въ полуденной Россіи по лѣсистымъ горамъ произвольно растущее, также въ довольномъ количествѣ около Пулковской и Дудеровой горъ, у Краснаго села, и по другимъ мѣстамъ.

(*) *Levisticum* inter eximia naturae dona numeratur... ad pondus argentei denarii pensum!—Erat iu culinis Romanorum et Groecorum usitatissimum: Dodonæus — An *Laserpitium Siler*? I. (Копіоръ).

Качества—корня и листовъ зависятъ отъ экстрактнаго вещества, содержащагося болѣе въ листахъ;—*запаху* корень и листы не имѣютъ; *вкусъ* корня сладковато-горькой, клейкій; листовъ очень горькій.

Сила обѣихъ: слегка побуждающая, разводящая мокроты, желудочная, укрѣпляющая.

Употребленіе. Въ грудныхъ астеническихъ болѣзняхъ, мокротной чахоткѣ, особенно въ соединеніи съ исландскимъ мохомъ, совѣтуетъ *Вилліе*; въ судорожномъ кашлѣ, язвахъ легкаго, водяной болѣзни и ломотѣ: *Карпинскій*, *Шведіоръ*, *Бурдахъ*.—Въ грудномъ колотѣ—pleuritis, для разрѣшенія воспаления и отдѣленія мокротъ, совѣтуетъ *Дюгамель* (*), *Штолль*, *Колминъ*; *Косте* и *Роке* подтверждаютъ многими наблюденіями пользу этого средства въ мѣстныхъ грудныхъ болѣзняхъ, сопряженныхъ съ кровоплеваніемъ, сухоткою и чахоткою, давая отваръ: изъ 3 унц. корня, отвареннаго въ 3 фунтахъ воды до половины, по чайной чашкѣ, три раза въ день (**).

(*) Mem. d' Acad. des Sc. de Paris, 1739, p. 131 et 1740.

(**) Cours de Botanique medic. comparée par M. Bodard, a Paris, 1810, T. II, p. 320—324.

Количество. Въ порошокъ корень дается отъ половины до 1 драхмы, 2 или 3 раза въ день; для отвара 1 унція на 2 фунта воды, которую кипятить, пока останется половина жидкости, процѣдивъ, принимать по чайной чашкѣ, нѣсколько разъ въ день.—Для винной настойки полагается тоже количество корня, на бутылку бѣлаго винограднаго вина, которое, настоявъ 3 дня въ тепломъ мѣстѣ и процѣдивъ, давать больнымъ по рюмкѣ, 3 раза въ день.

Въ аптекахъ приготавлиють:

Отваръ истодоваго корня — *decosturagad. polygalæ amaræ* (*), который въ упомянутыхъ болѣзняхъ весьма полезенъ, принимаютъ онаго по 2 унціи, три или четыре раза въ день: *Вилле*.

Примѣчанія. 1. По опытамъ дю-Гамеля и новѣйшихъ врачей, горькій истодъ и слѣдующая онаго порода качествами своими подходятъ къ корню сенегги—*polygala senega*: а потому могутъ оный въ тѣхъ же случаяхъ замѣнять удобно: *Штолль, Коллинъ, Пейриль*.

(*) Pharmacop. castr. R. p. 247.

2. Некоторые писатели утверждают, что коровы и другая скотина, паёвшия истодовой травы, даютъ много молока, а особенно овцы и козы; впрочемъ лошади и свиньи оной не трогаютъ.

3. Матери и кормилицы, имѣющія недостатокъ молока въ грудяхъ, употребляя сей корень въ горячей наливки вмѣсто чаю, возстановляютъ оное.

ИСТОДЪ ОБЫКНОВЕННЫЙ, или ВЫКА КОНИЧЬЯ—*polygala vulgaris*, L.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, растущее во всей Россіи на сухихъ лугахъ и въ лѣсахъ; также въ Исетской и Киргизской степи, на Пулковской и Дудеровой горахъ, около Ладожскаго канала, у рѣки Луги, деревни Колодецы, изрѣдка на Каменномъ островѣ, и вездѣ по сухимъ пажитямъ.

Качества. Корень *запаху* не имѣеть; *вкусъ*: слабо-горькій, островатый.

Сила—разводящая, грудная, подобная вышеописанному, и замѣняющая китайскій чай—*succedanea theæ chinensis*: *Пленкъ*.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Употребляется въ боковомъ колотѣ—*pleuritis*, и въ другихъ грудныхъ болѣзняхъ. Недавно въ иностранныхъ госпита-

ляхъ произведены были опыты съ успѣхомъ, въ пользованіи чахотныхъ: *Кранцъ*.

Количество. Предписывается такимъ же образомъ, какъ вышеописанный истодъ — р. амага. — Для чахотныхъ, можно употреблять съ пользою молочный отваръ, полагая 1 унцію срезаннаго корня на фунтъ козьего молока; процѣженный пить по чайной чашкѣ, 2 или 3 раза въ день. К....

Примѣчаніе. И эта трава составляетъ скоту рогатому хорошую паству, умножающую молоко. — Высушенные листья оной пьютъ многіе вмѣсто чаю. — Изъ цвѣтовъ пчелы собираютъ много меду.

племъ полевой, или вязъ — *ulmus campestris*, L.

Мѣсто. Дерево въ умѣренной Россіи нерѣдкое, растущее по лѣсамъ и дорогамъ: около рѣки Луги, Волхова, и около Гостилицы.

Качества. Кора, взимаемая изъ тонкихъ вѣтвей, особенно молодаго дерева, имѣетъ *вкусъ* клейкій, горьковато-вяжущій; изъ старыхъ деревьевъ кора болѣе вяжетъ, и не столь горька.

Сила — вяжущая, укрѣпляющая, мочегонительная, очищающая.

Употребленіе. Отваръ корки употребляется въ различныхъ кожныхъ болѣзняхъ; именно: въ чесоткѣ, лишаяхъ, паршахъ, проказѣ и застарѣлыхъ язвахъ: *Лизонъ*, *Берій*; въ упорной ломотѣ, теченіи бѣлей, перемежныхъ лихорадкахъ, поносахъ и водяной болѣзни: *Пленкъ*, *Струве*, *Бурдахъ*; — въ кожныхъ болѣзняхъ венерическаго свойства — *morbi cutanei syphilitici*: *Шедіоръ*; для утоленія болей, происходящихъ отъ внутренняго или сокрытаго рака — *cancre occultus*, совѣтуетъ *Гаррисъ*; порошокъ листовъ, во внутреннихъ боляхъ, коликахъ и почечныхъ припадкахъ, давалъ съ успѣхомъ *Багливъ*.

Количество. 1 или 2 унціи молодой средней корки варятъ въ 2 фунтахъ воды, пока останется половина жидкости; процѣженный отваръ принимаютъ по чайной чашкѣ весь въ день, продолжая таковыя приемы нѣсколько времени (*). Снаружи, тоже употребляется крѣпкій отваръ для омыванія и примочки, полагая 4 унц. этой корки на 4 фунта воды, отвариваемой до половины. — Этимъ отваромъ,

(*) Лизонъ: in Medical transact. Vol. 2 p. 204, гдѣ говоритъ: "Nonquidem cito, at tuto curat.,."

или изъ листовъ приготовленныхъ , примачиваютъ переломленыя кости, для скорѣйшаго оныхъ сращенія: *Діоскоридъ*.—Выжатый изъ свѣжихъ листовъ сокъ, прикладываемый къ ранамъ, оныя въ скорости заживляетъ; впуская въ глаза, истребляетъ пятна, и язвы роговидной оболочки исцѣляетъ: *Гейеръ, Фаллоній*.

Примѣчанія. 1. Америкацы молодою толченою корою присыпаютъ раны и язвы для заживленія оныхъ; вареная съ молокомъ наподобіе розмазни, производитъ хорошее нагноеніе, и очищаетъ застарѣлыя язвы; слѣдуетъ перевязывать однажды въ день, дабы не ускорить заживленія оныхъ, сопряженнаго съ опасностію! *Берній*.—Слизь, извлеченная изъ этой корки, хорошо излечиваетъ ожоги и раны: *Пленкъ*.

2. Слѣдуетъ собирать оную въ Маѣ мѣсяцѣ изъ молодыхъ деревъ; свѣжая корка содержитъ много слизи, полезной въ ранахъ, ожогахъ и проч.; сухая и старыхъ деревьевъ содержитъ больше вяжущаго вещества, годнаго для дубленія, употребляемаго въ Швеціи.

3. Молодые листочки, весною можно варить въ кушаньѣ, какъ здоровую зелень; старые листы всякій скоть ѣсть, и заготовляютъ оныя на зиму для коровъ, овецъ и проч. Дерево, по своей

крѣпости, годно для подводныхъ корабельныхъ частей, для мельничныхъ колесъ, и прочихъ подобныхъ издѣлій; изъ разныхъ коренныхъ наростовъ, Калмыки вырѣзываютъ прочную домашнюю посуду.—Столяры дерево это поддѣлываютъ подъ магоновое или красное.—Зола даетъ хорошій поташъ.

4. Дерево это рано распускается весной, и весьма полезно для алей, изгородовъ, и проч.; но не должно сажать оное близъ плодовыхъ растеній, ибо широко распространяющіеся его корни отнимаютъ питаніе у другихъ растеній: *Севергинъ*.

ИРЬ ИЛИ АИРЬ; КОСАТИКЪ; ЛЕПЕШНИКЪ, ТАТАРСКІЙ САБЕЛЬНИКЪ—*asogus calamus*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, въ южной Россіи и Сибири произвольно растущее на мокрыхъ и болотныхъ мѣстахъ, какъ-то: на Оби, Чулимѣ, Иртышѣ, въ Соногоріи и Бухаріи.

Качества—корня зависятъ отъ остраго летучаго масла, соединеннаго съ экстрактымъ горькимъ веществомъ и фосфорною или со-лекислою щелочью—*s. kalı phosphorico, v. sulphuratico*: *Шпренгель*. Запахъ разрѣзаннаго свѣ-

жаго и сухаго корня благовоный; *вкусъ*: пряно-острый, горьковатый, тошноватый.

Сила — превосходная, побуждающая, желудочная, и довольно хорошо замѣняющая хину, или лихорадочную корку.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ астеническихъ болѣзняхъ, особенно: въ цынготной разслабленности и трудномъ пищевареніи желудка, въ закоренѣлой цынгѣ, ломотѣ въ составахъ, гнилости десенъ и шатаніи зубовъ: *Гофманъ*, *Раве*; въ мокротномъ удушьѣ, зажной водяной болѣзни — *anasarca*, и запорѣ мочи: *Фаллоній*, *Галлеръ*, *Кранцъ*; въ астеническихъ внутреннихъ кровотеченіяхъ: *ле-Бо*; въ блѣдной немочи, бѣляхъ и теченіи мокротъ изъ дѣтородныхъ частей — *bleorrhagiæ*; въ дѣтской сухоткѣ, золотухѣ и англнской болѣзни: *Пленкъ*, *Вейкардъ*; въ долговременныхъ перемежныхъ лихорадкахъ и злокачественныхъ гнилыхъ горячкахъ, сопряженныхъ съ большею слабостію нервной системы, желчными нечистотами — *saburra biliosa*, астеническимъ колотьемъ — *pneumonia asthenica*, и пятнами — *petechiæ*, ирный корень вмѣстѣ съ мауномъ — *radix valerianæ officin.* употребляемый, чрезвычайную оказываетъ пользу: *Линней*, *Гуфеландъ*, *Франкъ*, *Горнъ*; таковое же дѣйствіе онаго какъ въ знобучихъ лихорадкахъ, такъ и въ другихъ

хроническихъ болѣзняхъ подтверждаютъ: *Аллиони и Куллеъ*; въ дѣтскихъ глистныхъ болѣзняхъ, ирный корень, даваемый съ цытварнымъ сѣменемъ, въ видѣ крѣпкой наливки, служитъ лучшимъ средствомъ, изгоняющимъ ихъ гнѣздилище, и уничтожающимъ твердую опухоль живота: *Горитъ*; въ соединеніи съ казацкимъ можжевельникомъ—*juniperus sabina*, полезно присыпать бостоѣдныя язвы, — *ulcera cariosa*, *Менхъ*; крѣпкимъ отваромъ касатика промываются цынготныя гнилыя язвы, рытики, венерическія язвы и раковыя: *Бурдахъ*; съ прибавленіемъ купоросной вислоты—*acid. sulphuric.* и меда, служитъ хорошимъ полосканьемъ: *Пленкъ*; онъ же совѣтуетъ ирнымъ отваромъ, смѣшаннымъ по равной части съ виннымъ слабымъ спиртомъ, тереть ежедневно: грудь, животъ и спину у дѣтей золотушныхъ, сухотныхъ, и сиднями одержимыхъ — *infantes thacitici*.

Количество. Внутрь дается въ порошокъ отъ 20 гранъ до полдрахмы, 3 раза и болѣе; въ видѣ кашки: 1 или 2 драхмы смѣшиваютъ съ медомъ, и даютъ дѣтямъ по чайной ложкѣ, нѣсколько разъ въ день; въ упомянутыхъ лихорадкахъ, и горячкахъ наилучшимъ образомъ предписывается въ видѣ наливки, или отвара — *infuso-decoctum*; напр. наливъ 1½ унціи толченаго корня 16 унц. горячей воды, ко-

торую вскипятить однажды въ покрытомъ сосудѣ, и процѣдивъ 12 унц. этого отвара, по простуженіи прибавить 4 драхмы Гофмановыхъ капель — æther. sulphuric. alcoholisat., на приемъ давать чрезъ 2 часа по двѣ столовыя ложки.—
Цынготнымъ, настоявъ въ пивѣ, можно ежедневно давать по 1 фунту, вмѣсто питья.

Въ аптекахъ готовятъ:

1. Пряный порошокъ — pulvis aromaticus (*), который въ слабости желудка, отъ накопленія вѣтровъ въ кишкахъ, въ астеническихъ лихорадкахъ и въ другихъ выше-упомянутыхъ болѣзняхъ, можно принимать съ водою, или съ бѣлымъ виномъ: по 10—20 гранъ и больше.

2. Ароматную настойку, — tinctura aromatica (**), полезную въ тѣхъ же случаяхъ; принимается отъ 1—4 драхмъ.—*Тромсдорфъ* одобряетъ составленіе оной: изъ ирьянаго корня, гравилатнаго, горечавки и сѣмянъ волоскаго укропа.

3. Порошокъ травительный, или ѣдкій — pulvis escharoticus (***), служащій для

(*) Pharmacop. castrens. R. p. 321.

(**) Р. 373.

(**) Р. 322.

истребленія мясной дичи, нарастающей въ нечистыхъ язвахъ, бородавокъ, и проч.

4. Наборъ противуцынготный — species antiscorbuticæ (*), употребляемый въ отвѣрѣ. Сей наборъ можно также, по методу. Г. *Виліе*, настаивать молодымъ пивомъ, для составленія такъ называемаго противуцынготнаго — *secevisia antiscorbutica* (**), полагая онаго набора 6 фунтовъ на 120 фунтовъ молодаго пива, или сусла — *infusum matli* Н. и поставивъ въ погребъ на 4, или 6 дней, пока кончится броженіе, потомъ процѣженное пить ежедневно отъ $\frac{1}{2}$ —1 фунта; съ прибавленіемъ угле-кислаго поташа — *subcarbonas potasæ*—1 фунта, на сказанное количество сусла или пива, который хорошую пользу оказываетъ также въ водяной и каменной болѣзняхъ.

Примѣчанія. 1. Иръ или касатикъ, по своей пряности и испытанному дѣйствію, замѣняетъ прочія такого же свойства иноземныя ароматныя средства, именно: имбирь, калганъ, перецъ, гвоздику, корицу, мушкатный орѣхъ, и другія тому подобныя, примѣшиваемыя обыкновенно къ нѣкоторымъ лекарствомъ, для лучшаго оныхъ дѣйствія.—Ко-

(*) Тамъ же, р. 346.

(**) ————— р. 235.

рень этотъ, въ сахарѣ вареный, составляетъ весьма пріятный и здоровый конфектъ, служащій желудочнымъ средствомъ, и отвращающимъ противный запахъ рта: *Бодардъ*.—Перегоняемый съ водою, служитъ весьма хорошимъ лекарствомъ, укрѣпляющимъ желудокъ.

2. Оный же съ вербною коркою, дубовою и гравилатнымъ корнемъ дѣлають хину въ Россіи вовсе ненужною.

3. Бухарцы кладутъ свѣжіе корни касатика въ горячую золу, потомъ, очистивъ вернюю кожу, толкутъ его, и употребляютъ съ пользою во всѣхъ болѣзненныхъ припадкахъ, какъ универсальное домашнее лекарство.

4. Вода вониючая и гнилая, посредствомъ ирригатора ирригатора съ прибавленіемъ угольного порошка дѣлается годною для питья и безвредною. Татары, въ недостаткѣ чистой воды, пьютъ и болотную, но предварительно кладутъ въ оную порошокъ этого корня.—Примѣръ, въ нуждѣ достойный подражанія.

5. Корень и траву ири охотно употребляетъ рогатый скотъ, и этотъ кормъ для нихъ очень полезенъ.

иссопъ, или синий звѣрбой—*hyssopus officinalis*, L.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, въ южныхъ странахъ Россіи и Сибири произвольно растущее, особенно на мѣловыхъ холмахъ Дона и Медвѣдицы, также на гористомъ берегу Волги, близъ Саратова и Камышина.

Качества. Трава, съ цвѣтными верхушками собираемая, прежде разцвѣтанія, содержитъ въ себѣ летучее масло, соединенное съ экстрактымъ горькимъ началомъ. *Запахъ* свѣжая и сухая трава имѣетъ благовонный; *вкусъ* горьковато-пряный, горячительный.

Сила—слегка побуждающая, грудная, разводящая.

Употребленіе. Въ грудныхъ мокротныхъ болѣзняхъ, одобряетъ *Шпильманнъ*; въ простудномъ кашлѣ, мокротной жабѣ и удушѣ, *Кранцъ*. Снаружи, для разведенія ушибовъ, и багровыхъ кровяныхъ застоевъ—*есшумота: Рюланъ, Боиллъ, Розенштейнъ*.

Количество. Внутрь дается въ видѣ наливки, полагая 2 драхмы верхушекъ на 4 унціи горячей воды; для наружнаго употребленія, 1 унцію травы варятъ въ 8 унціяхъ воды, прибавляя краснаго вина 2 унціи; отваръ этотъ служитъ хорошимъ полосканьемъ

и примочкою; вареная трава съ водою и уксу-
сомъ употребляется для припарки, и по-
лосканья рта отъ простудной боли зубовъ;
Диоскоридъ.—Пары, втягиваемые въ легкія,
полезны при воспаленіи оныхъ, и горла—
angina; допускаемые къ слуховому проходу,
уничтожаютъ звонъ въ ушахъ: *Фогель*.

Въ аптекахъ готовятъ:

1. Гнанную воду—*aqua hyssopi offic.*, ко-
торая имѣетъ свойства мятной воды; въ груд-
ныхъ припадкахъ, дается въ видѣ микстуры
съ солодковымъ сокомъ *succus spissatus glycyrrhizæ gl.* въ поносахъ и слабости желудка, съ
экстрактотъ завязнаго корня—*extractum tormen-
tillæ erectæ*, или съ горькимъ,—*extract. ama-
rum*, и проч.—Наливка состоящая: изъ 1 ун-
ціи травы, и 12 унц. горячей воды, имѣетъ
тѣже свойства.

2 Консерву—*conserva hyssopi* (*), полез-
ную тоже въ упомянутыхъ болѣзняхъ, которая
дается въ приличныхъ микстурахъ, отъ $\frac{1}{2}$ —1
унціи.

3. Сборы грудные, *species pectorales* (**),
употребляемые въ вышесказанныхъ болѣзняхъ

(*) *Pharmacopœa Rossica.* p. 199.

(**) Р. 246.

въ отварѣ съ медомъ, вмѣсто чаю, полагая 1 унцію на фунтъ кипячей воды.

Примѣчанія. 1. Многіе имѣвшіе наклонность въ чахоткѣ отъ поврежденія въ легкомъ, поправились, употребляя каждыя утра по чайной чашкѣ отваръ, состоящій: изъ 1 горсти иссопа и 12 винныхъ ягодъ или фигъ—*figus carica*, l., которыя, изрѣзавъ, варить въ 3 фунт. воды, пока останется 1 бутылка жидкости (2 фунта).

2. Ежели равныя части цвѣтной травы иссопа, розмарина, лаванды, тмина и можжевеловыхъ ягодъ, наполнивъ оными половинную часть кубика, и наливъ отъемнымъ виномъ, перегнать; то симъ образомъ получается весьма полезный бальзамъ отъ параличнаго расслабленія членовъ, и во всѣхъ ревматическихъ припадкахъ, которымъ натирать должно страждущія части.

3. Средство это, внутрь и снаружи употребляемое, можетъ замѣнить баккаутъ: *Бодардъ*.—Подсладивъ сиропомъ этого же растенія—*symplic. hyssopi*, можно давать по столовой ложкѣ въ истерическихъ и гипохондрическихъ припадкахъ: *Франкъ*.

К.

КАЛИНА—*viburnum opulus*, L.

Мѣсто. Дерево въ умѣренной Россіи растущее по мокрымъ лугамъ, по влажнымъ прилѣскамъ, и между горами, также около Выборгской дороги, пороховыхъ Охтенскихъ заводовъ, и вездѣ въ подобныхъ мѣстахъ.

Качества. Зрѣлыя ягоды калины имѣютъ *вкусъ* кислый и сладко-горьковатый.

Силу—слегка вяжущую, крѣпительную, противугнилъную, мочегонительную.

Употребленіе. Ягоды, веренныя съ медомъ, многіе употребляютъ отъ простуднаго кашлю, хрипоты, удушья и поноса; въ простудныхъ лихорадкахъ и водяной болѣзни, подъ конецъ леченія, могутъ также оказать великую пользу.—Г. *Соболевскій* имѣлъ отъ калины великое облегченіе, принимая по 3 рюмки въ день выжатаго изъ ягодъ сока, и съ медомъ смѣшаннаго: отъ ослабленія желудка и другихъ внутренностей, будучи притомъ подверженъ заваламъ въ печени и желтяницѣ (*).

(*) Санктпетербургской Флоры Ч. I. стр. 236.

Отваръ изъ цвѣтовъ и ягодъ этого дерева служитъ хорошимъ полосканьемъ отъ осиплости, жабы, и другихъ простудныхъ припадковъ горла. Если ложаешься спать, пить по стакану этого теплаго отвара, подслащеннаго мятнымъ сиропомъ, продолжая ежедневно; то осиплость въ теченіи недѣли проходитъ.—Онъ же предлагаетъ: изъ калинныхъ сѣмянъ, высушенныхъ и обжаренныхъ можно варить кофе, который и назвалъ Русскимъ, въ нуждѣ замѣняющимъ настоящій.—Многіе этотъ кофе пили и одобрили; ибо питье не только вкусно, но притомъ полезно отъ неваренія пищи въ желудкѣ, и для открытія остановленной испарины,—*transpiratio suppressa*.

Примѣчанія. 1. Калинку куры клюютъ охотно; листы ея всякая скотина ѣстъ, кромѣ лошадей и свиней. Ягодами питаются дрозды, щуры и свиристели.

2. Изъ зрѣлыхъ ягодъ крестьяне въ Украинѣ варятъ съ прибавленіемъ муки здоровый кисѣль, называемый: калинникъ.—Выжатый сокъ изъ оныхъ, смѣшанный съ $\frac{1}{4}$ воды, посредствомъ закваски даетъ хорошій уксусъ.

3. Изъ дерева дѣлаютъ превосходныя курительныя трубки;—изъ молодыхъ прямыхъ стволовъ хорошіе чубуки.

КАЛУФЕРЪ, или БЛАГОВОННЫЙ ДЕВЕТИЛЬНИКЪ; латинскія—*tanacetum balsamica*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, во всей Россіи садовое, и вездѣ удобно разводится сѣменами и коренными отпрысками.

Качества—превосходныя, мягкѣ подобныя; трава свѣжая и сухая имѣетъ *запахъ* благовоонный, летучій; *вкусъ*: горько-пряный, камфорный.

Сила—побуждающая, нервная, мѣсячное очищеніе гонящая.

Употребленіе. Въ слабости желудка, или невареніи пищи—*dyspepsia*, вѣтренной коликѣ, и запорѣ мѣсячныхъ кровей: *Бурдахъ*; въ глистныхъ припадкахъ, маточныхъ судорогахъ, и частыхъ спазмахъ, происходящихъ отъ слабости нервовъ; притомъ это растеніе противудѣйствуетъ усыпительному яду—*contra narcotismum*, причиняющему оцѣпенѣніе и лишеніе чувствъ; но въ этомъ случаѣ надобно пить онаго наливку въ довольномъ количествѣ: *Соболевскій*.—*Фогель* тоже утверждаетъ, что калуферъ укрощаетъ усыпительную силу опія, и гистерическіе спазмы.

Количество. 1, или 2 драхмы наливаются 6 унціями горячей воды, или бѣлаго ви-

на; винную наливку даютъ по двѣ столовыхъ ложки чрезъ 2 часа.—Для наружнаго употребленія, а особенно для ароматныхъ бань и ваннъ, полезныхъ въ застарѣлыхъ ревматизмахъ и слабости нервной системы, калуферъ съ мятою, душицею и богородскою травою, служитъ лучшимъ ароматнымъ наборомъ, издающимъ благовонный запахъ, укрѣпляющимъ тѣло, и открывающимъ кожныя поры.—Масло, настоянное съ листьями и цвѣтными верхушками онаго, хорошо разводитъ ушибы, поврежденные вспухшія части, отеки ногъ, и для ознобленныхъ членовъ полезно.—Сокъ, изъ свѣжихъ листовъ калуфера выжатый, и внутрь употребляемый, какъ винная настойка, полезенъ въ блѣдной немочи, и водяной болѣзни; или свѣжіе листы, растертые съ сахаромъ, даютъ въ видѣ кишки, по 1—2 драхмы, которая помогаетъ также въ обморокахъ, и падучей немочи: *Амбодикъ*.

Примѣчанія. 1. Калуферное сѣмя употребляется отъ глистовъ такимъ образомъ, какъ и цытварное.

2. Свѣжую траву кладутъ около постели, или подъ оную, для прогнанія блохъ и клоповъ. Сухая, полагаемая между платья и въ сундуки, наполняетъ оныя ароматнымъ запахомъ, противнымъ для моли.

КАМЕНОЛОМНАЯ ТРАВА, или чигирскій чай; БАДАНЪ;
ЛОМИКАМЕНЬ, — *saxifraga crassifolia*, 1.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, въ Сибири произвольно растущее по горамъ.

Качества. Корень и трава *запаху* не имѣютъ; *вкусъ*: горьковатый, вяжущій.

Сила—мочегонительная, укрѣпляющая, противугнилотная, — *antiseptica*: *Палласъ*.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ цынѣ, застарѣлой ломотѣ, и отъ песка, находящагося въ мочевыхъ путяхъ: *Лобель*. — Снаружи, свѣжіе листы прикладываются съ великимъ успѣхомъ для заживленія ножныхъ застарѣлыхъ язвъ — *ulcera scurum antiqua*: *Тереховскій*.

Количество. Корня 1 унція полагается на фунтъ воды для отвара, которую кипятить, пока останется 8 унцій жидкости, принимаемой по 2 столовыя ложки; — или тоже количество наливають бѣлымъ виномъ, которое, настоявъ, принимаютъ по рюмкѣ. — Выщелоченный поташъ изъ всего растенія, настоянный винограднымъ виномъ, тоже служитъ превосходнымъ мочегоннымъ лекарствомъ, полагая онаго 1 лоть на бутылку вина.

Примѣчаніе. Листы этого растенія въ Сибири употребляютъ наподобіе чаю, и потому называется: Чигирскимъ чаемъ, который гонитъ мочу и песокъ.

КАМЕПОСЪКЪ КОЗЛІЙ—*saxifraga hirculus*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, растущее въ умѣренной Россіи въ вырубленныхъ лѣсахъ, при заборахъ, также находится изрѣдка по мокрымъ лугамъ, около Катерингофа, у Краснаго кабака, и у Лигова.

Качества. Корень и сѣмя имѣютъ *вкусъ острый*.

Силу—мочегонительную, отверзающую.

Употребленіе. Одобряется для отвращенія запоровъ, въ остановкѣ мочи и мѣсячныхъ кровей, также въ чесоткѣ, и другихъ накожныхъ сыпяхъ.

Количество. Корень дается такимъ же образомъ, какъ и выше описаннаго растенія; сѣмянъ 2 драхмы наливаютъ 6 унціями бѣлаго вина.

Примѣчаніе. Нѣкоторые изъ пепла всего растенія, такъ какъ изъ предыдущаго, выщелачиваютъ постоянную соль, которая весьма хорошо гонитъ мочу, и съ нею каменную дресву и песокъ; оную

можно употреблять такимъ же образомъ, или какъ выщелачиваемый поташъ изъ бобовыхъ столовъ и листовъ.

КАМЕННОЕ СЪМЯ, или ВОРОБЬИНОЕ; МОРСКАЯ ГРЕЧА—
lithospermum officinale, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, въ умѣренной Россіи на необработанной почвѣ по прилѣскамъ растущее; изрѣдка находится по полямъ близъ дорогъ у Краснаго села.

Качества. Сѣмяна *запаху* не имѣютъ: *вкусъ*: мучной, клейкій.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Растертая сѣмяна съ водою въ видѣ эмульсіи *Диоскоридъ* давалъ въ запорѣ мочи отъ каменной дресвы — lithiasis sabulosa, и въ остановкѣ мѣсячныхъ кровей. *Жофруа* тоже одобряетъ для предохраненія отъ каменной болѣзни lithiasis, наливая бѣлымъ виномъ. *Крамеръ* хорошее дѣйствіе онаго видѣлъ въ кровавомъ поносѣ.—При воспаленіи мочевого канала, я давалъ съ селитрою въ видѣ эмульсіи, съ успѣхомъ.

Количество. Полъ-унціи толченаго сѣмени растираютъ въ 6 унціяхъ холодной воды; или 2 драхмы наливаютъ 6 унц. бѣлаго вина, и даютъ каждые два часа по 2 столовыхъ ложки.

Примѣчанія. 1. Траву его ѣдятъ одни только козы. — Наружная корка даетъ хорошую красную краску, которою можно подкрашивать водку, воскъ, масло и проч.

2. Нѣкоторые въ ежедневныхъ трясучкахъ даютъ это сѣмя предъ приступомъ лихорадки по 1 золотнику.

3. *Гревзъ* приписываетъ оному щелочно-земляное свойство, вскипающее съ кислотами.

КАМФОРНАЯ ТРАВА — *camphrosma monspeliaca*, L.

Мѣсто. Растеніе это однолѣтнее? у *Шведіора*, но у *Турнефорта* многолѣтнее (*), растущее между Волгою и Ураломъ, особенно въ Сибирскихъ и Киргизскихъ соляныхъ степяхъ, между другими соляными растеніями. — Цвѣтетъ въ Іюль и Августъ мѣсяцахъ.

Качества. Трава и листья имѣютъ *запахъ* камфоры; *вкусъ*: остро-пряный; корня тоже ароматическій, камфорный, зависящій отъ летучаго масла.

Сила — побуждающая, потогонная, разводящая, мочегонительная.

(*) Во Франціи растетъ въ большомъ количествѣ около города Монт-Пельра, коего именемъ названо.

Употребленіе. Въ слабости нервовъ, истерикѣ, судорожномъ удушѣ, коклюшѣ, простудной ломотѣ, долговременномъ насморкѣ, запорѣ мѣсячныхъ кровей, и въ брюшныхъ завалахъ — *phusconia abdominalis*: *Жофруа*, *Лобель*, *Бюрлетъ*; въ теченіи бѣлей и начальной водяной болѣзни, похваляетъ *Дидье* (*). — Снаружи, толченые листы прикладываются для очищенія и заживленія старыхъ ранъ: *Турнефортъ*, *Шведіоръ*.

Количество. 1 драхма наливается 4 унціями горячей воды; или 2 драхмы наливается 6 унц. бѣлаго вина. — Снаружи, какъ выше сказано, и въ видѣ припарки, разводящей холодныя опухоли.

Примѣчанія. 1. Сибирскіе жители съ успѣхомъ пользуются этимъ растеніемъ въ грудной и чревной водяницѣ, принимая въ отварѣ и порошкахъ, отъ $\frac{1}{2}$ —1 золотника; животнымъ даютъ отъ 1—2 лотовъ.

2. Свѣжая трава и летучее масло, изъ оной извлекаемое, могутъ замѣнять камфору: *Жофруа*, *Вотеръ*.

(*) Deidier. consult. et observat. medic. Paris, 1754.

КАПЕРСОВЫЙ КУСТЪ, или КАПЕРСЫ — *sarraris spinosa*, L.

Мѣсто. Древеццо въ южной Россіи расту- щее на Терекѣ, и въ Бухаріи на сухой и нѣсколько черноиловатой почвѣ, цвѣтущее въ полуденныхъ краяхъ во все лѣто.

Качества. Коренная корка и цвѣтныя почки, именуемая каперсами, имѣютъ *вкусъ* горьковатый, и нѣсколько вяжущій.

Силу—вяжущую, мочегонительную, разво- дящую; послѣднее свойство болѣе корки при- писываютъ.

Употребленіе. Отваръ корки *Галленъ* и *Діоскоридъ* одобряютъ въ завалахъ внут- ренностей, а особливо селезенки — *infarctus hepatis*, въ ипохондрическихъ припадкахъ и пара- личѣ: *Линней*; такую же пользу оказываютъ и почки каперсовыя, кои будучи употребляемы вмѣстѣ съ желѣзными минеральными водами— *aquæ ferratæ*, многихъ вылечили отчаянныхъ ипохондрикѣвъ, одержимыхъ завалами въ селе- зенкѣ, или въ иныхъ внутренностяхъ: *Кранцъ*; полезное дѣйствіе корки подтверждается также въ запорѣ мѣсячныхъ кровей, въ бедренной ломотѣ — *ischias*, и въ пользованіи нечистыхъ язвъ: *Шведіоръ*, *Бурдахъ*; въ истерическихъ или маточныхъ припадкахъ: *Троншенъ*.

Количество. Въ порошокъ коренная корка дается отъ полдрахмы до 1, чрезъ 2 часа; для отвара полагается 1 унція на фунтъ воды; нераспушенныхъ почекъ тоже количество наливается бѣлымъ виномъ. — Снаружи прикладываются толченныя почки, цвѣтки и плоды вмѣстѣ; или въ видѣ крѣпкаго отвара, вмѣсто примочки. — Свѣжую корневую корку жуютъ отъ зубной боли: *Діоскоридъ*; толченая, прикладывается къ язвамъ, очищаетъ оныя и уничтожаетъ мозолистую загрубѣлость: *Фогель*.

Примѣчанія. 1. Въ Августѣ мѣсяцѣ, каперсовое деревцо имѣетъ цвѣтныя почки и плоды вдругъ, почки или каперсы собираютъ отъ Іюня до Сентября мѣсяца, и оныя или солятъ, или въ уксусѣ заготавливаютъ. — Въ первомъ случаѣ усыпаютъ дно кадки солью и кладутъ слоями каперсовыя почки, потомъ сверху посыпаютъ солью, покрываютъ досками, и накладываютъ для гнѣтенія камень. — Во второмъ случаѣ обливаютъ ихъ виннымъ уксусомъ (ренсковымъ), и чрезъ недѣлю, когда почки онымъ довольно напитаются, сливаютъ, и наливаютъ опять свѣжимъ, что повторяется до четырехъ разъ. — Если бы прилагали болѣе раченія въ разведеніи этого нашего собственнаго куста, и въ заготовленіи каперсовъ, то мы

весьма могли бы обойтись безъ привозимыхъ къ намъ ежегодно и дорого покупаемыхъ иностранныхъ каперсовъ: *Северинъ*.—Эта малая отрасль для коммерціи можетъ быть весьма интересна!

2. Каперсы, въ уксусѣ заготовленные, служатъ обыкновенно для приправы кушанья; чѣмъ моложе собираемы будутъ, тѣмъ тверже и вкуснѣе бываютъ: *Бергій*. Страждущіе кислотою въ желудкѣ не должны ихъ употреблять.—Каперсы, имѣющіе пріятно-зеленый цвѣтъ, бываютъ поддѣланы мѣдью, что весьма вредно для здоровья!—Уксусъ, въ которомъ мочены были каперсы, служитъ превосходнымъ разводящимъ средствомъ, снаружи употребляемымъ: *Розье*.

3. Каперсовые листы служатъ для овецъ предохранительнымъ средствомъ отъ многихъ болѣзней: *Уденъ*.—Въ порошокъ даютъ по 1 лоту; 3 лота толченой корки варятъ съ пивомъ, наливая онаго 1 бутылку; отъ гнилой заразы можно приготовить этотъ отваръ съ пивнымъ уксусомъ.

КАПУСТА ОГОРОДНАЯ, или КАЧАННАЯ—*brassica oleracea*, l.

Мѣсто. Растеніе во всей Россіи огородное, ежегодно насаждаемое изобильно, особенно на тучныхъ низменныхъ мѣстахъ.

Качества. Листы бѣлой и красной свѣжей капусты *запаху* не имѣютъ; *вкусъ*: сладковато-водяной. — При согниваніи испускаютъ много азота: *Бергій*.

Сила—прохлаждающая, питательная, смягчительная, противуцынготная.

Употребленіе. Древніе философы и врачи капусту чрезвычайно уважали:—у Римлянъ, по сказаніямъ *Катона и Варрона*, была она всеобщимъ лекарствомъ—*medicina universalis*, *Пифагоръ и Гиппократъ* рекомендуютъ оную, какъ добросочную пищу, отвращающую запоры и выводящую желчныя мокроты (*). *Андроцидъ и Аристотель* одобряютъ для укрощенія пьянства,—чему и нынѣ многіе послѣдуютъ, особенно на похмѣльѣ, весьма охотно ѣдятъ кислую капусту. — Но вообще всякаго рода капуста, по справедливому замѣчанію *Цельса*, раждаетъ вѣтры въ животѣ; а потому кислая или квашеная капуста—*brassica acidulata s. fermentata*, какъ для обыкновенной пищи, такъ и для предохраненія отъ цынги, имѣетъ преимущество: *Прингле*.—Для отвращенія одменія или пученія—*flatulentia*, многіе, при заквашиваніи, прибавляютъ укропныя вер-

(*) *Brassicæ ius solvit, cuius substantia stringit.—Utraque quando datur, venter paratur (Schola Salern.).*

хушки, или кминное сѣмя:—sem. carvi. Свѣ-
жая капуста, вареная съ изюмомъ въ похлеб-
кѣ, одобряется: въ мокротномъ кашлѣ, хри-
потѣ, начальной чахоткѣ и каменной болѣзни:
Лоббъ, Жофруа; для осиплыхъ проповѣдни-
ковъ и пѣвчихъ, тоже рекомендуется; капуст-
нымъ отваромъ, одинъ эмпирикъ вылечилъ
свищеватую язву—ulcus sinuosum, которую дру-
гіе врачи не могли выпользовать: *Гофманъ*.—
Камерарій тоже подтверждаетъ, что капуст-
ные листы, вареные въ бѣломъ винѣ, весьма
полезны въ застарѣлыхъ язвахъ и проказѣ;
толченые свѣжіе листы тоже прикладываются,
и сверху цѣльными покрываютъ шолудивые
струпы у дѣтей—tinea caritit; согрѣтые, или
умягченные листы горячею водою, приклады-
ваются для утоленія колотья въ бокахъ; также
покрываютъ оными разѣденныя мѣста послѣ
шпанскихъ мухъ, для поддержанія нагноенія.
Муррай совѣтуетъ родильницамъ покрывать
груди распаренными листами капусты, при
излишнемъ теченіи молока, или стущеніи онаго
въ творогъ; отваромъ примачиваются ожоги,
ознобленія, и въ запорахъ служить, съ при-
бавленіемъ мыла, лучшимъ промывательнымъ,
испытаннымъ даже въ ущемленной грыжѣ—
hernia carcerata: *Тиссонъ*. — Вареные листы,
съ прибавленіемъ свѣжаго масла, или сала,
служатъ хорошою мягчительною и назрѣваю-

щею катаплазмой, для многоверхушечныхъ вередовъ, или огневиковъ—*anthracés*, паховиковъ—*bubones*, нарывовъ *abscessus*, и другихъ воспалительныхъ опухолей: *Димебрекъ*, *Кранцъ*. — Выжатый сокъ изъ красной капусты—*b. rubra*, и сваренный съ медомъ до густоты сиропа, служить наилучшимъ груднымъ средствомъ, для кашляющихъ и чахотныхъ: *Жофруа*.

Количество. 1 или 2 горсти свѣжей изрѣзаной капусты варять въ 1 фунтъ мясной похлебки; кислой: горсти по 2 съ лукомъ, или хрѣномъ, даютъ вмѣсто салата цынготнымъ. — *Прингле* и *Линней* совѣтуютъ для предохраненія отъ цынги морскихъ служителей, давать имъ по фунту квашенной капусты 2 раза, или чаще, въ недѣлю, которая, съ квасомъ и хрѣномъ, составляетъ лучшую противоцынготную пищу (*). — Капустный рассоль полезенъ въ водяной болѣзни, и для примочки гнилыхъ язвъ: *Грубе*; рассоль кислой капусты препятствуетъ распространенію ангонова огня, пользуется отъ ожоги и внутренняго воспаленія: *Амбодикъ*. Капустное сѣмя, употребляютъ нѣкоторые, какъ противуглистное средство, и въ катаплазмахъ, разводящихъ хо-

(*) Этимъ единственно способомъ я многихъ цынготныхъ спасъ въ Финляндіи, при Улеборгскомъ военномъ госпиталѣ, 1809 года.

лодные опухоли. Крѣпкую наливку этихъ сѣмянъ, нѣкоторые совѣтуютъ употреблять для spryskivaniya молодой капусты, когда гусеница оную портитъ;—но гораздо надежнѣе истребляютъ оную, посредствомъ водяной наливки ольховыхъ листовъ: *Розье*; для этого намѣренія наполняютъ оными половинную часть бочки, а другую доливаютъ холодною водою, и настоявъ нѣсколько дней, помощію шприцовъ или сифоновъ, ежедневно орошаютъ молодую зелень, пока насѣкомыя исчезнутъ.—Другіе совѣтуютъ между капустою сѣять коноплю изрѣдка, которой запахъ для гусеницы губителенъ.

Примѣчанія. 1. Чтобы капуста не производила пученія живота, или вѣтровъ—*flatus*, при квашеніи оной, надобно прибавлять вышеупомянутыя пряныя сѣмяна, или можжевельныя ягоды.

2. Изъ качанной капусты, рубленой и приведенной въ винное броженіе, можно гнать водку: *Бергій*.

3. По замѣчаніямъ *Гмелина*, капуста бѣлая, въ слишкомъ сѣверныхъ краяхъ, особенно въ Архангельскѣ и Якутскѣ, никогда не свертывается въ головки.—*Осбекъ* замѣтилъ, что и въ Китаѣ капуста эта не образуетъ головокъ—*Reise durch Sibirien*, p. 63, 64.

4. Квашеную капусту, для вояжовъ, и сохранения въ прокъ, можно сушить такимъ же образомъ, какъ обыкновенно заготавливаютъ на зиму: зеленые бобы, фасоль, петрушку, шпинатъ и проч. которая кислотою своего вкуса ничего не теряетъ: *Euzenz Unterricht von der allgem. Kräuter- u. Wurzel-Trocknung. Reval, 1773.*

5. Зола, изъ пережженныхъ кочерыгъ капусты остающаяся, умерщвляетъ насѣкомыхъ и червей: *Амбодикъ.*

КАПУСТА РЫПЧАТАЯ, или дикая РЫПА; ПОЛЕВАЯ БРЮКВА; НѢМЕЦКАЯ РЫПА—*brassica napus, l.*

Мѣсто. Растеніе двухлѣтнее, въ огородахъ сѣемое изобильно, также по пашнямъ и подъ заборами вездѣ растущее на поляхъ въ Паргаловѣ, на пустыряхъ Васильевскаго острова, и въ Осиновой рошѣ. — Цвѣтетъ на другой годъ въ Маѣ и Юнѣ, сѣмена собираются въ окончаніи другаго лѣта.

Качества—корня, подобныя обыкновенной рѣпѣ: *вкусъ* сладковато-острый, пріятный; сѣмянъ: островато-масляный.

Сила — разводящая, грудная, мочегонительная.

Употребленіе. Сочный корень составляетъ здоровую пищу, который можно варить въ похлебкахъ, приличныхъ въ грудныхъ мокротныхъ припадкахъ, и остановкѣ мочи; истертый корень въ видѣ катаплазмы, *Шевалье* прикладывалъ съ успѣхомъ для уничтоженія лomotной боли; однако черная рѣдька, въ этомъ случаѣ, гораздо дѣйствительнѣе, которую у насъ обыкновенно натираютъ въ банѣ.—Изъ ея сѣмянъ можно выжимать тучное масло, которое будучи очищено по методу г. *Киргофа* (*), какъ въ пищу, такъ и въ лампы для жженія, можетъ служить вмѣсто деревяннаго масла; неочищенное, при горѣннн издастъ много копоти, отягощающей грудь, и марающей платьѣ. Оно имѣетъ сходныя качества съ конджутнымъ масломъ — *oleum sesami orientalis*. — Сѣмя, растираемое съ водою, дается, въ видѣ эмульсіи, страдающимъ оспою или корью: *Фогель*, чтобы сыпь скорѣе наружу выходила. — *Маттіолъ* употреблялъ сѣмяна дикой рѣпы, какъ укрѣпляющее и предохраняющее средство отъ прилипчивыхъ, или заразительныхъ болѣз-

(*) Способъ очищенія разныхъ родовъ постнаго масла, посредствомъ крѣпкой сѣрной кислоты—*acid. sulphuric. iconcentrat*, чтобы оно при жженнн не производило ни запаха, ни копоти, обстоятельно описанъ въ Сѣверной Почтѣ, № 13, 1811 года.

ней; а потому оныя входятъ и въ составъ Андромахова еериака — *theriaca Andromachi*. —
Иные одобряютъ отъ желтяницы, и для пособія родовому кровоочищенію: *Амбодикъ*.

Примѣчанія. 1. Изъ сухихъ очищенныхъ корней и въ муку истолченныхъ, съ прибавленіемъ малаго количества кваснаго тѣста, можно печь вкусный и здоровый хлѣбъ, особенно въ голодное годовое время: *Глазеръ, Страндбергъ*. — Для этого коренья выкапывать должно въ глубокую осень, или весною, пока еще листы не появились; оныя весьма вкусны, будучи варены и въ мясныхъ похлебкахъ: *Бергій*.

2. Выжатое масло можетъ служить для составленія простаго мыла, и для суконныхъ фабрикъ. — Очищенное упомянутымъ способомъ, годится для лампъ или ночниковъ, составленія мазей и пластырей (*).

3. Збойна, или выжимки, послѣ масла остающіяся, полезны для зимняго корма овцамъ и коровамъ, которыя, питаясь этою пищею, даютъ много молока, и жирными дѣлаются; птицы домашнія

(*) *Pharmacop. castrens. R. p. 234, 250, 384.* — О пластырь для ранъ всякаго рода, т. е. свѣжихъ и старыхъ, упомянуто было при описаніи *Eli—pinus abies, 1.*

тоже утучняются этимъ кормомъ. Свѣжее растеніе ѣсть охотно всякая скотина, кромѣ лошадей; а потому въ Голландіи и Германіи, для откармливанія быковъ и овецъ, засѣваютъ онымъ цѣлыя поля: *Соболевскій, Северинъ*.

4. Зеленщики въ огородахъ тоже сѣютъ, и притомъ нѣсколько тѣснѣе, потому что меньшіе корешки всегда вкуснѣе бываютъ.

КАШКАРА, ИЛИ ШАБИНА; КЕЛАРСКЪ; ЧЕРНОГРИВЪ; ПЬЯНАЯ ТРАВА; ПЬЯНИШНИКЪ — *rhododendron chrysanthum*, l.

Мѣсто. Кустарникъ произвольно растущій на снѣжныхъ горахъ по всей Сибири, также около рѣки Енисея и озера Байкала, въ Камчаткѣ на островѣ Беринговомъ, какъ по каменистымъ утесамъ, такъ и у подошвы горъ по болотамъ.

Качества. Трава и стебли ея содержатъ экстрактно-горькое вяжущее начало, соединенное съ усыпительнымъ веществомъ. *Запаху* свѣжіе листы не имѣютъ, сухихъ отзывается нѣсколько ревенемъ; *вкусъ*—вяжущій съ ощутительною горечью и остротою.

Сила—въ маломъ количествѣ разводящая, потогонная, мочегонительныя, противуломотная;

въ большемъ: ядовитая, сильно раздражающая, и усыпительная подобно багуну—*ledum palustre*.

Употребленіе. Въ простудной ломотѣ, членовыхъ боляхъ, особенно застарѣлыхъ венерическихъ, бедренной ломотѣ—*ischias*, подагрѣ, сведеніи ногъ и параличѣ: *Гмелинъ*, *Палласъ*, *Кальтинъ*, въ астеническихъ ревматизмахъ, удушливомъ кашлѣ, и другихъ грудныхъ мокротныхъ припадкахъ, несопряженныхъ съ лихорадкою одобряютъ: *Грунеръ*, *Штаркъ*; *Годе* тоже замѣчаетъ, что это средство опасно употреблять, гдѣ сопутствуетъ лихорадка воспалительнаго свойства. *Менхъ* присовокупляетъ къ тому, что также наблюдать должно, чтобы первые пути были чисты, и нерѣдко прибавляетъ нужно къ оному противувоспалительныя средства—*diaphlogistica*. *Вейсмантель* удачно воспользовалъ этимъ средствомъ одного 80-лѣтняго больного, получившаго параличную расслабленность, или онѣмѣлость въ рукахъ, ногахъ, языкѣ, желудкѣ и кишечномъ каналѣ, которому другія лекарства напрасно были употребляемы. *Цанъ* одобряетъ въ поясничной и почечныхъ боляхъ; *Бертеле* въ кожныхъ болѣзняхъ и нечистыхъ высыпяхъ—*exanthemata*. Снаружи, въ видѣ припарки, примочки и присыпки въ застарѣлыхъ ножныхъ язвахъ, раковыхъ и скиррныхъ опухоляхъ грудей, недви-

жимости членосоединеній, и сведеніяхъ, послѣ подагры, паралича и проч.: *Бютцовъ*.

Количество. Стеблей и листовъ 2 драхмы, или 4 наливаются 12 унціями горячей воды, которую, въ покрытомъ сосудѣ, настоявъ чрезъ 24 часа, процѣдить и принимать по полчайной чашкѣ, 2 или 3 раза въ день, смотря по обстоятельствамъ.—При употребленіи этой наливки, должно обращать вниманіе на крѣпость оной, и на количество, т. е. потребно будетъ крѣпче или слабѣе давать, также касательно приемовъ: уменьшать, прибавлять, или перемежки дѣлать, чтобы избѣгнуть опасныхъ послѣдствій, могущихъ быть при употребленіи этого героическаго средства: *Вилліе* (*). *Меттернихъ* недавно испыталъ пользу этого средства въ упомянутыхъ болѣзняхъ, давая сушеные ласты въ порошокъ; отъ 5—10 и 20 гранъ, умножая постепенно.

Въ аптекахъ приготавливаютъ:

ОТВАРЪ КАШКАРЫ—*decoctura ab rhododendri chr.* (**), который въ выше-упомянутыхъ болѣзняхъ принимать можно по 2 унціи каждые

(*) *Pharmacop. castrens R. p. 145.*

(**) По образцу отвара волчьего лыка—*decoct. d. mezeri*, тамъ же стр. 243; или въ видѣ наливки—*infus. rhododendri chr.* стр. 278.

2 часа, до четырехъ разъ въ день: ежели не воспроятствуютъ круженіе головы, тошнота, рвота, или другіе встрѣчающіеся припадки.

Примѣчанія. 1. Татары, Осетинцы и другіе кочующіе народы по лѣсамъ и горамъ траву эту употребляютъ ежедневно вмѣсто чаю для здоровья. Жители Байкала тоже употребляютъ эту горячую наливку, когда отъ простуды занемогутъ; она производитъ сонъ, бредъ, потъ и слабитъ.

2. Сибирскіе жители, когда получаютъ насморкъ, или простудную боль головы, то, для извлеченія мокротъ, нюхаютъ истертую траву въ порошокъ. — Слабую наливку тоже употребляютъ вмѣсто чаю, и тѣмъ излечиваются отъ застарѣлой простуды, и ревматизмовъ.

3. Растеніе это въ пользованіи венерической болѣзни, по опытамъ многихъ врачей, можетъ дѣйствительно замѣнять безстебельный или сплюснутый горохъ—*astragalus exscapus*, L., растущій въ Туринѣ и около Нердузы, въ Венгріи.

КАШТАНЪ ДИКІЙ, или конскій—*aesculus hippocastanum*, L.

Мѣсто. Дерево сѣверной Азіи, нынѣ во всей Россіи изобильно разводится по садамъ, особенно въ Лифляндіи.

Качества. Кора, взимаемая изъ древъ среднихъ лѣтъ, содержитъ вяжущее и горькое начало, соединенное съ малымъ количествомъ склизы и смолы; старыхъ деревъ кора очень толста, и слишкомъ вяжетъ.

Запаху не имѣеть; *вкусъ* вяжущій, пріятно-горькій.

Сила—вяжущая, укрѣпляющая и превосходная противулихорадочная: *Карпинскій*.

Употребленіе. Въ перемежныхъ лихорадкахъ и гнилыхъ горячкахъ, *Гуфеландъ* испыталъ съ хорошимъ успѣхомъ; *Горнъ* рекомендуетъ корку эту во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ хина столь многими врачами одобряется; то же подтверждаютъ наблюденіями, удостовѣряющими, что каштановая кора можетъ дѣйствительно замѣнить лихорадочную корку: *Муррай*, *Данихелли*, *Косте*, *Виллементъ*, *Бухольцъ*, *Юнганцъ*, и другіе.

Плоды дикихъ каштановъ—fructus hippocastani, обжариваемые и вмѣсто кофе употребляемые *Гуфеландъ* одобряетъ въ астеническихъ кровотеченіяхъ, особенно маточныхъ и почечуиныхъ, въ долговременныхъ поносахъ, теченіи бѣлей, мокротномъ почечуѣ, застарѣломъ стволномъ теченіи—gonorrhæa habitualis, въ мокротномъ кашлѣ и чахоткѣ того же рода—phthisis pituitosa.

Количество. Въ порошокѣ, корка дается до полторы драхмы, каждые 4 часа; *Бурдахъ* совѣтуетъ чаще давать, только въ малыхъ приемахъ, и съ примѣсомъ какой-нибудь пряности, наприм. каждый часъ по 10 грановъ, прибавляя равное количество касатина, или горечавки—*rad. ascori calami, v. gentianæ l.*— Въ упорныхъ трясучкахъ, во время перемежки давать больному въ] раздѣленныхъ приемахъ: отъ $\frac{1}{2}$ —1 унціи съ бѣлымъ виномъ; гдѣ же корка эта производитъ рвоту, или слабить, прибавлять ароматную настойку, или Гофмановы капли. *Пейриль* давалъ въ видѣ противулихорадочной кашки: смѣшивая 1 унцію порошка каштановой корки съ 1 драхмою травы дикаго аврана—*gratiola offic.* столько же поташа—*sub-carbonas potassæ* и п. к. меда, на приемъ въ небытности лихорадки—*аругехія* по 1 драхмѣ, каждые 3 часа.—Снаружи крѣпкій отваръ каштановой коры служить наилучшею укрѣпляющею и противугнилою примочкою, для которой полагается 3 унціи на 2 фунта воды, отвариваемой, пока останется половина жидкости; къ этому отвару можно прибавлять винный спиртъ, мирровую настойку—*tinctura myrrhae*, и пр. *Горнъ*, для внутренняго же употребленія, полагается отъ 1— $1\frac{1}{2}$ унціи коры, на 12 или 16 урцій воды, отвариваемой до половины. Отваръ этотъ го-

раздо дѣйствительнѣе, съ прибавленіемъ ароматной настойки—*tinctura aromatica*. На приѣмъ дается по малой чайной чашкѣ.—Обжаренные и крупно истолченные плоды, даются въ наливкѣ вмѣсто кофе, полагая полторы унціи этого порошка, на 6 чайныхъ чашекъ горячей воды, которую, вскипятивъ нѣсколько разъ и процѣдивъ, принимать по утру и въ вечеру по 2 чашки: *Бурдахъ*.

Въ аптекахъ готовятъ:

1. Отваръ, замѣняющій лихорадочную корку. 2. Порошокъ такого же свойства—*decoct. et pulv. cinchonæ*, составляемый изъ равныхъ частей каштановой и ветловой корокъ; кореньевъ ирьянаго, гравилатнаго и горечавки (*). Опыты *Гуффеланда*, *Туры* и *Сабарота* подтверждаютъ желаемую пользу этихъ средствъ. О чемъ упомянуто также при описаніи гранатника — *rupica granatum*. 3. Экстрактъ каштановой коры — *extract. hippocastani cort.* (**), одобряемый въ тѣхъ же болѣзняхъ, котораго 1 драхму разстворивъ въ 1 унціи коричневой воды, даютъ каждые 3 часа 60 капель.

(*) Pharmacop. castrens. R. p. 419, 421.

(**) Pharmacop. Rossica, p. 209.

Примѣчанія. 1. Кору эту снимать должно съ вѣтвей ни слишкомъ старыхъ, ни слишкомъ молодыхъ деревьевъ, и рачительно отдѣлять ножемъ внутри пристающее бѣловатое лыко или заболонь—*albignum*, которая уменьшаетъ дѣйствіе ея.—Корка древесная и плодовъ, вареніемъ въ водѣ съ малымъ примѣсомъ поташа, даетъ темно-цвѣтную краску; съ желѣзнымъ купоросомъ темно-желтую, съ квасцами красноватую.

2. Вареными плодами, въ недостатокѣ корма, можно кормить домашній скотъ; оныя же употребляютъ вмѣсто мыла, для бѣленія полотна; дѣлали также опыты къ полученію воска и крахмала, годнаго для переплетчиковъ.—Мука каштановая годится и для выдѣльванія водки.

3. Порошокъ сушеныхъ плодовъ или сѣмянъ возбуждаетъ чахоту, и разводитъ залеганіе носа; а потому вдвуютъ оный лошадямъ въ ноздри отъ сапа, такъ же и внутрь даютъ съ пользою отъ одышки: *Севергинъ*.

4. Плоды дикаго каштана служатъ овцамъ и козамъ наилучшимъ предохранительнымъ и цѣлительнымъ средствомъ отъ водяной болѣзни: *Уденъ*; такъ же отъ кашлю.—Каштановою мукою, смѣшанною съ отрубями, откармливаютъ домашнихъ птицъ.

—Плоды, обжаренные наподобіе кофе, ближе всѣхъ подходятъ къ настоящему кофе (*). Отваръ плодовъ дикаго каштана служить отмѣннымъ глистогоннымъ средствомъ! *Фрибе*.

КЕРВЕЛЬ—*scandix cerefolium*, L.

Мѣсто. Растеніе однолѣтное, во всей Россіи садовое.

Качества. Свѣжая трава пріятно пахнетъ, особливо растертая, которое свойство зависитъ отъ малаго количества ароматнаго масла: *Левисъ*; сухая теряетъ; на огнѣ вспыхиваетъ; а выжатый сокъ даетъ въ холодномъ мѣстѣ осѣвшіе селитряные кристалы: *Бергій*.

Вкусъ—прянобальзамный, къ волоскому укропу—*a. foeniculum* подходящій.

Сила—разводящая, мочегонительная, умножающая молоко въ грудяхъ, и поправляющая непріятный духъ мѣсячныхъ и родовыхъ кровей: *Пленкъ*.

Употребленіе. Въ перемежныхъ лихорадкахъ, чревныхъ завалахъ и водяной болѣзни, весьма дѣйствительнымъ средствомъ выжатый

(*) *Lampadius*: Kastanienkaffee u. Stärkenzucker. Freiberg, 1812.

сокъ изъ кервеля поставляютъ *Шульцъ* и *Жофруа*; для разведенія кровяныхъ маточныхъ застоевъ, особливо послѣ родовъ, и для отвращенія вони, бывающей иногда при родовомъ и мѣсячномъ кровотеченіяхъ—*fætor lochiorum et catameniorum*: *Шенкъ*, *Кранцъ*, *Пленкъ*.—*Этмюллеръ* тоже рекомендуетъ роженицамъ, въ боляхъ послѣ родовъ, кушать кервельную похлебку, замѣняющую всѣ другія лекарства, въ застарѣломъ кашлѣ, удушѣ, кровохарканіи, чахоткѣ: *Ергардтъ*, *Галлеръ*; въ долгопродолжительномъ грудномъ колотѣ, излишествѣ выплевываемыхъ мокротъ — *anasatharsis nimia*, желтухѣ и геморроидальныхъ завалахъ, *Бергій* и *Менхъ* совѣтуютъ выжатый сокъ пить съ зельцерскою водою, или съ молочной сывороткою. Средство это полезно также въ изнурительной или сухотной лихорадкѣ—*febris lenta*, золотушныхъ затвердѣніяхъ железъ—*infarctus, glandularum*, долговременныхъ, кожныхъ болѣзняхъ, какъ-то: въ чесоткѣ, лишаяхъ и проч.: *Пленкъ*, *Карпинскій*. Снаружи, толченые и подогрѣтые листы, прикладываются къ затвердѣлымъ грудямъ и раздутымъ почечуйнымъ шишкамъ, 2 или 3 раза въ день; иногда и ольховые листы—*folia b. alni* прибавляются для большаго дѣйствія: *Муррай*; поджаренные съ масломъ, *Паули* прикладывалъ къ животу и лобковому мѣсту, для унятія сильной колики

и отвращенія запора мочи; въ видѣ клистира и припарки, тоже хорошо помогаютъ; съ прибавленіемъ болиголовныхъ листовъ—*folia cicutæ*, кервельная припарка полезна въ ломотныхъ опухоляхъ и раковыхъ затвердѣніяхъ: *Ланге*, *Шомель*.—При затвердѣніи внутренностей отъ заваловъ—*infarct. viscerum*, одобряетъ *Грубе*; въ круженіи головы, и какъ раноцѣлительное средство, одну кервельную катаплазму одобряетъ *Веделъ*.

Количество. Свѣжую траву даютъ кушать больнымъ въ супахъ; въ видѣ наливки, 2 горсти травы полагаются на фунтъ горячей сыворотки, которую, настоявъ и прожавъ сквозь полотенцо, пить по чайной чашкѣ, нѣсколько разъ въ день; или принимать по 2 унціи выжатого сока, съ сывороткою, либо съ мясною похлебкою, поутру и вечеромъ.—Средство это испытано съ желаемымъ успѣхомъ: въ золотушныхъ болѣзняхъ легкаго, и завалахъ железъ.

Въ аптекахъ готовятъ:

Кервельную воду и консерву—*aqua et conserva cerefolii* (*), одобряемая въ вышеупомянутыхъ болѣзняхъ; на *пріемъ* даются отъ

(*) Pharmacop. R. p. 191, 198.

$\frac{1}{2}$ —1 унція.—Сгущенный кервельный сокъ и съ порошкомъ листовъ смѣшиваемый *Бергій* рекомендуетъ давать въ пилюляхъ чахотнымъ, изнуреннымъ отъ долговременнаго кашля, кровоизлиянiя, сухотки, заваловъ, желтухи и въ другихъ упомянутыхъ выше болѣзняхъ: отъ $\frac{1}{2}$ —1 драхмы на прiемъ.

Примѣчанiя. 1. Пряность этого растенiя зависитъ отъ существеннаго масла, которое болѣе находится въ сѣмянахъ, которыя для птицъ смертельны: *Менхъ*.

2. Выжатый изъ всего растенiя сокъ, даютъ домашнимъ животнымъ, какъ отверзающее и мочегонное средство, до $\frac{1}{2}$ фунта въ день: *Розье*.

3. Ежели сосцы распухнутъ послѣ родовъ, отъ большаго скопленiя молока: то листы кервеля и болиголовы или вонюки, взятые по 2 горсти, облить кипяткомъ, и эту тепловатую прикладку къ грудямъ перемѣнять должно чрезъ каждые 4 часа.—Средство это многократно испытано съ желаемымъ успѣхомъ.

КЕРВЕЛЬ дикiй; БУТЕНЬ; КОРОВЬЯ ПЕТРУШКА—
cherophyllum sylvestre, L.

Мѣсто. Растенiе однолѣтное, въ умѣренной Россiи по лѣсамъ и садамъ на необ-

работанныхъ мѣстахъ, и по пахотнымъ землямъ растущее. Въ Сибири на лугахъ тоже находится.

Качества—травы ядовитыя, подобныя ядовитому болиголову—*cicuta virosa*; запахъ противный; вкусъ горько-острой.

Сила—внутри ядовитая, усыпительная—*parcötica*; снаружи разводящая.

Употребленіе. Въ припаркахъ и примочкахъ, прикладывается отваренная трава: къ твердымъ паховикамъ, раковымъ затвердѣніямъ железъ и другимъ тугимъ опухолямъ внутренностей — *phusconia abdominal.*: *Шведіоръ*. — Свѣжую катаплазму изъ этой травы я съ успѣхомъ прикладывалъ къ антонову огню, что и въ Голландіи испытано также было: *Мейеръ*.

Примѣчанія. 1. Ежели кто, по невѣдѣнію, вмѣсто садоваго кервеля наѣстся дикаго, и почувствуетъ жестокую боль въ головѣ, судорожныя корчи и трудное глотаніе: въ такомъ случаѣ *Бургавъ* поставляетъ лучшимъ противуяднымъ средствомъ теплую воду, смѣшанную съ довольномъ количествомъ масла деревяннаго, коноплянаго, льнянаго, или другаго т. п. и, подсладивъ медомъ, давать пить побольше; либо посредствомъ насоса вливать чрезъ горло въ желудокъ, пока поднимется рвота, и когда опомнится больнои, запивать

теплою же водою съ медомъ и уксусомъ, пока получить облегченіе.

2. Въ Швеціи цвѣтами, которые еще не распустились, красятъ съ квасцами въ желтую краску; изъ листьевъ дѣлаютъ васьма хорошую зеленую краску.

3. Козы, овцы и лошади ѣдятъ эту молодую траву; однако замѣчено, что рогатому скоту она бываетъ вредна.

кислица рогатая—*oxalis corniculata*, l.; кислица щавельная или оробинець, заячій щавель, кислецъ цвѣтушій—*oxalis acetosella*, l.

Мѣсто. Растенія многолѣтняя, въ сѣверной Россіи и Сибири произвольно растущія, также: при Уралѣ, Уѣ, и Чусовой, на Аптекарскомъ островѣ, на Васильевскомъ, и вездѣ по пещанымъ полямъ и лѣсамъ на влажныхъ мѣстахъ.

Качества. Свѣжіе листы содержатъ собственную кислоту, называемую—*acidum oxalicum*, или существенную соль, состоящую изъ поташа, напитаннаго кисличною кислотою—*sal acetosellæ, s. oxalas acidulus potassæ*: *Шведіоръ*.—Вкусъ очень кислый, пріятный, который однако сушеніемъ вовсе теряется.

Сила — прохлаждающая, противужелчная, противогнилостная, утоляющая жажду, рвоту и аппетитъ возстановляющая.

Употребленіе. Въ цынгѣ, желчныхъ горячкахъ и гнилыхъ съ пятнами—*typhus petechialis*: *Франкѣ*, *Пленкѣ*.—Снаружи, толченые листы прикладываются: къ золотушнымъ, цынготнымъ, раковымъ и другимъ злокачественнымъ язвамъ—*ulcera phagadæna*: *Пинель*, *Бурдахъ*.—Сокъ кислицы, ежедневно въ приличномъ питьѣ употребляемый, полезенъ въ меланхоліи, сумашествіи, огневицахъ, желтяницѣ, воспаленіи мозга, гортанной жабѣ, астеническихъ лихорадкахъ, сильномъ волненіи крови—*orgasmus*, чрезмѣрномъ и любовождельніи—*satyriasis*, *nympomania*: *Амбодикѣ*.

Количество. Грость свѣжей травы варятъ въ 1 фунтѣ похлебки, или полунціи наливаютъ 12 унціями молока, что, вскипятивъ и процѣдивъ, служитъ цѣлебною сывороткою въ упомянутыхъ болѣзняхъ; пьютъ оную по чайной чашкѣ; выжатый сокъ тоже дается съ сывороткою, отъ 1—2 унцій; кисличный сокъ, смѣшанный по равнымъ частямъ съ ординарною водкою и сотовымъ медомъ, служитъ весьма хорошею раноцѣлительною водою—*aqua vulneraria*; оною же полезно полоскать

ротъ въ цынготной порчѣ десенъ и гниложел-
 чной жабѣ—*angina putrido-biliosa*: *Пленкѣ*.—
 Кисличной соли дается до полдрахмы, и дѣла-
 ютъ лимонадъ, или питье, полезное въ горяч-
 кахъ.

Примѣчанія. 1. Изъ упомянутыхъ породъ ша-
 веля выжимаемый сокъ, и на легкомъ огнѣ чрезъ
 выпареніе сгущаемый, въ Англии продается подъ
 именемъ: *существенной лимонной соли*—*essenti-*
al salt of lemons, s. sal acetos ellae, которая, въ
 нуждѣ, можетъ замѣнять настоящую лимонную соль—
acidum citricum concretum (*) и винокаменную
 существенную—*acid. tartaric.*, одобряемую особен-
 но въ цынгѣ и гнилыхъ поносахъ.—На *приемъ*
 дается: по 20 гранъ и болѣе; или по методу *Г.*
Виліе, съ угольнымъ порошкомъ—*pulvis carbonis*
acidulus (**). *Шульце* одобряетъ такое смѣ-
 шеніе въ сухоткѣ и чахоткѣ.

2. Кисличной соли—*oxalas potassae*, новѣйшіе
 химики приписываютъ такое же свойство, какъ
 и сахарной кислотѣ; соль эта хорошо выводитъ
 чернильныя пятна изъ бѣлья, сукна и другихъ
 матерій.—Изъ 20 фунтовъ свѣжей травы выжа-

(*) *Pharmacop. castr. R. p. 198.*

(**) ————— *R. 323.*

тый и очищенный сокъ, даетъ кислой существенной соли, подобной креморъ-тартару, отъ 3—4 унцій: *Бергій*.—Ежели оную передвоить съ виннымъ спиртомъ, то можно получить родъ нафты, или Гофмановыхъ камель—*liquor apod. vegetabilis*, о чемъ упомянуто было.—Съ битыми маслами, составляетъ доброе мыло: *Амбодикъ*.

3. Въ лѣтнее время, кислицу можно употреблять въ кушаньяхъ вмѣсто обыкновеннаго щавеля и салата, имѣющаго пріятный вкусъ и утоляющаго жежду. Ежели въсомъ 1 часть кислицы щавельной и 2 части сахару растереть вмѣстѣ; то такимъ образомъ дѣлается весьма полезная консерва для больныхъ, замѣняющая лимоны. Траву ея всякая скотина тоже ѣстъ, кромѣ лошадей.

4. Примѣчаютъ, когда кислица листочки свои сжимаетъ, то предзнаменуетъ мокрую и дурную погоду: *Соболевскій*.—Другіе предсказываютъ что, когда это растеніе весною сильно цвѣтетъ, ожидать должно мокраго лѣта; въ противномъ случаѣ засухи.

КИШНЕЦЪ, ИЛИ КОЛЯНДРА; КОРИАНДРЪ—*coriandrum sativum*, l.

Мѣсто. Растеніе однолѣтное, въ умѣренной Россіи садовое.

Качества. Свѣжихъ сѣмянъ *запахъ* противный, тяжеловатый; сухихъ пріятный, ароматный; *вкусъ* тоже пряный, пріятный и хорошо поправляющій непріятный духъ и вкусъ Александрійскаго листа—*sennæ corrigens*: *Шведіоръ*.—Они содержатъ летучее и постоянное ароматное масло.

Силу—свѣжаго сѣмени нѣсколько усыпительная, сухаго вѣтрогонная, противусудорожная, уничтожающая молоко въ грудяхъ—*lactifuga*.

Употребленіе. Въ слабости желудка, кислыхъ отрыжкахъ, пученіи живота отъ вѣтровъ, истерикѣ и въ другихъ нервныхъ астеническихъ болѣзняхъ: *Иппократъ*; для укрѣпленія слабой памяти, и отъ круженія головы—*vertigo*, одобряетъ *Діоскоридъ*.—Винная наливка, предъ лихорадочнымъ пароксизмомъ употребляемая, часто уничтожаетъ лихорадку: *Тарзагъ*; она помогаетъ и для возстановленія непорядочнаго очищенія мѣсячныхъ кровей: *Бодардъ*. Для поправленія непріятнаго духа и вкуса сенны *Шведіоръ* совѣтуетъ прибавлять кишнецъ къ ея наливкѣ; *Кулленъ* тоже одобряетъ прибавленіе этого средства ко всякимъ слабительнымъ средствамъ, для отвращенія рѣзи въ кишкахъ. Вину сообщаетъ сѣмя мушкатную благовонность; особливо въ соединеніи

съ бузиннымъ цвѣтомъ; *Кранцъ*: (*). Снаружи въ видѣ катаплазмы, или припарки, разводитъ холодныя опухоли и затвердѣніе железъ: *Фогель*.

Количество. Въ порошокъ дается отъ $\frac{1}{2}$ — 1 драхмы; 2 или 4 драхмы наливаются 6 унціями горячей воды, или бѣлаго вина; водяная наливка служитъ также вѣтрогоннымъ клистиромъ.

Примѣчанія. 1. Свѣжее растеніе и сѣмяна онаго зеленыя, полагаемыя въ норы кротовъ, противнымъ запахомъ выгоняють ихъ изъ садовъ и огородовъ.—Домашнимъ животнымъ дается въ порошокъ сѣмя по 1 лоту, для изгнанія внутреннихъ червей.

2. Осахаренныя сѣмяна, въ видѣ конфектъ, поправляютъ дурной запахъ рта, у сидячихъ людей.

3. Кишнець, пріятностію своею, замѣняетъ многія иноземныя ароматныя вещества. Конфетчики и

(*) Врачебное благовонное вино—vinum medicatum fragans, вѣтрогонное и ободряющее силы, составляется: ежели 1 горсть толченыхъ сѣмянъ кишнеца, и полгорсти сухихъ бузинныхъ цвѣтовъ, налитыхъ 2 фунтами хорошаго бѣлаго вина (1 бутылка) и настоянныхъ 6 часовъ, процѣдить.—Принимають оное ежедневно по утру и послѣ обѣда по 1 рюмкѣ, продолжая къскольکو дней.

хлѣбники часто употребляютъ это сѣмя для приправы: *Бергій*.—Оное было также въ большомъ употребленіи на поварняхъ у древнихъ Египтянъ: П. *Алтинъ*.

КЛЕНЪ, или НЕКЛЕНЪ; ПАКЛЕНЪ; ВЯЗЪ—acer pseudo-platanus, & platanoides, l.

Мѣсто. Дерево большое и высоко растущее въ тѣни, по гористымъ лѣсамъ, около Гостилицы, Волги, Камы, на Уральскомъ хребтѣ, и въ другихъ премногихъ мѣстахъ Россіи полуденной.

Качества. Молодые листочки и ростки, при сорваніи, испускаютъ бѣлый, сладковатоклейкій и пріятный сокъ; старые листы немного горьковаты. — Цвѣтетъ въ Маѣ и Іюнѣ.

Сила—питательная, мочегонительная, противугнилотная.

Употребленіе. Молодые росточки, въ отварѣ можно пить съ большою пользою: отъ внутреннихъ заваловъ, желтухи, въ цынгѣ и грудныхъ припадкахъ; уксусъ, съ оными же отваренный и внутрь употребляемый, унимаетъ рвоту и тоскливость; съ винограднымъ виномъ вареные, прикладываются къ воспаленнымъ глазамъ. — Щелокъ, изъ золы переж-

женной кленовой коры сдѣланный, очищаетъ струнья и язвы, бывающія на головѣ. — Зеленые листы и молодые отпрыски, мелко изрубленные и сваренные съ водою и уксусомъ — *oxugatum*, служатъ полезною припаркою въ разныхъ припадкахъ печени и селезенки: *Амбодикъ*. — Изъ этого дерева, дѣлая надрѣзы въ корѣ, извлекаютъ весною пріятный сладкій сокъ, называемый кленовикою, который превосходитъ бѣрезоваго и служитъ весьма полезнымъ средствомъ отъ цынги. — Снаружи, толченые сочные листы прикладываются къ нечистымъ ранамъ и цынготнымъ язвамъ, промывая оныя часто кленовымъ сокомъ.

Количество. Для отвара полагаются, горсти 2 молодыхъ листочковъ, или сочныхъ ростковъ, на фунтъ воды, увариваемой до 8 унцій; или весною пьютъ ежедневно кленовый сокъ по бутылкѣ, замѣняющій всѣ противуцынготные соки и декокты.

Примѣчанія. 1. Изъ кленоваго сока, въ Канадѣ, вывариваютъ сахаръ, который отъ кашлю, грудной боли и другихъ простудныхъ припадковъ весьма полезенъ. — Средство это, для приправы лекарствъ, можетъ совершенно замѣнить не только сахарную патоку — *molasses*, но и самый са-

харь (*);—20 фунтовъ сладкаго кленоваго сока даютъ 1 ф. сахару.—По опытамъ Шведской Академіи Наукъ (1773), отвариваніемъ 24 каншъ этого сока въ продолженіе 10 часовъ, пвлечена 1 канна чистаго сахарнаго сироцу. *Бергій* замѣтилъ, что кленовый сокъ, зимою выпускаемый, гораздо слаще бываетъ, нежели весною.—*Готье* лучшее время полагаетъ для сего: отъ Ноября по Май мѣсяць.

2. Изъ кленовики приготавливаютъ здоровый и пріятный напитокъ, такъ какъ изъ бѣрезовицы, слѣд. образомъ:—На 3 или 4 кружки кленоваго сока, положить 1 фунтъ чистаго меду, прибавивъ къ тому: лимонной корки и гвоздики, сколько потребно для пріяности, и поваривъ съ часъ, снимая притомъ пѣну; потомъ снять съ огня, простуженную жидкость заквасить 3-мя столовыми ложками свѣжихъ дрождей.—Давъ перебродить, наконецъ чистую жидкость, сливъ съ поддонковъ, раздѣлить по бутылкамъ, которыя, засмоливъ, по-

(*) Докторъ Миканъ въ Прагѣ издалъ паставленіе о приготвленіи сахару изъ клена; Сѣверной Почты № 21, 1811 года. Въ Вѣнѣ начались уже опыты выдѣлыванія сахара изъ кленоваго сока. См № 27.—Praktische Anleitung zur Bereitung des zuckers aus Ahorn и Runkelrüben, etc. Wien, 1812.

ставить въ погребѣ.—Напитокъ этотъ довольно длітся долго, прѣнь, пріятенъ и здоровъ, особенно для одержимыхъ частою болью въ поясищѣ, отъ каменной болѣзни и цынги.—Для лучшаго вкуса или чистоты, нѣкоторые, вмѣсто меду, кладутъ тоже количество сахара; а чтобы оный напитокъ сдѣлать подобнымъ виноградному вину, подслащиваютъ его изюмомъ.

3. Кленовые листы и молодые побѣги козы очень любятъ; коровы и овцы тоже охотно ѣдятъ; лошади и свиньи не трогаютъ: *Соболевскій*.—Изъ цвѣтовъ пчелы собираютъ много меду.—Отпадшіе листы собираютъ осенью для подкладыванія, при печеніи хлѣба;—и такъ какъ оныя скоро согниваютъ, то и къ удобренію пахатной земли весьма способны.

4. Зеленые листы съ стеблями, приготовленную шерсть или полотно съ квасцами, окрашиваютъ превосходнымъ желтоцитроннымъ цвѣтомъ;—съ желѣзнымъ купоросомъ, черно-бурымъ, или темно-каштановымъ. Дерево по плотности своей годится для столярной и токарной работы, имѣющее внутри хорошіе разноцвѣтные слои.

5. Каждое большое и высокое кленовое дерево можетъ ежегодно источить около 200 фунтовъ

соку, который гораздо слаще бѣрезоваго. Онъ служитъ здоровымъ питьемъ; а потому нѣкоторые народы запасаются кленовикою на все лѣто.—За-
кваскою этой жидкости, можно дѣлать превосходный уксусъ.

КЛЕЩЕНИЦА, или змѣй—трава; нѣмецкій инбирь;
ОБРАЗКИ ГОРНЫЕ; СУХОТНЫЙ КОРЕНЬ; ААРОНОВА БО-
РОДА—*agum maculatum*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, въ южныхъ мѣстахъ Россіи растущее, по тѣнистымъ мѣ-
стамъ и рощамъ. — Цвѣтетъ въ Маѣ, или
Іюнѣ, распложается корешками и сѣмянами.—
Находится особенно въ такихъ мѣстахъ, кото-
рыя послѣ преждобывшихъ болотъ высушены.

Качества—свѣжаго корня превосходныя, зависящія отъ остраго летучаго начала; *запаху* не имѣетъ; *вкусъ*—острый, жгучій, который сушеніемъ и многократнымъ омываніемъ уни-
чтожается.—Изъ этого корня извлекается крах-
мальное питательное вещество—*fæculæ amy-
læ nutritivæ*, подобное животной студени.

Сила — свѣжаго корня ѣдкая, нарывная; сухаго побуждающая, разводящая, отверзаю-
щая, мочегонительная.

Употребленіе. Для разведенія густыхъ мокротъ и побужденія слабаго желудка. *Ип-*

пократь весьма много хвалить; *Рудлинъ* тоже имѣлъ хорошіе успѣхи: въ грудныхъ и брюшныхъ мокротныхъ болѣзняхъ, сопряженныхъ съ завалами внутренностей; *Геснеръ*, *Мюллеръ* и *Горстъ* тоже многочисленными наблюденіями подтверждаютъ пользу этого корня: въ мокротной одышкѣ, сочувственной головной боли — *sæphalea sympathica*, глистныхъ припадкахъ, худосочіи, долговременной хрипотѣ, перемежной лихорадкѣ (*), застарѣломъ ревматизмѣ, и бездѣйствии нервной системы — *torpor nervorum*. *Жилиберъ* и *Бодардъ* испытали въ астеническомъ блѣдноцвѣтіи и худосочіи, сопряженномъ съ великою слабостію пищеварительныхъ органовъ. — *Геснеръ* и *Константинъ*, давая порошокъ, смѣшанный съ медомъ до 30 гранъ, вылечили трехъ чловѣкъ, страдавшихъ сухоткою, которые имѣли уже всѣ признаки чахотки. — Изъ 8 золотниковъ порошка Ааронова корня и двойнаго количества свѣжей жерухи, или кислицы, растертыхъ

(*) По совѣту Биркмана, я составилъ противулихорадочный порошокъ: изъ 10 гранъ этого корня, столькоже нашатыря, и 5 гр. ревеня; — на приѣмъ давалъ въ нелихорадочный день — *аругехіа* таковой порошокъ, повторяя каждые 2 часа, весьма удачно! — Средство это весьма хорошо разводитъ мокротные застои и завалы внутренностей. *Рудлинъ* тоже свидѣтельствуетъ о удивительной пользѣ онаго.

съ медомъ наподобіе густаго тѣста, составляется кашка, поправляющая цынготное и всякое худосочіе—*electuar. anticachectic.*, которую принимать 3 раза въ день по чайной ложкѣ, или величиною въ мушкатный орѣхъ, запивая стаканомъ молочной сыворотки, смѣшанной съ 2 ложками хрѣноваго сока.—Этимъ способомъ онъ возстановилъ нѣкоторыхъ астеническихъ паралитиковъ.—Свѣжій корень давалъ жевать въ параличъ языка; жгучее свойство онаго тотчасъ проходитъ отъ полосканья рта уксу-сомъ.—Способъ этотъ заимствованъ отъ древняго врача: *Месюе* (*).

Снаружи, свѣжій корень, приложенный къ параличнымъ частямъ, возстановляетъ оныхъ чувствительность; въ видѣ припарки, все растеніе одобряется въ членовныхъ ломотныхъ боляхъ; свежовыжатымъ сокомъ напитанные кноты, (турунды) *Шомель* совѣтуетъ закладывать для очищенія свищей—*fistulæ*; сухимъ корнемъ, истертымъ въ порошокъ, присыпаются худосочныя язвы: *Иппократъ*, *Кранцъ*.—Въ видѣ катаплазмы, разводитъ бубоны и чумные опухоли железъ, или язвенныя шишки: *Маіеръ*.

Количество. Внутрь дается тоже сухой, въ порошокъ: отъ 10—15 и 20 гранъ,

(*) *Mesue opera*, Venet. 1589.

съ магнезією, виннымъ камнемъ, нашатыремъ, и пр. полъ-унціи полагается для наливки на 6 унц. бѣлаго вина, которую принимать по столовой ложкѣ.—Въ видѣ кашки, поправляющей худосочіе—*electuar. anticachectic.* дается, какъ сказано выше.

Примѣчанія. 1. Сухой корень беречь должно отъ сыраго воздуха, въ стеклянныхъ сосудахъ, хорошо закупоренныхъ.—*Бурдахъ* справедливо замѣчаетъ, что слишкомъ старый корень бываетъ вовсе недѣйствителенъ; свѣжій или сырой очень остръ; а потому и дѣйствіе онаго трудно опредѣлить.—Корень этого растенія выкапываютъ въ Мартѣ мѣсяцѣ, или въ осень, когда уже сѣмяна его созрѣли: *Бергii.*

2. Укусъ служитъ лучшимъ противодѣйствующимъ средствомъ, уничтожающимъ остроту свѣжаго корня такъ, что листы и корень, отваренные съ укусомъ, дѣлаются полезными въ цынготной болѣзни: *Турнефортъ.*

3. Въ Англіи и Неаполѣ, по свидѣтельству *Рая* и *Жофруа*, изъ этого корня дѣлаютъ родъ мыла, способнаго для бѣленія полотна; въ другихъ мѣстахъ тоже примѣшиваютъ крахмальное вещество этого корня—*fæculæ agi* къ мылу, убѣляющему руки и лицо—*sapo cosmetic.*: *Цезальпинъ.*

Сырѣ, обвитый листьями этого растенія, долго сохраняется; ягоды онаго, нѣкоторые одобряютъ на составленіе красной краски: *Севергинъ*.

4. Корень этого растенія во врачебномъ искусствѣ можетъ замѣнить: синегу—*polygala senega*, корку симарубы—*quassia simaruba* и ангустуры—*brucea ferruginea*: *Янъ*.—*Пейриль* почитаетъ столько же дѣйствительнымъ этотъ корень, какъ морскаго лука — *sillam*.— *Бодардъ* полагаетъ въ числѣ средствъ, замѣняющихъ мехоаканну — *convolvulus meschoasappa*, 1. или Бразильскій и Мексиканскій вьюнъ.

5. Изъ старыхъ кореньевъ извлекается мучное вещество, подобное картофельному, которое можетъ употребляемо быть въ пищу; нѣкоторые изъ этого крахмала дѣлаютъ искусственную саговую крупу весьма вкусную: *Пармантье*.—Свѣжіе листы и корни, вымоченные въ уксусѣ, древніе употребляли вмѣсто салата, полезнаго въ цынгѣ: *Теофрастъ*, *Діоскоридъ* (*).

(*) *Valeriani milites apud Julium Cæsarem inde nutriti.*

КЛУБОЧНИКЪ ОБЫКНОВЕННЫЙ, ИЛИ ШАРОВИДНАЯ ТРАВА—
globularia vulgaris, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, растущее въ умѣренной Россіи по прилѣскамъ и сухимъ лугамъ, также около рѣки Луги.

Качества. Листы имѣютъ *вкусъ* горькій.

Силу—разводящую, очищающую.

Употребленіе. Хвалятъ для очищенія внутреннихъ отъ дурныхъ мокротъ и для заживленія ранъ.

Количество. Полунціи свѣжей травы наливаютъ 12 унціями сыворотки. Снаружи прикладываютъ траву толченую.

КЛЮКВА, ИЛИ ЖУРАВЛИНА; ЖУРАВИКА—*vaccinium oxycoccos*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, въ сѣверной Россіи и Сибири изобильно растущее на торфяныхъ и мшистыхъ болотахъ.

Качества. Зрѣлыя ягоды имѣютъ *вкусъ* очень кислый, мороженныя: кисловатый, пріятный, зависящій отъ лимонной кислоты.

Сила—прохлаждающая, противуцынготная, укрощающая гнилость.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ воспалительныхъ лихорадкахъ, желчныхъ и гнилыхъ горячкахъ, а особенно въ цынгѣ: выжатый сокъ, смѣшиваемый съ водою, служитъ полезнымъ питьемъ.

Количество. Клюквенный сокъ примѣшиваютъ по 2 унціи на фунтъ воды или ячнаго отвара, служащаго обыкновеннымъ питьемъ въ горячкахъ: или даютъ кушать цѣльныя ягоды, прибавивъ немного меду.

1. **Клюковный медъ**—*mel oxycocci*, составляемый изъ 2 фунтовъ выжатого сока и 1 фунта меда, подваренныхъ до густоты сиропа, тоже весьма полезенъ въ упомянутыхъ горячкахъ, прибавляя онаго къ питью по нѣскольку унцій, вмѣсто простаго уксомеда — *oxumel simpl.*, въ аптекахъ составляемаго.

2. **Клюквенный кисель или варенье**—*geob bassav. v. oxycocci* (*) къ тому же годится; прибавляется по 1 унціи къ питью и микстурамъ прохладительнымъ.

3. **Клюквенный сокъ, съ селитрою**—*succus v. oxycocci c. nitrate potassæ* (**), по опытамъ *Паттерсона*, принимаемый ежедневно отъ 6—унцій и даже до 12, въ раз-

(*) *Pharmacop. astr. R. p. 361.*

(**) *P. 362.*

дѣленныхъ приемахъ, оказываетъ желаемую пользу въ цынгѣ, и упорныхъ цынготныхъ поносахъ.—Снаружи тоже съ успѣхомъ при-
мачиваютъ этимъ сокомъ синія, или багровыя
пятна на ногахъ, появляющіяся весною у скор-
бутиковъ.

4. Изъ клюквеннаго сока извлекается су-
щественная кислая соль, замѣняющая вино-
каменную и лимонную кислоты — acid. tartaric.
& citric : *Бранденбургъ* (*).

Примѣчаніе. Мастера золотыхъ дѣлъ, въ Рос-
сїи, сокомъ этихъ ягодъ чистятъ серебро.—Изъ
клюквы можно готовить горячее вино, такимъ
образомъ, какъ изъ брусники и черники.

кимичъ, или тминъ; гушьба—*suminum, cuminum, I*

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, въ южной
Россїи сѣмое въ садахъ.

Качества—сѣмянъ превосходныя, зависящія
отъ летучаго масла.—*Боме* изъ 25 фунтовъ
сѣмянъ получилъ ефирнаго желтаго масла 12
унц. *Запахъ* крѣпкій ароматный; *вкусъ* остро-
пряный, горячительный.

(*) См. его же сочиненіе: *Опыты о выгодномъ отдѣ-
леніи лимонной кислоты изъ клюквеннаго сока.* С. П. Б.
1811 г.

Сила—побуждающая, вѣтрогонная, разводящая, мѣсячногонная, мочегонительная.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ раздутости живота отъ вѣтровъ, коликѣ того же рода и маточныхъ припадкахъ, происходящихъ отъ запору кровей.—Снаружи, для разведенія грудныхъ молочныхъ опухолей, шулятныхъ ушибовъ и другихъ холодныхъ—*tumores frigidi*: *Шпильманъ*, *Кранцъ*.

Количество. Въ порошокъ даютъ по драхмѣ; 2 драхмы на 6 унцій горячей воды, для клистира. Снаружи, въ упомянутыхъ опухоляхъ, въ видѣ мокрой и сухой припарки; также въ видѣ куренія, полезнаго въ удушьяхъ и гистерикѣ, или маточныхъ припадкахъ.—Растерши сѣмяна съ хлѣбомъ, прикладываютъ ко лбу, для утоленія головной боли: *Фогель*.—Англійскіе врачи одобряютъ *кминный пластырь*—*empl. cumini*, составляемый изъ этихъ толченымъ сѣмянъ, кишнецовыхъ и лавровыхъ, или можжевеловыхъ ягодъ, которыя съ бѣлою смолою (живицею), и желтымъ воскомъ, распущеннымъ на огнѣ, намазываютъ на холстинѣ, прикладываютъ къ животу, для разогнанія вѣтровъ и укрѣпленія кишекъ: *Шпренгель*.—Онъ же съ хорошимъ успѣхомъ прикладываютъ для укрощенія астенической колики, мыта и кроваваго поноса: *Арнеманъ*.—

Гнанное кминное масло, для этого же даютъ отъ 3 — 6 капель на сахарѣ, и втираютъ оное по немногу въ животъ: *Пленкѣ*.

княженица, или куманика—*rubus arcticus*, L.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, въ сѣверной Россіи и Сибири произвольно растущее: также по Выборгской дорогѣ, около Петергофа и Стрѣлиной, въ лѣсахъ по мокрымъ мѣстамъ изрѣдка находятъ.

Качества. Зрѣлыя ягоды имѣютъ *запахъ* пріятный, подобный малинѣ; *вкусъ*: кисло-сладкій, зависящій отъ клейко-сахарнаго начала.

Силу—прохлаждающую и укрѣпляющую.

Употребленіе. Для утоленія жажды и жара въ воспалительныхъ лихорадкахъ, желчныхъ горячкахъ, цынгѣ и кровавомъ поносѣ: *Менхъ*, *Шведіоръ*. — Въ жабѣ — *angina*, въ видѣ полосканья.

Количество. Зрѣлыя ягоды даютъ большимъ кушать по желанію; или на бутылку воды, полагаютъ стаканъ выжатаго сока, для питья въ упомянутыхъ болѣзняхъ. — Листы, по вяжущему ихъ свойству, употребляютъ въ клистирахъ, полагая полуниціи на 6 унцій воды для отвара. — Съ прибавленіемъ меда и

уксуса, служить полосканьемъ въ воспалительныхъ болѣзняхъ горла: *Роке*.

Примѣчаніе. Ягоды эти однихъ почти качествъ съ малиною, изъ которыхъ приготовляютъ съ сахаромъ или медомъ весьма пріятное варенье; настоянныя чистою водкою, составляютъ весьма хорошій ароматный и красноцвѣтный ликеръ.

КОЗЕЛЕЦЪ НИЗКІЙ, или ужовникъ; КОСМАТИКЪ—
scorzonera humilis, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, въ умѣренной Россіи и Сибири произвольно растущее по лѣсистымъ лугамъ, также въ Паргаловѣ, Муринѣ, около пороховыхъ Охтенскихъ заводовъ, и въ другихъ открытыхъ мѣстахъ сѣверной Россіи.

Качества. Корень испускаетъ молочный горьковатый сокъ, который послѣ желтѣетъ.

Сила—разводящая, притупляющая остроту влагъ, мочегонительная;—по опытамъ *Дюранда*, потогонная; нѣкоторые по этому свойству отваръ козельца съ сочевицею, хвалятъ въ оспѣ и кори, ежели онѣ медленно выступаютъ.

Употребленіе. Отваръ этого корня, съ прибавленіемъ уксуса и меда, служить прох-

ладительнымъ питьемъ во всѣхъ воспалительныхъ болѣзняхъ; одинъ крѣпкій водяной отваръ, одобряютъ для разведенія густыхъ мокротъ и брюшныхъ заваловъ: *Паули*; въ мокротномъ удущѣ, ипохондріи и подагрѣ: *Арбутнотъ*; въ послѣднемъ случаѣ, выжатый сокъ гораздо дѣйствительнѣе отвара; оный же впускаютъ въ глазъ, для очищенія пятенъ на роговидной оболочкѣ — *masulæ corneæ*: *Шильманъ*; въ воспаленіи легкихъ, завалѣ печени, и желтяницѣ, хвалятъ: *Бургавъ*, *Соболевскій*; нѣкоторые рекомендуютъ прикладывать свѣжій толченый корень и траву къ змѣинымъ уязвленіямъ; по чему и названъ ужовникомъ: *Монардъ*.

Количество. 1 унцію корня полагаютъ на фунтъ воды для отвара, которую кипятятъ до 8 унцій; выжатый сокъ даютъ по 1, или 2 унціи съ сывороткою.—*Феръ* приготовлялъ отваръ изъ этого корня вмѣстѣ съ щавельнымъ—*rad. acetosæ*, и перловою крупю, который, подкисливъ барбариснымъ сиропомъ, давалъ пить въ злокачественныхъ лихорадкахъ, сопровождаемыхъ конвульсіями, помѣшательствомъ ума и падучею.—Онъ объ этомъ весьма хорошо писалъ, основываясь на собственной опытности (*).

(*) *Anchora sacra*, vel *Scorzonera*. Jenæ, 1665.

Примѣчанія. 1. Свѣжій молодой корень варятъ въ кушаньяхъ такъ, какъ гишпанскій козалецъ — *scorzonega hispanica*, вмѣсто спаржи; изъ сухихъ кореньевъ, превращенныхъ въ муку, въ случаѣ недостатка, можно печь хлѣбъ.—Обжаренный слегка, наподобіе кофе, весьма близко подходитъ къ оному.

2. Траву его ѣсть всякая скотина охотно; а особенно свиньи чрезвычайно любятъ эти корни, которые, вырывая, луга портятъ.—Молодые листы служатъ здоровымъ кормомъ для нѣжныхъ малыхъ индѣекъ (калкуновъ).

КОЗЛОБОРОДЪ ЛУГОВОЙ, или козлиная желтоцвѣтная борода; чертова борода—*tragopogon pratense*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, растущее вездѣ по лугамъ травянистымъ, какъ-то: около пороховыхъ Охтенскихъ заводовъ, въ Осиновой рошѣ, въ Драницахъ и въ другихъ подобныхъ мѣстахъ. — Въ огородахъ засѣваемое, получаетъ корень бѣлѣе, толще и стволъ длиннѣе.—Цвѣтетъ въ Маѣ и Іюнѣ на другое лѣто.

Качества—корня молочно-клейкія, подобныя вышеописанному козельцу.

Сила и употребленіе тѣже. *Шведіоргъ* отваръ этого корня одобряетъ въ кашлѣ и мочерѣзѣ; *Соболевскій*, въ припадкахъ каменной болѣзни, кожныхъ сыпяхъ, свербежѣ всего тѣла и золотухѣ. Снаружи, совѣтуетъ толченую траву прикладывать на цынготныя и другія раны, которыя она заживляетъ; въ видѣ припарки, весьма хорошо умягчаетъ затвердѣлыя опухоли.

Примѣчанія. 1. Въ иностранныхъ земляхъ, употребляютъ и этотъ корень вмѣсто спаржи и скорзонеры; а иные съ солью заготавливаютъ на зиму. — Веретенообразный свѣжій корень, въ разрѣзѣ испускаетъ бѣлый молочный сокъ, который имѣетъ ранозѣлительное свойство; равно и все свѣжее растеніе, толченое, прикладываютъ для очищенія и заживленія язвъ.

2. Его траву и коренья ѣстъ всякая скотина весьма охотно.—Козелецъ и козлотородокъ луговой служатъ здоровымъ кормомъ для всѣхъ домашнихъ животныхъ. Простолюдины, весной, срѣзываютъ молодые листы и стволы козельцовъ у самаго корня, для приготовленія съ оными разнаго кушанья.

3. Молочный сокъ, высушенный, составляетъ темно-красное смолисто-камедьное вещество, ко-

торое можетъ служить для миниатурныхъ красокъ:
Амбодикъ.

КОКОРНИКЪ, или КИРКАЗОНЪ; ШИКОВНИКЪ; ПХИНОВ-
НИКЪ; СМОЛЬНИКЪ — *aristolochia clematitis*.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, въ южной Россіи произвольно растущее на рѣкахъ: Москвѣ, Окѣ, Сурѣ и на Волгѣ, отъ Симбирска до Уральскихъ горъ, въ лѣсахъ и по полямъ.

Качества—корня превосходныя; *запахъ* тяжелодушистый; *вкусъ* горькій, острый и долго остающійся;—сокъ онаго содержитъ въ себѣ нѣкоторую кислоту, перемѣняя синій цвѣтъ бумаги въ красный.

Сила—побуждающая, разводящая, мѣсячногонная мочегонительная, очищающая.

Употребленіе. Въ задержаніи мѣсячныхъ или родовыхъ кровоочищеній, маточныхъ судорожныхъ припадкахъ и мокротномъ удушкѣ: *Шонборнъ*, *Фернель*; въ худосочіи, ломотѣ и подагрѣ: *Гельдъ Алстонъ*, *Вергофъ* и *Гейстеръ* тоже рекомендуютъ для подагриковъ принимать оный въ порошокъ, какъ предохранительное и врачевательное средство.— Въ цынготной одышкѣ — *asthma scorbuticum*, язвахъ и рытикахъ: *Пленкъ*, *Фаллоній* и

Трагъ тоже съ успѣхомъ присыпали порошкомъ этого корня всякаго рода гнилыя застарѣлыя язвы, также и на дѣтородныхъ частяхъ — *ulcera genitalium*. *Паули* посредствомъ этого порошка и листовъ размоченныхъ въ бѣломъ винѣ, вылечилъ весьма худую язву на голени — *ulcus sasoëthes tibiae*, въ короткое время, которую другіе врачи въ теченіи года не могли излечить. — *Мейеръ* одобряетъ кирказоновый корень въ ломотныхъ припадкахъ, подагрѣ, глухомъ почечуѣ и перемежныхъ лихорадкахъ, сопряженныхъ съ брюшными завалами.

Количество. Въ порошокѣ даютъ полдрахмы; для наливки, полагаютъ 2 драхмы на 4 унціи горячей воды, или вина. Снаружи, въ видѣ присыпки и примочки, дѣлаемой изъ отвара, полагая полунціи корня на 6 унцій воды. — Посредствомъ впрыскиванья и промывательнаго изъ этого же отвара, *Шомель* вылечилъ внутреннія геморроидальныя язвы.

Примѣчанія. 1. Корень этотъ, въ недостаткѣ, можетъ замѣнить виргинскій змѣевникъ — *a serpen-
taria*: *Шведіоръ*.

2. Живущіе около Волги мужики употребляютъ отваръ этого растенія отъ всякаго лому и боли въ костяхъ; а плоды онаго, подобныя смоквѣ, служатъ имъ слабительнымъ лекарствомъ. Сушеные,

отваривъ въ водѣ, употребляютъ въ желчныхъ лихорадкахъ и горячкахъ, полагая 3—4 золотника на бутылку сусла, или пива; въ порошокъ принимаютъ по 1 золотнику истертаго корня, или зеленыхъ высушенныхъ плодовъ.

3. *Жилбертъ и Бодардъ*, растеніе это поставляютъ замѣняющимъ сукотринскій сабуръ — *aloe perfoliata*, l.

4. Такія же качества имѣютъ и малый кирказонъ, или многоножная трава—*aristolochia pistolochia*, l., растущая въ южныхъ странахъ Россіи, около Уральскихъ горъ. Пользуется хорошо гнилыя и раковыя язвы.—Пчелы очень любятъ ея цвѣты, изъ которыхъ высасываютъ много меду: *Менеръ*.—Нѣкоторые приписываютъ этому растенію, какъ и выше упомянутому, свойство укрощать ядовитое дѣйствіе змѣйнаго уязвленія.

5. *Мазь, служащая для всякихъ скотскихъ ранъ*, составляютъ: изъ 8 золотниковъ толченаго корня кирказона, столько же корня чистотѣльнаго, или желтомолочника, и коневьяго щавеля, смѣшавъ съ 1 фунтомъ свѣжаго свиного сала, поставить на угольный жаръ, и прибавивъ 8 золотниковъ яри, мѣдянки, или бѣлаго цинковаго купоросу — *sulphas zinci*, варить въ покрытомъ горшкѣ,

пока сало все почти выкипитъ; потомъ, снявъ съ огня, прибавить фунтъ деревяннаго или постнаго масла, какое случится, и вымѣшавъ хорошо, прожать сквозь полотенцо.

6. Ежели лошадь давно уже больна, мало ѣсть корму, и причина продолжительной болѣзни неизвѣстна; то, смѣшавъ по 8 золотниковъ порошка кирказона, столько же корня горечавки желтой, толченыхъ можжевеловыхъ ягодъ, и пережженой кости, давай этой смѣси ежедневно по 8 золотниковъ въ видѣ болуса, и послѣ приѣма не кормить, по крайней мѣрѣ, 4 часа.

КОКУШНИЦА ДВУЛИСТНАЯ, или КОКУШНИНЫ СЛЕЗЫ; СТАГАЧКА; САЛЕПЬ; ДѢТСКІЯ ЯДРЫШКИ—*orchis bifolia* L., КОКУШНИЦА ШИРОКОЛИСТНАЯ—*o. latifolia*, КОКУШНИЦА МУЖЕСКАЯ, или МУЖЕСКІЙ САТИРІЙ, *o. mascula*; КОКУШНИЦА ЖЕНСКАЯ, или ДРЕМЛИКЪ, ЦАРЬ; ЦАРИКЪ—*o. morio*. L.

Мѣсто. Растенія многолѣтныя, въ умѣренной Россіи произвольно растущія по лѣсистымъ и влажнымъ лугамъ, на островахъ Невы рѣки между бѣрезами, около пороховыхъ Охтенскихъ заводовъ и Мурина, на Пулковской и Дудеровой горахъ, около Краснаго села, и въ другихъ мѣстахъ въ великомъ количествѣ нахо-

дятся на сырой почвѣ, особенно въ бѣрезникахъ. Лучшее время къ собираю оныхъ въ Августѣ, когда сѣмяна совершенно зрѣлы будутъ, и стволъ увядать станетъ: *Мультъ*.

Качества. Корни упомянутыхъ растений весьма клейкіе, такъ, что одна драхма истертыхъ въ порошокъ, вареніемъ въ 8 унціяхъ воды, дѣлаетъ оную совершенно клейкою, или насыщеною слизью.—*Запахъ* нѣкоторыхъ породъ козлиный, а другихъ благовонный; *вкусъ* чистый слизистый.

Сила—довольно питательная (*), притупляющая остроту влагъ, сгущающая, смягчительная.

Употребленіе. Въ простыхъ и кровавыхъ поносахъ, сухоткѣ, чахоткѣ, и изнурительныхъ лихотадкахъ — febres lentæ, hecticæ; также при внутреннихъ язвахъ, ссадинахъ кишекъ, въ мочерѣзѣ и худосочіи, отъ котораго увядаютъ какъ твердыя части, такъ и жезненные сосилы лабѣваютъ: *Себа*, *Дешеръ*, *Галлеръ*; въ большихъ загноеніяхъ, особенно послѣ ампутацій, въ цыготныхъ язвахъ, поддерживаемыхъ худосочіемъ: *Линдъ*; въ

(*) Такъ, что взрослому человѣку полунціи толченаго корня, довольно для пищи на цѣлый день; ибо 1 драхма или золотникъ салапа можетъ 12 унціями похлебки составить студенистую клейкость: *Пленкъ*.

долговременномъ простудномъ кашлѣ и чахотномъ, одобряетъ *Шпренгель*; при язвахъ, находящихся въ легкомъ, въ почкахъ, или въ мочевомъ пузырьѣ, отъ остроконечныхъ камней, изъ коихъ всасывающими сосудами поглощаемый гной служитъ поводомъ къ сухоткѣ, или чахотной лихорадкѣ: *Гуфеландъ*, *Бертеле*, *Бурдахъ*; въ дѣтской грыжѣ, или рѣзѣ въ кишкахъ—*tormina infantum*: *Фогель*; въ недостаточномъ побужденіи къ совокупленію—*anaphrodisia*, холоднымъ особамъ, также изнуреннымъ отъ постыднаго рукоблудія—*onanія* рекомендуетъ *Галенъ*.—*Гартманъ* совѣтуетъ давать порошокъ сала сѣ винограднымъ виномъ изнуреннымъ женщинамъ отъ непомѣрныхъ кровей, и увѣряетъ, что этимъ средствомъ многія не только излечились въ короткое время, но даже сдѣлались способными къ оплодотворенію—*proliferæ*.—Въ старческой дряхлости—*marasmus, s. tabes senilis*, превосходнымъ питательнымъ и подкрѣпляющимъ средствомъ поставляетъ *Гееръ*.

Количество. Отъ 1—2 драхмъ въ порошокѣ полагаютъ на фунтъ воды, или молока для отвара, который пьютъ по чайной чашкѣ 2 или 3 раза въ день; въ порошокѣ даютъ полдрахмы, съ прибавленіемъ сахара, корицы, или иной приличной пряности. Можно также

варить съ бѣлымъ или краснымъ виномъ, съ сухими вишнями, и другими плодами въ су-пахъ, служащихъ легкою, и питательною пи-щею для больныхъ; или готовить желе, подобное саговому—*instar gelatinæ sago*: *Гук-самъ*.

Въ аптекахъ готовятъ:

Отваръ кокушницы, простой и аро-матной—*Decoctura c. morionis per se, vel aroma-tica* (*), который съ пользою употребляютъ, какъ выше сказано: въ поносахъ, мочерѣзѣ, каменныхъ припадкахъ, и проч.

Примѣчанія. 1. Турецкій, или персидскій са-лепъ, который дорого продаютъ, ничѣмъ не лучше нашихъ кокушницъ, исключая только, что тотъ бы-ваетъ крупнѣе; а потому мы можемъ какъ оный са-лепъ—*rad. saler.*, такъ и саговую крупу — *grana sago*, нашими совершенно замѣнить; также ара-війскую и трагакантную камеди. — Персы и Ки-тайцы коренья этого растенія имѣютъ въ вели-комъ уваженіи, для подкрѣпленія силъ какъ въ путешествіи, такъ и пиршествахъ, готовя съ винограднымъ виномъ весьма пріятное и здоровое

(*) *Pharmacop. castrens. R. p. 246.*

желе, возстановляющее силы и умножающее похоть—celebre aphrodisiacum: *Себа*.

2. Кокушкины слезы, иначе ядрушками и яичками называемыя, собирать должно въ сказанное время: полносочные, плотные, ломкіе и при погруженіи въ воду, на дно осѣдающіе;—таковые корни отобравъ, а старые и вялые отбросивъ, омыть холодною водою; потомъ положить на малое время въ горячую воду, и обтереть тряпчкою, чтобы верхняя кожица съ нихъ сошла; наконецъ, на желѣзномъ листѣ разложивъ, поставить въ теплую печь, пока высохнуть и получить видъ роговой, полупрозрачной: *Соболевскій*; другіе совѣтуютъ, напизавъ на нитку, сушить на свободномъ воздухѣ. Зернистая крупа этого корня, вареная съ молокомъ, или виномъ, составляетъ желе, подобное саго.—Въ Бухаріи изъ обжареннаго садепа варятъ кофе, служащее здоровымъ напиткомъ.

3. Въ голодное время, можетъ служить лучшею пищею, изъ всѣхъ питательныхъ произрастеній! — Мучное или крахмальное вещество одинакаго свойства съ картофельнымъ: *Пармантье*.

4. Тощія лошади и другая скотина весьма скоро поправляются, ежели этотъ толченый корень

примѣшивать къ овсу, или другому корму по нѣскольку горстей.

КОЛОСНИЦА ЛѢСНАЯ, или ЛѢСНАЯ БУКВИЦА; ЗМѢИНАЯ ТРАВА; ЗМѢВНИКЪ—*stachis sylvatica*, l.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, въ умѣренной Россіи растущее въ мокрыхъ и темныхъ лѣсахъ, на уѣкѣ Томѣ, и въ Санктпетербургскомъ округѣ: на Пулковской и Дудеровой горахъ, около Гатчины, и въ другихъ подобныхъ мѣстахъ.

Качества. Трава имѣетъ *запахъ* противный, вонючій, *вкусъ*—горьковатый.

Сила—усыпительная, мочегонительная, раноцѣлительная.

Употребленіе. Въ падучей болѣзни, пострѣлѣ—*epilepsia*, *apoplexia*, запорѣ мѣсячныхъ и родовыхъ кровей; трава эта выгоняетъ также оставшееся мѣсто послѣ родовъ, пользуется обмороки и гистерическіе припадки.—Снаружи, толченая прикладывается къ гнилымъ ранамъ, или язвамъ, для очищенія и заживленія оныхъ; растертая съ оливою, или постнымъ масломъ, полезна отъ обжоги; вареная съ мыломъ и молокомъ, служитъ хорошею разводящею припаркою въ женской грудницѣ, затвердѣлыхъ паховикахъ и въ другихъ твер-

дыхъ опухоляхъ; полезна также для утоленія колики и боли въ животѣ, бывающей при наступленіи мѣсячнаго очищенія, и послѣ родовъ: *Турнефортъ, Соболевскій.*

Количество. 1 драхма травы съ цвѣтными верхушками наливается 4 унц. горячей воды, или бѣлаго вина; въ порошокъ даютъ 20 гранъ, 3 или 4 раза въ день. Снаружи, все растеніе прикладывается въ видѣ разбивающей припарки.

Примѣчанія. 1. Изъ ея отцвѣтшей травы вариваютъ желтую краску, для льняныхъ и шерстяныхъ матерій годную. — Стебла годятся для выдѣлыванія тонкой пряжи, приготовляя оную такимъ же образомъ, какъ изъ льна и пеньки.

2. Траву молодую ѣдятъ коровы, козы и овцы, а прочая скотина не трогаетъ. — Примѣчено, что жабы, любящія вообще вонючія растенія, водятся и часто скрываются въ тѣни этой травы: *Северинъ.* — Кроты тоже охотно водятся подъ оною.

КОЛОСНИЦА ЛѢТНАЯ, или годовая — *stachys annua*, L.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, растущее около пашенъ, по сухимъ и каменистымъ полямъ, около Краснаго села и Дудеровой горы.

Качества. Трава имѣеть вяжущій *вкусъ*.
Силу—тоже вяжущую.

УПОТРЕБЛЕНИЕ—наружное, въ излеченіи ранъ подобное выше описанному.

КОЛОСНИЦА НѢМЕЦКАЯ, или конскій полей—*stachys germanica*. L.

Мѣсто. Растеніе однолѣтное, въ умѣренной Россіи растущее на гористыхъ, грубыхъ и необработанныхъ мѣстахъ, отъ Москвы до Иртыша.

Качества. Трава имѣеть пріятный *запахъ*, *вкусъ*: горьковатый.

Силу, подобную колосницѣ лѣсовой—*s. sylvatica*.

УПОТРЕБЛЕНИЕ такое же; а особенно по опытамъ *Бургава*, въ запорѣ мѣсячныхъ кровей, падучей болѣзни и цынгѣ одобряется.

КОЛОЦИНТЫ, или горькая тыква; САБУРГЪ ЧЕРТОВЪ;
ЧЕРТОВЫ ЯБЛОКИ—*cucumis colocynthis*, L.

Мѣсто. Растеніе однолѣтное, растущее въ Архипелагѣ, и въ южной Россіи удобно разводится въ садахъ.

Качества. Очищенныхъ плодовъ или мякоти, *запахъ* слабый, тошноватый; *вкусъ*:

весьма горькій, островатый.—По разложенію содержитъ склизъ и камедно-смолистое вещество.

С и л а—въ маломъ количествѣ превосходная, мочегонительная, отверзающая, мѣсячногонная, противуглистная; въ большемъ—сильная, проносная, причиняющая боль и рѣзь въ кишкахъ и нередко извергающая изъ матки зародышъ—*abortiva*: *Гойеръ*, *Сталпартъ*, *Віель*, *Тульній*, *Платеръ*.

Употребленіе. Въ брюшныхъ завалахъ и водяной болѣзни одобряютъ: *Банъ*, *Горизъ*; въ зопорѣ мѣсячныхъ кровей: *Фонъ-Свитенъ*, *Тимей*; въ блѣдной немочи и слизистомъ долговременномъ поносѣ: *Жилиберъ*; въ мочротномъ пострѣлѣ и падучей болѣзнѣ: *Линней*; въ перемежной глистной лихорадкѣ астеническаго свойства, помѣшательствѣ ума и бездѣйствіи членовъ послѣ паралича: *Пленкъ*, *Бурдахъ*. Снаружи *Хритіенъ*, натирая животъ колоцитною мякотью, смѣшавъ 20 гранъ съ свинымъ саломъ, видѣлъ хорошій успѣхъ въ сумасшествіи; при чемъ послѣдовалъ покойный сонъ, изобильное испражненіе мочи.—*Шпильманъ* совѣтуетъ таковою же мазью натирать животъ младенцамъ отъ глистовъ; или ставить промывательныя. *Иппократъ* впрыскивалъ съ приличными жидкостями въ маточный рукавъ, ког-

да находились въ дѣтородныхъ частяхъ и въ маткѣ язвы. Средство это запрещается беременнымъ, также кои подвержены кровоточеніямъ, въ кровавомъ поносѣ, каменной болѣзни, истерикѣ, и при лихорадочныхъ движеніяхъ: *Бергій*; потому оное, по своему сильному дѣйствию, можетъ причинить опасныя послѣдствія, замѣченныя: *Тульпиемъ*, *Платеромъ* и *Германномъ*.

Количество. Отъ 1—2 и 5 гранъ дается въ порошокъ: съ вишневымъ клеемъ, Аравійскою камедью, или растерши съ яичнымъ желткомъ; для клистира полагается 1 или 2 драхмы на фунтъ жидкости, гдѣ требуется сильнѣйшее побужденіе, какъ-то: при апоплексическомъ ударѣ, параличѣ, ущемленной грыжѣ и проч. *Фогель*.—Въ глистныхъ завалахъ и запорахъ 30 гранъ мякоти на 6 унц. воды для отвара; или тоже количество въ пилюляхъ, смѣшавъ съ порошокъ аравійской камеди, или съ мякишемъ бѣлаго хлѣба, давая на пріемъ: отъ 2—5 и 10 гранъ: *Кранцъ*; особливо при большой нечувствительности кишечнаго канала—*torpor intestinorum*: *Шпрегель*. — *Ганнеманъ* надежнѣйшимъ средствомъ полагаетъ водяной экстрактъ колоцинтовъ—*extract. aquos. colocynthidis*, которой въ упомянутыхъ болѣзняхъ даютъ: отъ 3—4 и 8 гранъ въ мелан-

холии, зависящей отъ чревныхъ мокротныхъ застоевъ, и сывороточной влаги, скопившейся въ головѣ — *colluvies serosa*: *Гартманнъ*, *Юнгкенъ* (*). *Гуфеландъ* рекомендуетъ колоцинтную настойку—*tra colocynth*, полагая полунции очищенной мякоти на 6 унцій французской водки, или виннаго разведеннаго спирта, прибавляя къ тому 2 драхмы анису—*sem. anisi*, которую настоявъ, процѣдить и выжать. — *Пріемъ*: отъ 10—15 и 20 капель, принимая 3 или 4 раза въ день съ водою, пользуютъ апоплексическіе и ломотные припадки. *Хретіенъ* сумасшедшимъ давалъ съ успѣхомъ отъ 30—60 капель; *Далбергъ*, отъ 15—20 капель, одобряетъ въ нервныхъ расслабленіяхъ и головной боли; *Ведель* употреблялъ въ гонорей (переложі), и другихъ венерическихъ болѣзняхъ (**). — *Мурай* въ зубной боли.

(*) 1811 и 1816 годовъ я имѣлъ случай двухъ знатныхъ особъ вылечить отъ параличнаго полуразслабленія—*hæmiplēgia*, посредствомъ этого экстракта, давая имъ въ видъ микстуры, состоящей: изъ 6 унцій водяной ревенной настойки—*anima rhei*, 1 драхмы колоцинтнаго экстракта столько же мауннаго, и 6 гранъ сладкой ртути *sublimatis hydrargyri*, ежедневно по 2 столовыхъ ложки, по утру и вечеромъ; къ тому же много вспомоствовало и электризованіе.

(**) Онъ доказываетъ примѣромъ, что нѣкоторый цитрульникъ мочилъ колоцинтковыя сѣмяна въ пивѣ, и ле-

Примѣчаніе. 1. Противудѣйствующимъ этому сильному средству *Шведіоръ* поставляетъ камфору;—*Бодардъ* оливу, или иное тучное масло, внутрь и въ клистирахъ употребляемое для притупленія сильнаго раздраженія.

2. Порошокъ колоцинтовъ, насыщаемый между листовъ и перенлета книгъ, предохраняетъ ихъ отъ моли и червей.—Смѣшанный съ бычачьею желчью и приложенный къ пупку, слабитъ, умерщвляетъ глистовъ и изгоняетъ ихъ —Изъ этихъ плодовъ дѣлаютъ черную краску для шелковыхъ матерій.

3. Высушенная мякоть колоцинтовъ, истертая въ порошокъ, дается лошадямъ для изгнанія червей, и при отнятіи или бездѣйствіи ногъ: отъ 1—2 лотовъ, сдѣлавъ большіе катышки съ хлѣбною мякотью.—Средство это многими ветеринарами испытано.

4. Колоцинты врачевнымъ своимъ дѣйствіемъ ничѣмъ не уступаютъ сабуру и желтой камеди—*cambogia gutta l.—stalagmitis cambogioides: Murray;—garcinia cambogia: Willd.*

чиль онимъ французскую болѣзнь—*lues venerea*.—Природы остраго молочая—*euphorbia*, такое же дѣйствіе оказываютъ: Пейрилъ. См. при описаніи онаго на своемъ мѣстѣ.

КОНОПЕЛЬНИКЪ, или РЪШКЪ; КОНСКАЯ ГРИВА; КОРОЛЕВИНА ТРАВА—*eupatorium-cannabinum*, I.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, растущее произвольно въ умѣренной Россіи на мокрой почвѣ, на острову Наровы рѣки, выше пороговъ, и въ другихъ водянистыхъ мѣстахъ. —Цвѣтетъ въ Іюль, Августѣ и Сентябрѣ.

Качества. Трава и корень *запахъ* имѣютъ острый, и пронизательный; *вкусъ*: очень горькій.

Сила—корня мочегонительная, слабительная, и иногда рвотная; травы—очищающая, разводящая, ранозѣлительная.

Употребленіе. Въ слабости брюшныхъ органовъ, засоренныхъ мокротами, одобряетъ *Линней*; въ завалахъ внутренностей, особливо печени и селезенки: *Авиценна*; въ запорѣ кровей и желтухѣ: *Рай*; въ кожныхъ болѣзняхъ водяной, бывающей нерѣдко послѣ перемежныхъ лахорадокъ: *Шпильманнъ*, *Германъ*, *Кранцъ*, въ худосочіи, отека ногъ, водяной шулятной грыжѣ—*hydrocele*, и гнилыхъ цыготныхъ язвахъ: *Шомель*, *Скополи*, *Шредеръ*.—Сокъ, выжатый изъ свѣжихъ листовъ, и принимаемый съ сывороткою, *Роке* одобряетъ не только въ упомянутыхъ болѣзняхъ, но также въ упор-

ныхъ перемежныхъ лихорадкахъ, зависящихъ отъ астеническихъ заваловъ—*infarctus atonicus*.

Количество. Корень дается въ порошокъ отъ 5—10 гранъ; травы одна щепоть наливается 4 унц. горячей воды; либо 1 горсть наливають 12 унц. сыворотки и, вскипятивъ, даютъ по 2 столовыхъ ложки каждыя 2 часа; или толченаго корня 2 драхмы наливають 6 унц. горячей сыворотки.—Снаружи отваренная трава въ водѣ служитъ хорошею разводящею припаркою; свѣжая толченая трава очищаетъ цыготныя раны, и другія язвы приводитъ въ заживленіе, и при томъ разводитъ какъ золотушныя, такъ и другія холодныя опухоли.

Примѣчанія. 1. Траву эту употребляютъ деревенскіе жители въ отварѣ водяномъ и съ пивомъ: въ водяной болѣзни, цыгѣ, желтяницѣ, 3 и 4-дневныхъ лихорадкахъ и въ поваральныхъ гнилыхъ болѣзняхъ, съ великимъ успѣхомъ: *Соболевскій*. По свидѣтельству *Бургава*, тоже у многихъ поселянъ служитъ это растеніе домашнимъ универсальнымъ лекарствомъ: въ мокротныхъ хроническихъ болѣзняхъ, водяныхъ опухоляхъ, отъ глистовъ, вѣтряной колики, и проч. — Въ Швеціи простолюдины, корень и траву этого растенія, отваривъ съ молочной сывороткою, пьютъ отъ водяной

болѣзни, и *Линней* хвалить, какъ особенное слабительное средство—*purgans specificum*.

2. Козы ѣдят оное охотно; а другая скотина не трогаетъ. Замѣчено также, что это растеніе подстрѣленные олени ѣдятъ, и тѣмъ себя лечатъ: *Северинъ*.

конопля, и конопель; посконь; кура—*cannabis sativa*, l.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, сѣемое изобильно во всей Россіи на поляхъ и въ огородахъ.

Качества—сѣмянъ превосходныя, зависящія отъ маслянаго и клейкаго начала; *запаху* не имѣютъ; *вкусъ*: нѣсколько затхлый, масляный.

Сила — притупляющая, болеутолительная, смягчительная.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ видѣ наливки или эмульсіи, конопляное сѣмя одобряется: въ воспалительномъ мочерѣзѣ, теченіи бѣли, и венерическомъ столовомъ теченіи—*bleorrhagia: Tode*; въ простудномъ кашлѣ и желтухѣ, производящей отъ спазмовъ желчной системы—*aurigo spasmodica: Б. Сильвій*.—Снаружи, толченныя сѣмяна и съ молокомъ варенныя до густоты розмазни, служатъ хорошою смягчи-

тельною припаркою; незрѣлыя сѣмяна, съ зелеными цвѣтными листочками толченныя, составляютъ болеутолительную и разбивающую катаплазму; такого же свойства и конопляные листы, варенные въ водѣ: *Турнефортъ*.—Конопляное масло, выжатое изъ сѣмянъ, имѣеть такія же свойства, какъ и льняное—*oleum lini usitatissimi*; употребляется снаружи въ ожогахъ и для смягчительныхъ клистировъ; согрѣтое масло, втираемое въ поясницу, по опытамъ *Вельша*, оказываетъ желаемую пользу въ почечныхъ боляхъ, поясничныхъ и крестцовой ломотѣ — *сохагга*.—Пенька, или конопляныя пакли—*fila cannabina*, варенныя въ зольномъ щелокѣ, или просто съ золою, и прикладываемыя къ нижней части живота, служатъ припаркою, сильно гонящею мѣсячную кровь—*fortissime emmenagoga*: *Родерикусъ а Кастро*. Молоко конопляныхъ сѣмянъ даютъ пить роженицамъ для ускоренія родового очищенія, груднаго молока, и въ желтухѣ: *Сильвій*, *Боннетъ*; оное же служитъ нѣжною примочкою, истребляющею оспенныя пятна: *Фогель*.—Для выгнанія оспы наружу, нѣкоторые даютъ пить больному въ жажду молочную сыровотку, вареную съ коноплянымъ толченымъ сѣмянемъ, полагая онаго пригоршню на кувшинъ жидкости.

Количество. Полууңціи толченыхъ сѣмянъ полагають на 6 унцій горячей воды для наливки; или растирають съ 4 унціями холодной воды для эмульсіи.

Примѣчанія. 1. Конопляное сѣмя имѣеть свойства, подобныя сладкому миндалю; а потому приготовляемое изъ оныхъ сѣмянное молоко, можетъ замѣнить *миндальную эмульсію* — *emulsio amygdagum* (*), и съ равною пользою можетъ употребляемо быть во всѣхъ случаяхъ, гдѣ упомянутая предписывается.

2. Свѣжее конопляное масло, кромѣ извѣстнаго домашняго употребленія, годится также для составленія многихъ пластырей и мазей, вмѣсто деревяннаго масла — *oleum oleæ eugoreæ*, что я многократно испыталъ, и всѣмъ армейскимъ врачамъ извѣстно. — Для внутренняго употребленія, это постное масло и другія, можно совершенно очистить и уподобить лучшей оливѣ, или прованскому маслу, посредствомъ сѣрной кислоты — *acid. sulphuric.*: *Киргофъ* (**). — Полезная мазь отъ грудицы — *mastodynia*, составляется: изъ 1 рюмки свѣжато коноплянаго масла, и желтаго воска ве-

(*) *Pharmacop. Rossica* p. 208.

(**) Объ этомъ упомянуто было прежде.

личиною въ грѣцкѣй орѣхъ, которыя, распустивъ на огнѣ, прибавъ 1 свѣжій яичный желтокъ; потомъ смѣшавъ хорошо и намазавъ на ветошку, приложить къ больному мѣсту тепловатую, повторяя ежедневно. — *Отъ шолудей овечьихъ*: надобно предварительно больныхъ овецъ остричь, и растерши шолуди черепкомъ, потомъ мазать оныя помощію квачика или кисти, обмоченной въ сѣрное масло, составляемое изъ 4 лотовъ толченой горючей сѣры и 1 бутылки пестнаго масла, которое должно настаивать 12 часовъ;—средство это полезно и для головныхъ паршей у людей.

3. Конопляныя цвѣтки, кистью расположенные, имѣющіе крѣпкій проищательный и усыпительный запахъ—*odor fortissime narcoticus*, подобный опию; не могутъ ли оныя служить такъ, какъ и хмѣлевые верхушки—*coni h. lupuli*, принятыя въ Россійской Фармакопее *и. Вилліе*, вмѣсто опия? — Въ восточной Индіи мужескіе и женескіе цвѣтныя кисти конопли варятъ въ водѣ, и отъ этой жидкости цѣляють.—Персіяне окуриваютъ колосными вѣтками большихъ въ бессонницѣ: *Флакуръ*.—Башкирцы завертываютъ оныя вѣтки въ капустныя листья, кладутъ ихъ въ горячую золу, и когда сопрѣютъ, то обливаютъ сливками и потомъ завертываютъ ихъ опять въ листья; когда же оныя

цвѣтки въ горячей золѣ совершенно упрѣютъ и сдѣлаются тѣстомъ, въ то время дѣлаютъ изъ нихъ пилюли или катышки, коихъ по нѣскольку проглатываютъ, для возбужденія удовольствія или веселія—*scopo refocillante v. exhillarante: Северинъ*.—Обжаренное сѣмя и съ солью смѣшанное, ѣдятъ для возбужденія похоти: *Олеарій*.—Плодотворная пыль—*pollen*, выѣваемая изъ цвѣточныхъ кистей, имѣетъ усыпительное свойство, изъ которой Персіане дѣлаютъ свои лепешки—*pastilli*, употребляемыя ими для веселости: *Кемпферъ*.—Средство это тоже достойно испытанія: не можетъ ли употребляемо быть вмѣсто опія?

4. Противный духъ цвѣтущей конопли выгоняетъ хлѣбныхъ червей изъ вороховъ; предохраняетъ капусту и другія огородныя растенія отъ гусеницы и прочихъ вредныхъ насѣкомыхъ и мышей, ежели на грядкахъ по краямъ оныхъ будетъ посѣяна.—Коноплянымъ сѣменемъ кормятъ куръ, отъ котораго они будутъ нестись во всю зиму; употребляютъ также для корму и другихъ птицъ, отъ чего они жирѣютъ.

5. Моченіе и отрепчиваніе конопли производить должно въ отдаленности отъ жилья; ибо вода и воздухъ портятся оглушающимъ (наркотическимъ)

испареніемъ (*)!—Уголь конопляныхъ стеблей годится для дѣланія пороха (**).

КОПЕРЬ ФРАНЦУЗСКІЙ, или БѢЛАЯ ГОРЕЧАВКА—
lasergitium gallicum, et latifolium, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, въ южной Россіи самородно растущее на Волгѣ и въ Калмыцкой степи.

Качества—корня и сѣмянъ превосходныя; *запахъ* ароматный, къ кмину подходящій; *вкусъ* горько-пряный, острый.

Сила—побуждающая, желудочная, вѣтрогонная, мочу и мѣсячныя крови гонящая.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ худомъ пищевареніи, вѣтряной коликѣ и боли живота, отъ запора кровей; *Иппократъ* давалъ во всѣхъ маточныхъ астеническихъ болѣзняхъ; *Галленъ* въ падучей болѣзни, судорожной одышкѣ, и для гнанія мочи.

(*) Касательно выдѣлыванія пряжи изъ разныхъ произрастеній, см. Kögels Anbau u. Bearbeitung der Flachspflanze bis zum Spinnen, Quedlinburg, 1812.—И въ сочиненіи г. Розье: Cours complet d' Agriculture, a Paris, 1793. Т. III. p. 2—12.

(**) См. les Memoires de M. Proust, Journal de physique, 1811.

Количество. Въ порошокъ сѣмяна даютъ по драхмѣ; 2 драхмы на 6 унціи горячей воды полагаютъ для наливки; 3 драхмы для промывательнаго.

Примѣчаніе. Растеніе это служитъ здоровымъ кормомъ для домашняго скота.—Корень онаго, по превосходному своему пряному свойству, подходящей къ дягильному, заслуживаетъ вниманіе врачей:
Бергій.

КОШЫТЕНЬ ПОДЛѢСНЫЙ, или ПОДЛѢСНИКЪ; КОШЫТНИКЪ;
СУХОЙ ВОДОЛЕНЬ, ПОДОРЪШНИКЪ, ОБЛАНА, ОХВАТКА,
СКИЩИДАРНИКЪ—*asaagum eugoræum*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, въ умѣренной Россіи произвольно растущее въ тѣнистыхъ мѣстахъ и рощахъ, также и въ С.-Петербургской округѣ: около Царскаго села, на Пулковской и Дудеровой горахъ, и у Волхова.—Цвѣтетъ въ Маѣ и Іюнѣ.

Качества—корня и листовъ сильныя, зависящія отъ остраго летучаго начала; *Запахъ* имѣетъ приторный; *вкусъ*: тошновато-острый, горьковатый.—Химическимъ разложеніемъ извлечено летучее камфорное масло.

Сила — въ порошокъ рвотно-слабительная, и возбуждающая чиханіе; въ отварѣ: моче-

гонительная, также потъ и мѣсячныя крови гонящая.

Употребленіе. Прежде открытія ипеакакуанны или рвотнаго корня—*psuchotria emetica* L. Копытень служилъ обыкновеннымъ рвотнымъ лекарствомъ; въ Голландіи, по свидѣтельству *Бургава*, прежде этого продавали онаго кореня за настоящую мексиканскую ипеакакуанну.—Въ перемежныхъ лихорадкахъ одобряютъ: *Гельмонтъ*, *Матіолъ*, *Руландъ* и *Лентилій*; въ 4-дневныхъ упорныхъ трясучкахъ, *Алексій* особеннымъ средствомъ поставляетъ; въ водяной болѣзни многими опытами подтверждаютъ: *Руландъ*, *Шефферъ*, *Меллисъ*, *Аллионъ*; въ брюшныхъ завалахъ, запорѣ кровей, желчныхъ припадкахъ и въ меланхолии, *Додоней* и *Рольфинкъ* копытневые листы: отъ 5—8 числомъ отваривая въ водѣ, и наливая виномъ, употребляли съ хорошимъ успѣхомъ. Сухихъ листовъ нюхаемый порошокъ отъ 4—5 гранъ къ ночи, производитъ слѣдующаго утра обильное истеченіе мокроты, и такимъ образомъ вылечиваетъ насморкъ и головную боль—*coгуza*, *grauedo*: *Питтъ*, *Колбачъ*, *Жофруа*, *Шульцъ*. Этимъ же нюхательнымъ порошкомъ, изъ листовъ и корня приготовленнымъ, удачно использованы: темная вода, или слѣпота—*amaurosis*, долговременная

боль головы—cephalæa, глухота—sophosis (*), параличь язычныхъ нервовъ, и язвы мокротныхъ носовыхъ пазухъ: *Фандермондъ, Колбачъ, Десмаре*.—По Единбургской Фармакопей порошокъ—pulv. sternutatorius, для этого же намѣренія приготовляемый, состоитъ: изъ 3 частей листовъ копытня, маіорана, и столько же лавандныхъ цвѣтовъ.—Нюхая оный по немногу, великую пользу доставляетъ въ упомянутыхъ головныхъ и глазныхъ упорныхъ боляхъ: *Шпренгель*.

Количество. Въ малыхъ приемахъ, корень оказываетъ разводящее и противусудорожное дѣйствіе, по опытамъ *Левфлера*, отъ 1—2 гранъ; принимаемый отъ 20—30 гранъ въ порошокъ, или смѣшавъ полдрахмы съ медомъ, въ видѣ болюса, служитъ рвотнымъ и слабительнымъ средствомъ; для отвара 2 драхмы корня, или 4 драхмы травы полагаютъ на фунтъ воды, который принимаютъ по 2 столовыхъ ложки каждыя 2, или 3 часа.—Этотъ отваръ служитъ также отверзающимъ промывательнымъ, —clysma deobstruens.—Винная наливка, такимъ же образомъ приготовляемая и

(*) Въ этомъ случаѣ Колбачъ вдвухъ въ слуховой проходъ по нѣскольку гранъ порошка: Discourse on acid and alcali. P. I. p. 164.

употребляемая, полезна въ брюшныхъ завалахъ и параличѣ: *Косте*.

Примѣчанія. 1. Копытневый корень, по многократнымъ испытаніямъ *Иосифа Каменецкаго* и *Жилиберта*, можетъ дѣйствительно замѣнять рвотный корень ипеакауаны, что и *Линней* уже замѣтилъ; а по опытамъ иныхъ врачей, особливо *Руланда* и *Шеффера*, тотъ же корень, долѣе въ водѣ отвариваемый, превосходно гонитъ мочу, и совершенно замѣняетъ морской лукъ—*scilla m.*—*Фернелъ* говоритъ, что это средство, столько же благонадежное и безвредное для каждаго возраста и пола, что оное можно съ равнымъ успѣхомъ употреблять во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ ипеакауана одобряется. — Онъ же особенно рекомендуетъ отъ весеннихъ лихорадокъ и брюшныхъ заваловъ сывороточную наливку, полагая отъ 5—8 листочковъ на 1 бутылку горячей жидкости, которую, настоявъ и процѣдивъ, пить чрезъ 2 часа по чайной чашкѣ.

2. Французскіе ветеринары или коновалы даютъ лошадямъ копытневые листы съ корнемъ, вмѣсто проноснаго порошка: отъ 1—2 лотовъ, мѣшая съ кормомъ, когда имѣютъ намѣреніе очистить внутренности: *Соболевскій*. Средство это полезно также для изгнанія червей у лошадей; а для ро-

гатаго скота и овецъ, отъ гнилости и падежа: *Фрибе*. — Для этого кладутъ горсть листовъ на полбутылки пива, или горячей сыворотки. Въ Германіи молошницы кладутъ свѣжіе листы, въ свѣжо-доенное молоко, чтобъ гуще садилось и давало болѣе снимковъ: *Амбодикъ*.

3. По совѣту *Гофмана*, должно весною листы и коренья содержать въ сушильнѣ на свободномъ воздухѣ нѣсколько мѣсяцовъ, чтобы улетѣла оныхъ излишняя острота. Я замѣтилъ, что чѣмъ мельче будутъ истерты въ порошокъ, тѣмъ скорѣе и удобнѣе возбуждаютъ рвоту; при треніи же производятъ чихоту.—Тереть должно при самомъ употребленіи, иначе они потеряютъ свою силу!

4. Ежели свѣжее растеніе съ корнемъ истолочь и настоять въ звѣробойномъ маслѣ, потомъ прожать, и прибавить 3-ю часть терпентиннаго масла, то этимъ образомъ составляется *мазь отъ лому въ ногахъ*.

КАСАТИКЪ БОЛОТНЫЙ, или САБЕЛЬНИКЪ—*iris pseu-
dacorus, L.*

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, растущее по болотамъ, каналамъ и по краямъ рововъ, во всѣхъ мѣстахъ Россіи, также около острововъ Невы рѣки, и почти вездѣ.

Качества. Свѣжій корень *запаху* не имѣеть; *вкусъ* острый, нѣсколько вяжущій.

Сила—вяжущая, мочегонительная.

Употребленіе. Сокъ изъ корня выжатый, въ водяной болѣзни *Линней* чрезвычайно хвалить; *Рамзай* и *Платеръ* тоже многими наблюденіями подтверждаютъ: *Этмюллеръ* изгонялъ круглые глисты, *lumbrici*; *Цаната*, давая жевать этотъ корень и снаружи прикладывая толченый, въ теченіи 50 или 60 дней, совершенно вылечивалъ подбородочныя килы или зобы—*strumæ*; положенный на больной зубъ, отнимаетъ чувствительность и утоляетъ боль; въ видѣ полосканья употребляемый, отвращаетъ цынготную порчу десень — *stomacase*: *Шведіоръ*, *Соболевскій*.—Катаплазма изъ распаренныхъ листовъ укрощаетъ ломотную и подагрическую боли: *Роке*.

Количество. Сокъ дается съ приличными жидкостями, отъ 1—4 драхмъ; сухой корень въ порошокъ: отъ 20 гранъ до полудрахмы, въ поносахъ и разныхъ астеническихъ кровотеченіяхъ: *Соболевскій*.—Маточное кровотеченіе этимъ средствомъ укрощали *Додоней* и *Шульцъ*, полагая полуниціи корня на 6 унц. краснаго вина.

Примѣчанія. 1. Изъ сушенаго корня, мелко изрѣзаннаго и отвареннаго въ водѣ, съ прибавле-

ніемъ желѣзныхъ опилокъ, или простаго зеленаго купороса, можно сдѣлать чернила.—Красные, вяжущіе корни, пригодны для выдѣлки кожъ. Изъ высушенныхъ цвѣтовъ, посредствомъ уксуса, извлекаютъ желтую постоянную краску, предпочитаемую желтяницѣ—*siacina*; потому что темнѣе оной, и на воздухѣ не измѣняется.—Изъ обжаренныхъ сѣмянъ, въ Англіи варятъ кофе: *Морво*.

2. По замѣчанію *Линнея*, корень болотнаго касатика, для всѣхъ животныхъ служитъ ядомъ, исключая козъ, которыя ѣдятъ его безвредно.—Сушеный имѣетъ одинакія силы съ касатикомъ пѣмецкимъ и флорентинскимъ—*iris germanica et florentina*: *Пеириль*.

3. Сѣмяна въ Англіи недавно испытаны *Скриплевъ*, какъ замѣняющія аравійское кофе.

КАСАТИКЪ СИБИРСКІЙ, или пѣтушокъ; чистякъ; бубенчикъ—*iris sibirica*, I.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее сибирское, находится также у рѣки Волхова недалеко отъ Чертовой деревни, и въ садахъ разводится.

Качества. По свидѣтельству *Гмелля*, имѣетъ силу въ умѣренномъ количествѣ про-

носную; въ большемъ рвотную. — Сибиряки корень этотъ чрезвычайно хвалятъ, и пользуются онымъ въ венерической болѣзни, и ломотѣ тогоже свойства, принимая его отваръ по утрамъ по стакану, или въ порошокѣ: по 1 золотнику съ молочной сывороткою. — Нѣкоторые смѣшиваютъ свѣжо-выжатаго сока 4—6 лотовъ, съ равнымъ количествомъ постнаго масла и, настоявъ сутки въ тепломъ мѣстѣ, трутъ онымъ страждущія части ломотою, и для истребленія кожныхъ нечистыхъ сыпей—*morbi cutanei*: *Георгій*.

Количество. Полунціи полагаютъ на 12 унцій воды для отвара.—Въ порошокѣ сушеный корень даютъ отъ 15—20 гранъ;—малолѣтнимъ: отъ 7—8 гранъ.—Для винной наливки полагаютъ полунціи корня, или сѣмянъ на полбутылку жидкости; приѣмъ: по 1 рюмкѣ.

КАСАТИКЪ СИНИЙ, или нѣмецкая ирь; САБЕЛЬНИКЪ—*iris germanica*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, изъ нѣмецкихъ земель происходящее, въ южной Россіи растеть самородно и бездѣ, по садамъ удобно распложается.

Качества—свѣжаго корня ѣдкія, зависящія отъ остраго летучаго начала; *вкусъ*

тоже острый, тошновато-горькій; сухаго мучной.

Сила — свѣжаго, въ большомъ количествѣ, рвотная; въ маломъ: разводящая, мочегонительная; сухаго корня: чихотная, грудная, мѣсячегонная: *Шведіоръ*. — По составнымъ началамъ гораздо дѣйствительнѣе, нежели фіалковый корень—*iris florentina*: *Роке*.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Выжатый сокъ употреблялъ я въ брюшной водяной болѣзни—*ascites*, по совѣту *Рамзая* (*), давая одному больному, сначала каждый часъ по 80 капель, а послѣ повторялъ чрезъ 2 часа, смѣшавъ съ медомъ; успѣхъ въ послѣдствіи оказался желаемый. — *Ганеманиъ* тоже одобряетъ. Отъ насморка, въ грудныхъ мокротныхъ припадкахъ и запора кровей, нѣкоторые давали съ успѣхомъ сушеный корень, въ видѣ водяной или винной наливки: *Ферпель*, *Платеръ*, *Верловъ*.

Количество. Сокъ свѣжаго корня даютъ съ медомъ, или съ какимъ-нибудь сиропомъ, какъ выше сказано; или смѣшанныя 2—3 унціи онаго съ 2 фунтами молочной сыворотки, даютъ пить по чайной чашкѣ, нѣсколько разъ

(*) Society of Edinburgh, T. V. Flour de luce; German Iris, or flower de luce.

въ день.—Сухой корень въ порошокъ нюхаютъ для чихотнаго дѣйствія: отъ 3—4 грань, смѣшанныхъ съ сахаромъ; внутрь: 10—20 и 30 грань; для наливки: полунціи корня полагаютъ на фунтъ горячей воды, сыворотки, или винограднаго вина.

Примѣчанія. 1. Свѣжій корень, при внутреннемъ употребленіи, требуетъ большой осторожности, хотя оный, по свидѣтельству *Соболевскаго*, въ нѣкоторыхъ земляхъ и употребляютъ въ водяной болѣзни; но по весьма острому и жгучему свойству, ежели принять будетъ въ непомѣрномъ количествѣ, можетъ произвести сильную желчную рвоту, кровавое изпражненіе, жженіе въ горлѣ, и жаръ въ желудкѣ и кишкахъ съ величайшею болью!—Винный камень—*supertartar potassæ*, и селитра—*nitras potassae*, могутъ служить для направленія его остроты.—Для наружнаго употребленія, корень этотъ настаиваютъ въ деревянномъ или постномъ маслѣ, полагая 2—3 унціи толченаго на бутылку, которое оказываетъ такую же пользу, какъ и предыдущаго сибирскаго касатика.

2. Цвѣты полусогнившіе, съ негашеною известью, или съ квасцами смѣшанные, даютъ превосходную сине-зеленую краску, для миниатюрной живо-

писи.—Изъ свѣжихъ цвѣтовъ дѣлаютъ сиропъ пріятно-фіалковаго цвѣта; напротивъ, изъ сухихъ лепестковъ приготовляемый, получаетъ темно-зеленоватый цвѣтъ, и непріятный вкусъ. *Бергii.*

3. Сушенымъ корнемъ этого растенія можно замѣнять фіалковый корень, или ирь флорентинскую—*iris florentina* L.: *Роке.*—Свѣжовыжатый сокъ, осторожно употребляемый, не уступаетъ дѣйствию морскаго лука—*scilla m.*: *Линней.*

КОШЕЧЬЯ ТРАВА, или КОШЕЧЬЯ МЯТА—*pereta cataria*, L.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, растущее въ южной Россіи произвольно на сырой почвѣ: около Волги, Урала и въ Калмыцкой степи; цвѣтеть въ Іюнѣ и Іулѣ.

Качества—зависятъ отъ летучаго масла—*ol. essentielle*; трава имѣетъ *запахъ*: противный, козлиный, который кошки любятъ; *вкусъ*: пряно-горькій, приторный.

Сила—побуждающая, нервная, мѣсячегонная, противуглистая, отверзающая; сокъ, втянутый въ ноздри, возбуждаетъ чихоту и отдѣленіе носовыхъ мокротъ: *Розе.*

Употребленіе. Въ маточныхъ болѣзняхъ и блѣдной немочи—*chlorosis*, одобряетъ *Линней*; въ запорѣ кровей и истерикѣ: *Шве-*

диоръ, Бурдахъ; въ судорожномъ кашлѣ, одышкѣ, брюшныхъ завалахъ, особенно печени, и въ желтухѣ: *Беклеръ*. Въ кошечьемъ падежѣ—*lues epidemica felium*: *Пленкѣ*.—Снаружи, въ видѣ припарокъ и ваннъ, въ тѣхъ же болѣзняхъ одобряетъ *Фогель*.

Количество. Для наливки полагаютъ 1 драхму травы, или цвѣтныхъ вершущекъ на 4 унціи бѣлаго вина; въ порошокъ даютъ траву съ цвѣтными верхушками по 20 грань, 3 или 4 раза въ день; свѣжовыжатого сока, даютъ по 2 унціи; для клистировъ отверзающихъ и противусудорожныхъ, полагаютъ 1 унцію травы на фунтъ жидкости.

Примѣчанія. 1. Растеніе это получило свое имя отъ того, что кошки за нимъ гоняются, и трудно даже отъ оныхъ сберечь.—Пчеловоды, для отвращенія мышей и крысъ, расплодившихся въ пасѣкѣ, вѣшаютъ пучокъ этой травы повыше ульевъ, и такимъ образомъ кошки безотлучно тамъ живутъ.—Такое же свойство имѣетъ и маіоранъ кошечій—*teucrium marum*, l.

2. Трава эта вмѣстѣ съ вонючею пупавкою—*anthemis cotula*, l. могутъ замѣнять дурной духъ или вонючую камедь—*ferula asa foetida*, l.: *Бодардъ*.

КРАПИВА БОЛЬШАЯ—*urtica dioica*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, растущее во всей Россіи произвольно: въ садахъ и на поляхъ, около дорогъ, по краямъ лѣсовъ и вездѣ около заборовъ, равно и по нежилымъ мѣстамъ.

Качества. Корень и трава *запаху* не имѣютъ; *вкусъ*: молодой крапивы—травяной; взрослой, при осязаніи жгучій, и производящій на кожѣ красноватые пузырьки.

Сила—молодой травы: разводящая, мочегонительная, исправляющая соки—*alterans*; сѣмянь, тоже мочегонная.

Употребленіе. Молодую траву весною варятъ въ кушаньяхъ вмѣсто шпината и другой зелени, которая служитъ кровочистительною пищею: *Соболевскій*. *Діоскоридъ* кормилъ жидкою ячною кашницею съ крапивою—*urtisana с. urtica decosta*, больныхъ слабогрудыхъ, сухотныхъ, и имѣвшихъ наклонность къ чахоткѣ.—Я тоже имѣлъ случай испытать съ успѣхомъ надъ однимъ чахлымъ грекомъ, питая его похлебкою, состоящею изъ перловой крупы, молодой крапивы, и свѣжихъ истолченныхъ улитокъ—*helix pomatia*, l. Выжатый изъ свѣжей травы сокъ, одобряется во

всѣхъ кровотеченіяхъ, а особенно въ крово-
харканіи, излишнемъ почечуйномъ теченіи,
кровоавой мочѣ, чахоткѣ, желтухѣ, почечныхъ
боляхъ, и непостоянной ломотѣ: *Списъ, Ла-
зермъ, Пленкъ*; въ цынготныхъ кровотече-
ніяхъ, крапивный сокъ давали съ успѣхомъ:
Сеннертъ, Борель, Дидье.—*Поассонье* кор-
милъ корову этимъ свѣжимъ растеніемъ,
и однимъ ея молокомъ излечилъ цынгу и
упомянутыя болѣзненные кровотеченія—*profluvia
sanguinea*. Сѣченіе старою жгучею крапивою—
urticatio, по совѣту *Цельса*, многіе врачи съ
успѣхомъ производили: въ расслабленности мы-
шечныхъ волоконъ—*atonia, s. torpor fibrarum*,
параличъ какого-либо члена, и бездѣйствіи
дѣтороднаго уда—*impotentia erectionis* (*).—Въ
падучей болѣзни и апоплексическомъ ударѣ,
Менхъ совѣтуетъ сѣчь крапивою грудь, спину
и плечи; пупырья и жгучій зудъ въ ско-
рости исчезаютъ, намазанные деревяннымъ,
или льнянымъ масломъ.—Средство это также
полезно для возбужденія утопшихъ; потому что
такое сѣченіе можетъ возстановить движе-
ніе крови въ охладѣвшемъ тѣлѣ: *Саполовичъ*;
для возбужденія пораженныхъ глубокимъ обмо-
рокомъ—*lethargici*, *Артей* сѣкъ крапивою

(*) См. *Memoires de l'Acad des sciences de Paris*, 1741
p. 103.

нижнія конечности.—Снаружи: растертые сочные листья, и сокъ оныхъ, *Діоскоридъ* клалъ въ ноздри, для остановленія непомѣрнаго носоваго кровотеченія—epistaxis, толченые съ солью прикладываютъ: къ ядовитому угрызенію бѣшеной собаки, антонову огню, раковымъ язвамъ и другимъ злокачественнымъ, не безъ успѣха. *Шмель* разваренною крапивою припаривалъ поясницу отъ почечныхъ болей.

Количество. Для палвки, полагаютъ горсть крапивы на 6 унцій горячей воды, которую, прожатую, принимаютъ по 2 унціи нѣсколько разъ въ день; или тоже количество выжатаго сока даютъ по утру и въ вечеру.—Сѣмя, растертое съ водою: отъ $\frac{1}{2}$ —1 драхмы *Ферпель* давалъ въ одышкѣ, и для утоленія каменной боли въ почкахъ; съ виномъ принятое, умножаетъ похоть: *Діоскоридъ*.

Примчанія. 1. У башкирцовъ и многихъ сибирскихъ народовъ крапивные стебли служатъ вмѣсто конопли, изъ конхъ они прядутъ нитки, дѣлаютъ сѣти рыболовныя, и ткуть холстъ въ $\frac{1}{2}$ или $\frac{1}{4}$ аршина, который послѣ варятъ въ щелокѣ для лучшаго укрѣпленія. Холстъ этотъ, хотя грубъ, но весьма крѣпокъ: *Фалькъ*.—Въ Лейпцигѣ одинъ ткачъ тоже произвелъ удачный опытъ изъ крапи-

вной пряжи: *Галле* (*). *Шефферъ* въ Регенбургѣ дѣлалъ изъ нея бумагу.

2. Крапивный корень, вареный съ квасцами, красить желтымъ цвѣтомъ яйца и шерстяную матерію;—стебли: зелено-желтымъ.

3. Сушеную траву, изрѣзанную наподобіе сѣчки, ѣсть охотно всякая скотина, а особенно смѣшенную съ гущею; у коровъ она умножаетъ молоко, дающее много сливокъ, изъ коихъ приготовленное масло имѣетъ пріятный вкусъ, и зимою даже получаетъ такой же желтый цвѣтъ, какъ лѣтомъ; сверхъ того, отъ этого корма домашнія животныя не только утучняются, но даже предохраняются отъ заразительныхъ болѣзней; по чему запасъ такового фуража для хозяйства весьма интересенъ! Крапивныя верхушки или сѣмяна, распариваемыя съ отрубями, служатъ хорошимъ кормомъ для куръ, отъ котораго будутъ они всю зиму нестись.—Высушенные листочки и сѣмяна, въ деревняхъ многіе употребляютъ, какъ лекарство, мочу гонящее.

4. Сѣченіе жгучею крапивою, въ нѣкоторыхъ параличныхъ расслабленіяхъ, можетъ замѣнить дѣй-

(*) Открытыя тайны древнихъ мажиковъ. Ч 2, стр. 448.

ствіе электричества и гальванизма: *Пимпанъ*.— Я испыталъ хорошее дѣйствіе этого средства: въ бездѣйствіи руки и ноги, и въ долговременномъ ревматизмѣ.

КРАПИВА МЕНЬШАЯ, или жигучка—*urtica urens*, L.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, растущее вездѣ почти по пустырямъ, обработаннымъ землямъ и огородамъ.

Качества—сходныя съ большою крапивою.

Сила—сѣмянъ противуглистная, притупляющая остроту мочи.

Употребленіе. Въ отварѣ одобряютъ отъ глистовъ: *Штолль*; оный же пьютъ отъ застарѣлаго кашля, кровавой мочи, или воспалительнаго мочерѣза, и мокротнаго ствольнаго теченія—*blenorrhæa*. Весною молодая крапива служитъ первою здоровою зеленью, для суповъ и вмѣсто шпината: *Розье*. Снаружи, свѣжіе толченые листы прикладываются къ язвамъ, бывающимъ около прохода, и на дѣтородныхъ частяхъ, и для очищенія головныхъ паршей.

Количество. Полунціи сѣмянъ варятъ въ 12 унціяхъ воды или молока, пока останется 10 унц. жидкости; отваръ этотъ ежедневно

пьютъ въ раздѣленныхъ приемахъ; выжатый сокъ изъ свѣжихъ листовъ даютъ отъ 2—5 унцій; сѣмя и корень даютъ въ порошокъ по 1 драхмѣ съ водою; или въ горячей наливкѣ, полагая 1 унцію на 6 унцій воды, которую *Витетъ* одобряетъ въ каменныхъ припадкахъ почекъ и мочеваго пузыря; также въ чахотномъ кашлѣ, и желтухѣ, происходящей отъ заваловъ желчныхъ органовъ (*).

Примѣчанія. 1. Крапивныя сѣмяца, собранныя лѣтомъ и высушенныя на солнцѣ, даются толченныя по горсти лошади каждый разъ съ овсомъ, т. е. поутру и вечеромъ. — Этимъ средствомъ датчане дѣлаютъ хворыхъ лошадей полнотѣлыми и лоснящимися.

2. Боль отъ ужаленія крапивы скоро проходитъ, ежели натирать ужаленныя части деревяннымъ, льнянымъ, или коноплянымъ масломъ. Это доказываетъ, что крапива жалитъ подобно насѣкомымъ и пресмыкающимся.

КРАПИВА БѢЛАЯ, или ГЛУХАЯ—*lamium album*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, вездѣ по необработаннымъ мѣстамъ, при заборахъ, по

(*) Dictionnaire universel etc. par. M. l' Abbe Rozier a Paris, 1793. T. VII. p. 303.

рощамъ въ тѣни, на рѣкѣ Камѣ и въ Сибири дико растущее.

Качества. Трава имѣетъ *запахъ* тяжелый; *вкусъ*: травяной, горьковатый.

Сила—мочегонительная, разводящая, ранощлительная.

Употребленіе. Цвѣтныя верхушки *Шпигманъ* одобряетъ, какъ мочегонительное, мѣсячногонное, и поспѣшествующее родовому очищенію средство; по испытаніямъ *Бургава*, трава и цвѣты, въ видѣ наливки и отвара употребляемые, полезны: въ разныхъ маточныхъ болѣзняхъ, истерическихъ припадкахъ, судорогахъ въ животѣ, желтяницѣ, отъ застарѣлаго кашля и удушья, жабы въ горлѣ, и воспаленій въ груди, печени, и почкахъ; *Кенигъ* одобряетъ эту наливку въ припадкахъ каменной болѣзни—*affectiones calculosæ*; выжатый сокъ изъ свѣжаго растенія, полезенъ въ маточномъ и носовомъ кровотеченіяхъ, теченіи бѣлей, золотухѣ и чахоткѣ: *Соболевскій*, *Бурдахъ*.—Снаружи, въ ваннахъ и припаркахъ употребляемая, разводитъ грудницу, и пользуетъ упомянутыя женскія болѣзни.—Цвѣтныя верхушки, настоянныя на солнечной теплотѣ съ деревяннымъ, или свѣжимъ льнянымъ масломъ, составляютъ ранощлительный бальзамъ, которымъ *Додартъ* вылечилъ

самыя застарѣлыя раны на ногахъ;—и яимѣлъ случай испытать пользу этого бальзама съ хорошимъ успѣхомъ, въ излеченіи сухожильныхъ ранъ, наливая верхушки глухой крапивы звѣробойнымъ масломъ, какъ упомянуто было прежде.

Количество. Цвѣтныхъ верхушекъ 1 или 2 щепоти наливають 6 унц. горячей воды, которую пьютъ вмѣсто чаю; травы $\frac{1}{2}$ унціи варятъ въ фунтѣ воды, пока останется 10 унц. жидкости; отваръ этотъ принимаютъ по чайной чашкѣ, 2 или 3 раза въ день, какъ выше сказано; выжатый сокъ можно принимать по 2 унціи.

Примѣчанія. 1. Молодые листья этого растенія, по свидѣтельству *Г. Линнея*, въ Швеціи употребляютъ весною въ кушанья, такъ какъ и обыкновенную крапиву; вареніемъ и выжиманіемъ теряется непріятный запахъ.

2. Глухую крапиву козы и овцы ѣдятъ охотно; коровы не много; лошади и свиньи не трогаютъ.—Домашнему скоту, выжатый сокъ изъ свѣжаго растенія даютъ отъ кровавой мочи, до полфунта (12 лотовъ), особенно коровамъ и лошадямъ.

КРАСАВИЦА, или сонная одурь; БЪШЕННЫЯ ПЕСЫИ
 ВИШНИ; ЧЕРНЫЯ ПСИИКИ; ВЪТРЯНЫЯ ЯГОДЫ—*atropa*
belladonna, I.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, въ умѣрен-
 ной Россіи по разнымъ мѣстамъ разводится
 въ ботаническихъ садахъ; дикое находится:
 въ лѣсахъ, по тѣнистымъ мѣстамъ, около
 заборовъ и въ развалинахъ.—Цвѣтетъ въ Іюнѣ
 и Іулѣ мѣсяцахъ.

Качества,—листовъ, ягодъ и корня силь-
 ныя, ядовитыя, зависящія отъ усыпительнаго
 начала, соединеннаго съ острымъ веществомъ,
 изобилующимъ водотворомъ углекислымъ.—
Вокеленъ открылъ горько-вяжущее начало ле-
 тучаго свойства, подходящее къ кислотѣ бер-
 линской лазори — *acid. bogusic.* *Запахъ*: тоже
 усыпительный; *вкусъ*: островатый и нѣсколько
 вяжущій, сухіе листы и коренья запаху почти
 не имѣютъ.

Сила—въ маломъ количествѣ побуждаю-
 щая, противусудорожная, болеутолительная,
 потогонная, разводящая и противудѣйствию-
 щая яду бѣшеныхъ животныхъ—*antilyssa*, въ
 большемъ: чрезвычайно усыпляющая, смерто-
 носная! *Діоскоридъ, Рай, Венферъ, Таль,*
Ламбергенъ, Фонъ-Свитенъ и другіе.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ угрызеніи бѣшеныхъ животныхъ, особливо собакъ, и для отвращенія бѣшенства—hydrophobia: *Мюнхъ, Шмидтъ, Рихтеръ, Гуфеландъ, Менхъ, и Меллинъ* имѣли счастливые успѣхи, такъ, что это средство можно почесть надежднѣйшимъ, и въ особенности противудѣйствующимъ—specificum antihydrophobicum! По поводу этихъ опытовъ, другіе врачи многократно испытали полезное дѣйствіе онаго же: въ меланхоліи, сумасшествіи и падучей болѣзни: *Еверсъ, Шмуккеръ, Гредингъ, Штолль, Муррай, Бергій;* въ различныхъ судорожныхъ припадкахъ, корчахъ, судорожной пляскѣ с. вита—chorea s. viti, параличныхъ разслабленіяхъ членовъ, языка, и слѣпотѣ, называемой темною водою—amaurosis: *Бургавъ, Селле, Штолль,* въ застарѣлой желтухѣ, упорной ломотѣ, особенно бедренной—ischias, судорожномъ и удушливомъ кашлѣ: *Дегнеръ, Гуфеландъ, Шефферъ, Шведіоръ, Горнъ,* въ затвердѣніяхъ внутренностей, особенно желудка, печени, кишекъ и чревныхъ железъ: *Дурлахъ, Ламбергенъ, Марто;* по его методу полезная настойка въ сказанныхъ болѣзняхъ составляется: изъ 4 унцій листовъ красавицы, 2 унц. кудрявой мяты, и 2 драхмъ шафрана; истолокши крупно, налить 2 фунта виннаго спирта, прибавивъ полунціи нашатырнаго, или оленорожнаго лету-

чаго спирта — spirit. volat. c. c. и завязавъ пузыремъ, поставить въ умеренную теплоту на 4 дни; потомъ выжать настойку и процѣдить. На эту выжимку налить опять тоже количество новаго спирта, а настоявъ, какъ сказано, смѣшать съ первою настойкою процѣженную жидкость.—На приемъ даютъ, сначала по 8 капель, съ водяною наливкою мари благовонной—*infus. chenopodii ambrosioides*, умножая постепенно: до 20—40 и 80 капель.

Кранцъ.—Въ чумѣ и чумныхъ паховикахъ: *Амуре*, *Блокъ*, *Ланге*. Снаружи, свѣжіе толченые листы, въ видѣ катаплазмы прикладываются, полезны: въ раковыхъ затвердѣніяхъ железъ, скиррѣ, и злокачественныхъ язвахъ: *Галенъ*, *Рай*, *Виллуби*, *Гатакеръ*. — *Мюнхъ* и *Алберти* тоже подтверждаютъ многочисленными примѣрами удачно этимъ средствомъ вылеченныя скиррныя и раковыя язвы. *Кулленъ* счастливо пользовалъ скирры и раки на грудяхъ и губахъ; *Дарлюкъ* привелъ въ разрѣшеніе чрезвычайную опухоль и затвердѣніе железъ; *Дегнеръ* развелъ скиррную твердость языка; *Еверсъ* съ успѣхомъ пользовалъ скиррную окрѣпость матки; *Фонъ денъ Блокъ* (*) одобряетъ во всехъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ болиголовъ—*cicuta s. conium maculatum* ника-

(*) См. *Journal de Medecine, Chirurgie etc.* T. XIV. 1761.

кого дѣйствія не оказываетъ, что самое подтверждаютъ наблюденіями: *Гейстеръ*, *Девверенъ*, *Гредингъ*, *Шмуккеръ*, *Лентинъ*, и другіе. Наливкою и отваромъ листовъ, внутрь и снаружи употребляемыхъ, излечены были грудные раки—*carcinomata* въ теченіи 17 мѣсяцевъ: *Юнкеръ*, *Алберти*, *Ламбергенъ*.—*Галенъ* и *Египета* тоже пользовали этимъ средствомъ эту опасную болѣзнь.—Винною и спиртною наливкою ягодъ этого растенія пользовали нѣкоторые кровавый поносъ и удушье.—*Геснеръ* какъ эти средства, такъ и сиропъ, изъ ягоднаго сока вареный, давалъ въ упомянутыхъ болѣзняхъ успѣшно, по чайной ложкѣ.—Свѣжими толчеными листьями и корнемъ, варенымъ къ молокѣ, прикладываемыми къ проходу, разводили весьма твердыя печечуйныя шишки, опухоль задней кишки, препятствующую испражненію, и другія выше упомянутыя скиррныя затвердѣнія железъ: *Германъ*, *Граамъ*. Равнымъ образомъ и сушеные листья красавицы, въ видѣ припарки снаружи прикладываемые, приводятъ въ разрѣшеніе упомянутыя опухоли: *Амбодикъ*. Выжатый сокъ изъ свѣжихъ листовъ, разведенный водою, *Вельтъ* прикладывалъ въ хроническомъ воспаленіи глазъ.

Количество. Должно внутрь давать съ осторожностью! сухіе листья, или корень въ

порошкѣ: по 1 грану, до 3 въ день, и мало по малу возвышать приѣмъ до 6 и 8 гранъ взрослымъ людямъ; младенцамъ: отъ $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ грана; но болѣе 2—3 гранъ никогда не даютъ. — По методу *Менха*: для предохраненія и врачеванія бѣшенства, корень этого растенія — *rad. a. belladonnæ* черезъ день даютъ въ теплой водѣ или пивѣ, взрослымъ: отъ 10—15 гранъ; младенцамъ 6-ти-лѣтнимъ: до 5 гранъ;—4-лѣтнимъ: 3 грана. Листовъ сушеныхъ (которые дѣйствуютъ слабѣе корня), взрослымъ: отъ 12—16 гранъ, и по прошествіи 48 часовъ повторяютъ приѣмъ отъ 10—13 гранъ; нѣкоторые для лучшаго дѣйствія прибавляютъ ревенъ и сладкую ртуть. — Въ видѣ наливки: 20 гранъ сухихъ листовъ наливаютъ 10 унціями кипячей воды, которую взрослымъ даютъ по 2 унц. нѣсколько разъ въ первые дни; потомъ ежедневно умножаются приѣмы, пока окажется сухость въ роту, напряженіе гортани, или круженіе головы. — Снаружи, въ видѣ присыпки и припарки, какъ выше упомянуто.

Въ аптекахъ готовятъ:

Экстрактъ, или сгущенный сокъ травы красавицы—*succus spissat. a. belladonnæ*, одобряемый въ тѣхъ же самыхъ болѣзняхъ, ко-

торый даютъ на пріемъ: отъ 1—3 грань, *Вилліе* (*).—*Демуръ* 1 часть этого экстракта, растворивъ въ 3 частяхъ чистой воды, впускалъ по нѣскольку капель въ хроническихъ воспаленіяхъ глазъ и помраченіи зрѣнія.

Примѣчанія. 1. Домашнему скоту корень даютъ въ порошокъ по 17 грань; но послѣ лекарства не должно давать корму по крайней мѣрѣ 12 часовъ (**).—Листовъ истертыхъ въ порошокъ: отъ 1—2 драхмъ.

2. Ягоды этого растенія, называемыя бѣшенными вишнями, весьма ядовиты, и по невѣдѣнію съѣденныя, причиняютъ тяжесть, сонливость, безуміе, бѣшенство, судороги и смерть.—Впрочемъ свиньи, овцы и другая скотина ѣдятъ оныя безвредно.

3. Лучшія противудѣйствующія этому яду средства суть: уксусъ, клюквенный сокъ, рвотное, теплое молоко, постное масло и смягчительныя клистиры изъ ромашки, и проч.

(*) *Pharmacopoea castr. R. p. 762.*

(**) Въ полуденной Россіи для этого употребляютъ крѣпкій отваръ тисоваго дерева—*taxus baccata*, L., растущаго въ Таврической области; но красавица можетъ оное замѣнить съ лучшею пользою.

4. Сокъ ягодъ употребляютъ нѣкоторые на крашеніе кожъ; въ Швабіи бѣдные люди дѣлаютъ изъ нихъ масло для жженія: *Северинъ*.—Итальянскія красавицы, въ старину, приготовляли изъ этого растенія умывальную воду, почему и названіе свое получило—*belladonna*. Живописцы изъ этихъ ягодъ приготовляютъ настиваніемъ оныхъ съ водою хорошую зеленую краску, годную для миниатюрной живописи: *Амбодикъ*.

5. Нѣкоторые изъ новѣйшихъ врачей употребляютъ это растеніе вмѣсто чилибухи—*strychnos pux vomica*: корня калагвалы—*rad. calgualae* и тисоваго дерева—*taxus baccata*: *Бодаръ*.

КРЕССЪ ИНДІЙСКІЙ, или КРАСУЛЬКИ; НАСТУРЦИ; ЦВѢТНОЙ САЛАТЪ; КАПУЩИНЫ—*troræolum maius*, I.

МѢСТО. Растеніе мексиканское однолѣтнее, во всей Россіи садовое, цвѣтущее во все лѣто.—Разводится сѣменами.

Качества. Трава, стебли и цвѣты свѣжіе имѣютъ *вкусъ*: редисный, острый.

Силу—разводящую, мочегонительную, противуцынготную.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Одобряютъ въ цынгѣ и худосочной чахоткѣ: *Паули*, *Шведіоръ*.—Отваръ, подслащенный медомъ, служитъ хоро-

шимъ полосканьемъ отъ молошницы—*aphtæ*:
Роке; выжатый свѣжій сокъ полезенъ въ
 каменныхъ припадкахъ мочеваго пузыря: *Гарт-*
маннъ.

Количество. Свѣжую молодую траву и
 цвѣты примѣшиваютъ, какъ здоровую и при-
 ятную, пряность къ салату, который даютъ
 цынготнымъ ежедневно кушать съ особенною
 пользою; или выжатый сокъ изъ всего ра-
 стенія, вмѣстѣ съ щавелемъ, вахотою и одуван-
 чиками, принимаютъ: отъ 1—2 унц. съ мо-
 лочною сывороткою (*).

Примѣчанія. 1. Почки, или нераспустившіе-
 ся цвѣтки, заготовляютъ въ уксуcѣ, что гораздо
 пріятнѣе каперсовъ.—Я приготовлялъ изъ капу-
 циновъ превосходные каперсы, наливая оныя эстра-
 гоннымъ уксуcомъ. Сосудъ не должно иначе зявя-
 зывать, какъ только чистымъ рѣдкимъ полотен-
 цомъ, дабы болѣе всасывался кислотворъ изъ
 атмосферы. Кромѣ соли, не нужно прибавлять ни-
 какихъ пряностей.

2. Растеніе это качествами своими замѣняетъ
 иноземныя бразильскія, наз. *aya-rapa*, et *spi-*
lanthus oleracea: *Бодаръ*.

(*) Эти противуцынготные соки оказываютъ такую
 же пользу, какъ и предложенные противуцынготные
 сборы.

КРЕССЪ ЛУГОВОЙ, или полевой СЕРДЕЧНИКЪ; ПОЛЕВАЯ ГОРЧИЦА; КОКУШНИКЪ; СМОЛЯНКА; КРЕССЪ КЛЮЧЕВОЙ—
cardamine pratensis, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, растущее вездѣ по влажнымъ лугамъ и около каналовъ, также на островахъ Невы рѣки и въ другихъ низменныхъ мѣстахъ; цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іулѣ.

Качества. Трава и цвѣтныя верхушки содержатъ островатое начало; *запахъ и вкусъ* нѣсколько къ жерухѣ подходитъ, островато-горькой.

Сила — противусудорожная, противуцынготная.

Употребленіе. Въ судорогахъ и судорожныхъ корчахъ, *Одье* имѣлъ хорошіе успѣхи; въ истерикѣ, одышкѣ сопряженной съ брюшными спазмами: *Пленкѣ*; въ желудочныхъ спазмахъ и отъ глистовъ, полезнымъ средствомъ поставляетъ *Бурдахъ*; выжатый сокъ одобряетъ *Соболевскій*: въ цынгѣ, завалахъ внутренностей, желтухѣ и водяной болѣзни.— Цвѣты, употребляемые въ порошокѣ, въ болѣзняхъ нервной системы судорожнаго свойства, *Бакеръ* испыталъ съ хорошимъ успѣхомъ — *præstans antispasmodicum* (*).

(*) См. Medical. Transact. Vol. 1 p. 442.

Количество. Молодую траву съ уксусомъ, солью и масломъ, кушаютъ вмѣсто салата; выжатый сокъ можно принимать по столовой ложкѣ съ сывороткою, нѣсколько разъ въ день; цвѣтныя сухія верхушки даютъ въ порошокъ: отъ 20 гранъ до полдрахмы, по утру и вечеромъ.

Примѣчанія. 1. Растеніе это цвѣтущее можетъ служить всякому скоту здоровою пищею, кромѣ лошадей.

2. Цвѣты, употребляемые по утру и въ вечеру отъ одного до полутора золотника, почитаются полезнымъ средствомъ отъ рѣзу въ животѣ и колики.—Иные почитаютъ особеннымъ средствомъ отъ падучей болѣзни.

КРЕССЪ САДОВЫЙ—*leridium sativum*, l.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, вездѣ садовое; цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюлѣ.

Качества. Свѣжая трава и сѣмяна имѣютъ слабое острое начало; изъ сѣмянъ *Маркграфъ* получилъ фосфоръ.—*Запахъ* свѣжей растертой травы пронизательный, жерухѣ подобный; *вкусъ* травы и сѣмянъ горьковато-острый, горячительный.

Сила—побуждающая, мочегонительная, противуцынготная.

УПОТРЕБЛЕНИЕ. Одобряютъ выжатый сокъ въ цынгѣ и мокротныхъ брюшныхъ завалахъ: *Менхъ*, *Бурдахъ*, *Жилиберъ*; въ каменной болѣзни давалъ съ пользою *Гартманнъ*; сѣмя въ водяной болѣзни и, какъ внѣшнее возбуждающее средство, одобряютъ *Иппократъ* и *Галленъ*.—Снаружи: толченая трава и сѣмя съ саломъ смѣшанная, прикладываютъ съ успѣхомъ къ головнымъ шолудямъ—*tinea* *Парре* и къ астеническимъ нечистымъ язвамъ. Этою же мазью съ пользою натирать можно злую чесотку какъ у людей, такъ и у скота.

Количество. Молодая трава, съ щавелемъ и цикоріемъ, служитъ вмѣсто салата, полезнаго для цынготныхъ; или горсть травы наливаютъ 1 фунтомъ мясной похлебки; выжатого соку даютъ по 2 унціи съ сывороткою. Этимъ средствомъ *г. Роке* въ два мѣсяца излечилъ многихъ цынготныхъ разслабленныхъ; багровыя пятна примачивалъ однимъ выжатымъ сокомъ. Толченое сѣмя дается по 1 драхмѣ съ медомъ, въ видѣ кашки.—Наружное употребленіе выше сказано, съ которымъ и внутреннее соединять должно. — Гнанную воду изъ этого растенія, *Гартманнъ* испы-

таль весьма полезною для страдающихъ каменною болѣзнію—*calculosis mire præstat.* (*)!

Примѣчанія. 1. Такое же свойство имѣютъ *крессъ дикій*—*lepidium ruderale*, иначе дикою жерухою и клоповникомъ называемый; и *перечный крессъ*, или широколистый—*lepidium latifolium*. Первый растетъ по сухимъ пустырямъ въ Ямской, надъ Лиговскимъ каналомъ, около домовъ и заборовъ въ окружности Петербурга, а второй въ тѣнистыхъ мѣстахъ, и на плодоносной почвѣ въ Куманскихъ, Калмыцкихъ, Киргизскихъ и Сибирскихъ соляныхъ степяхъ.

2. Въ недостаткѣ садоваго кресса и ложечной травы, можно этими удобно замѣнять оныя. Корень перечнаго кресса, при жеваніи возбуждаетъ слюотеченіе, и потому качествами своими можетъ замѣнять корень зубнаго жигунца—*rad. anthemidis rugethri*. Эти растенія коровы и козы ѣдятъ охотно; овцы и лошади не трогаютъ; о свиньяхъ неизвѣстно.

3 *Бодаръ* замѣчаетъ, что упомянутыя породы кресса служатъ наилучшими противуцынготными средствами, замѣняющими магелланскую и винтер-

(*) *Praxis chymiatrica*, Nor. 1677.

скую дорогія корки. Въ 1806 году издержано во Франціи, на поупку оныхъ: 39,648 франковъ серебромъ, которые могли бы остаться въ казнѣ, ежели бы Правительство обратило вниманіе на отечественныя произведенія (*).

КРЕСТОВНИКЪ ОБЫКНОВЕННЫЙ, или СТАРИНА—*senecio vulgaris*, l.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, растущее вездѣ по обработаннымъ мѣстамъ, садамъ, огородамъ и по влажнымъ пустырямъ.

Качества. Трѣва *запаху* не имѣетъ; *вкусъ* горьковато-соленый, тарвяной.

Сила—превосходная мягчительная, противуглистная, разводящая.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Отъ глистовъ, особенно круглыхъ—*lumbrici*, колики въ животѣ, желтухи и простуды; также одобряютъ въ кровохарканіи, мочерѣзѣ и теченіи женскихъ бѣлей; снаружи: въ видѣ мягчительной припарки, разводящей грудницу отъ сгустившагося молока, и другія твердыя опухоли; или въ видѣ клистира, въ брюшныхъ завалахъ — *physocia abdominalis*.

(*) Тоже можно сказать и о нашей коммерціи, или тарифѣ, касательно туземныхъ произведеній.

Количество. Внутрь даютъ выжатый сокъ по 1 или 2 унціи; для промывательнаго, полагаютъ горсть травы на фунтъ воды; толченая трава тоже служитъ хорошею умягчающею катаплазмою и раноцѣлительною: *Фогель*.

Примѣчанія. 1. Нѣкоторые одобряютъ, какъ противусудорожное средство? *Роке*.—Дѣтямъ прикладываютъ толченое свѣжее растеніе къ пупку отъ глистовъ, и для укрощенія судорожной колики: *Лентиль*.

2. Въ воспалительныхъ лихорадкахъ и огневицахъ или горячкахъ—*phlogorugæ*, выжавъ 1 фун. соку изъ свѣжаго растенія, и смѣшавъ съ 3 фунтами ячнаго ствара, давать больнымъ по чайной чашкѣ. Средство это испытано съ великою пользою.

3. Одинъ сокъ, даютъ англійскіе ветеринары лошадямъ и другимъ животныхъ отъ круглыхъ червей, наз.—*botts*, по 8 лотовъ; или 1 горсть травы, отваривъ въ 1 фунтъ воды (полбутылки) (*).

КРУШИНА, или СОБАЧЬИ ЯГОДЫ; БОЛДАНЪ—*hamnus frangula*, l.

Мѣсто. Дерево во всей Россіи нерѣдкое, растущее по влажнымъ лугамъ и мокрымъ лѣ-

(*) *Essays of Edinburgh*, 1733. Vol. 11 p. 47 Seq. et contin. 1744—1745. Vol. VII.

самъ, также на Поклонной горѣ и на островахъ Невы рѣки.

Качества. Внутренняя корка *запазу* не имѣеть; *вкусъ*: горьковато-вяжущій, приторный.

Сила—крѣпкая, слабительная, мочегонительная и противуглистная; —корневому дереву и коркѣ такія же приписываетъ силы: *дю-Гамель*. — Листы имѣють разводящую и разноцѣлительную силу: *Розье*.

Употребленіе. Какъ превосходное и безопасное слабительное средство—*tutum et gregium purgans*, одобряетъ *Меттиоль*; *Додоней* замѣтилъ, что эта корка производитъ иногда рвоту и побужденіе на низъ; это зависитъ отъ свѣжей зеленой корки, или отъ большого приема; высушенная, довольно хорошо слабитъ и гонитъ мочу; а потому многіе съ успѣхомъ употребляютъ въ отварѣ: отъ водяной болѣзни, мокротнаго кашля, удушья, желтухи, глистовъ, между-проходныхъ шишекъ—*varices ani* и чесотки: *Соболевскій*, *Шведіоръ*.—*Роке* не могъ этимъ средствомъ разрушить глистное гнѣздилище; но *Жилиберъ* корку эту, истерши съ вишневымъ клеємъ, давалъ въ видѣ пилюль съ желаемымъ успѣхомъ: отъ упорныхъ 3-дневныхъ лихорадокъ и тесемочной глисты—

t. solium.—Снаружи, въ видѣ свѣжей и вареной катаплазмы.

Количество. Въ порошокъ даютъ отъ $\frac{1}{2}$ —1 драхмы; 2 или 3 драхмы полагаютъ на 8 унцій воды для отвара. — Снаружи, въ видѣ мази: толченую среднюю корку, смѣшанную съ свинымъ саломъ, употребляютъ отъ чесотки.

Примѣчанія. 1. Въ деревняхъ простой народъ корку, или внутренний лубъ—*cortex interior s. liber.* крушины, употребляютъ какъ обыкновенное слабительное лекарство, въ порошокъ: отъ 1—2 золотниковъ; для очищенія внутренностей, даютъ и домашнему скоту, отваривъ 1 лоть толченой корки въ бутылкѣ пива, или тоже количество крушиновыхъ ягодъ, которыя помогаютъ отъ запора; и дѣйствительно она въ недостаткѣ можетъ замѣнить ремень—*r. rhabarbarum*, ялапшу—*s. jalappa*, александрийскій литъ—*cassia senna*.—Для этого оную снимаютъ въ Маѣ мѣсяцѣ.

2. Корка эта даетъ желтую краску; а красную, ежели прежде размочить въ квасцовой водѣ; но если долгое время будетъ мочена въ водѣ съ желѣзною ржавчиною; то даетъ черную краску, употребляемую фабрикантами, столярами и токарями костяныхъ издѣлій. Незрѣлыя ягоды—зеле-

ную, кошми можно красить пряжу, и шерстяная матерія.—Дерево даетъ легкій уголь, весьма способный для составленія пороха.—Изъ растертыхъ сѣмянъ можно выжимать масло.

3. Листья служатъ кормомъ коровамъ, козамъ и овцамъ; прочая скотина не трогаетъ. *Малетъ* совѣтуетъ листы крушины и ольхи мочить долгое время въ водѣ, которая можетъ употребляема быть для спрыскиванія садовой зелени и плодовыхъ деревьевъ, къ изстребленію насѣкомыхъ, пожирающихъ листы и цвѣты. *Гледичъ* совѣтуетъ разводить это деревцо на болотныхъ лугахъ для изгнания оныхъ, чѣмъ сама натура насѣ руководствуетъ.—*Дале* корню онаго приписываетъ кровоочистительное свойство—стволы этого дерева годятся для столярной работы, которое будучи очернено, не уступаетъ эбенову дереву: *Розье*.

4. Кора этого дерева и другой породы, извѣстной подъ именемъ: придорожной иглки—*gnamus catarticus*, l. по слабительному свойству, могутъ замѣнять тамариндъ индійскій—*tamarindus indica*, l. *Бодаръ*.

кунджуть, или кунчукъ—*sesamum orientale*, l.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, вывезенное изъ Китая и Японіи, которое нынѣ въ изоби-

ли разводится около Одессы, въ Болгарскихъ колоніяхъ вновь населенныхъ. — Кунджутное сѣмя и масло продаются въ Петербургъ (*).

Качества—сѣмянъ пріятно—масляныя. — У египтянъ, кунджутное масло почитается лучшимъ притираньемъ — *excellent cosmétique: Роке*.

Сила—мягчительная, питательная.

Употребленіе. Получаемое изъ этихъ сѣмянъ масло, по своему пріятному вкусу, не уступаетъ прованскому. Оно на самыхъ пышныхъ азіатскихъ столахъ въ великомъ употребленіи, и у насъ найдено лучше всякаго постнаго: для приправы разныхъ кушаньевъ и въ салатахъ. Кунджутное масло годится также и для освѣщенія, употребляемаго въ лампахъ. — Во врачебномъ искусствѣ одобряется: для смягченія болей, несноснаго зуда, сильнаго воспаления—*phlegmone*, и отъ чахлости—*marasmus*. — Азіатскіе врачи съ успѣхомъ употребляютъ оное въ эпидемическихъ поносахъ, и съ кровохарканіемъ сопряженныхъ кашляхъ. Принимая по утрамъ по столовой ложкѣ, многіе излечились отъ долговременной простуды и насморковъ. Средство это имѣло успѣхъ надъ многими больными; принимаемое съ бишевомъ

(*) См. Сѣверную Почту 1810 года. № 74.

или съ хорошимъ сладкимъ виномъ, умервщляетъ глисты. — Оно въ этомъ случаѣ можетъ замѣнить клещевинное масло — *oleum ricini communis*: *Виллие*. Втираемое въ животъ облегчаетъ колику и рѣзь въ кишкахъ; особенно же полезно, при воспаленіи кишекъ — *enteritis*, сильнѣйшемъ запорѣ, и завивной грыжѣ — *volvulus*: *Галлески*, *Бруннингъ*; по методу *Лентина*, можно давать въ жестокой подвздошной боли, сопряженной съ изверженіемъ кишечныхъ нечистотъ ртомъ — *miserege*; въ свинцовой и пиктоновой коликахъ, какъ это, такъ и льняное свѣжее масло: *Сидингамъ* и *Багивъ* давали съ хорошимъ успѣхомъ. *Брамбилла* въ этихъ мучительнѣйшихъ кишечныхъ боляхъ, предписывалъ постное масло, смѣшанное съ манною, или съ медомъ; *Кранцъ* одобряетъ: въ воспаленіи почекъ, въ припадкахъ каменной болѣзни и кровавомъ мочерѣзѣ; *Гриффитъ*, при внутреннихъ кровоизліяніяхъ — *extravasationes*, кровавомъ кашлѣ и повальной ломотѣ *rheumatismus epidemicus*, давалъ съ ревенемъ и слизью камедною; но въ соединеніи съ опиѣмъ, гораздо лучшую пользу оказываетъ: *Арнеманнъ*. Онъ же совѣтуетъ, по методу *де-Гена*, въ воспаленіи грудной плевры — *pleuritis*, втирать масло это въ бока и грудь; но предварительно пускаютъ больному потребное количество кро-

ви. — Способъ этотъ и въ другихъ грудныхъ воспаленіяхъ весьма полезенъ. — Снаружи, пользу оказываетъ при натираниі ожогъ и мѣстныхъ воспаленій: *Алпинъ*, *Гриммъ*; въ клистирахъ употребляемое, умягчаетъ спазмы и помогаетъ мѣсячному кровоочищенію: *Фогель*.

Количество. Свѣжее масло, принимаютъ по 1 унціи. — *Локостъ*, въ грудномъ колотѣѣ, возвышалъ пріемъ до 6 унцій. По методу г. *Вилліе*, приличнѣе давать можно въ видѣ масляно-мыльнаго питья — *haustus saponaceus*, полезнаго въ простудѣ, запорѣ, каменной болѣзни, отъ глистовъ и судорожной корчи, бывающей у новорожденныхъ — *trismus neonatorum* (*). — Снаружи: въ видѣ смягчительныхъ, промывательныхъ, одобряемыхъ особенно въ упомянутыхъ кишечныхъ припадкахъ, и судорожномъ ущемленіи грыжъ — *constrictio spasmica*; въ видѣ мази: для смягченія твердыхъ опухолей, членовныхъ болѣй и мышечныхъ судорогъ — *scampri*. Масло кунджутное, втираемое въ десны, облегчаетъ зубную боль, умягчаетъ боль почечуйныхъ шишекъ; смѣшанное съ яичнымъ бѣлкомъ, пользуется воспаленіе заднепроходной кишки и ожоги: *Рейсъ*. — Свѣ-

(*) Pharmacop. castrens. R. p. 264.

жіе листы тоже съ хорошимъ успѣхомъ прикладываются къ воспалительнымъ частямъ и рожѣ; въ видѣ теплой катаплазмы, истолченные и подогрѣтые листы утоляютъ боли въ животѣ, также подагру, хирагру и глазныя воспаленія; вареные въ молокѣ, составляютъ изрядную катаплазму, приводящую въ созрѣніе вереда и чирьцъ, и заживляютъ раны послѣ шпанскихъ мухъ.—Размоченныя въ уксуcѣ, или растертыя съ онымъ, истребляютъ лишай, чесотку и головныя шолуди.

Примѣчанія. 1. Конжутное масло одинакія качества имѣетъ съ льнянымъ; а потому для составленія мазей, пластырей и смягчительныхъ катаплазмъ, съ равною пользою можно употреблять и это (*).—Изъ конжутнаго масла, варенаго со щелокомъ содно—известковымъ, можно приготовить хорошее врачебное мыло—*sapo oleosus*, замѣняющее венеціанское и гишпанское—*sapo venetus et alicantinus* (**).

2. Для предохраненія отъ прогорклости, масло вылить должно въ чистую стеклянную посуду и, закупоривъ, хранить въ холодномъ мѣстѣ, или держать зарытое въ землѣ. Для очищенія масла, на-

(*) Pharmacop. castr. R. p. 250.

(**) Тамже стр. 151.

чинающаго горкнуть, предлагаютъ: а) промыть оное въ соленой водѣ, пока взмутится; б) растворъ поташа, или масло онаго—*oleum tartari p. deliquitum*, полагаемое на каждый фунтъ по 10 капель, и прибавляемыя кислоты растений, какъ-то: малина, яблоки, сливы, вишни и проч., по совершеніи бржеженія, тоже дѣлаютъ оное чистымъ и пріятнаго вкуса (*).

3. Чтобъ масло въ лампадахъ и ночникахъ смрадной копоти не производило, совѣтуютъ свѣтильню предварительно мочить въ репсковомъ укусуѣ и, высушивъ, употреблять оную для свѣчъ и лампадъ; тоже производятъ, ежели на перегнанный луковый сокъ, положенный въ лампаду, наливаютъ это масло. — А чтобы оно не скоро горѣло: то въ каждую лампу кладутъ по 1 грану простой соли.—*Галле*, для отвращенія вредныхъ слѣдствій копоти, предлагаетъ *лампаду, служащую для здоровья*, снабжать оную грецкою губкою, въ нѣкоторомъ разстояніи надъ свѣтильнымъ пламенемъ висящую, которая привязывается на проволоку сзади лампы, укрѣпленной и изогнутой на подобіе буквы г. Губку смочить водою, смѣшанною съ хорошимъ укусомъ и до половины вы-

(*) Секретный Экономъ Ч. 1. стр. 317, 318, 319.

жавъ, чтобы не канала жидкость на огонь; временемъ, когда повысохнетъ, слѣдуетъ смачивать вновь.—Онъ держалъ такую губку цѣлую зиму надъ лампою и когда выжималъ, вода истекала очерненная всосанною копотью.—Уксусъ, при теплотѣ испаряясь изъ губки, наполняетъ комнату здоровымъ воздухомъ, которую на виткѣ можно опускать и поднимать по надобности. Способъ, изобрѣтенный гг. *Крейтономъ и Кирхгофомъ* для очищенія постнаго масла, такъ, чтобы оно при жженіи въ лампахъ не производило ни запаха, ни копоти, по своей пользѣ, заслуживаетъ также одобреніе (*).

4. Опытные старожилы избавляютъ отъ насморку себя и другихъ слѣдующимъ домашнимъ лекарствомъ: ввечеру, вмѣсто всякой пищи, даютъ кушать нѣсколько дней хлѣбъ, изрѣзанный ломтиками, поджаренный въ кунжутномъ, или постномъ маслѣ.—Отъ ужаленія пчель, комаровъ и другихъ насѣкомыхъ, берутъ зеленые листы черной или красной дикой бузины—*sambucus nigra*, v. s. *ebulus*, толкутъ оные съ выжатымъ тучнымъ масломъ,

(*) Обстоятельно объ этомъ описано въ новой С. П. Б. газетѣ или Сѣверной почтѣ № 13, 1811 года и упомянуто уже было при описаніи масла, выжимаемаго изъ сѣмянъ дикой рѣвы—*oleum semin. brassicae napi* l.

потомъ, выжавъ масляный сокъ, натираютъ онымъ уязвленное мѣсто. — Когда цыпленокъ начинаеть опускать крылья, кричитъ охриплымъ голосомъ, то это пазываютъ типуномъ; разсмотрѣвъ у него голову, найдешь нѣсколько вшей, которые причиняють эту болѣзнь; чтобы истребить оныя, надлежитъ цыпленку вымазать голову упомянутымъ маслянымъ сокомъ, отъ котораго вши потрескаются, и цыпленокъ освободится отъ типуна.

5. Въ Египтѣ конжутное масло служитъ всеобщимъ лекарствомъ; оное пьютъ женщины послѣ бани, для утучненія тѣла, доставленія кожѣ нѣжной мягкости, отъ зуда, груднаго колотья, одышки, болей желудка и кишекъ и въ маточныхъ припадкахъ натираютъ животъ, или въ промывательныхъ употребляютъ: *Фогель*.

6. Рѣзуха сѣяльная, иначе мухоловка — *муаггум sativum* l. дасть столь же превосходное масло, какъ и конжутное сѣмя: *Пеириль*, *Фрибе*.

кувшинчикъ бѣлый и желтый, или водяной лапушникъ; водяныя маковки; лататье; кубышечки; кувшинцы озерныя — *пумрхаа alba et lutea*, l.

Мѣсто. Растенія многолѣтныя, растуція во всей Россіи въ болотныхъ мѣстахъ, озерахъ и тихотекущихъ водахъ; — цвѣтутъ въ Іюнѣ и Іюлѣ мѣсяцахъ.

Качества корня и цвѣтовъ: первый содержитъ смолисто-горькое начало, и большое количество клейко-мучнаго вещества, въ особенности высушенный; цвѣты имѣютъ благовонный *запахъ*, который сушеніемъ улетаетъ.

Сила. Цвѣты бѣлые и желтые утоляютъ любовожденіе — antaphrodisiaca? прохлаждаютъ и успокоиваютъ. *Авиценна* тоже дѣйствіе приписываетъ корню и листьямъ желтыхъ кувшинчиковъ—*n. lutea*; напротивъ корень бѣлыхъ кувшинчиковъ имѣетъ силу воспалять кожу и натягивать мокроты—*tubefaciens, vesicans*. —Приведенный въ муку, повтореннымъ омываніемъ услажденную, питаетъ подобно хлѣбнымъ зернамъ—*cerealia*: *Линдеръ*.

Употребленіе. Отваръ корня желтоцвѣтныхъ кувшинчиковъ рекомендуютъ, какъ хорошее смягчительное, притупляющее и охлаждающее средство, въ воспалительномъ задержаніи мочи, мочерѣзѣ, гноетеченіи, бѣляхъ, воспаленіи почекъ и другихъ внутренностей: *Діоскоридъ*;—въ астеническихъ теченіяхъ—*profluvia atonica*, *Шульцъ* давалъ винную настойку корня бѣлыхъ и желтыхъ кувшинцовъ. Цвѣты и плоды этого растенія тоже полезны; ихъ толкутъ и наливаютъ кипяткомъ, для составленія питья, утоляющаго жаръ, жажду и наводящаго сонъ: *Алиберъ*.—Или варятъ иногда

вмѣстѣ съ кореньями; отваръ этотъ болѣе хва-
 лять: въ ночномъ сѣменотеченіи или сонной
 грезѣ—*pollutio nocturna*, безсонницѣ, завалахъ
 внутренностей и желтухѣ.—Листы его, толче-
 ные, прикладываются къ воспалительнымъ опу-
 холямъ, и къ ножнымъ подошвамъ для утоле-
 нія жару.—Корень бѣлыхъ кувшинчиковъ
 (*rad. n. albæ*), разрѣзанный вдоль пластинами
 и къ подошвамъ приложенный, служитъ вос-
 паляющимъ или отвлекательнымъ средствомъ
 —*qua tubefaciens, s. revellens*. *Детардинъ*
 этимъ способомъ часто вылечивалъ трясучку,
 или перемежную лихорадку. *Соболевскій* со-
 вѣтуетъ прикладывать на затылокъ и виски
 отъ глазной боли—*ophthalmia*. Толченый
 свѣжій корень, смѣшавъ съ еловою или сос-
 новою бѣлою смолою наподобіе мази, приклады-
 ваютъ къ головнымъ паршамъ, для очищенія
 струповъ, и отращенія волосъ, вылѣзшихъ
 —*aloresia*; причемъ должно также мыть голову
 отваромъ этого корня: *Діоскоридъ*. Гнанная
 вода съ бѣлыми цвѣтами кувшинчиковъ слу-
 житъ въ Турціи косметическимъ средствомъ,
 и для составленія пріятнаго ихъ питья, назы-
 ваемаго тербетомъ: *Турнефортъ*.

Количество. Горсть бѣлыхъ или жел-
 тыхъ свѣжихъ цвѣтовъ наливаютъ 8 унц. кипя-
 чей воды; наливка эта служитъ питьемъ, какъ
 выше сказано, и болеутолительнымъ промыва-

тельнымъ: *Разсѣхъ*.—1 или 2 унціи корня желтоцвѣтныхъ маковокъ полагаютъ на фунтъ воды для отвара; нѣкоторые моютъ онымъ голову для рощенія волосъ, такъ какъ и отваромъ репейника—*decoctura rad. a. lappæ*, приготовляя съ пивомъ.

Примѣчанія. 1. Куреніемъ этихъ корней, т. е. водянаго лапушника выгоняютъ домашнихъ свѣрчковъ и таракановъ. — Другіе для умерщвленія оныхъ совѣтуютъ корень желтоцвѣтнаго кувшинчика растирать съ молокомъ, и ставить на ночь въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ эти животныя размножились. Листы и корни служатъ для дубленія кожъ.— Изъ корней можно извлекать мучное вещество, въ пищу употребляемое, способомъ, предложеннымъ при описаніи хлѣбницы болотной—*calla palustris*.

2 Простолюдины, отваривая эти корни въ водѣ или суслѣ, даютъ пить въ сухоткѣ и чахотномъ кашлѣ: *Фогель*. Отваръ этотъ полезенъ и для кормилицъ, ежели грудное молоко очень уменьшается.

3. Листы оныхъ козы ѣдятъ немного; свиньи охотно пожираютъ листы и коренья, отъ чего дѣлаются довольно жирными; другая скотина не трогаетъ.—Свѣжіе цвѣтныя лепестки имѣютъ такое же легкое усыщительное свойство, какъ и ма-

ковые: *Алиберъ*; изъ оныхъ можно готовить болеутолительный сиропъ, столько же полезный, какъ и маковый—*symplicis diascodii*: *Бодаръ*.— Цвѣты, настоянные съ деревяннымъ, льнянымъ, или инымъ постнымъ масломъ, могутъ служить хорошимъ смягчительнымъ и болеутолительнымъ средствомъ, для наружнаго употребленія: *Турнефортъ*.

КУРОСЛѢПЪ МЕНЬШІЙ, или КУРЯЧЬЯ СЛѢПОТА; порчевая помощь; очной цвѣтъ; УМЪ-ДА-РАЗУМЪ—*anagallis arvensis*, l.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, растущее въ умѣренной Россіи на сухихъ поляхъ между пашней, по дорогамъ и въ садахъ; цвѣтеть почти во все лѣто; удобно расплывается сѣмянами на тучной и влажной почвѣ.

Качества. Трава, собираемая прежде распущенія красныхъ или желтыхъ цвѣтовъ—*flore rubro v. luteo*, *запаху* не имѣетъ; *вкусъ* сначала травяной, послѣ горьковато-острый, тошнотавый.

Сила—разводящая и противудѣйствующая яду бѣшеныхъ животныхъ—*antilyssa*, но гораздо слабѣе, нежели трава вышеописанной красавицы—*folia a. belladonnae*.

Снаружи очищающая, ранозѣлительная: *Иппократъ*, *Галенъ*.

У П О Т Р Е Б Л Е Н І Е. Въ брюшныхъ завалахъ и запорѣ мѣсячныхъ кровей хваляютъ *Галонъ* и *Гофманъ*; въ желтухѣ, *Штоль*; въ меланхолии и сумасшествіи: *Кверцетанъ*, *Гартманнъ*, *Табернемонтъ*; въ песьемъ бѣшенствѣ —rabies canina: *Бенеккенъ*, *Трагъ*.—*Марольдъ*, *Равенштейнъ* и *Кемпфъ* тоже многими наблюденіями подтверждаютъ; въ падучей болѣзни, застарѣлой ломотѣ, расслабленности брюшныхъ органовъ, и въ водяной болѣзни: *Шведіоръ*, *Бурдахъ*.—Выжатый сокъ этого растенія, и въ наливкѣ употребляемый, *Розье* хвалить въ одышкѣ мокротнаго свойства—asthma pituitosum и чахоткѣ мослѣдовавшей отъ воспаленія легкихъ—phthis. post pneumonia. Снаружи *Иппократъ* порошкомъ травы присыпалъ нечистыя язвы; *Пленкъ* совѣтуетъ онымъ же присыпать ежедневно ядовитыя уязвленія бѣшеныхъ собакъ —vulnera et ulcera venenata; нюхаемый или втягиваемый въ ноздри, производитъ чихоту, помогаетъ въ насморкѣ и утоляетъ головную боль: *Турнефортъ*; выжатый изъ свѣжаго растенія сокъ и смѣшанный съ медомъ залечиваетъ глазныя раны, очищаетъ пятна, изощряетъ тупое зрѣніе и отвращаетъ началь-

ную слѣпоту — *cataracta incipiens*. *Каулинъ* и *Діоскоридъ* давали внутрь, и снаружи прикладывали подслащенный сокъ отъ угрызенія ехиднѣ. *Трагъ* употреблялъ отъ глистовъ и червей, находящихся въ кишкахъ. Свѣжая трава, вмѣстѣ съ попутникомъ истолченная, или въ видѣ припарки прикладываемая, очищаетъ головныя шолуди, золотушные струпы, и приводитъ въ созрѣніе вереда (абсцессы). Толченная свѣжая трава, настоянная масломъ деревяннымъ, или льнянымъ, которымъ смазываютъ животъ, и въ промывательное кладутъ отъ боли и колотья: *Амбодикъ*.

Количество. Въ порошокъ дается по 20 гранъ, 4 раза въ день; для наливки полагаются 2 драхмы на фунтъ горячей воды; снаружи въ видѣ присыпки, повторяемой ежедневно, пока ядовитая рана сама заживетъ; также въ видѣ сырой и вареной катаплазмы.

Примѣчанія. 1. Молодые, нераспустившіеся желтые цвѣты или почки, посоливъ, кладутъ въ укеусъ, которые употребляютъ въ кушаньяхъ вмѣсто каперсовъ.

2. Изъ зрѣлыхъ цвѣтовъ выжимаютъ сокъ, который, сваренный съ квасцами, даетъ желтую краску, способную для рисованья.—Выжатый сокъ

изъ всего растенія, Персіяне, посредствомъ хлопчатой бумаги, впускаютъ въ глаза лошадямъ для истребленія бѣльма и начальной слѣпоты—*cataracta incipiens equorum*: Гмелинъ.

3. Козы и овцы ѣдятъ траву эту безвредно, коровы и лошади не трогаютъ.

4. Бернское экономическое общество опытами подтверждаетъ, что это растеніе, собранное прежде развѣтанія, и въ порошокъ даваемое людямъ по 2 драхмы, а домашнимъ животнымъ по 1 унціи, служитъ полезнымъ средствомъ отъ водобоязненнаго бѣшенства—*contra hydrophobiam*. Розье совѣтуетъ ядовитое угрызеніе присыпать порошокомъ, смѣшаннымъ съ солью.

Л.

ЛАВАНДА, или увѣчная трава; нарцъ—*lavandula spica*, l.

Мѣсто. Растеніе полукустарникомъ растущее во всей Россіи въ садахъ; въ полуденныхъ краяхъ цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іулѣ.

Качества цвѣтныхъ верхушекъ превосходныя, зависящія отъ большаго количества летучаго масла.— *Запахъ* свѣжей и сухой цвѣтной травы благовонный, пронизательный; *вкусъ* пряно-горьковатый, горячительный.

Сила побуждающая, нервная, мѣсячногонная, разводящая.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Одобряется въ слабости нервовъ, головныхъ и маточныхъ припадкахъ: *Шиллеманъ*, *Кранцъ*; въ частыхъ обморокахъ, головокруженіи, параличѣ, трясеніи членовъ, тяжеломъ слухѣ, тупомъ зрѣніи, слабой памяти или забывчивости, безгласіи и разслабленіи языка: *Руландъ*, *Пленкъ*, *Шведіоръ*. —Снаружи, въ видѣ сухихъ или мокрыхъ припарокъ, разводящихъ мокротныя опухоли, застои влагъ, и укрѣпляющихъ параличныя разслабленія; также для разведенія отековъ, багровыхъ ушибовъ, и проч.—Ароматныя ванны съ лавандою, *Розье* хвалить въ дѣтскомъ увѣчьѣ—rachitismus, и блѣдной немочи, послѣдовавшей отъ остановки мѣсячнаго очищенія, причиненной простудою.

Количество. Для наливки полагается полгорсти цвѣтныхъ верхушекъ; или 1 драхма цвѣтовъ на 4 унціи кипячей воды, которую пьютъ вмѣсто чаю; съ прибавленіемъ 1 унціи виннаго спирта, служитъ хорошимъ поло-

сканьемъ въ упомянутыхъ разслабленіяхъ. —Винная настойка цвѣтныхъ верхушекъ, въ упомянутыхъ болѣзняхъ гораздо сильнѣе дѣйствуетъ на нервную систему, возвышая вмѣстѣ и біеніе пульса.

Консерву, изъ свѣжихъ цвѣтовъ пригото-
вляемую, *Кранцъ* совѣтуетъ принимать: отъ 1—2 драхмъ патоцахъ дряхлымъ астеникамъ, и слабымъ старикамъ. Для нервическихъ ваннъ, къ лавандѣ прибавляютъ: душицу—*origanum m.*, чаберъ—*satureia*, тимьянъ—*thymus* и богородскую траву—*serpyllum*, кои и въ сухомъ видѣ удерживаютъ проникающую свою ароматность.

Въ аптекахъ готовятъ:

1. *Лавандное масло* — *oleum lavenderulae* (*), имѣющее слишкомъ горячительную и побуждающую силу; похваляется снаружи впускаемое по каплямъ въ ядовитыя раны и уязвленія, сопряженныя съ судорогами: *Барбетъ*; смѣшанное съ виннымъ нашатырнымъ спиртомъ—*alcohol ammoniatum*, пользуется въ бездѣйствіи членовъ, и при другихъ параличныхъ разслабленіяхъ: *Менхъ*.—Ежели 1

(*) Pharmacop. Rossica, p. 229.

драхму этого масла смѣшать съ фунтомъ виннаго спирта, и прибавить такое же количество розовой воды; и нѣсколько капель росноладонной настойки—*tinctura benzoes*: то такимъ образомъ дѣлается весьма пріятное умыванье, служащее для дамскаго туалета: *Роке*.

2. *Лавандный спиртъ*—*spiritus lavenderæ* (*) тоже одобряется, какъ дѣйствительное возбуждающее и укрѣпляющее средство, особенно въ скоростижномъ упадкѣ силъ, обморокѣ и мокротномъ ударѣ.—Внутрь даютъ на сахарѣ: отъ 8—10 капель; снаружи трутъ онымъ виски, запястье рукъ, и даютъ нюхать; удерживаемый во рту, помогаетъ въ параличѣ языка, непонятномъ лепетаніи, или трудномъ выговорѣ—*balbuties* **) и безгласіи—*arhonia*: *Пленкъ*. Лаванднымъ спиртомъ полезно также натирать въ бездѣйствіи и трясеніи членовъ, въ ушибахъ, отекахъ и судорожныхъ корчахъ. *Арнеманнъ*, смѣшивая съ камфорою, укрощалъ судорожныя движенія, утолялъ боль, проис-

(*) Тамже, стр. 250.

(**) Этимъ средствомъ я имѣлъ недавно случай возстановить дѣйствіе языка послѣ параличнаго расслабленія у духовника Его императорскаго величества Г. Торопогрицкаго, втирая при томъ позади ушей, въ шею и затылокъ нервическій бальзамъ.

ходящую отъ ужаленія насѣкомыхъ, разгонялъ опухоль и воспаленіе, при томъ бывающее; также безчувственную одевенѣлость частей приводилъ въ прежнюю чувствительность.—*Акрель* таковымъ же втираніемъ разогналъ мягкую опухоль, выросшую на тѣмѣ у младенца.—Замѣчено также, что насѣкомыя лаванднаго духу терпѣть не могутъ, а по тому опрыскиваніемъ платья можно себя отъ оныхъ защищать.

3. *Курительный порошокъ*—pulvis pro suffimento (*), который могутъ замѣнить и одѣть можжевеловыя ягоды—bassae juniperi communis.

Примѣчанія. 1. Гнанное масло, и сложный лавандный спиртъ, двоенный съ розмариномъ, очень полезныя средства, снаружи употребляемая, отъ расслабленія первъ и паралича.—Я давалъ оный внутрь вмѣсто гофмановыхъ капель: отъ 10—20 на сахарѣ, при обморокахъ и истерическихъ припадкахъ, а расслабленные члены отъ паралича—membra resoluta, натираю бальзамомъ выше упомянутымъ. — Другіе хвалятъ *бальзамъ отъ паралича*, составляемый слѣдующимъ образомъ. на полбутылки сложнаго лаванднаго спирта, упомянутаго выше, полагаютъ $\frac{1}{4}$ фунта червиваго масла—liquamen lumbric. terrestr. столь-

(*) Pharmacop. castrens. R. p. 327.

ко же терпентиннаго — *ol. terebinth.* и чернаго смолянаго мыла—*sapo piceus*, 3 лота, смѣшавъ, болтать закупоренную бутылку сильно, пока все соединится. — Этимъ бальзамомъ тереть должно отнявшуюся часть помощію напитааннаго полотенца, или суконки, два раза въ день, и онымъ же, смочивъ полотенцо, обвить сраждущій членъ.— При употребленіи не должно согрѣвать, но только взболтать этотъ составъ.—Ежели нужно будетъ сильнѣйшее раздраженіе: то къ оному бальзаму прибавить можно 16 золотниковъ летучаго нашатырнаго спирта—*ammonia liquida*, или настойки шпанскихъ мухъ—*tinctura cantharid.*

2. Ежели лавандныя, цвѣтныя верхушки вмѣстѣ съ благовонною марью—*chenopod. ambrosioides* l. перегнать съ виннымъ спиртомъ—*alcohol dilutum*: то извлекается очень душистая и пріятная спиртная жидкость, замѣняющая—*l't Eau de Lavande d'Ambrée*, служащая для дамскаго туалета, и душистыхъ опрыскиваній.

3. Растеніе это служить и для украшенія садовыхъ цвѣтниковъ.

ЛАВРОВИШНЕВОЕ ДЕРЕВО, или ЛАВРОВАЯ ВИШНЯ—*prunus laurocerasus*, L.

Мѣсто. Дерево всегда зеленѣющее, довольно высокое, растущее близъ Чернаго моря, которое и въ садахъ полуденной Россіи удобно разводится; цвѣтетъ въ Іюнь.

Качества. Свѣжіе листы имѣютъ ядовитое свойство, зависящее отъ летучаго масла, соединеннаго съ усыпительнымъ началомъ, водотворно-углекислаго и азотнаго свойства, подобнаго кислотѣ Берлинской лазури—*acid. borussic.* *Шпренгелъ.* Запахъ растертыхъ листовъ тяжеловато-бальзамный, усыпительный; *вкусъ* горькій и нѣсколько вязущій, подобный периковымъ ядрамъ, или горькому миндалю—*amugdalis persica et a. communis*; сушенныя почти безвкусны.

Сила. Въ малыхъ раздѣленныхъ приемахъ усыпительная, противусудорожная, разводящая, мочегонительная; въ большомъ количествѣ: чрезвычайно ядовитая—*summe deleteria!* особенно для животныхъ.—Средство это изъ всѣхъ усыпляющихъ ядовъ—*venena narcotica* сильнѣе дѣйствуетъ на нервную систему и, непосредственно угнѣтая силу жизненную, причиняетъ скоропостыжную смерть, безъ предшествующихъ судорогъ и воспаленія внутреннихъ органовъ: *Шаубъ, Дольцъ, Спардовъ.*

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Многіе опыты остроумныхъ врачей подтверждаютъ, что это сильно усыпляющее средство, съ крайнею осторожностію употребляемое, прямо и непосредственно прекращаетъ судорожныя движенія, конвульсіи и боли, которое славные Италійскіе врачи: *Борда и Разори*, называютъ противураздражающимъ—*contrastimulans*, *Тилениусъ*, *Пиннебрингъ*, и нѣкоторые Англійскіе врачи замѣтили, что оное сильно разводитъ черную сгущенную кровь; а потому съ хорошимъ успѣхомъ предписывали въ хроническихъ завалахъ печени, селезенки, затвердѣніяхъ легкаго—*tubercula pulmonum*, брижеечныхъ железъ, и въ брюшномъ полнокрвіи—*plethora abdominalis*, происходящемъ отъ астеническаго запора почечуйныхъ или мѣсячныхъ кровей.—Въ ипохондрическихъ припадкахъ, меланхолии и сумашествіи одобряютъ: *Ланритъ*, *Тилениусъ*, *Каммеронъ*; при внутреннихъ аневризмахъ, или тѣхъ астеническихъ опухоляхъ кровеносныхъ сосудовъ, кои, дѣлая большой приливъ крови къ сердцу, причиняютъ трепетаніе онаго и стѣсненіе въ грудяхъ.—Наконецъ, для укрощенія болей, зависящихъ единственно отъ нервной слабости—*asthenia nervosa*: *Бурдахъ*.—Онъ же рекомендуетъ воду лавровишневую—*aqua laurocerasi* въ перемежныхъ лихорадкахъ и кровохарканіи, для

поощренія пасочныхъ сосудовъ, всасывающихъ, и разведенія золотушныхъ опухолей железъ; также въ брюшныхъ черножелчныхъ застояхъ, сопряженныхъ съ спазмами, бывающими у инокхондриковъ и меланхоликовъ, вода эта, прибавляемая къ раствору вино-сурмяной соли — *solotio tart. stibiati*, или даваемая съ мыльно-горькими разводящими экстрактами — *extracta amara, resolventia* оказываетъ большую пользу: *Шпренгель*. *Фанъ-Свитенъ* и *Линней* одобряютъ въ чахоткѣ молоко, варенное съ листьями этого дерева, полагая: 1, или 2 оныхъ на фунтъ жидкости, которая сообщаютъ весьма пріятный миндальный вкусъ; — однако горячая молочная наливка предпочитается, которую въ Голландіи съ желаемымъ успѣхомъ употребляли въ сказанныхъ болѣзняхъ, и скиррномъ затвердѣніи легкихъ; — также въ болѣзняхъ пасочной системы, золотухѣ и застарѣлой венерической: *Камеронъ*, *Венель*. Снаружи свѣжіе толченныя листы прикладываются къ скиррнымъ опухолямъ, раковымъ язвамъ, и застарѣлымъ венерическимъ: *Менхъ*, *Горизъ*, *Шведіоръ*. — *Гуфеландъ*, для усиленія разводящаго дѣйствія, совѣтуетъ прибавлять тяжелошпатную землю — *murias barytae*; *Бурдахъ* виносурмяную соль — *tartras stibii et potassæ*, полагая 1 часть на 3 части гнанной лавровишневой воды; — давая внутрь эти рас-

творы отъ 20—40 капель, я имѣлъ хорошій успѣхъ въ излеченіи стеническаго воспаления легкихъ—*pneumonia acuta*, чахотки, послѣдовавшей отъ затвердѣній въ семь органѣ—*phthisis tuberculosa*, и золотушной сухотки—*tabes serophulosa*, зависѣвшей отъ опухолей брыжейныхъ железъ—*tumores gland. meseraic.*

Количество. Въ видѣ перегнанной воды—*aqua stillatitia*, полагаю 1 фунтъ свѣжихъ листовъ на 2 фунта воды, которую двоить до половины.—На приемъ дается: отъ 30—40 и 60 капель, начиная съ 10, и давать по 3 или 4 раза въ день, мало по малу возвышать приемы съ большою осторожностію. Къ отверзающимъ клистирамъ по методу *Тилениуса*, прибавляется: отъ 1½—2 драхмъ. Снаружи въ видѣ катаплазмы и примочки, какъ выше сказано.—Одинъ безыменный Англійскій врачъ, прикладывая припарку, изъ этихъ листовъ и муки составленную, давая притомъ внутрь гнанной лавровишцевой воды отъ 30—60 капель, три и четыре раза въ день, видѣлъ превосходный успѣхъ въ разрѣшеніи скиррныхъ затвердѣній внутренностей, и другихъ т. п. опухолей. (*)

(*) *Practical essays on medical sybiects. Lond. 1778.*

Примѣчанія. 1. Сухіе листы теряютъ свое дѣйствіе; равнымъ образомъ и вареніемъ улетаютъ существенныя начала свѣжихъ, которыя (начала) наилучшимъ образомъ соединяются съ водою, посредствомъ перегонки.

2. По наблюденіямъ многихъ опытныхъ врачей, сколько дѣйствительное это средство, столько же и опасное, а особенно при неумѣренномъ количествѣ, можетъ скоропостижно умертвить больнаго, съ потеряніемъ всей раздражимости! *Кулленъ*.—*Дю-Гамель*, испытывая усиленную перегнанную воду съ этими листьями—*aqua sobolata laurocerasi*, давъ оной столовую ложку большой собакѣ, которая вскорости околѣла; другой, давая ежедневно по нѣскольку капель, замѣтилъ, что хворающая собака получила позывъ на кормъ, и вскорости выздоровѣла; — чахлымъ лошадямъ давалъ въ порошокъ этихъ листовъ: отъ 1 — 8 золотниковъ, умножая такое количество постепенно до 12 лотовъ.— Для рогатаго скота, средство это служить ядомъ!— Простолодины свѣжіе лавровишневые листочки по 3—4 кладутъ въ парное молоко на одинъ кувшинъ, и настоявъ пьютъ по ставану отъ чахотки. *Гартманнъ* тоже рекомендуетъ это средство: наливая 3 свѣжихъ листочка 1 фунтомъ, или полбутылкою вскипяченнаго молока, и настоявъ въ покры-

томъ сосудѣ полчаса, давать оное пить чахотнымъ по чайной чашкѣ, все количество ежедневно. *Фонъ-Свитенъ* и *Линней* тоже одобряютъ это безвредное, пріятное и полезное средство.—Французскіе повара прибавляютъ эти листы къ разнымъ кушаньямъ, дабы сообщить онымъ пріятный вкусъ горькаго миндаля: *Berrié*.

3. Средства, противудѣйствующія этому усыпительному яду—*antidota laugocerasi*, суть: молоко, мыльная вода, поташный растворъ, летучая щелочная соль, или нашатырный спиртъ—*ammonia liquida*, разведенный довольнонымъ количествомъ воды и крѣпкая кофейная наливка—*infusum coffeæ saturat.*: *Пленкъ*, *Менхъ*, *Горнъ*, *Бурдахъ*, *Меадъ*.

4. По опытамъ *Леонгардта*, равное дѣйствіе имѣютъ миндаль горькій, вишневыя ядра, персиковыя, и листы этого же дерева, которые въ недостаткѣ могутъ замѣнить лавровишневые—*succedanea fol. laugocerasi*. *Борда* присовокупляетъ также наперсточную траву—*digitalis purpurea*, авранъ дикій—*gratiola officinalis*, пасленъ черный и сладко-горькій—*solanum nigrum et dulcamara*, и т. п. усыпительныя растенія—*plantae narcoticae*.

ЛАНДЫШЪ МАЙСКІЙ, или конваллея—*convallaria maialis*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, во всей Россіи произвольно растущее въ тѣнистыхъ лѣсахъ и травянистыхъ рощахъ; находится также на островахъ Невы рѣки.—Цвѣтеть въ Маѣ и Іюнѣ.

Качества. Свѣжіе цвѣты имѣютъ *запахъ* благовонный, пріятный, сухіе теряютъ; *вкусъ* горьковато-острый, и тошнотавый ягодъ и листовъ; сухіе цвѣты не столь горьки.

Сила. Цвѣты имѣютъ чихотную, усыпительную, противусудорожную и слабительную: *Шульцъ*.—Ягоды, созрѣвающіе въ Сентябрѣ мѣсяцѣ, оказываютъ противулихорадочную, и въ падучей болѣзни полезную: *Шенкенбергъ*.—Экстрактъ, изъ свѣжихъ цвѣтовъ приготовляемый, имѣетъ слабительное свойство, подобное сабуру: *Картейзеръ*.

Употребленіе. Въ головныхъ припадкахъ, истерическихъ мокротныхъ обморокахъ, застарѣломъ насморкѣ, простудныхъ ушныхъ, глазныхъ и личныхъ боляхъ: *Пленкъ*; и при апоплексическомъ ударѣ, даютъ нюхать свѣжіе высушенные цвѣты, истертые въ порошокъ однѣ, или въ видѣ сложнаго порошка. Одобряются также въ падучей

болѣзни, и перемежныхъ лихорадкахъ, по опытамъ упомянутыхъ врачей.—*Пейриль и Вотеръ* хвалятъ экстрактъ, даваемый вмѣстѣ съ экстрактомъ вахты—extr. menyanth. trifol.

Количество. 1 драхма цвѣтовъ наливается 4 унц. кипячей воды, которую пьютъ вмѣсто чаю; винная наливка тоже весьма полезна въ упомянутыхъ болѣзняхъ.—Ягодъ сушеныхъ, истертыхъ въ порошокъ, даютъ предъ пароксизмомъ отъ 10—20 гранъ; а въ небытность лихорадки: отъ 20—40 гранъ, 2 или 3 раза въ день.—Экстрактъ дается одинъ, или въ соединеніи съ упомянутымъ горькимъ экстрактомъ, отъ 20 гранъ до полдрахмы.

Примѣчанія. 1. Листы коренные, съ известью смѣшанные, даютъ прочную зеленую или желтую краску, способную для живописи.

2. *Кулленъ* считаетъ это растеніе между ядовитыми травами; однако козы и овцы ѣдятъ оное безвредно; коровы не трогаютъ.

3. Ландышевыхъ цвѣтовъ экстрактъ, по слабительному свойству, можетъ замѣнять камедьно-смолистый сокъ скаммоніи—scammonium, и сабуръ—aloe. *Бодаръ.*

4. *Противусудорожный домашній элексиръ* по методу *Розье*, готовится слѣдующимъ образомъ: наполнивъ свѣжими цвѣтами бутылку, или иной побольше сосудъ, налить хорошею водкою, сколько оной вмѣстится можетъ; потомъ, закупоривъ плотно, выставить на солнце для настаиванія нѣсколько мѣсяцевъ. Наконецъ, процѣдивъ чрезъ чистое полотенце, выжать остатокъ, и хранить въ стеклянномъ сосудѣ, хорошо закупоренномъ.— Польза онаго испытаннаго въ продолженіи 30 лѣтъ, заслуживаетъ имѣть въ дому у каждаго добраго хозяина:—принимая по столовой ложкѣ, поправляетъ худое пищевареніе и укрѣпляетъ желудокъ, помогаетъ въ коликахъ, запорѣ кровей, обморокахъ, и въ мокротномъ прострѣлѣ—*apoplexia segosa*; втягиваемый въ ноздри понемногу ежедневно, облегчаетъ головную боль, и укрѣпляетъ слабое зрѣніе.

ЛАНДЫШЪ МНОГОКОЛѢВЧАТЫЙ; КУПЕНА; СОЛОМОНОВА ПЕЧАТЬ—*convallaria polygonatum*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, растущее въ лѣсахъ во всей Россіи, находится также въ Паргаловѣ, и вездѣ.

Качества. Свѣжій корень имѣетъ вкусъ сладковато-клейкій.

Сила смягчительная, притупляющая, очищающая—*cosmetica*.

Употребленіе. Отваръ корня одобряется въ кашлѣ, и теченіи бѣлей: *Бррдахъ*; молочный онаго отваръ полезенъ въ почечуйныхъ, и другихъ непомѣрныхъ кровотеченіяхъ; *Кудденъ*.—Снаружи въ видѣ катаплазмы, *Верлгофъ* и *Галлеръ* одобряютъ въ воспаленіяхъ матки и другихъ внутренностей; толченныя корни прикладываются для заживленія ранъ.—Отваръ листьевъ весьма полезенъ для омыванія чесотки, и примачиванія пятенъ, оставшихся послѣ оспы и кори; употребляемый внутрь, и въ клистирахъ, отвращаетъ запоры: *Соболевскій*. Свежіе листы истребляютъ бородавки на рукахъ, ежели онымъ чаще натирать: *Пленкъ*. Все растеніе, отваренное въ молоко, прикладываютъ для утоленія болящихъ почечуйныхъ шишекъ, припариваютъ онымъ ущемленные грыжи, и вертлужную ломоту—*dolor ischiatic.... Шомель*.

Количество. Полунціи корня полагается на фунтъ воды или молока для отвара, которой пьютъ по чайной чашкѣ;—снаружи въ видѣ смягчительной припарки, одобряемой въ сухихъ воспаленіяхъ, ранахъ и проч.

Примѣчанія. 1. Коренья этого растенія, содержащая крахмальное вещество, въ голодные вре-

мена могутъ служить для печенія хлѣба, ежели прибавить малое количество ржаной муки; а молодые онаго стебли и побѣги, Турки употребляютъ вмѣсто спаржи, которые, приправленные съ уксусомъ и масломъ, составляютъ лакомое кушанье.—Зрѣлыя ягоды бываютъ красныя и черныя;—съѣденныя отъ 12—15, возбуждаютъ рвоту.—Крестьяне пьютъ отваръ этого растенія отъ ломоты, и припариваютъ онымъ чревыя болящія опухоли, а свѣжее, истолокши, прикладываютъ для заживленія ранъ.—Деревенскія дѣвки выжатымъ сокомъ изъ корней купены притираютъ себѣ лицо, для очищенія онаго, и доставленія привлекательнаго румянца; и дѣйствительно дѣлаются краснолицыми отъ нѣкоторой остроты онаго.

ЛАСТОВИЧНЫЙ КОРЕНЬ, или ЛАСТОВИЧНИКЪ; СТРУЧЕЧНИКЪ; ЧЕРТОВА БОРОДА; ПРОТИВУЯДНАЯ ТРАВА, СТРУЧКОВАТОЕ ЗѢЛЪЕ—*asclepias vincetoxicum*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, въ умѣренной Россіи произвольно растущее въ лѣсахъ, рощахъ и при заборахъ; также: на Окѣ, Дону, Медвѣдицѣ и Сурѣ; въ Сибири: отъ Урала до рѣки Иртыша. Цвѣтетъ въ Іюнь и Іюль.

Качества. Свѣжій корень испускаетъ молочный сокъ, нѣсколько ядовитый; *запахъ* имѣетъ пронизательный, толшоватый, по содержанию экстрактно-остраго вещества.

Вкусъ—нѣсколько острый, и пряно-горьковатый, подобный вергинскому змѣвику—*a. serpentaria*.

Сила побуждающая, разводящая, мочегонная, свѣжаго корня рвотная, подозрительная!
Галлеръ.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ мокротныхъ завалахъ, запорѣ кровей, и водяной болѣзни, многихъ удачно пользовалъ: *Дюрръ* и *Трагъ* въ сыпяхъ, скрывшихся внутрь, золотухѣ и зобахъ—*strumæ*, одобряетъ *Ельснеръ* (*). Толченый корень и листы, снаружи тоже съ успѣхомъ прикладываются: къ затвердѣлымъ болящимъ железамъ, груднымъ опухолямъ и нечистымъ язвамъ: *Турнефортъ*, *Гофманнъ*. — Въ венерическихъ болѣзняхъ, внутрь и снаружи одобряетъ *Дебоа Рошфоръ*.

Количество. Для отвара полагается отъ 4—8 драхмъ на фунтъ воды; сушеной дается въ порошокъ отъ 20 гр. до полдрахмы.

Примѣчанія. 1. Корень этотъ можетъ въ недостатокъ замѣнить безвременный цвѣтъ—*colchicum autumnale*; морской лукъ—*scilla maritima*, и даже контраверку—*dorstenia contrayerva*, и виргин-

(*) Польза отвара этого корня, въ упомянутыхъ болѣзняхъ, подтверждается: in *Ephem. N. S. Dec. 1. Ann. 1. № 57 p. 153.*

скій змѣвикъ—*a. serpentaria*, одобряемая въ злокачественныхъ лихорадкахъ и горячкахъ, сопряженныхъ съ опаснымъ поносомъ; настоящаго 1 унцію въ фунтѣ винограднаго вина давать по столовой ложкѣ, 2—3 раза въ день;
Фогель.

2. Замѣчено, что овцы траву этого растенія ѣдятъ охотно и безвредно; домашнимъ животнымъ отъ заразы, закрутки железъ и кашля, сушеный корень дается въ порошокѣ: отъ 2—4 лотовъ. Свѣжее толченое растеніе прикладываютъ къ ядовитымъ угрызениямъ животныхъ: *Витетъ.*

ЛЕБЕДА САДОВАЯ БЛѢДНОЗЕЛЕНАЯ И КРАСНОБУРАЯ—
atriplex hortensis pallida et rubra.

Мѣсто. Растеніе однолѣтное, растущее вездѣ на обработанныхъ земляхъ, въ огородахъ, садахъ и на поляхъ; также произвольно на островахъ Невы рѣки, около Сясты, Урала и проч. Сѣмянами скоро размножается; цвѣтеть въ Іюнѣ и Іюлѣ.

Качества. *Трава безвкусна и запаху не имѣетъ.

Сила мягчительная, разводящая, слабительная; сѣмянъ: рвотно-слабительная.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Хотя въ поварняхъ составляетъ мало-питательную пищу; однако по замѣчаніямъ *Иппократа* и *Галена*, полезно весною кушать страждущимъ брюшными завалами, желтухою, и частыми запорами.— Снаружи, лебеда служитъ смягчительною припаркою, облегчающею подагрическія боли, почечуиыя шишки, и другія болящія опухоли; въ клистирахъ вареная, съ прибавленіемъ льнянаго масла и меда, разводитъ сгущенныя мокроты, и на низъ слабить: *Соболевскій*.— Листья и цвѣтъ красной лебеды *Динцъ* совѣтуетъ пить вмѣсто чаю, для разведенія вязкихъ мокротъ и отъ хрипоты.— Сѣмяна садовой лебеды, принятыя внутрь до 1 драхмы, возбуждаютъ рвоту, и слабятъ низомъ: въ меньшемъ количествѣ, почитаются особеннымъ средствомъ для страждущихъ англійскою болѣзною—specific. gachiticis: *Фогель*.

Примѣчанія. 1. Ее ѣтъ охотно всякая скотина, кромѣ лошадей.

2. Въ неурожайные годы, изъ сѣмянъ лебеды дѣлаютъ муку, которую, мѣшая ея малымъ количествомъ ржаной, пекутъ хлѣбъ.—Свѣжая молодая трава вмѣстѣ со щавелемъ, будучи варена съ рыбою или мясомъ, заступаетъ у крестьянъ мѣсто свѣжей и кислой капусты.—Нижегородскіе

жители, изъ зрѣлыхъ сѣмянъ дѣлають крупу, которая, будучи варена съ молокомъ, составляетъ довольно вкусную и питательную кашу: *Амбодикъ* (*).

3. Въ деревняхъ лебедѣ приписываютъ то особенное свойство, что она вытягиваетъ изъ тѣла занозы; на этотъ конецъ прикладывается свѣжая толченая трава къ большому мѣсту, гдѣ имѣется заноза, которая въ продолженіи нѣкотораго времени сама выходитъ;—равнымъ образомъ и ноготѣду—*ragoynchia* вылечиваютъ, которую иные называютъ волосатникомъ.

ЛЕВКОЙ ЖЕЛТЫЙ, или ЖЕЛТАЯ ФІАЛКА; РУКОЦВѢТЪ—*cheiranthus cheiri*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, растущее произвольно въ жаркихъ климатахъ по утесамъ и старымъ стѣнамъ; въ Россіи вездѣ садовое, и удобообразимое сѣмянами.

(*) Онъ же въ своемъ Врачебномъ Веществословіи кн. 2, стр. 332 пишетъ, что сѣмянами лебеды, цѣлые уѣзды избавились отъ печальныхъ слѣдствій голода, приведя къ тому нашу общенародную пословицу: то еще не бѣда, когда есть лебеда.

Качества. Свѣжіе цвѣты имѣютъ *запахъ* благовонный, зависящій отъ летучаго начала; *вкусъ*: горьковатый и нѣсколько острый.

Сила—болеутолительная, нервная, разводящая, очищающая.

Употребленіе. Цвѣты одобряются для утоленія головной боли, и отвращенія судорогъ: *Турнефортъ*. *Рейснеръ* употреблялъ съ успѣхомъ, для предохраненія отъ удара и паралича; — *Шпильманъ* хвалитъ въ запорѣ мѣсячныхъ кровей; *Бурдахъ*, въ завалахъ внутренностей, особенно печени; также въ астеническихъ припадкахъ матки, и непорядочномъ родовомъ кровоочищеніи; выжатый изъ цвѣтовъ сокъ, смѣшавъ съ яичнымъ свѣжимъ желткомъ, *Крамеръ* давалъ съ успѣхомъ отъ кроваваго поноса; отъ желтухи и черножелчныхъ застоевъ, причиняющихъ меланхолію: *Шульцъ*. Выжатый сокъ изъ всего растенія, съ молочной сывороткою можно употреблять, какъ полезное противуцыготное средство, особенно въ соединеніи съ свѣжимъ щавелемъ и капуцинами: *Бергій*. — *Пленкъ* вдвухвалъ порошокъ въ глазъ, для очищенія бѣльма—leucoma. — Масломъ, настоящимъ съ этими свѣжими цвѣтами, натираютъ части, страдающія ревматизмомъ.

Количество. Горсть цвѣтовъ наливають 4 или 6 унціями кипячей воды, которую, настоявъ и подсластивъ, пьютъ по чайной чашкѣ; для вишняго употребленія, сушеные цвѣты трутъ мелко по равной части съ сахаромъ, и посредствомъ пера, или трубочки, вдувають въ глазъ.—Въ видѣ припарки, листы и цвѣты употребляются для разрѣшенія—*scopo discutiente*.

Примчанія. 1. Цвѣты эти, вмѣсто желтой фіалки, служатъ обыкновеннымъ украшеніемъ садовъ, и даютъ желтую краску, способную для рисованія. Ежели желательно имѣть эти цвѣты двойные или махровые: то секретъ состоитъ въ томъ, что сѣмена оныхъ должно садить во время затмѣнія луны: *Розье*; мнѣ кажется, что это болѣе зависеть отъ сѣмянъ своей породы, и хорошаго качества оныхъ.

2. Настоянные въ виноградномъ винѣ, употребляютъ опытные бабки въ трудныхъ родахъ, и для изгнанія послѣда, или дѣтскаго мѣста;—съ нивомъ и водою вареные, употребляютъ въ желтухѣ, и остановкѣ кровей; гниаюю водою примачивають больные глаза и веснушки.

ЛЕНЪ ДИКІЙ, или ЛЬНЯНЫЙ ЖАРБЕЙ; МАЛЫЙ ЖАРБЕЙ;
ЛЪВИНЫЯ УСТА; ЛЬНЯНКА—*antirrhinum linaria*, l.

Мѣсто. Растеніе двухлѣтное, или многолѣтное, во всей Россіи произвольно растущее, на необработанныхъ мѣстахъ въ Сибири, и въ С.-Петербургской округѣ: по сухимъ полямъ, пашнямъ, и около дорогъ: въ Паргаловѣ, Лиговѣ, въ Стрѣлиной, и на островахъ Невы рѣки находится; цвѣтетъ во время большихъ жаровъ.

Качества—травы превосходныя, имѣющія *запахъ*: нѣсколько летучій, противный, усыпительный; *вкусъ*: горьковато-соляной, непріятный.

Сила смягчительная, болеутолительная, разводящая, мочегонная и слабительная.

Употребленіе. Трава и цвѣты въ видѣ наливки, одобряются въ запорѣ мочи, каменныхъ припадкахъ, желтухѣ и водяной болѣзни: *Бурлавъ*, *Линней*, *Шведіоръ*, свѣжая толченая трава съ цвѣтами, прикладывается къ воспалительнымъ геморроидальнымъ шишкамъ; или вареная съ молокомъ, въ видѣ катаплазмы: *Горстъ*. *Пленкъ* совѣтуетъ прикладывать къ больнымъ шишкамъ выжатый сокъ, смѣшанный съ квасцами; *Горстъ* этимъ средствомъ помогалъ въ запорѣ мочи, и глухомъ или за-

крытомъ почечуѣ—*haemorrhoides saesa*, утоляя боли и разгоняя шишки, помощію припарки и промывательныхъ, съ льнянкою приготовленныхъ. *Паул* рекомендуетъ примачивать выжатымъ сокомъ воспаленіе глазъ.—Сокъ, выжатый изъ всего растенія, смѣшавъ съ свѣжимъ коровьимъ масломъ, или саломъ, составляетъ хорошую смягчительную мазь—*ungv. linariae*.

Количество. Горсть цвѣтной травы наливается 6 унц. кипячей воды, которую, подсладивъ, принимаютъ каждый часъ, или чрезъ 2 часа по двѣ столовыхъ ложки. Снаружи въ видѣ припарки, мази, какъ сказано выше.—Гнанная вода, съ цвѣтнымъ растеніемъ, служитъ притирательнымъ средствомъ—*aqua cosmetica*, очищающимъ угреватое лицо.

Примѣчанія. 1. *Линней* замѣтилъ, что мухи, садясь на цвѣты этого растенія, усыпаютъ и околѣбаютъ; а потому въ Швеціи держатъ оное на окошкахъ, для истребленія мухъ; или ставятъ тарелки съ молокомъ, въ которомъ растертъ дикій ленъ.—Этимъ средствомъ примачиваютъ и воспалительныя раны, или сильно болящія язвы.

2. Козы и овцы мало ѣдятъ оное; коровы, лошади и свиньи вовсе не трогаютъ.—Пчелы изъ цвѣтовъ собираютъ много меду.

лещь кокушкинъ; волосистый мохъ—*polytrichum commune*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, по влажнымъ лѣсамъ и тѣнистымъ лугамъ между мхамъ растущее, особенно около Муринна, Охты, и въ другихъ мѣстахъ образуетъ великія кочки.

Качества. Трава имѣетъ *вкусъ вяжущій*.

Силу разводящую, потогонную, грудную.

Употребленіе Въ грудныхъ мокротныхъ припадкахъ, простудномъ кашлѣ и удушѣ одобряетъ *Иппократъ*, въ грудномъ колотѣ: *Турнефортъ*. Отваромъ этого растенія моютъ голову для отращенія волосъ, когда оныя послѣ горячки вылѣзли: *Галенъ*.

Количество. Горсть травы варятъ въ 12 унц. воды, пока укипитъ половина жидкости, которую, подсластивъ медомъ, пьютъ вмѣсто сбитню; съ прибавленіемъ краснаго вина, *Соленандръ* одобряетъ въ непомѣрномъ теченіи мѣсячныхъ кровей—*menstrua nimia*.

Примѣчанія. 1. Ланонцы, живущіе по лѣсамъ, дѣлаютъ себѣ постели изъ этого растенія; медвѣди тоже собираютъ онаго великое количество для берлога, въ которомъ всю зиму живутъ.—

Въ Финляндіи, за неимѣніемъ соломы, я дѣлалъ тюфяки или постель изъ этого мшистаго растенія для больныхъ. — Въ Голландіи и Англии этимъ мохомъ тоже набиваютъ матрацы.

2. Его кладутъ также промежъ каменьевъ, когда каналы устилаютъ, чтобы оныя не осыпались и другою травою не заросли.

ЛЕНЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ—*linum usitatissimum*, L.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, съемое изобильно во всей Россіи на поляхъ, имѣющихъ крѣпкую и нѣсколько мокрую почву. — Въ Сибири растеть дико. *Linum perenne*, L.: *Палласъ*.

Качества—сѣмянь клейко-масляныхъ, содержащихъ малое количество бѣлочно-сахарнаго вещества: *Шпренгель*; *запаху* не имѣютъ; *вкусъ* — тоже клейкій, сладковато-приторный.

Сила притупляющая, мочегонительная, смазывающая жесткія и разѣденныя части.

Употребленіе. Клейкій отваръ, или наливку льнянаго сѣмяни, *Иппократъ* давалъ: въ болѣзняхъ мочевыхъ путей, особливо въ воспалительномъ мокротномъ теченіи—*Benenog-*

rhagia.—Новѣйшіе врачи хвалятъ: въ хрипотѣ, перхотѣ, простудномъ кашлѣ, воспаленіи легкихъ, одышкѣ и трудномъ отдѣленіи мокроты: *Ridley*.—Въ воспалительномъ запорѣ мочи, наливка этихъ сѣмянъ, равно какъ и конопляныхъ, съ прибавленіемъ 1 драхмы селитры на 2 фунта жидкости, подслащенной уксусомъ, или клюквеннымъ вареньемъ—good oxusossi, оказываетъ большую пользу; также и въ передоинномъ мочерѣзѣ, принимаемая по чайной чашкѣ нѣсколько разъ въ день.—Снаружи: въ видѣ полосканья, подслащенного медомъ, одобряется въ жабѣ и молошницы во рту; въ видѣ промывательнаго, смягчающаго боль въ кишкахъ, рѣзы и частыя потуги—tenesmi, нерѣдко сопряженные съ кровавымъ поносомъ; въ видѣ припарки: толченныя сѣмяна, варенныя съ молокомъ, служатъ самую лучшую смягчительную катаплазму, употребляемую при твердыхъ воспалительныхъ опухоляхъ, особливо нарывахъ, паховикахъ. и проч.

Количество. Отъ $\frac{1}{2}$ —1 унц. полагается цѣльныхъ сѣмянъ на 2 фунта кипячей воды, которую, вскипятивъ однажды и процѣдивъ, внутрь и снаружи употреблять, какъ сказано выше.—Склизь, изъ сѣмянъ извлекаемая вареніемъ, или наливкою горячей воды, полагая 1 унц. сѣмянъ на 6 унцій воды, замѣняетъ:

проскурнячую—mucilago altheae offic., квітнуую — р. cydoniae, трагакантовую— a. tragacantha et a. gummifer и арав. камеди—minosae п., которую, смѣшавъ съ медомъ, *Розенштейнъ* совѣтуетъ помазывать дѣтямъ во роту, для очищенія молошницы и другой сыпи; также и въ другихъ случаяхъ можно оную употреблять вмѣсто упомянутыхъ камедей и другихъ слизей, употребляемыхъ въ кровавомъ поносѣ, моче-рѣзѣ, воспаленіи горла, желудка и кишечнаго канала: *Бодаръ*.

Масло льняное—oleum sem. lini п., выжимаемое безъ поджариванія сѣмянъ, нѣскоро горкнетъ, и можетъ для недостаточныхъ людей служить вмѣсто деревяннаго и миндалянаго масла; употребляется отъ глистовъ всякаго рода, вмѣсто клещевиннаго—ol. ricini с.; также въ подвздошной боли—ileus (*), свинцовой колкѣ, и сухомъ запорѣ. *Галлескій, Лентинъ и Брамбилла* давали внутрь по нѣсколько унцій, смѣшавъ оное съ медомъ и

(*) Въ этой мучительной болѣзни, нерѣдко сопряженной съ кальной рвотою—meserere, я имѣлъ случай спасти одного страдальца, смѣшавъ льнянаго масла 6 унцій, съ равнымъ количествомъ маковаго сиропа *symplic. diacodii*, и давалъ каждый часъ по столовой ложкѣ.—Доденей и Фанъ-Свитенъ, въ подобныхъ случаяхъ тоже давали средство это до 1 фунта въ день.

прибавляли къ клистирамъ; *Михель и Гриффитъ*, смѣшивая съ свѣжимъ яичнымъ желткомъ, употребляли съ успѣхомъ въ кровохаркаціи, легочномъ нарывѣ—empyema и гнойной чахоткѣ; *Бертеле*, такое смѣшеніе хвалить для притупленія острыхъ ядовитыхъ веществъ, въ кровавомъ поносѣ, при частыхъ потугахъ на низъ, и рѣзѣ въ кишкахъ. *Мидлетонъ и Гамилтонъ*, по столовой ложкѣ этого свѣжаго масла, давали въ геморроидальныхъ спазмахъ, каменныхъ боляхъ почекъ, или мочеваго пузыря.—*Сидешамъ, Багливъ, Геснеръ и де-Генъ*, хвалятъ въ грудномъ колотѣ воспалительнаго свойства—pleuritis sthenica; не менѣе свѣжее льняное масло полезно и въ кровоплеваніи, происходящемъ отъ спазмовъ, и раздраженія легочныхъ сосудовъ; *Роке*, при воспалительной и судорожной коликѣ, совѣтуетъ втирать въ животъ масло это, смѣшанное съ камфорою—oleum camforatum, полагая 2 лота на полбутылки; масло это, прибавляемое къ промывательному, по 2—3 лота, тоже большую пользу оказываетъ въ упомянутыхъ боляхъ. *Шведіоръ* рекомендуетъ натирать члены, страдающіе ломотою, при уязвленіи ядовитыхъ насѣкомыхъ, и для скорѣйшаго нагноенія нарывовъ или абсцессовъ.—Тожо полезно натирать бока, въ грудномъ колотѣ; животъ, при брюшныхъ спазмахъ и сильныхъ

запорахъ на низъ; поясицу, при колкѣ въ почкахъ, и проч.

Количество. Внутрь свѣжее масло даютъ по 1 или 2 унціи и больше, нѣсколько разъ въ день; къ промывательнымъ примѣшивается по 3 или 4 унціи, которые особенно при ущемленной грыжѣ отъ затвердѣвшихъ нечистотъ, производятъ отличное пособіе. Льняную наливку сѣмянъ, смѣшавъ по равной части съ этимъ же свѣжимъ масломъ, впрыскиваютъ въ мочевою каналъ, при воспалительномъ моче-рѣзѣ и перелѣ—*hemorrhagia*. Снаружи припариваютъ ущемленное мѣсто льняною паклею, напитанною теплымъ масломъ (*).—Онымъ же смазываютъ: больныя почечуйныя шишки, устье маточнаго рукава при трудныхъ родахъ, ожоги, и втираютъ въ десны при воспаленіи оныхъ, и отъ зубной боли: *Беймлеръ*.—Ежели $\frac{1}{2}$ фунта льнянаго масла смѣшать съ 4 свѣжими яйцами; то такимъ образомъ составляется весьма хорошая домашняя *мазь отъ ожога*, которою помазываютъ помощію кисточки обожженные мѣста ежедневно, пока заживутъ.—Иные смѣшиваютъ оное же масло съ равнымъ количествомъ известковой воды,

(*) Посредствомъ этой припарки и упомянутыхъ клистировъ, я нѣсколько разъ удачно влагалъ ущемленную грыжу въ свое мѣсто многимъ людямъ.

и такимъ же образомъ употребляютъ; другіе составляютъ *мазь отъ ожоги*, тоже полезную, слѣдующимъ образомъ: на $\frac{1}{4}$ фунта льнянаго масла, полагаютъ 4 золотника желтаго воска, столько же второй зеленой истолченой кожи бузиннаго дерева, и распустивъ на огнѣ въ глиняномъ горшкѣ, вымѣшивая четверть часа, потомъ прожать сквозь полотенце. Когда остынетъ, намазавъ на ветошку, приложить къ обожженной части, перемѣняя два раза въ день, пока заживетъ. Когда ожога столь сильна, что кожа ссажена, или долой сошла: то въ такомъ случаѣ полезно помазывать маслянымъ смѣшеніемъ съ известковою водою, или масломъ, смѣшаннымъ по равной части съ медомъ, присыпая сверху бобовою мукою, до заживленія. Если случится, что глаза будутъ обожжены и сильно воспалены: то смѣшавъ толченыхъ льняныхъ сѣмянъ по равной части съ сухими розовыми цвѣтами—fl. rosarum, и завернувъ въ полотенце, окунуть въ горячую воду, и эту тепловатую припарку прикладывать къ поврежденнымъ глазамъ, повторяя нѣсколько разъ въ день.

Въ аптекахъ готовятъ.

1. *Наливку льнянаго сѣмянъ*—infusum sem. lini usitat. (*), которую можно употреблять

(*) Pharmacop. castrens. R. p. 269.

во всѣхъ вышеупомянутыхъ болѣзняхъ, по 2 или 3 унціи каждый часъ.

2. *Мягчительную припарку*—cataplasma emolliens (*), ускоряющую нагноеніе вередовъ, чирьевъ и другихъ воспалительныхъ опухолей.

Примѣчанія. 1. Льняное масло дѣлаютъ подобнымъ деревянному и мицдальному, ежели, смѣшавъ оное съ водою; поддержать нѣсколько времени въ свинцовой посудѣ; однако масло это въ пищу, по вредности свинцовыхъ частицъ, не годится; но для живописи и лаковъ очень хорошо.—Масло это скоро сохнетъ; а потому пригодно для живописцевъ и книгопечатанія.—Прогорклое масло поправляютъ, промывая горячею водою: *Бергій.* — *Палласъ* замѣчаетъ, что въ Сибири дѣлаютъ изъ него лакъ для мѣдной, желѣзной и деревянной посуды, который не уступаетъ Китайскому; именно: варятъ это масло съ глетомъ—lythargium, до надлежащей густоты, и прибавляютъ сажу, сколько потребно для черноты; потомъ намазываютъ посуду 7, 8 и 10 разъ, просушивая каждый слой въ теплой печи.—Для домашняго же или повареннаго употребленія, очищаютъ масло это посредствомъ сѣрной кислоты, по методу *Г. Кирюфа.* Этимъ способомъ

(*) Р. 230.

очищенное, можетъ замѣнить: клещевинное масло—*ol. ricini c.* деревянное—*ol. o. Europeae*, и миндальное—*ol. amygdali c.*

2. Лепешки или сбойны, остающіяся по выжимкѣ масла, примѣшиваютъ къ корму для рогатаго скота, отъ котораго коровы получаютъ примѣтное умноженіе молока, изобилующаго масломъ.

3. Обыкновенное моченіе льна, такъ какъ и конопля, въ рѣчкахъ и прудахъ, сообщаетъ водѣ противный запахъ и вкусъ, умерщвляющій рыбу; равно и для людей, употребляющихъ такую воду, бываетъ вредно: *Pittterъ*.

4. *Розье* замѣчаетъ, что льняное сѣмя, хранимое въ мѣшкахъ, портится и горкнетъ; почему и выжимаемое изъ оныхъ масло бываетъ тоже прогорклое—*ol. rancid.* Для полученія хорошаго масла, слѣдуетъ эти сѣмяна содержать въ сухомъ мѣстѣ, на открытомъ воздухѣ; обжариваніе оныхъ, и выжиманіе помощію нагоряченныхъ плитъ, тоже ускоряетъ порчу этого масла.

ЛЕНЪ ПРОПУСКНОЙ, или СЛАБИТЕЛЬНЫЙ; КОКУШКИНЪ
ЛЕНЪ—*linum catharticum*, L.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, въ умѣренной Россіи произвольно растущее, на поляхъ

и влажныхъ лугахъ; въ С. Петербургскомъ округѣ: около Царскаго и Краснаго сель, въ окружности Дудеровыхъ горъ, также на Окѣ, Сурѣ, и въ другихъ мѣстахъ.

Качества. Трава *запаху* не имѣеть; *вкусъ*: горьковато-соляной, тошноватый.

Сила:—хорошая слабительная, безъ всякаго отягощенія желудка, и мочегонительная.

Употребленіе. Въ болѣзняхъ, происходящихъ отъ засоренія кишечнаго канала—*morbi saburrales*, летучей или непостоянной ломотѣ, начальной водяной болѣзни, и въ каменной боли почекъ, или мочеваго пузыря: *Шлевогтъ*, *Пленкъ*, *Шведіоръ*.—Иные настаиваютъ растеніе это въ бѣломъ виноградномъ винѣ, и пьютъ по рюмкѣ въ сказанныхъ болѣзняхъ.

Количество. 2 драхмы сушеной травы наливаютъ 6 унціями кипячей воды, или сыворотки; въ порошокъ дается по 1 драхмѣ; для винной настойки полагается сушеной травы 1 унція на бутылку, и по прошествіи 12 часовъ, сливаютъ процѣженную жидкость.—Я такимъ же образомъ настаивалъ маковое и льняное масло, которое многимъ, страдающимъ

глистами, давать съ равною пользою вмѣсто клещевиннаго: отъ 1—2 унц. взрослымъ; отъ 1—4 драхмъ малолѣтнимъ.

Примѣчанія. 1. Растеніе это можетъ совершенно замѣнить сенну, или слабительный александрійскій листь—с. seppa, которое можно употреблять во всѣхъ случаяхъ, гдѣ потребно будетъ слабительное лекарство; также вмѣсто ревеня и ялапы.

2. *Домашнее слабительное питье* — *potio laxativa domestica*, можно составлять такимъ образомъ: на 1 лоть сухихъ листовъ слабительнаго льна, налить пивной стаканъ горячей воды, прибавить къ тому: 1 золотникъ сѣмянъ волоскаго укропа—*a. fœniculum*, или анису, и 2 золотника солодковаго корня; настоявъ полчаса, процѣдить, и принимать чрезъ часъ по чайной чашкѣ, пока послабитъ.

3. Козы, овцы и лошади ѣдятъ эту траву; коровы и свиньи не трогаютъ.

лилія бѣлая, или кринъ—*lilium candidum*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, растущее въ нашихъ садахъ безъ приемотру.—Смотря по климату, цвѣтетъ въ Іюль и Августъ мѣсяцахъ.

Качества. Луковичный корень *запаху* не имѣеть; свѣжихъ цвѣтныхъ лепестковъ *запахъ* крѣпкій, пріятный, который сушеніемъ теряется; *вкусъ*—луковиць весьма клейкій, зависящій отъ изобилующей слизи, которая составляетъ $\frac{1}{4}$ часть вѣса оныхъ.

Сила корня смягчительная; цвѣтовъ: ободряющая, болеутолительная, уменьшающая болѣзненное напряженіе частей: *Шпренгель*.

Употребленіе. Растертыя луковицы снаружи прикладываются въ видѣ смягчительной катаплазмы, для нагноенія твердыхъ воспалительныхъ опухолей. — По свидѣтельству *Шпилманна*, нѣкто *Годеръ*, сокъ лилейныхъ луковиць, смѣшавъ съ яичною мукою — *farina hordeacea*, пекъ лепешки, коими вылечивалъ страждущихъ водяною болѣзною. — *Розье* предлагаетъ другой способъ употребленія: ежели испечь оныя луковицы въ горячей золѣ, и 2 унціи мякоти налить 6 унц. бѣлаго вина, то это средство, принимаемое по столовой ложкѣ, сильно гонитъ мочу, оказывая желаемую пользу въ водяной болѣзни, и мокротной одышкѣ. Цвѣтные лепестки, налитые виномъ, служатъ пріятнымъ ободряющимъ средствомъ—*gratum letificans*; свѣжіе листы,

цвѣты и корень, настоянные съ деревяннымъ, или свѣжимъ льнянымъ масломъ на солнечной теплотѣ три недѣли, служатъ внѣшнимъ смягчительнымъ и болеутолительнымъ лекарствомъ, которымъ съ пользою натираютъ части, одержимыя жестокою болью, спазмами, и судорожными корчами: *Кранцъ*.—Ежели въ ухѣ распухли железы, или отъ сгустившейся сѣры послѣдовала глухота, то лилейное масло, смѣшанное съ бычачьею желчью и водкою, впускаемое въ слуховой проходъ трижды на день, по 3—4 капли, особливо ложась спать, оказываетъ желаемое дѣйствіе.—При разслабленіи слуховыхъ нервъ, луковичный сокъ—*succus bulbi* а. серæ, такимъ же образомъ употребляемый, испытанъ съ равною пользою. Гнанная лилейная вода изъ свѣжихъ цвѣтовъ употребляется дамами для притиранія лица—*aqua cosmetica*: *Месюе*.

1. *Катаплазму, приводящую въ нагноеніе* воспалительныя опухоли—*cataplasma pus maturans* можно готовить по образцамъ, предложеннымъ: in *Pharmacop. castrensi Ruthena*, p. 323.

2. Для приготовления *настояннаго масла и гнанной воды*, полагается 1 часть цвѣтовъ на 8 частей упомянутыхъ жидкостей.

Примѣчанія. 1. Луковицы обыкновенной цыбули—*bulbi*. а. серæ, такоеже дѣйствіе оказы-

вають для умягченія и нагноенія нарывовъ:
Пеириль.

2. Слизь лилейныхъ луковиць имѣеть одина-
кія качества съ елемовою камедью—*gummi elemi*;
а потому можно оную употреблять для составленія
Арцеева раноцѣлительнаго бальзама: *Бодарь* (*).

3. По замѣчанію *Розье*, цвѣты эти не должно
держатъ въ большомъ количествѣ въ комнатахъ;
ибо они сильнымъ испареніемъ своимъ портятъ
воздухъ, дѣлая оный мепитическимъ.

линейя сѣверная, или лѣсной чай—*linnaea bo-
realis*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, въ умѣрен-
ной и сѣверной Россіи растущее, по тѣнистымъ
и мшистымъ лѣсамъ, въ окружности Петер-
бурга: на Васильевскомъ островѣ, въ Петер-

(*) Составленіе онаго находится in *Pharmacop. Rossica*
N. K. p. 193 et castr. R. p. 388. Или 6 частей слизи,
столько же сосноваго терпентина, или бѣлой еловой
смолы, 8 частей свиного или бараньяго сала, и 2 части
желтаго воска распустить на огнѣ.—Подобные составы
для ранъ предложены выше, въ которые, вмѣсто
бѣлизы и сурика, можно полагать тоже количество слизи
лилейныхъ луковиць.

гофъ, Стрѣлиной, и въ другихъ подобныхъ мѣстахъ.—Цвѣтеть въ Іюнь и Іюль мѣсяцахъ.

Качества. Цвѣтная трава пріятно пахнетъ; въ ночное время сильнѣе. *Вкусъ* имѣеть горьковатый и нѣсколько вяжущій.

Сила—тоже слабо-вяжущая и мочегонительная.

Употребленіе. Въ видѣ наливки, пьютъ вмѣсто чаю съ молокомъ: въ простудной лѣтѣ, поясничной и вертлужной боляхъ, въ запорѣ мочи, отъ чесотки, и другихъ нечистыхъ сыпей.—Снаружи, въ видѣ припарки, тоже дѣлаеть большое облегченіе, прикладываемый къ больнымъ членамъ: *Линней, Соболевскій, Шведіоръ*.

Количество. 3 драхмы цвѣтной травы, или верхушекъ, наливають 8 унціями кипячей воды, или молока.

Примѣчанія. 1. Многіе траву эту пьютъ вмѣсто обыкновеннаго зеленаго чаю, и она разводитъ густыя мокроты, и кровь чистить (*).

2. Ея ѣдятъ козы и овцы; другая скотина не трогаетъ.

(*) Объ искусственномъ чаѣ упомянуто при описаніи мари, или лебеды душистой—*chenopodium botrys*, l.

липа, или липина—*tilia europaea*, l.

Мѣсто. Дерево во всей Россіи изобильно растущее на влажной и тучной землѣ, особенно около рѣки Луги, на Волгѣ и Уралѣ; въ Сибири тоже попадаются большія липы только до Тоболя, также въ разныхъ лѣсахъ и садахъ составляютъ прекрасные проспекты, алеи, и проч.

Качества. Цвѣты имѣютъ *запахъ* благовоный, усыпительный, который сушеніемъ теряется; вкусъ: сладко-клейковатый; сѣмянъ и плодовъ вяжущій.—Свѣжіе цвѣты даютъ большое количество слизи—*mucilago*, палитые горячею водою; равнымъ образомъ и вторая древесная корка: *Бодаръ*.

Сила цвѣтовъ притупляющая, болеутолятельная, противусудорожная.

Употребленіе. Въ видѣ наливки, или гнанной воды—*aqua stillatitia*, одобряются въ грудныхъ припадкахъ, спазмахъ, боляхъ головы, обморокахъ и судорожныхъ болѣзняхъ: *Фогель*. Липовый чай полезенъ также для ипохондриковъ и склонныхъ къ удару, *Соболевскій*. Наливкою этихъ цвѣтовъ, *Гофманъ* вылечилъ застарѣлую падучую болѣзнь; онъ же хвалитъ среднюю липовую корку—*albicans*, разваренную въ водѣ, пока превратится въ слизь

—mucilago s. mucus, для примачиванія ожогъ, подагрическихъ ломотныхъ опухолей, сопряженныхъ съ несною болью; слизь эта, прикладываемая къ болящимъ почечуйнымъ шишкамъ, оныя хорошо умягчаетъ и утоляетъ боль: *Шпренгель*; смѣшиваемая съ порошкомъ жженой пробки наподобіе мази, по опытамъ *Шомеля*, служитъ болеутоляющимъ и разводящимъ средствомъ (*).—Я, смѣшивая съ чистою сажею, прикладывалъ къ дѣтскому огнику—serpigo, лишаямъ и остроочнымъ язвамъ—ulcera serpentina, и втиралъ въ золотушныя опухоли железъ; помазывалъ молочныя струпы, именуемыя тѣмянницею—crusta lactea, и давалъ внутрь дѣтямъ, страдающимъ золотухою и англійскою болѣзнию—serophula, rachitis, въ видѣ лепешекъ—trochisci, состоящихъ изъ 1 золотника чистой сажи, столько же бадяги—spongia fluviatilis, истертой въ порошокъ, и потребнаго количества липовой слизи—mucus alburni tiliaë; на приѣмъ: отъ 10—20 гранъ, по утру и въ вечеру, съ желаемымъ успѣхомъ.—*Шредеръ* виннымъ отваромъ той же корки совершенно выпользовалъ одну худосочную и чахотную женщину, давая ей пить ежедневно по 3 чайныхъ чашки.

(*) *Plantes usuelles*, T. II. p. 332, гдѣ пишетъ, что онъ это средство многократно испыталъ съ лучшимъ успѣхомъ.

Воду ранозѣлительную для золотушныхъ язвъ составлялъ: изъ 2 унцій липовой заболони, 1 унціи жженой извести—*calx viva* и столько же чистой сажки, которая, наливъ 1 фунтомъ воды, варила $\frac{1}{4}$ часа; потомъ, къ отстоявшейся жидкости и процеженной, прибавлялъ равное количество свѣжо-выжатого сока изъ чистотѣла большаго—*chelidon. maius*; иногда прибавлялъ 1—2 унціи меду сотоваго. Толченые листья тоже съ пользою прикладываются: на обожженные части и воспалительныя опухоли, къ женской грудницѣ и къ ножнымъ язвамъ. Слизистый отваръ оныхъ *Діоскоридъ* употреблялъ въ трудномъ кровоочищеніи, мочерѣзѣ и для полосканія рта отъ язвъ—*ulsera oris*. Сѣмяна, истертая въ порошокъ, по вяжущему своему свойству, уменьшаютъ носовое кровотеченіе, ежели опыи нюхать нѣсколько разъ въ день.

Количество. Полуунціи цвѣтовъ наливаютъ 6 унціями кипячей воды; которую съ медомъ или сахаромъ пьютъ вмѣсто чаю.—Свѣжей борки тоже количество варятъ въ 8 унціяхъ воды, или вина, пока останется 6 унцій отвара. Снаружи въ видѣ катаплазмы и припарки, какъ сказано выше.—Чай изъ липовыхъ цвѣтовъ и мяты гораздо полезнѣе въ упомянутыхъ болѣзняхъ: *Роке*.

ВЪ АПТЕКАХЪ ПРИГОТОВЛЯЮТЪ:

1. *Глицерную воду липовыхъ цвѣтковъ*—*aqua stillat. fl. tiliæ*, которая пріятно пахнетъ, и нерѣдко предписывается въ судорожныхъ болѣзняхъ; особенно даютъ оную малолѣтнимъ дѣтямъ въ родимцѣ—*epilepsia puerorum*: отъ 3—6 унцій въ день.—Сокъ липоваго дерева, выпускаемый насѣчкою ближе къ корню, тоже полезенъ въ дѣтскихъ судорогахъ.

2. *Порошокъ угольный*—*pulvis carbonum* (*) имѣетъ *силу*: противугниlostную, всасывающую, очищающую, и уменьшающую раздражимость, поглощая въ тѣлѣ излишество водотвора и кислотвора: *Шпренгель*.—О пользѣ этого средства, пространно излагаетъ Лейбъ-Медикъ Г. *Каменецкій* (**).

Употребленіе. Древніе по преданіямъ *Варрона*, употребляли уголь вмѣсто соли, для сохраненія мяса отъ гнилости. Новѣйшіе опыты тоже подтверждаютъ, что мясо, начинающее гнить, будучи угольнымъ порошкомъ

(*) *Pharmacop. Rossica. p. 236; et castrensis R. p. 42.*

(**) См. Краткое наставленіе о леченіи болѣзней простыми средствами. С. П. Б. 1811 стр. 50, 165, также Наставленіе, какимъ образомъ поступать должно съ больными, гдѣ нѣтъ лекарей, С. П. В. 1813 г.—и Прибавленіе, объ употребленіи чистаго угля растеній, 1816 г. Апрѣля 23 дня.

пересыпано, теряетъ вонь, и получаетъ прежнюю свою свѣжесть.—Морскіе служители, по опытамъ *Ловица*, тоже поправляютъ испорченную воду въ бочкахъ— *aqua putrescens*, полагая въ оныя крупно-толченый уголь, и прибавляя малое количество сѣрной кислоты—*acidum sulphuric.*; такимъ же образомъ очищается и всякая гнилая вода, въ недостаткѣ чистой.— На этихъ опытахъ основываясь, *Менхъ* и *Гай* давали внутрь угольный порошокъ въ простыхъ и желчногнилыхъ горячкахъ; въ гнилыхъ горячкахъ съ пятнами—*turphus petechialis* послѣдній совѣтуетъ прибавлять камфору. Въ кровавомъ и гнилломъ поносахъ хвалитъ *Юхъ*; въ цынгѣ, цынготной порчѣ десенъ, смрадномъ дыханіи, воннѣ изо рта и кровотеченіяхъ, зависящихъ отъ цынготной порчи крови: *Одые*; во время чувствуемой промозглои или неприятнымъ запахомъ сопровождаемой отрыжки, должно принимать: 2—3 раза въ день по чайной ложкѣ чистаго угля, истертаго въ порошокъ, съ водою;—также и во многихъ иныхъ болѣзняхъ угольный порошокъ, употребляемый внутрь и снаружи, оказываетъ полезныя дѣйствія: *Каменецкій*.—Древесный уголь противудѣйствуетъ гнилой заразы, укрощаетъ гнилость злокачественныхъ язвъ, и даже антоновъ огонь—*ganggræna*, очищаетъ чесотку, шолуды головные и всякаго рода

долговременныя сыпи—*exanthemata diuturna*; останавливаетъ гнилую порчу зубовъ, ежели оныя чистить ежедневно угольнымъ порошкомъ, и промывать холодною водою: *Шпренгель*.— Съ этою же цѣлью предложень выше *зубочистный порошокъ*. Въ раздутости живота отъ вѣтровъ, или отъ гнилаго разрѣшенія влагъ: *Леонарди*; въ кровоплеваніи и чахоткѣ: *Гарнетъ*, *Беддоесъ*, *Гунольдъ*; въ чесоткѣ, мокрыхъ лишаяхъ, и головныхъ паршахъ давали внутрь, и снаружи присыпали: *Гунольдъ*, *Томакъ*, *Соргъ*, *Пиккель*; въ застарѣлыхъ нечистыхъ язвахъ, гнилыхъ и сопряженныхъ съ антоновымъ огнемъ: *Бернманнъ*, *Гаргенсъ* и *Одье* прикладывали угольный порошокъ, смѣшивая съ кваснымъ тѣстомъ—*fermentum panis*, или съ медомъ; отъ глисть хвалитъ *Шефферъ*. Въ соединеніи съ цытварнымъ сѣменемъ и папортнымъ корнемъ, я давалъ съ хорошимъ успѣхомъ, при которомъ и падучая болѣзнь у одного малолѣтнаго кончилась.

Количество. Вънутрь дается отъ 20 гранъ до полдрахмы въ порошокъ; или въ видѣ каши, смѣшавъ 1 унц. порошка съ 3 унц. простаго сиропа, либо патоки: въ поносахъ, прибавляется вишневый клей—*gummi cerasorum*, проскурнячная склизъ, салеповая, льняныхъ

сѣмянъ, и т. п.—Или по методу *Г. Виллие*, дается съ лимонною кислотою, выше упомянутому при описаніи кислицы щавельной—*oxalis acetosella* L.; въ чесоткѣ и другихъ нечистыхъ сыпяхъ, даютъ съ очищенною сѣрою—*S. sulphuris*; въ чахоткѣ, по равной части съ сѣрною печенью—*hepar sulphuris*: *Гарнетъ*. Для составленія зубнаго порошка, укрѣпляющаго ослабленныя десны, прибавляется дубовая корка, завязной корень, гравилатный, и квасцы; для составленія мази: смѣшиваютъ съ свинымъ саломъ, или медомъ, сметаною и масломъ; къ гнилымъ пролежнямъ, и для укрощенія помертвѣлости—*sphacelus*, прикладывается со ржаною мукою въ видѣ тѣста: *Шпрингель*.—По опытамъ *Г. Виллие*, угольный порошокъ, смѣшиваемый съ терпентиннымъ масломъ—*oleum p. laricis, v. sylvestr.* служитъ лучшею противугнилою катаплазмою—*cataplasma antisepticum* (*).—Онъ же, давая внутрь угольный порошокъ вмѣстѣ съ сѣрною печенью—*hydrosulphure cum potassæ* укротилъ сильное ртутное слюнотеченіе.—Средство это можетъ служить и для спасенія отравленныхъ мышьякомъ—*antitoxicum arsenici!*

(*) Pharmacop. castrens. R. p. 228.

—*Бертрандъ* одинъ угольный порошокъ испыталъ, какъ надежное средство (*).

Примѣчанія. 1. Липовый листъ полезенъ скотицѣ въ кормъ на зиму; изъ коры, моченой въ водѣ, дѣлаютъ весьма крѣпкія веревки; изъ лыкъ и мочаль: лапти, рогожки, цыновки, и проч. Изъ цвѣтовъ пчелы собираютъ много душистаго меду, который можетъ замѣнить сахаръ, а цвѣты лучший ханскій чай (**). Въ Польшѣ и Литвѣ варятъ изъ этого меду весьма пріятный напитокъ, наз. липецъ. Дерево даетъ много поташу; уголье онаго почитается наилучшимъ для составленія пороху, и проч.—Липовица, или сокъ, весною изъ липы отцѣживаемый, имѣетъ одинакія свойства съ бѣрезовицею и кленовикою.—*Маркграффъ* съ липовыми распускающимися цвѣтами, приведши эту

(*) См. Всеобщій журналъ врачебной науки, № IV, 1816 года.

(**) Искусственный чай—*thea artificial* составляется: изъ 2 лотовъ свѣжихъ липовыхъ цвѣтовъ, 4 лот. цвѣтныхъ верхушекъ душистой лебеды или кудрявца—*chenopod. botrys* 1. и 2 лот. листовъ вероники; высушивъ наскоро, и изрѣзавъ мелко, хранить въ бумажныхъ картузахъ въ сухомъ мѣстѣ. Чай этотъ совершенно сходствуетъ съ китайскимъ чаемъ—*thea viridis*, t. *bohea* 1. При томъ полезенъ: въ простудномъ кашлѣ, слабости пищеварительныхъ органовъ, и гонитъ мочу: Бодаръ.

жидкость въ винное броженіе, помощію перегонки, получилъ хорошую водку.

* 2. Ежели каленый липовый уголь, окунувъ въ водку, погасить, то изъ онаго получится весьма хорошій труть удобосгараемый.—Изъ свѣжихъ липовыхъ корокъ дѣлается красно-розовый лакъ: ежели 3 лота оной варить въ 2 фунтахъ воды, съ 1 лотомъ римскихъ квасцовъ; потомъ посредствомъ поташа осадить, и процѣдивъ промыть отсѣдъ водою, наконецъ высушишь.—Плоды даютъ хорошее и вкусное масло: *Фрибе*.

3. Изъ цвѣтовъ и молодыхъ листовъ липы, подвергаемыхъ броженію, въ Литвѣ гонють превосходную водку.—Простаго: спирта непріятный запахъ уничтожается посредствомъ угля.

4. Болотная вода, и колодезная нечистая или вонючая, будучи нѣсколько разъ пропущена чрезъ холстинный мѣшокъ наполненный чистымъ углемъ, дѣлается годною къ употребленію.—Мясные припасы, пересыпанные порошкомъ угля, чрезъ долгое время предохраняются отъ согнитія, да и начавшія портиться теряютъ вонючій запахъ.—Крупный порошокъ угля, будучи насыпанъ въ испражнительное судно, уничтожаетъ смрадъ нечистотъ и мочи.—Смѣшанный по равной части съ пшеничными

отрубями, и всыпанный въ надлежащемъ количествѣ въ сапоги, уничтожаетъ вонючій потъ на подошвахъ и между пальцевъ пожныхъ: *Каменеукій*.

лиственница—*pinus larix*, l.

Мѣсто. Дерево, изобильно растущее на горахъ въ Архангелогородской губерніи и въ Сибири, въ Уфимской губерніи;—также въ сѣверной части Россіи.

Качества. Изъ лиственницы получаемый терпентинъ, чистотою своею, предпочитается всѣмъ прочимъ смолистымъ бальзамамъ,—и называется: *Венеціанскимъ терпентиномъ*—*terebinthina Veneta, s. larigna*. *Запахъ* имѣетъ скипидарный; *вкусъ* горько-бальзамный, и менѣе противный, нежели простаго соснового терпентина.—По опытамъ *Кинда*, терпентинъ содержитъ камфору, получаемую посредствомъ соляной пресыщенной кислоты—*acid. muriatic. oxygenatum*.

Сила побуждающая, мочегонительная, и при томъ сообщающая мочѣ фіалковый духъ; въ большемъ количествѣ: слабительная; снаружи разводящая, противугнилостная, ранозцѣлительная.

Употребленіе. Одобряется подъ конецъ венерическаго мокротнаго теченія—in ultimo sta-

dio blenorrhææ, для побужденія ослабѣвшихъ
 железъ, и испражненія гноеватою слизи; но
 въ началѣ гонорей, (перелоя) останавливаетъ
 средство это теченіе матеріи, и умножаетъ
 воспаленіе! *Теденъ*; въ астеническомъ запорѣ
 мочи, или отъ песка, находящагося въ почкахъ
 и мочевомъ пузырьѣ, хвалить *Маухартъ*.
 Чистый терпентинъ, даваемый вмѣстѣ съ угле-
 кислою водою—*patrum carbonicum*, удиви-
 тельное дѣйствіе оказываетъ въ каменной болѣзни,
 въ сильныхъ запорахъ на низъ—*obstipationes*
rebelles, и въ водяной болѣзни, смѣшанный съ
 яичнымъ желткомъ, хвалятъ: *Кулленъ*,
Бурдахъ; отъ плоской глисты—*tænia*: *Клоссъ*;
Г. Каменецкій тоже подтверждаетъ, что
 чистой скипидаръ и нефть, принимаемые
 внутрь, отъ 5—20 капель, смѣшанные съ д. к,
 меда или патоки, по утру и въ вечеру, не
 рѣдко выгоняютъ плоскую глисту—*tænia s.*
Фенвикъ давалъ скипидарное масло, для ук-
 рощенія жестокихъ глистныхъ припадковъ въ
 большихъ приемахъ, т. е. отъ половины до
 1—2 унцій (*). Въ ломотныхъ боляхъ,
 хирагрѣ и подагрѣ: *Ганъ*, *Хейне*, натирая
 при томъ страждущее мѣсто терпентиннымъ
 масломъ, смѣшаннымъ съ медомъ, въ чахот-
 ныхъ загноеніяхъ легкаго, кишечныхъ язвахъ,

(*) Pharmacop. castr. R. p. 134.

и разслабленіи задняго прохода послѣ долго-временныхъ поносовъ, смѣшавъ съ вишневымъ клеемъ и сахаромъ, или съ медомъ, можно давать до полдрахмы, наблюдая, чтобы не было при томъ лихорадки, или внутренняго воспаленія: *Шпрегель*, *Пленкъ*, *Бертеле*; въ застарѣлыхъ ножныхъ язвахъ—*ulcera crugum antiqna*, гнилыхъ и другихъ нечистыхъ: *Меркъ*, *Фрамъ*.—Мазью, состоящею изъ терпентина и меда, *Тонеръ* въ короткое время вычлѣлъ головныя парши и плѣшивость—*tinea s. alopecia*.—*Перебомъ* растертый терпентинъ съ яичнымъ желткомъ употреблялъ съ успѣхомъ въ видѣ промывательнаго отъ заднепроходнаго свища—*fistula ani*.

Количество. Внутрь дается отъ 10—20 гранъ и больше, въ пилюляхъ; или въ видѣ эмульсіи: растирая съ яичнымъ желткомъ, либо съ какою-нибудь слизью—*mucilago*, медомъ, сахаромъ и проч.—Снаружи въ видѣ промывательнаго, полагаются 2 драхмы на 6 унцій молока. Для составленія терпентинной загноивающей мази—*unguent. terebinthinæ, s. digestiv.* 12 частей терпентина смѣшиваютъ съ 4 частями меда, или въ видѣ бальзама, составляемаго по методу *Фрамія*—*balsamum terebinthinaceum Frahmii*: изъ лиственничнаго терпентинна, желтаго воска, и терпентиннаго масла—*oleum terebinthinæ*.—Обѣ эти мази слу-

жать лучшими ранозѣлительными средствами.

Въ аптекахъ готовятъ:

1. *Напоивающую мазь*—unguentum digestivum (*).—Для загноенія и очищенія астеническихъ язвъ, терпентинъ смѣшиваютъ съ медомъ, звѣробойнымъ масломъ и прибавляютъ немного сабура: *Шпренгель*.

2. *Смолистую мазь*—unguent. resinosum (**), которая замѣняетъ *Арцеевъ бальзамъ*, употребляемый снаружи для смягченія, очищенія и заживленія ранъ и язвъ.—Ежели 3 унціи листовничнаго терпентина и полунціи желтаго воска, распустивъ на огнѣ, потомъ прибавить столько же терпентиннаго масла, мѣшая, пока масса остынетъ: то такимъ образомъ составляется весьма полезный *Фрамиевъ бальзамъ*, служащій для застарѣлыхъ ножныхъ язвъ—ulcera crurum antiqua.—*Гернеръ*, прибавляя къ оному полунціи глетнаго уксуса, вылечилъ раковую язву.

3. *Скипидарное масло*, или терпентинное—oleum terebinthinæ (***), принимаемое внутрь съ осторожностію и въ маломъ количествѣ,

(*) Тамъ же, р. 229.—(**) Р. 132, 133.

(***) Тамъ же, р. 134.

смѣшанное съ медомъ, или съ яичнымъ желткомъ, сильно побуждаетъ и гонить мочу. *Попе* хвалить: въ задержаніи мочи, почечныхъ камняхъ и водяной болѣзни; *Лентинъ* втиралъ оное съ успѣхомъ въ поясицу, лобокъ—*pubes* и между-проходное мѣсто—*perinaeum*;—втираемое въ спинный хребетъ предъ приступомъ лихорадки, укрощаетъ сильный пароксизмъ: *Ниманъ*. *Валлиспери* и *Бургавъ* хвалятъ въ желчныхъ камняхъ—*cholelithi*; *Виттъ*, *Дюрандъ* и *Герцъ* давали оное вмѣстѣ съ сѣрнымъ эфиромъ—*aether sulphuric*, смѣшавъ 2 части терпентиннаго масла съ 3 эфира, на приемъ по 1 драхмѣ каждого утра, съ молочной сывороткою; втирая при томъ снаружи, соотвѣтвенно мѣстоположенію печени въ хроническихъ ревматизмахъ, упорной лomotъ, шіагрѣ и подагрѣ. *Бертеле* хвалить внутрь давать вмѣстѣ съ экстрактомъ прострѣльной травы—*extract. asoniti n.* Снаружи, смѣшавъ по равной части съ камфорнымъ спиртомъ, или съ нашатырнымъ—*ammonia liquida*, натираютъ страдающіе члены ломотою, ознобленные, параличные, и отекрые. *Хейне* и *Аккерманъ* тоже видѣли хорошіе успѣхи отъ упомянутыхъ средствъ, внутрь и снаружи употребляемыхъ. Въ загноеніи мочевыхъ путей, и при внутреннихъ астеническихъ кровотеченияхъ, *Адаиръ* давалъ съ яичнымъ желт-

комъ. Теплое скипидарное масло, вливаемое въ свѣжія прободенія нервъ, сухихъ жилъ и перепонокъ, служитъ превосходнымъ средствомъ, утоляющимъ боль и спазмы—*incomparabile anodinum!* *Бургавъ*, *Діонисъ*; для укрощенія кровотеченій изъ разсѣченныхъ небольшихъ кровеносныхъ сосудовъ, одобряетъ *Йонгъ*; *Пленкъ*, втираніемъ одного терпентиннаго масла, разводилъ холодныя опухоли, мѣшечныя, и сухожильные желваки—*ganglia*; *Руландъ*, для разведенія зобовъ—*strumae*, совѣтуетъ смѣшивать оное съ льнянымъ сѣрнымъ масломъ—*ol. lini sulphuratum*. По учиненіи насѣчки—*scarificatio*, съ успѣхомъ укрощалъ антоновъ огонь и ускорялъ отдѣленіе костоѣдицы; по методу *Дюссоссуа*. тоже весьма полезно присыпать язвы, сопряженныя съ антоновымъ огнемъ—*ulcera gangraenosa*, порошкомъ дубовой коры, или угольнымъ, и сверху поливать терпентиннымъ масломъ; *Галлеръ* терпентиннымъ масломъ защищалъ отъ гнилости анатомическіе препараты; въ сильныхъ ожогахъ и ознобленіяхъ частей одобряютъ *Кентнишъ*, *Менхъ*, они же; увивая параличные члены полотенцами, питанными терпентиннымъ масломъ, имѣли хорошій успѣхъ въ излеченіи двухъ больныхъ, изъ коихъ одинъ получилъ таковую расслабленность руки послѣ гнилой горячки; а другой послѣ апоплексическаго удара. Я для этого

составлялъ патиране, сильно раздражающее —embrocatio stimulans: изъ 1 фунта терпентиннаго масла, столько же спиртной настойки корня жигунца, и бадяги—*tinctura a. puyetri et spongiae fluviat.* съ прибавленіемъ простаго мыла и поташа, cadaго по 3 унціи, которое въ параличномъ расслабленіи руки и ноги у 60-лѣтняго моего пациента, произвело желаемое дѣйствіе. Въ другихъ случаяхъ, при полурасслабленіи или бездѣйствіи членовъ—*haemiplegiae*, употреблялъ съ равною пользою: *ароматный спиртъ* и *бальзамъ отъ паралича*, давая внутрь средство, предложенное при описаніи колоцинтовъ; не оставляя и другія потребныя къ тому пособія, тамъ же упомянутыя.

Количество. Внутрь одно чистое терпентинное масло дается отъ 5—10 и 15 капель съ сахаромъ, или съ медомъ, смѣшивая 2 драхмы онаго съ 1 унц. меда. Смѣшеніе это принимаютъ поутру и въ вечеру по чайной ложкѣ. Впрочемъ *Штедманнъ* замѣчаетъ, что неумѣреннос употребленіе этого слишкомъ горячительнаго средства—*calida medicina* производитъ капельный мочерѣзъ, кровавое мочетеченіе, и опасную лихорадку!! Снаружи, какъ сказано выше; или въ видѣ мазей, предписываемыхъ въ Россійской Военной Фармакопее г. *Виліе*.—Опыты намазыванія скипидарнымъ

масломъ, вскорости послѣ ожоги—combusturae, оказались дѣйствительными.

Въ аптекахъ приготавлиются:

1. *Мазь смолисто-терпентинная*—linimentum resinoso-terebinthinatum (*), имѣющая силу: очищать гнилыя худосочныя язвы, и отражать антоновъ огонь.

2. *Мазь мыльно-терпентинная*—sapo terebinthinatus, s. balsamus vitae externus (**).

3. *Нашатырно-терпентинная, или летучая*—linimentum ammoniato-terebinthinatum, (***) одобряется для побужденія разслабленныхъ и параличныхъ частей, для разведенія твердыхъ холодаыхъ опухолей, членовныхъ грибовъ, желваковъ, и проч.—также для утоленія ревматизмовъ, спазмовъ и простудныхъ ломотныхъ болей.

4. *Мазь сѣрно-кислая терпентинная*—linimentum sulphurico-terebinthinatum (****), употребляемая въ ушибахъ, растяженіи составовъ, ожогахъ, ознобленіяхъ, ужаленіяхъ насѣкомыхъ, и багровыхъ закожныхъ кровоизліяніяхъ.

(*) Pharmacop. castrens R. p. 277.

(**) Р. 332.

(***) Р. 275.

(****) Р. 277.

Примѣчанія. 1. Въ Сибири нѣкоторые народы, лубъ лиственницы, умягчая въ водѣ, употребляютъ вмѣсто хлѣба.—Молодые зеленые отрасли, изрѣзавъ, варятъ весною съ молокомъ или сывороткою, которая имѣетъ слабительное свойство.—Выступающій изъ оныхъ смолистый сокъ и сгущаемый солнечною теплою въ видѣ бѣловатыхъ зеренъ, представляетъ сладковатую манну своего рода—*manna lagicea*, имѣющую слабительное свойство.—Древніе Евреи собирали эту манну, предъ восхожденіемъ солнца, которая имъ служила очищающимъ средствомъ отъ свойственной или врожденной имъ коросты.

2. Лиственничный терпентинъ входитъ въ разные составы мазей, пластырей и скоросохнущихъ масляныхъ лаковъ.—Терпентинъ этотъ—*terebinthina ueneta*, *lagicina*, качествами своими можетъ замѣнить бальзамы: канадскій, копайскій—*pinus balsamea*, *et coraifera offic.* перувіантскій и толутанскій.

3. Дерево, имѣющее красноватый цвѣтъ, плотное, крѣпкое и смолистое существо, въ Италіи оное полируютъ, и разныя столярныя издѣлія разрисовываютъ; годится также для строенія кораблей, мельницъ и водопроводныхъ трубъ, и проч. Дерево это въ водѣ больше еще твердѣетъ, и

неподвергается гнилости. Бочки, изъ онаго дѣлаемыя, препятствуютъ испаренію вина, и другихъ спиртныхъ жидкостей: *Розье*.—Для строенія домовъ, нѣтъ прочнѣе этого дерева, которое, въ продолженіи времени покрываясь своимъ лакомъ, чернѣетъ и, такъ сказать, каменѣетъ.—*Плиній* и другіе древніе писатели почитаютъ оное нетлѣннымъ; особенно ежели будетъ нѣсколько снаружи окопчено, или обожжено.

4. Лечение лошадей отъ червей, наз. овсяниками, производится обыкновенно, давая имъ кормъ изъ отрубей, пересыпанныхъ толчеюю горючею сѣрою; но вѣрнѣе выгоняются эти около-проходные черви, ежели 1 горсть толченой сѣры, и столькоже печной лоснящейся сажи растереть съ коноплянымъ масломъ, мѣрою 1 пивной стаканъ, прибавивъ равное количество скипидарнаго масла.—Вымажь эту смѣсь въ проходѣ у лошади; а остатокъ влей ей въ горло.

5. Заливаніе раны скипидаромъ умерщвляетъ червей;—или истолкши свѣжую траву львиной лапы, иначе наз. манжетка—*alchemilla vulgaris* l. съ скипидарнымъ масломъ, приложи къ ранѣ: отъ этого средства черви помрутъ, и рана скорѣе заживетъ.

6. Лекарство для копытъ: возми по равной части терпентина, козловаго сала, говяжей желчи и желтаго воска; спусти на огнѣ, и, намазавъ на тряпку, приложи къ копыту и къ подошвѣ.

О канифоли и листовяничной губкѣ упомянуто было на своихъ мѣстахъ.

ЛИШАЙ ГРУДНОЙ, или ПЛЮСНИКЪ; МОХЪ ПЛЮЩЕВОЙ —
lichen pulmonarius, l., sticta pulmonacea
 (achar.).

Мѣсто. Вырастаетъ на старыхъ дубахъ, букахъ и другихъ большихъ деревьяхъ, въ густыхъ и темныхъ лѣсахъ; находится также около Царскаго села, и въ другихъ подобныхъ мѣстахъ.

Качества. Запахъ имѣеть слабый; *вкусъ*: горьковато-соляной, нѣсколько вяжущій и островатый, при жеваніи.

Сила разводящая, укрѣпляющая.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Употребляется въ отварѣ отъ сухаго кашля, кровоизліванія, сухотки и чахотки: *Соболевскій, Бурдахъ*; въ желтухѣ: *Брейль, Линней, Шведіоръ*. — Снаружи толченый съ водою, прикладываютъ къ нечистымъ ранамъ и язвамъ съ хорошимъ успѣ-

хомъ;—для укрощеніе антонова огня, прикладывается настоящий въ винномъ спиртѣ:
Шпренгель.

Количество. Полупціи варятъ въ 1 фунтѣ воды, пока укипитъ половина жидкости, и процѣдивъ, пьютъ по чайной чашкѣ съ медомъ и молокомъ, нѣсколько разъ въ день;—въ порошокѣ доется по 1 драхмѣ.

Примѣчанія. 1. Въ Сибири при рѣкѣ Усолкѣ нѣкоторые жители собираютъ этотъ весьма горькій лишай, на пняхъ ели выростающій, и кладутъ оный въ пиво вмѣсто хмѣлю, отъ чего бываетъ оное пьянѣе обыкновеннаго; однако *Г. Соболевскій*, предписывая чахотнымъ, и я, послѣдуя его опытамъ, отваривали въ суслѣ—*decocatura malti hordei*, никакого усыпительнаго дѣйствія не замѣтили, кромѣ большаго облегченія, особенно въ грудныхъ, выше упомянутыхъ болѣзняхъ. Ежели плющевой мохъ мочить съ зеленымъ купоросомъ, то окрашиваетъ полотно темнокраснымъ цвѣтомъ;—съ квасцами: желтымъ;—съ уриною и известью: темно-каштановымъ.

2. Нѣкоторые опытные экононы употребляютъ грудной лишай въ водяномъ отварѣ для излеченія овецъ, коровъ и лошадей отъ кашлю, тоже съ хорошею пользою.

3. Къ этому лишайю качествами своими подходитъ: лишай стѣнной, или желтый мохъ—*lichen parietinus*, *parmelia parietina*, имѣющій вкусъ горько-вяжущій; качества, зависящія отъ хиннаго начала—*principium cinchoninum*: *Саудеръ*.—По свидѣтельству *Шпренгеля*, принимаемый въ порошокъ по нѣскольку драхмъ, укрощаетъ перемежныя лихорадки; снаружи, въ видѣ присыпки и спиртной примочки, поправляетъ гнилыя язвы и даже антоновъ огонь уничтожаетъ—*efficax ad curandam gangrænam* (*). Находятся на древесныхъ корахъ и старыхъ каменныхъ стѣнахъ; изъ него вываривается хорошая желтая краска: *Соболевскій*.

ЛИШАЙ ИСЛАНДСКІЙ, или грудной мохъ; дубовыя лапти—*lichen islandicus*, *I.*, *cetraria islandica*.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, къ мхамъ или поростамъ принадлежащее; въ сѣверной Россіи во множествѣ растущее по сухимъ и гористымъ лѣсамъ, особенно въ финляндскихъ пещаныхъ борахъ и открытыхъ мѣстахъ на каменистой почвѣ; также въ окрестности Петербурга: на Поклонной и Дудеровой горахъ, въ Осиновой рощѣ, Паргаловѣ, и проч.

(*) C. Sprengel. Institutiones med. T. V. Pharmacologia; Lipsiæ. 1816, p. 320.

Качества трехлѣтняго моха превосходныя, зависящія отъ горьковато-клейкаго и нѣсколько вяжущаго вещества; — по опытамъ *Пруста*, слизь этого моха подобна крахмальной—*mucus amyli*.

Запаху не имѣеть; *вкусъ*: горькій и немного вяжущій; горечь сушеніемъ и вареніемъ, или моченіемъ въ холодной водѣ много теряется; посредствомъ варенія извлекается огромное количество слизи—*mucilago*, такъ, что 1 унц. сухаго моха, отвариваемая въ 16 унц. воды, даетъ 7 унц. столько же густой слизи, сколько тоже количеств оаравійской камеди—*gummi mimosae piloticae*, растворенной въ 3 унц. воды.

Сила свѣжаго моха слегка слабительная; сухаго: питательная, укрѣпляющая, грудная, притупляющая остроты, противугниlostная.

Употребленіе. Какъ превосходно питательное и укрѣпляющее средство, хвалится во всѣхъ хроническихъ болѣзняхъ, сопряженныхъ съ слабостію силъ, изнурительными испражненіями, примѣтнымъ истощеніемъ животной матеріи и сухоткою—*tabe*: *Скополи*, *Бергій*, *Крамеръ* и *Паулицкій*.—Исландскій мохъ хорошую пользу приноситъ тѣмъ особенно больнымъ, которые слишкомъ раздражительны, имѣють худое вознагражденіе питательныхъ соковъ и склонны къ поносамъ—Въ долго-

временномъ простудномъ кашлѣ, кровопле-
ваніи, чахоткѣ, и во многихъ астеническихъ
болѣзняхъ легкаго, сопряженныхъ съ отдѣле-
ніемъ большого количества кровавыхъ или
гноевыхъ мокротъ—*sputa cruenta v. purulenta*,
первые испытали: *Боррихій* и *Бартолинъ*(^{*});
въ мокротной чахоткѣ, золотушной, нерв-
ной сухоткѣ, и изнурительной лихорадкѣ
—*febricula*, зависящей отъ загноенія внутрен-
ностей, или внутреннихъ язвъ, хвалятъ
Олафзенъ, *Герцъ*; въ сухомъ долгопродол-
жительномъ кашлѣ и чихлостн—*contabescencia*:
Шешидеръ, *Тромсдорфъ*, *Штоль*; въ
простыхъ и кровавыхъ поносахъ, которые изнурн-
тельными изображеніями—*profluvia colliquativa*
непосредственно влекутъ за собою сухотку—
atrophia: *Гофманъ*, *Вилліе*, *Карпнскій*.—
Въ сухоткѣ, происходящей отъ сильного на-
гноенія большихъ ранъ и язвъ—*tabes a nimia*
suppuratione, или послѣдовавшей отъ излишняго
ртутнаго слюнотеченія, съ успѣхомъ употреб-
ляли: *Пленкъ*, *Тоде*.—Въ загноеніи почекъ
и дѣтородныхъ частей, отъ язвъ находящихся
въ этихъ органахъ, равную пользу исландскій
мохъ оказываетъ, какъ и въ легочной чахоткѣ—
phthisis pulmonalis: *Кваринъ*, *Штоль*,
Моршеймъ. — Въ чахотной лихорадкѣ—

(*) Acta med. Hafn. 1671. p. 126.

—f. hecticа, первой изнурительной, непомѣромъ потѣни, большой потерѣ крови, сѣмян, и для притупленія острыхъ ядовъ, причиняющихъ разрушеніе органическихъ частей, или при сухотномъ истощеніи всего организма, *Бурдахъ* рекомендуетъ употреблять крѣпкій отваръ, съ яичными желтками приготовленный. Въ подобныхъ случаяхъ, я многихъ больныхъ возстановлялъ молочною жидкою кашницею—*pulmentum lacteum*, и студнемъ исландскаго моха—*gelatina lichenis island.*, приготовленнымъ съ прибавленіемъ бѣлаго или краснаго винограднаго вина, давая имъ нѣсколько разъ въ день по столовой ложкѣ.—Средство это и въ цыготной сухотѣ оказываетъ желаемую пользу. *Крихтонъ*, *Ренольтъ* и *Герцъ* замѣтили, что исландскій мохъ наиболее помогаетъ въ мокротной чахоткѣ—*phthisis mucosa*; или послѣдовавшей послѣ долговременнаго кровоплеванія—*hæmoptysis*; но для больныхъ, имѣющихъ грудную востоянную боль и ощущаемую при глубокомъ вдыханіи, не годится! *Рейске* и *Шенейдеръ* хвалятъ для притупленія сильнаго раздраженія въ легкихъ.—*Гьерне* и *Горнъ* совѣтуютъ при сильной слабости кишечнаго канала давать въ отварѣ, съ прибавленіемъ пряныхъ веществъ, спиртныхъ, и другихъ летучихъ возбуждающихъ средствъ—*stimulantia volatilia*.—Для выздора-

вливающихъ послѣ долговременныхъ болѣзней, равно и во всѣхъ хроническихъ недугахъ, для поддержанія силъ, особливо питанія, средства эти могутъ служить пищею и лекарствомъ: *Шпренгель*. — Снаружи для промыванія гнилыхъ язвъ, и въ клистирахъ, крѣпкій отваръ этого моха тоже оказываетъ полезное дѣйствіе; съ прибавленіемъ равнаго количества известковой воды—*aqua calcis*, хорошую оказываетъ пользу.

Количество. Въ порошокъ, по своей легкости, рѣдко дается: отъ $\frac{1}{2}$ —1 драхмы съ сахаромъ, или солодковымъ корнемъ—*pulv. rad. glycyrrhizæ*; обыкновенно же употребляютъ въ отварѣ, полагая 1 унцію сухаго, крупно истертаго моха на 16 унц. воды, отвариваемой до 12 унцій. Отваръ этотъ, процѣдивъ, пьютъ съ медомъ или молокомъ по чайной чашкѣ, каждые 2 часа; для доставленія тѣлу большаго питанія, варятъ 1, или 2 унціи вымоченнаго моха, чрезъ $\frac{1}{4}$ часа, въ 2 фунтахъ молока до половины, и это количество крѣпкаго отвара—*decost. saturatum* употребляютъ ежедневно; съ прибавленіемъ сахару, гораздо пріятнѣе. —Этимъ однимъ средствомъ, давая до 2 фунтовъ ежедневно, *Бернъ* вылечилъ многихъ чахотныхъ, которые при томъ сдѣлались крѣпкими и полнотѣлыми. —Чтобы извлечь экстрактногорькое начало, отъ котораго зависитъ

слабительное дѣйствіе, — для этого предвари- тельно наливаютъ мохъ холодною водою, и по попростествіи 24 часовъ, сливъ оную, потомъ уже варятъ въ свѣжей водѣ, или въ молокѣ, какъ выше сказано; но для тѣхъ, которые под- вержены запорамъ, эту полезную горечь, от- верзающую и укрѣпляющую слабыя внутрен- ности, вымачивать не совѣтую.

ВЪ АПТЕКАХЪ ПРИГОТОВЛЯЮТЪ:

Отваръ исландскаго моха — *decoctura lichenis islandici* (*), который тоже съ пользою употребляется въ упомянутыхъ астеническихъ болѣзняхъ легкаго — *morbi pulmonum atonici*, какъ-то: въ упорномъ кашлѣ, мокротной чахоткѣ, сухоткѣ, женскихъ бѣляхъ, и проч. — Принимаютъ по 4 унціи, 3 или 4 раза въ день: *Вилліе*.

Примѣчанія. 1. Исландцы собираютъ этотъ мохъ осенью въ сырую погоду, чтобы сухимъ не поколотъ рукъ, и не прежде, какъ чрезъ 3 года повторяютъ собираніе; потому что онъ требуетъ этого времени для своего созрѣванія. — Мохъ этотъ состав- ляетъ для рода человѣческаго не менѣе драгоцѣн- ное растеніе, какъ и прочія хлѣбныя зерна — *cerealia*. — Исландскіе жители, съ давнихъ вре-

(*) Pharmacop. castrens. R. p. 244.

мень пользуются этимъ мохомъ, какъ пріятнымъ лекарствомъ и здоровою пищею: отмочивъ въ водѣ, варятъ съ молокомъ, дѣлаютъ студень, или желе; а съ малымъ количествомъ муки пекутъ хлѣбъ, который не уступаетъ пшеничному, легокъ для желудка, и составляетъ какъ вкусную, такъ и здоровую пищу: *Горребовъ* (*).

2. Исландскій мохъ и *степной*—lichen esculentus, pallas., иначе наз. *землянымъ хлѣбомъ*, о которомъ упомянуто при описаніи лишая оленьяго—lichen ganfigerinus, служатъ въ голодное годовое время лучшими питательными средствами, замѣняющими насущный хлѣбъ. Первый, по содержанію въ большомъ количествѣ студенистаго вещества, можетъ также замѣнить: аравійскую камедь, азіатскій салець и саговую крупу—сусас сігсіпаліс 1, — Покойный профессоръ *Соболевскій*, имѣлъ счастье въ теченіи 43 лѣтъ многихъ немощныхъ, почти изсохшихъ, или представляющихъ живой остовъ, возстановить съ отличнымъ успѣхомъ единственно исландскимъ мохомъ. — *Галлеръ*, *Линней* и *Скополи* тоже подтверждаютъ мно-

(*) Tilforladelige Efterretninger om Island. p. 88.— Олафзенъ пишетъ, что 1 бочка очищеннаго, высушеннаго и смолотаго исландскаго моха равняется, по содержанію питательности, 2 бочкамъ лучшей муки хлѣбныхъ зеренъ. Reise igienem Island. Т. II. p. 816.

гими опытами. Последний пишетъ, что въ карні-оли изнуренный скоть, въ 3 или 4 недѣли, этимъ же мохомъ хорошо откармливается, утучняется и прежнія свои силы получаетъ.—Гдѣ этотъ мохъ во множествѣ растеть; тамъ для откармливанія на убой свиней и быковъ, оный, предварительно распаренный кипяткомъ, замѣняетъ всякія хлѣбныя зерна.—Будучи въ Улеборгѣ, я въ 1 мѣсяць поправилъ свою изнуренную лошадь, и откормилъ борова, котораго мясо и окорока, выкопченные можжевельникомъ, замѣнили такую ветчину, съ которою и вест-фальская не можетъ сравниться.

3. Исландцы изъ него вывариваютъ желтую краску, постоянную на воздухѣ, и способную для шерстяныхъ матерій.—Ежели прибавить нѣсколько зеленаго купоросу: то краска дѣлается темнофіолетовою.—Студенистымъ отваромъ онаго моютъ нечистое бѣлье, которое выбѣливается также, какъ отъ мыла; густою же слизью можно клеить бумагу, какъ лучшимъ клейстеромъ: *Северинъ*. Исландскій мохъ противудѣйствуетъ окисанію молока въ лѣтнее время: ежели, предварительно вымочивъ въ водѣ, положить вѣточки двѣ въ сосудъ молочный: *Фрибе*.

ЛИШАЙ ЧЕРВЕЦОНОСНЫЙ, или КОРОВАТЫЙ, КУСТОВАТЫЙ—
lichen cocciferus & ruxidatus, l.; capitularia ru-
xidata (Flörck).

Мѣсто. Мохъ этотъ вырастаетъ въ сосно-
вомъ бору на землѣ, а особенно на гнилыхъ
пняхъ деревъ.

Качества. *Вкусъ* имѣетъ горьковатый и
слабо-вяжущій.

Силу разводящую, укрѣпляющую.

Употребленіе. Въ судорожномъ дѣтскомъ
кашлѣ, иначе коклюшемъ называемомъ—tussis
convulsiva, ferina, s. pertussis, *Виллисъ*, *Гукс-
гамъ* и *Кулленъ* испытали его полезное
дѣйствіе; многіе также хвалятъ: въ застарѣлой
простудѣ, сухомъ кашлѣ, сухоткѣ и чахоткѣ:
Дилленіусъ, *Соболевскій*.—Снаружи, водя-
ной отваръ служитъ хорошею вяжущею и
укрѣпляющею примочкою, для астеническихъ
язвъ и мѣстныхъ кровотеченій: *Фогель*.

Количество. Предписывается въ томъ же
видѣ, какъ исландскій мохъ—lichen islandicus,
т. е. его можно варить въ молоко, и давать
въ порошокъ на *приемъ*: отъ $\frac{1}{2}$ —1 драхмы;
въ этомъ видѣ еще лучше дѣйствуетъ, особен-
но въ соединеніи съ молочнымъ сахаромъ
—sacchar. lactis; для отвара полагаютъ 1 ун-
цію на фунтъ жидкости, которую, подсластивъ

сахаромъ, или медомъ, пьютъ по чайной чашкѣ, отъ кашлю судорожнаго свойства:
Балмевъ.

Примѣчаніе. Замѣчено, что овцы, пожирая этотъ мохъ, избавляются отъ жестокаго кашлю.—Моченый въ слабомъ щелокѣ, даетъ пурпуровую постоянную краску.

лишай прыщеватый—lichen arthosus, l.

Мѣсто. Вырастаетъ въ старыхъ лѣсахъ, между мхами и травой, въ Копорскомъ уѣздѣ, и около Краснаго села.

Качества. Запахъ и вкусъ имѣетъ противный, вонючій.

Силу слабительную, противуглистную.

Употребленіе. Въ наливкѣ или отварѣ, пьютъ для изгнанія глистовъ, и смѣшавъ съ медомъ, полощутъ ротъ отъ молочницы—*arthra: Соболевскій, Шведіоръ.*

Количество. Дѣтямъ даютъ по 12 грань въ порошокъ съ медомъ; взрослымъ отъ $\frac{1}{2}$ —2 драхмъ; или полунціи моха варятъ въ 6 унціяхъ воды, пока останется 4 унціи жидкости, которую, процѣдивъ съ выжимкою, и подсластивъ медомъ, принимаютъ чрезъ 2 часа по столовой ложкѣ.

Примѣчанія. 1. Прыщеватый лишай можетъ замѣнить коренканекій глистогонный мохъ—*Fucus helminthochorton*, s. *conserva dichotoma* L., также ямайскую и суринамскую противуглистныя корки—*cortices geoffroyæ inermis*, et *g. surinamensis*, рекомендуемая *Волтеленемъ*, *Юліаномъ*, *Шварцномъ*, и другими повѣйшими опытными врачами.

2. Въ Швеціи, деревенскіе жители этимъ мохомъ обыкновенно пользуются отъ глисть: *Линней*.

лишай собачій, или земляной мохъ—*Lichen caninus*, L.

Мѣсто. Растетъ по тѣнистымъ лѣсамъ и влажнымъ лугамъ, большею частью на землѣ, также при заборахъ, и нередко на пняхъ деревь покрываетъ другіе мохи.

Качества. *Запахъ* и *вкусъ* противный.

Сила разводящая и поправляющая соки—*alterans*.

Употребленіе. Въ Англіи *Морей* и *Меадъ* испытали полезное дѣйствіе онаго въ угрызеніи бѣшеныхъ собакъ, или песьемъ бѣшенствѣ—*hydrophobia*; *Буттеръ* и *Шведі-*

оръ хвалить въ сумасшествіи и судорожномъ удушѣ—*asthma convulsivum*; его можно также въ отварѣ пить съ пользою: для очищенія мокротъ и отъ глистовъ: *Соболевскій*.

Количество. Даютъ такимъ же образомъ, какъ выше описанный прыщеватый лишай—*I. aphthosus*.

Примѣчанія. 1. Лишай этому приписываютъ силу, укрощающую припадки отъ угрызенія бѣшен-ной собаки—*hydrophobia*, отъ чего и названіе получилъ.—Англійскіе врачи: *Слоанъ* и *Гартлей* составляли порошокъ отъ бѣшенства—*pulv. anti-lyssus*, изъ 2 частей этого моха и 1 части перца, котораго давали на приемъ людямъ: отъ 1—2 золотниковъ; собакамъ и другимъ домашнимъ животнымъ: отъ 1—2 лотовъ (*).

лишай сплетенный, или дубовый—*lichen plicatus, I.*

Мѣсто. Вырастаетъ на старыхъ деревьяхъ, особенно дубахъ; находится также на Дудеро-

(* *Tiansact. Philosophic. No 237, 443.*—Нѣмецкіе врачи тоже испытывали этотъ мохъ для отвращенія водобоязненнаго бѣшенства *ralies hydrophobica: Frankische Samml. u. Anmerk. Norimberg, 1755. Vol. I. p. 494.*—Флигъ Свитень съ великимъ учителемъ Буртавомъ, сомнѣваются въ успѣхѣ этого средства. *Commentar. T. III. p. 587.*

вой горѣ, и вездѣ въ подобныхъ мѣстахъ.

Качества. *Вкусъ* имѣеть вяжущій.

Силу—тоже вяжущую, сушительную.

Употребленіе. Въ сильныхъ кровотеченіяхъ и кровавыхъ поносахъ, зависящихъ отъ большой слабости брюшныхъ органовъ, древніе врачи давали съ краснымъ виномъ. Снаружи, тоже полезно прикладывать толченый съ краснымъ виномъ въ дѣтскихъ грыжахъ, особливо къ пупочной—omphalocèle: *Соболевскій*.

Примѣчаніе. Съ квасцами даетъ желтую краску, годную для шерстяной матеріи.

лишай олений, или ягель.—lichen rangiferinus, l.

Мѣсто. Растетъ по сѣвернымъ тундрамъ, и нередко въ Финляндіи изобильно покрываетъ пещаные боры; въ окружности Петербурга находится на Поклонной горѣ, и вездѣ по бесплоднымъ гористымъ лѣсамъ въ большомъ количествѣ.

Качество. *Вкусъ* горьковато-соляной.

Сила разводящая, питательная.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ мокротномъ кашлѣ, сухоткѣ и чахоткѣ, можно употреблять съ пользою въ порошокѣ и отварахъ, какъ и выше упомянутые мохи.—При Улеаборгскомъ госпиталѣ, я имѣлъ случай неоднократно испытать пользу этого моха, давая въ видѣ молочнаго отвара имѣвшимъ чахотную лихорадку—*febris hectica*, послѣдовавшую отъ всасыванія гнойной матеріи изъ большихъ ранъ.

Примѣчанія. 1. По замѣчанію Г. Соболевскаго, чрезъ 5 или 6 лѣтъ вырастаетъ оный до своей совершенной величины, т. е. на 4 дюйма вышиною.—Съ зеленымъ купоросомъ вымоченный, даетъ желтую краску, подобную охрѣ.

2. Въ Лапландіи олени питаются этимъ мохомъ всю зиму, и отъ него бываютъ очень жирны, здоровы, и даютъ много молока.—По новѣйшимъ экономическимъ опытамъ, когда выварится въ водѣ и смѣшанъ будетъ съ обыкновенною сѣчкою, служить хорошимъ кормомъ для рогатаго скота, который отъ него стольже здоровъ бываетъ, и столькоже молока даетъ, какъ отъ лучшей обыкновенной своей пищи.

3. Къ этому качествами своими подходитъ степной мохъ, или земляной хлѣбъ—*lichen es-*

culentus pallastii, растущій мѣстами въ сухой Калмыцкой и Киргизской степи, образуя мелкія сѣрья тѣла, величиною въ горошину или орѣхъ, которыя тамошніе жители собираютъ и, во время голода, употребляютъ въ пищу: *Севергинъ*. Объ этихъ породахъ моха было выше упомянуто, при описаніи Исландскаго.

ЛОЖЕЧНАЯ ТРАВА, или ЛОЖЕШНИКЪ; ВАРУХА; ЦЫНГОТНАЯ ТРАВА; МОРСКОЙ САЛАТЪ—*cochlearia officinalis*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, вездѣ разводится удобно въ садахъ, и произвольно растетъ на берегахъ морскихъ; въ садахъ разводится на влажной почвѣ; цвѣтетъ въ Маѣ и Іюнѣ.

Качества свѣжей травы хорошія, зависящія отъ остраго летучаго начала, соединеннаго съ большимъ количествомъ азота. *Запахъ* слабый, нѣсколько къ жерухѣ подходящий; *вкусъ*: горьковато-острый.

Сила слегка побуждающая, противуцынготная, отверзающая, мочегонительная, испариногонная и поправляющая худосочіе.

Употребленіе. Въ цынгѣ и многоразличныхъ ея припадкахъ, первѣйшимъ средствомъ

поставляетъ *Евгалея*; въ Гренландіи, гдѣ
 ложечная трава и щавель вмѣстѣ растутъ,
 тоже служитъ единственнымъ спасеніемъ отъ
 скорбута: *Бартолинъ*; въ мокротной одышкѣ,
 брюшныхъ завалахъ и водяной болѣзни, хва-
 лятъ *Линней*, *Кранцъ*; въ худосочіи и кож-
 ныхъ болѣзняхъ, происходящихъ отъ остроты
 пасоки, какъ-то: чесотка, лишай, синія пятна
 на ногахъ и хроническія язвы—*ulcera scur-
 gantica*, открывающіяся отъ цынготной порчи
 соковъ—*cachexia scorbutica*: *Менхъ*, *Бертеле*;
 въ цынготной ломотѣ, расслабленности, не-
 подвижности составовъ и параличѣ: *Сиден-
 гамъ*, *Пленкъ*.—Снаружи, свѣжая толченая
 трава съ хорошимъ успѣхомъ прикладывается
 къ цынготнымъ и другимъ гнилымъ язвамъ;
 выжатый сокъ и смѣшанный съ малымъ коли-
 чествомъ квасцовъ служитъ хорошимъ сред-
 ствомъ отъ цынготной порчи десенъ и язвъ
 въ роту: ежели онымъ часто мазать, или
 чаще полоскать ротъ тѣмъ же сокомъ, смѣшан-
 нымъ по равной части съ водкою, или раз-
 веденнымъ спиртомъ—*alcohol dilutum*, подсла-
 стивъ нѣсколько медомъ: *Форестъ*; въ мо-
 кротной жабѣ—*angina pituitosa*, превратившейся
 въ язвы, я испыталъ хорошее дѣйствіе этого
 полосканья; равнымъ образомъ и въ астени-
 ческомъ запорѣ мочи, или мокротнаго свойства
 —*ischuria mucosa* видѣлъ весьма скорое облегче-

ніе, давая внутрь: отъ 2—4 драхмъ; *Фогель* хвалитъ въ недостаточномъ очищеніи кровей. Примочкою этого сока разгоняются багровыя пятна, всегда почти бывающія на ногахъ у цынготныхъ людей.

Количество. Свѣжую траву, съ щавелемъ, цынготнымъ весьма полезно ежедневно кушать вмѣсто салата (*); или горсть травы наливаютъ 12 унціями кипячей сыворотки, которую, выжавъ и процѣдивъ, пить по чайной чашкѣ, 2 или 3 раза въ день; одинъ выжатый сокъ изъ свѣжей травы тоже дается по 1—2 и 3 унціи съ сывороткою; или 1 унцію толченой травы, смѣшавъ съ медомъ, принимать въ видѣ каши ежедневно означенное количество, раздѣливъ на 2 или 3 приѣма. Свѣжее сѣмя тоже дается по 1 драхмѣ въ видѣ каши, какъ превосходное мочегонное и очищающее средство. *Жилиберъ*, съ дымянкою—*fumaria offic.* и вероникою ручейною—*v. bescabunga*, растерши съ сахаромъ, или ме-

(*) Линшоттенъ, Мартенсъ, Эгедъ, Ансонъ и другіе врачи и мореплаватели этимъ способомъ не только предохранили отъ цынги, но и пользовали въ самой высочайшей степени свирѣпствующій на морѣ скорбутъ.—Форстеръ, въ своемъ путешествіи вокругъ свѣта, тоже подтверждаетъ спасительное дѣйствіе ложечной травы.

домъ, составлялъ весьма полезную консерву въ упомянутыхъ болѣзняхъ, особенно въ цынготной ломотѣ, зависящей отъ худосочія—*sachexia scorbutica*.—Полупціи, растворивъ въ 6 унц. бѣлаго вина, давалъ каждый часъ по столовой ложкѣ отъ запора мочи—*ischuria*, и мѣсячныхъ кровей, съ хорошимъ уснѣхомъ.

ВЪ АПТЕКАХЪ ПРИГОТОВЛЯЮТЪ:

1. *Сокъ ложечной травы* съ другими противу-цынготными растеніями,—*succus cochleariæ offic. compositus* (*), который пьютъ обыкновенно весною, какъ выше сказано: въ цынгѣ, и другихъ худосочіяхъ—*sachexiæ*: *Виліе*.—Въ недостаткѣ ложечной травы, я употреблялъ жеруху, капуцны и щавель, изъ коихъ свѣжовыжатый сокъ давалъ по полчайной чашкѣ съ сывороткою, нѣсколько разъ въ день.

2. *Консерву*,—*conserva cochleariæ* (**), которая, особенно для мореплавателей, очень полезна, и долго можетъ сохранена быть; дается на приѣмъ: отъ 1—4 драхмъ. Снаружи: съ угольнымъ порошкомъ, смѣшаннымъ по равной части, служитъ лучшею зубочистною башкою—

(*) *Pharmacop. castrens. R. p. 381; et civilis R. p. 256.*

(**) Тамъ же, стр. 199.

electuarium dentifricium, предохраняющею десны и зубы отъ цынготной порчи—stomacase.— Кашку эту я давалъ внутрь по полунціи 2—3 раза въ день: въ кровавомъ поносѣ, и астеническихъ кровотеченіяхъ цынготнаго свойства—profluvia scorbutica, s. atonica,—золотушнымъ и англійскою болѣзнію страдающимъ дѣтямъ—infantes scorbutosi, rachitici, у коихъ членовые составы, шейныя железы и брюшныя боли распушія, съ сопутствовавшей изнурительною лихорадкою—f. lenta, и сыпями по разнымъ частямъ тѣла: 3 раза въ день, по десертной ложкѣ.

3. *Спиртъ ложечницы*—spiritus cochleariæ, (*) внутрь дается, какъ побуждающее, вѣтрогонное и мочегонительное средство: отъ 30—60 капель. Снаружи по 1 или по 2 унціи прибавляется къ противуцынготнымъ полосканьямъ—collutoria scorbutica, и хорошо разводитъ цынготныя пятна на ногахъ: *Пленкѣ*. Въ цынготномъ параличѣ, *Вермофъ* совѣтуетъ этимъ острымъ спиртомъ тереть разслабленные члены и давать внутрь, смѣшавъ съ пряною ароматною кислотою—acid. sulphuric. aromatic. по 30 капель, 2—3 раза въ день.

(*) Тамъ же р. 249.

Примѣчанія. 1. По опытамъ *Кремля*, эта трава содержитъ летучую щелочную соль, ощущаемую даже при треніи свѣжихъ листьевъ, которые перегонкою даютъ бѣлое, весьма душистое летучее масло, столь пронизательное, что 1 капля онаго сообщаетъ запахъ и вкусъ ложечницы 16 унц. воды, или виннаго спирта.—Масло это можно давать цынготнымъ при слабости желудка, по 1 капль, на сахаръ.—Оно столь тяжело, что погружается въ водѣ на дно сосуда: *Картейзеръ*, *Левисъ*.

2. Въ Исландіи траву эту овцы ѣдятъ съ жадностію, и отъ ней жирѣютъ, но масло и мясо ихъ бываетъ отъ этого корму невкусное: *Еггертъ*, *Олафзенъ*.—Исландцы готовятъ листья съ кислымъ молокомъ, и употребляютъ оное въ снѣдь; также и на зиму заготавливаютъ, соля въ большихъ кадкахъ: *Бергій*.—Такимъ образомъ можно въ прокъ готовить на зиму и нашу жеруху или рыжуху—*sisymbrium nasturtium*.

3. Одинъ свѣжовыжатый сокъ изъ этого растенія замѣняетъ всѣ противуцынготныя средства.—Я замѣтилъ, что наша жеруха, съ водянымъ трилистникомъ и щавелемъ, составляютъ также превосходный противуцынготный сокъ.—Смѣшавъ онаго полюбутылки, съ равнымъ количествомъ молочной

сыворотки, можно пить по 2—3 чайныя чашки въ день, отъ цынготной болѣзни, запивая по рюмкѣ бѣлымъ, или краснымъ винограднымъ виномъ.

4. *Питье, испытанное отъ цынготной болѣзни*, составляется изъ горети ложечной травы, столько же ключеваго кресса и листьевъ съ кореньями конскаго, или водянаго щавеля—*gumex acutus*, v. г. *hydrolapathum*, которыя, изрѣзавъ, варить въ 6 бутылкахъ воды $\frac{1}{4}$ часа, или полчаса; потомъ, процѣдивъ, прибавить 1 бутылку винограднаго вина, и пить ежедневно этотъ отваръ по 3 стакана.

5. Ложечная трава и жеруха могутъ совершенно замѣнить: бразильскую айапану—*ayurapa*, которой особенную противуцынготную силу приписываютъ: *Алиберъ* и *Кадетъ* (*).

ЛОМАНОСЬ, или ЖИГУНЕЦЪ; ЖИГУЧКА СТЕЛЮЩАЯСЯ;
БОРОДАВОЧНЫЕ ВОЛОСЫ—*clematis recta*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, во всей Россіи произвольно растущее, особенно на увалахъ около Самары.—Цвѣтетъ въ Іюлѣ и Августѣ.

(*) *Bodard. Cours de Botanique medic. comparée*, T. I. p. 123.

Качества—травы и цвѣтовъ зависятъ отъ остраго начала;—*запахъ* свѣжей цвѣтной травы слабый; *вкусъ*: острый, жгущій, сухой травы гораздо слабѣе; но сухихъ и палитыхъ горячею водою цвѣтовъ постоянно острый.

Сила разводящая, мочегонительная, потогонная, противулюбоострастная; снаружи свѣжей травы: воспаляющая кожу, и натягивающая пузыри, —vesicans.

Употребленіе. Въ застарѣлой венерической болѣзни, ночныхъ боляхъ костей и костяныхъ опухоляхъ—*exostosis syphilitica*: *Штеркъ*; въ мокротной долговременной чесоткѣ—*psora humida*, жестокой головной боли—*септалѣа*, меланхоліи и твердыхъ членовыхъ опухоляхъ: *Карпинскій*, *Бурдахъ*.—Снаружи толченая свѣжая трава прикладывается для очищенія грибовидныхъ венерическихъ, костоѣдныхъ и раковыхъ язвъ—*ulcera phagedænica*: *Галлеръ*, *Муррай*, *Шведіоръ*; также и въ подагрическихъ боляхъ свѣжую катаплазму изъ этой травы, какъ отвлекающее средство—*tubefaciens* хвалить *Шесно*;—приложенная къ ручнымъ пульсамъ на короткое время предъ приступомъ лихорадки, прерываетъ оную; равно помогаетъ и отъ головной долговременной боли, прикладываемая къ затылку: *Розье*. Онъ же со-

вѣтуеть употреблять это средство вмѣсто фонтанели, для извлеченія болѣзненной пасоки, и для открытія старыхъ засушенныхъ ножныхъ ранъ.—Траву съ цвѣтами, вымоченную въ уксусъ, *Диоскоридъ* давалъ вмѣсто салата мокротнымъ астеникамъ; *Маттіоль* и *Борелль* тоже хвалятъ въ долговременныхъ мокротныхъ болѣзняхъ.

Количество. Цвѣтной травы для наливки полагается отъ 2—3 драхмъ на фунтъ горячей воды, которую, вскипятивъ однажды въ покрытомъ сосудѣ и процѣдивъ, принимать по 4 унціи: 2, 3, или 4 раза въ день. Сухой травы и цвѣтовъ: въ порошокъ даютъ по 3 грана смѣшанные съ двойнымъ количествомъ сахара, или истертаго солотковаго корня, 3 раза въ день; умножая исподволь приемы до 5 и 10 гранъ: *Бернй*.—4 грана этого порошка, смешанные съ 20 гран. корня горечавки, давая 3 раза въ день, я скорѣе этимъ средствомъ излечивалъ перемежныя лихорадки, нежели хиною.—Снаружи употребляется въ видѣ примочки, катаплазмы и присыпки, очищающей худосочныя язвы.—Наливка цвѣтной травы, состоящая изъ полуунции оной, и 1 фунта кипячей воды, служить для омыванія упорной чесотки — *psora rebellis*.

ВЪ АПТЕКАХЪ ИЗЪ СВѢЖЕЙ ТРАВЫ ПРИГOTOВ-
ЛЯЮТЬ:

Экстрактъ ломаносный—extract. fol. ges. *Platmulæ jovis* (*), который въ упомянутыхъ болѣзняхъ тоже съ пользою дается: отъ 1—3 гранъ съ сахаромъ въ порошокъ, или въ пилюляхъ, съ другими приличными экстрактами.

лукъ огородный, или сажанецъ; цибуля—*allium*
сера, 1.

Мѣсто. Растеніе двухлѣтное, во всей Рос-
сїи садовое, или въ огородахъ растущее.

Качества. Луковичный свѣжій корень и сокъ онаго *запахъ* имѣютъ собственный, тя-
желоватый, летучій; *вкусъ* сладковато-острый. Свѣжая разрѣзанная луковица, острымъ своимъ
началомъ, столь сильно раздражаетъ глаза, что
даже слезы извлекаетъ.—Свойство это, по
опытамъ *Вокеллена* и *Фуркроя*, зависитъ
отъ летучаго остраго масла, соединеннаго съ
малымъ количествомъ сѣры.—По разложенію
другихъ химиковъ, лукъ содержитъ: сахарное
вещество, клейкое, подобное животному клею
—*gluten*, фосфорную кислоту и лимонно-ки-

(*) Pharmacop. Rossica, p. 210.

слую известъ—*citras calcis*.—*Гагенъ* и *Кадетъ* полагаютъ: сахарно-клейкое вещество, соединенное съ летучимъ острымъ масломъ.

Сила свѣжаго побуждающая, потогонная, мочегонительная, противуглистная, противуцынготная, снаружи раздражающая; варенаго или печенаго лука: смягчительная, созрѣвающая, или ускоряющая нагноеніе—*maturans*.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Лукъ, обыкновенно употребляемый въ кушаньяхъ, полезенъ для страдающихъ водяною болѣзною и каменною—*hydricis et calculosis prodest*.—*Галенъ*, запрещаетъ лукъ холерикамъ: напротивъ флегматикамъ или многомокротнымъ весьма рекомендуетъ. *Аскленій* говоритъ, что эта пища, побуждая желудокъ, помогаетъ варенію, разведенію густыхъ мокротъ—*pituita tenax*, отдѣленію питательныхъ соковъ и, умножая отдѣленіе сѣмянн, возбуждаетъ похоть—*aphrodisiaca* (*); однако у многихъ производитъ вѣтры, волненіе крови и вздрагиванія во время сна.—Лукъ, употребляемый съ кислую капустою, служитъ хорошимъ противуцынготнымъ сред-

(*) Евреи особенно любятъ сырой лукъ; они наиболее ѣдятъ оный во время шабаса.—Не отъ того ли они такъ плодовиты?—Геродотъ, рассказывая объ Израильскомъ народѣ, скитавшемся въ пустынь, и Египтянахъ, дѣлаетъ объ этомъ таковое же заключеніе.

ствомъ.—Многократными опытами подтверждается, что всё тѣ, которые при появленіи цынги, въ первой ея степени, какъ на морѣ, такъ и на сухомъ пути, ежедневнымъ употребленіемъ упомянутаго салата, предохраняютъ себя отъ оной.—Во многихъ странахъ Россіи, особливо въ сѣверной и азійской, сырой лукъ ѣдятъ съ хлѣбомъ, солью и квасомъ, отъ чего бываютъ здоровы, и имѣютъ свѣжій цвѣтъ въ лицѣ. Зеленый лукъ мѣшаютъ также въ салатахъ.—*Иппократъ* хвалитъ лукъ, какъ мочегонительное и грудное лекарство; въ первомъ случаѣ даютъ выжатый сокъ по нѣскольку унцій въ день, подсластивъ сахаромъ или медомъ; во второмъ, употребляютъ печеный или жареный лукъ съ свѣжимъ масломъ—*seræ assatæ*: отъ кашлю, мокротной одышки и другихъ грудныхъ припадковъ,—*Ланзонъ* однимъ лукомъ, употребляемымъ въ пищу, вылечилъ больного, одержимаго брюшною водяною болѣзною—*asceticum sanavit*.—Особы, коимъ противенъ лукъ сырой, могутъ готовить его въ уксусѣ; также варенныя 2 или 3 луковицы съ укропомъ и петрушкою въ супахъ, многимъ помогаютъ въ начинающей водяницѣ—*hydrops incipiens*. Печеный въ золѣ лукъ, растертый съ масломъ, прикладывается въ видѣ тепловатой катаплазмы къ лобку и промежному таку—*reginaeum* отъ запора мочи: *Шпиль-*

манъ. Равнымъ образомъ и отваренный въ молоко лукъ составляетъ катаплазму, столько же полезную: *Шульце*. Съ прибавленіемъ 1 золотника толченаго перца, и ползолотника шафрана, прикладываютъ къ боковому колотью—pleuritis, перемежная тепловатую припарку каждые 4 часа, пока утихнетъ боль.—Одна молочная луковая катаплазма употребляется также для умягченія вередовъ, нарывовъ, паховиковъ, (бубоновъ), мозолей, и почечуйныхъ болящихъ шишекъ: *Крамеръ*.—Печеный, прикладывается также съ хорошимъ успѣхомъ: къ затвердѣлымъ скуловымъ опухолямъ—parotides, бубонамъ, и къ мозолеватымъ венерическимъ шишкамъ—condylomata callosa: *Гардинеръ*, *Мленкъ*.—Лукъ, настоянный въ бѣломъ виноградномъ винѣ, тоже хорошо гонитъ мочу, песокъ, отвращаетъ запоры оной, боль поясницы, и истребляетъ мелкія задне-проходныя глисты—ascarides; принимаютъ эту настойку на тощакъ, по рюмкѣ.—Другое средство: возми толченаго луку, живыхъ мокрицъ—millepedes, лимоннаго соку, и миндальнаго, или маковаго масла: по 3 лота cadaго; налей бутылку бѣлаго вина, и настоявъ сутки (24 часа), принимай, какъ сказано выше.—Средство это тоже испытано отъ глисть—vermes, и каменной болѣзни—lithiasis.—Снаружи выжатый сокъ, закладываемый въ ухо посредствомъ на-

питанной хлопчатой бумаги, пользуетъ ушную простудную боль—*otalgia rheumatica*, и звонъ или шумъ въ ушахъ—*sonitus aurium*: *Диоскоридъ*. — Смѣшавъ съ медомъ, мажутъ глаза при тусклости зрѣнія, или начальной слѣпотѣ—*suffusio*: *Фогель*.—Другіе совѣтуютъ: вынуть сердце или средизу изъ луковицы, наполнить пустое мѣсто тминомъ, и закрывъ оное тѣмъ же кускомъ луковицы, исечъ оную подъ горячею золою; потомъ, когда поснѣеть, выжать изъ нея сокъ, который удивительно помогаетъ отъ простудной глухоты—*dyscæa*, шуму, и другихъ ушныхъ припадковъ, впуская въ слуховой проходъ ежедневно по нѣсколько капель.—Подобное средство предложено было при описаніи лѣтн.—Сырая истолченная луковица, съ малымъ количествомъ соли, къ свѣжей ожогъ приложенная, препятствуетъ сдѣлаться пузырямъ, и укрощаетъ сильное раздраженіе; по снятіи же сыраго, печеный лукъ въ послѣднемъ случаѣ тоже хорошо полезенъ.—Другіе совѣтуютъ къ обожженному мѣсту, пока не вздулся пузырь, немедленно приложить истолченную луковицу съ большою щепотью соли, и малымъ кусочкомъ мыла.—Истолченная съ медомъ и солью, служитъ хорошимъ средствомъ отъ укушенія бѣшеныхъ собакъ и другихъ ядовитыхъ жи-

вотныхъ—*morsuræ venenatae* (*). Печеный лукъ, съ кислымъ тѣстомъ и медомъ прикладываемый, ускоряетъ медленное нагноение вередовъ или нарывовъ: *Сиполовичъ*.

Количество. Сырой лукъ можно ежедневно кушать въ салатахъ; или по 3 небольшихъ луковицы варить въ фунтѣ телячей похлѣбки—*in jusculo vitulino*; выжатый сокъ, подслащенный сахаромъ или медомъ, принимаютъ по 2 унціи; или въ видѣ винной настойки, какъ выше сказано.—Снаружи въ видѣ *млечительной* и *созрывающей катарлазмы*—*catarlasma pus matigans*; прикладывается съ медовою лепешкою, или съ какою-нибудь смолистою мазью (**).

Примѣчанія. 1. Огородный лукъ, по мочегонительному своему свойству, подходитъ къ морскому луку—*scilla maritima* L., который въ недостаткѣ, равно какъ и безвременный цвѣтъ—*colchicum autumnale*, можемъ удобно замѣнять.

2. Опытные экононы въ ссыпанную рожь, пшеницу и другія хлѣбныя зерна кладутъ луко-

(*) См. Источникъ здравія, или Словарь касательно сохранения здоровья и врачеванія болѣзней, и проч. М. 1800 г., стр. 118, 121.

(**) *Pharmacop. castrens. R. p. 232.*

вицы, отъ которыхъ червь въ хлѣбѣ никогда не заведется.—Увѣряютъ многіе, что во время мороваго повѣтрія, или иныхъ прилипчивыхъ болезней, ежели развѣшать въ комнатахъ связки луковиць, то этимъ способомъ уничтожается зараза, и воздухъ въ покояхъ очищается.—Для этого же намѣренія, во время скотскаго падежа, продѣвъ на нитку побольше луковиць и чесноковиць, привязываютъ оныя на шею коровамъ, лошадямъ, и другимъ домашнимъ животнымъ, чтобы не заразились.

3. Луковый сокъ, по увѣренію *Діоскорида*, способствуетъ рощенію волосъ, если онымъ мазать ежедневно тѣ мѣста, гдѣ хочется отрастить волосы. — Для этого нѣкоторые, разрѣзавъ пополамъ свѣжую луковицу и намазавъ сотовымъ медомъ, трутъ плѣшивую голову, или другія безволосыя мѣста—*алоресія*.—Другіе обжариваютъ лукъ съ травой песьяго языка—*synoglossum offic.* въ свиномъ салѣ и, выжавъ сквозь полотенце 12 золотниковъ сока, смѣшиваютъ съ 3 золотниками чистой медовой патоки.—Этою мазью натираютъ вылинявшее мѣсто, на которомъ волосы въ 2 недѣли вырастаютъ: *Галле* (*).

(*). См. Его же сочищ. *Zauberkräfte der Natur* etc.

4. Мелкій лукъ, очистивъ отъ щелухи и вымочивъ въ росолѣ, варятъ потомъ въ уксусѣ, и такимъ образомъ заготавливаютъ въ прокъ, для приправы разнаго кушанья: *Берийи*.

5. Когда лошадь наступитъ на гвоздь, или другимъ образомъ повредитъ копыто; тогда истолки нѣсколько цибульныхъ луковницъ съ печною сажею и, прибавивъ немного пшеничныхъ отрубей, сдѣлай съ уксусомъ тѣсто, и намазавъ на тряпку, обвяжи онымъ копыто.—Или поджарь истолченаго луку въ салѣ; прибавь пшеничныхъ отрубей, и немного уксуса, и обложи этою мазью копыто.— Ежели лошадь страждетъ запоромъ, то истолки 2 большихъ луковницы съ 1 горстью печной сажки, и разведши 2 стаканами коровьяго молока, дай выпить.— Это же средство, вливаемое больной лошади въ горло, чрезъ 2 дня по стакану, помогаетъ отъ запалу и студенца, или простуды, бывающей у лошадей.— Для назрѣванія мытовыхъ желваковъ и бывающихъ около сальца у заднихъ ногъ: истолки 2 печеныхъ луковницы съ 2 горстями льняной муки, и разведя немного пивными свѣжими дрожжами, намазавъ на тряпку, прикладывай, перемѣняя ежедневно.

6. *Предохранительное средство во время скотскаго надежа.* Зараженной скотинѣ вклады-

ваютъ въ проходъ большую луковицу, разрѣзанную на четверо, и набитую солью. Это производитъ поносъ, и такимъ образомъ скотъ, очистившись, выздоравливаетъ.—Другіе даютъ *чистительное питье* коровамъ и лошадямъ, состоящее изъ 3 большихъ луковицъ, истолченныхъ съ горстью соли, которыя, разведши бутылкою пива, вливаютъ за одинъ разъ въ горло.

ЛЪВИНОУСТЬ СЕРДЕЧНЫЙ, или СЕРДЕЧНАЯ ТРАВА;
СЕРДЕЧНИКЪ; ГУСНИНАЯ ЛАПА; ЛЬВИНЫЙ ХВОСТЪ; ДИКІЯ
КРАПИВА—*leopurus cardiaca*, l.

Мѣсто. Растеніе двулѣтнее, по необработаннымъ и запущеннымъ мѣстамъ, около огородовъ и садовъ растущее; въ С. Петербургской округѣ: около рѣки Волхова, Ладожскаго канала, на Пулковской и Дудеровой горахъ, и по разнымъ деревнямъ около жилья; также на Уралѣ и въ Киргизской степи.

Качества. Все растеніе имѣетъ *запахъ* крѣпкій, который сушеніемъ теряется; *вкусъ* пряногорькій, горячительный.

Сила разводящая, желудочная, укрѣпляющая.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ видѣ наливки употребляется въ истерикѣ, трепетаціи сердца, желудочныхъ спазмахъ, отъ кислоты и вязкихъ мокротъ; въ брюшныхъ мокротныхъ завалахъ, ипохондрическихъ припадкахъ, запорѣ мѣсячныхъ и родовыхъ кровей, теченіи бѣлей, слабости нервовъ и отъ глисть, *Бурдахъ* рекомендуетъ, какъ для старыхъ людей, такъ и для малолѣтнихъ. *Галлеръ* хвалитъ въ простудныхъ мокротныхъ лихорадкахъ, въ мокротной одышкѣ, дѣтскомъ увѣчьи, и во всѣхъ астеническихъ припадкахъ, не сопряженныхъ съ судорожными движеніями: *Розье*.—Снаружи, тоже прикладываются съ пользою свѣжіе толченые листы къ ушибеннымъ частямъ, и для заживленія ранъ; или въ видѣ припарки, разводящей воспалительныя опухоли, и отражающей гнилость язвъ, антоновымъ огнемъ обжигать: *Соболевскій*.

Количество. Полунціи травы наливается 8 унціями воды, которую, вскипятивъ и процѣдивъ съ выжимкою 6 унц. жидкости, принимать по 2 столовыхъ ложки, нѣсколько разъ въ день, или каждые два часа.—Сушеной травы тоже количество наливается бѣлымъ виномъ. Снаружи въ видѣ катаплазмы или припарки.

Примѣчанія. 1. Многіе Татары собираютъ эту траву осенью, сушатъ ее на воздухѣ, и треплютъ, какъ обыкновенно поступаютъ съ коноплею, чрезъ что получаютъ родъ льна, который прядутъ, дѣлаютъ полотно, и проч.

2. Оцую ѣдятъ охотно козы, овцы и лошади; коровы не много, свиньи не трогаютъ.

3. Поселяне свѣжіе растертыя листья прикладываютъ къ ранамъ для заживленія оныхъ, и разведенія багровыхъ ушлбовъ, или убоевъ.

ЛЮТИКЪ, или ПРОСТРЕЛЬНАЯ ТРАВА; БОРЕЦЪ, ПРЕГРЯДЪ; ПРИКРЫТЪ; ЦВѢТОЧНИКЪ—aconitum napellus et neomontanum: W.——tauricum: (Wulff.)

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, въ южныхъ краяхъ Россіи по Волгѣ, и въ Сибири растущее на горахъ, самородно, и въ садахъ разводится удобно сѣмянами; цвѣтетъ въ Іюль и Іюль.

Качества—травы или листовъ ядовитыя, зависящія отъ остраго усмынительнаго начала; *запахъ* крѣпкій, тошнотавый; *вкусъ*: острый, колюій. *Бухгольцъ*, по новѣйшему разложенію, полагаетъ смолисто-экстрактное летучее начало, соединенное съ фосфорно-кислотою, и яблочнокислою известью—phosphas et malas calcis.

Сила, въ маломъ количествѣ, побуждающая, чрезвычайно разводящая, потъ и мочу гонящая; въ неумѣренномъ: сильно раздражающая, усыпительная, ядовитая; *Венферъ, Куртень, Штеркъ*.—Корень имѣетъ еще больше ядовитости, такъ, что 15 гранъ, данные собакамъ, произвели жестокую рвоту и судорожную корчъ во всемъ тѣлѣ; по чему во врачебномъ искусствѣ и не употребляется: *Амбодикъ*.

Употребленіе. Въ видѣ сгущеннаго сока или экстракта, приготовляемаго въ аптекахъ изъ еврейской молодой травы—succus spissatus a. neomontani (*): *Штеркъ и Коллинъ* многими опытами и наблюденіями испытали полезное онаго дѣйствіе: въ застарѣлыхъ ломотахъ, шіятихъ, или вертлужной боли—malum ischiadicum, членовныхъ венерическихъ боляхъ, костныхъ опухоляхъ или наростахъ—exostoses, и недвижности составовъ.—Съ разнымъ успѣхомъ пользу онаго же подтверждаютъ Шведскіе врачи: *Бломъ, Оделій, Гастъ* и другіе(**). *Розенштейнъ* этимъ экстрактомъ укротилъ самую жестокую боль головы—sæphalea dirissima, сопровождаемую съ мѣстными конвульсіями; *Рибе* выпользовалъ ревматизмъ, сопряженный съ недвижимоścią членовъ и су-

(*) Pharmacop. castr. R. p. 362.

(**) Schwed. Abhandl. XXXVIII R. p. 72.

дорожнымъ напряженіемъ мускуловъ; *Муррай* и *Теленіусъ*, укрощали всякаго рода ломотныя боли и подагрическія, сопряженныя съ конвульсіями; *Розенъ* и *Шшоль* тоже удачно лечили этимъ средствомъ судорожныя болѣзни—*morbi convulsivi*, даже повсемѣстную судорожную борчь, наз. пляскою С. Вита—*chorea S. Viti* и столбнякомъ—*tetanus*, что самое повторенными опытами подтверждаетъ *Рейшолдъ* (*).—*Мигъ*, внутреннимъ и вѣрхнимъ употребленіемъ, развея твердую колѣнную опухоль, причинявшую недвижимость состава; *Штеркъ*, *Менхъ*, *Гредингъ* и *Коммъ* тоже очень дѣйствительнымъ средствомъ поставляютъ для разведенія золотушныхъ затвердѣній железъ на шеѣ, скірриныхъ грудныхъ опухолей и при венерическомъ затвердѣніи ядеръ; въ упорныхъ язвахъ, ракъ и костоѣдѣ, хвалятъ: *Пипенбригъ*, *Янъ*, *Колсбургъ*, *Фукетъ*, *Шведіоръ*; въ упорныхъ 4-дневныхъ лихорадкахъ, сопряженныхъ съ брюшными завалами, гдѣ хина не дѣйствуетъ, прострѣльной травы экстрактъ оказываетъ желаемый успѣхъ. Онымъ же хорошо пользовали падучую болѣзнь, меланхолію, сумасшествіе, елѣпоту—*amaurosis*, параличныя расслабленія языка, глазъ, мочеваго пузыря и онемѣлость

(*) Diss inaug de Aconito Napello. Argentor. 1769.

или бездѣйствіе членовъ—*resolutio membrorum*: *Колмицъ, Штеркъ, Шенкенбургъ, Балдингеръ, Одеши, Гредингъ*; въ долговременномъ маточномъ кровотеченіи, зависящемъ отъ ослабленности и заваловъ матки, хвалить *Бергii*; въ удушѣ и начинающей чахоткѣ, особенно отъ затвердѣній легкаго—*phthisis tuberculosa*: *Геккеръ, Бушъ*. Наконецъ, для очищенія кожныхъ долговременныхъ сыпей, особливо злой чесотки—*scabies ferina*, лишавей, паршей и колтуновъ—*plica polonica*: *Виліе, Бурдахъ*.

Количество. Сгущеннаго сока или экстракта, отъ 1—2 гранъ, даютъ въ порошокъ съ сахаромъ; или въ пилюляхъ, мало по малу возвышая пріемъ до 3 гранъ; сумашедшимъ исподволь давали: до 6—10—20 и 30 гранъ. Свѣжовысушенныхъ листовъ, въ порошокъ, отъ 2—5—10 гранъ, растерши съ сахаромъ;—въ видѣ пилюль, смѣшавъ съ экстрактомъ болгодовнымъ—*extract. conii im.*, я давалъ къ ночи: отъ 4—5 гранъ, для укрощенія боли въ костяхъ—*osteodynia nocturna*, s. *dolor osteocopus*; или въ видѣ *спиртной настойки*—*tinctura hb. aconiti*, наливая по методу *Кемфа*: 6 частей виннаго спирта на 1 часть сухой прострѣльной травы, которую онъ и *Тилениусъ* давали съ желаемою пользою въ упомянутыхъ болѣзняхъ: отъ 20 —

40 капель.—Новѣйшіе врачи болѣе хвалятъ эфирную настойку — *tinctura aconiti ætherea*, полагая одну унцію сухой травы на 3 унціи винокупороснаго спирта — *æther sulphuricus alcoholisatus*.—На приемъ даютъ до 30 капель.— По методѣ *Меккеля*, отъ золотушной и лomotной тусклости глазъ, я употреблялъ съ хорошимъ успѣхомъ въ видѣ водяной наливки слѣд. образомъ: на 2—4 драхмы сушеныхъ листовъ, наливъ 1 фунтъ кипячей воды, и настоявъ $\frac{1}{2}$ часа, потомъ къ процѣженной жидкости, простывшей, прибавивъ 1 драхму гофмановыхъ капель—*liquor anod. h.* и подсластивъ сиропомъ, давалъ принимать по 3—4 унціи, три раза въ день.—У одного больного вышло нѣсколько круглыхъ глистовъ—*lumbrici*, и тѣмъ слѣпота кончилась.

Примѣчанія. 1. По опытамъ *Тоде*, требуется, чтобы при употребленіи этого средства первыя пути были чисты, и хорошимъ признакомъ служить, ежели въ скорости оказывается равномерный по всему тѣлу потъ, или только въ страждущихъ частяхъ тѣла, за этимъ скоро и боли утихаютъ; однако для отвращенія отрыжекъ, совѣтуетъ продолжать еще нѣсколько времени; но ежели при первыхъ приемахъ появится головокруженіе, тоска и изнурительный потъ, то въ такихъ

обстоятельствах *Ганеманнъ* совѣтуетъ тотчасъ прекратить употребленіе онаго, и спустя нѣсколь-ко времени, давать отъ $\frac{1}{2}$ —1 грапа ежедневно къ почкѣ, исподоволь умножая приемы; или въ видѣ эфирныхъ капель.—Если же въ теченіи 14 дней не послѣдуетъ желаемое дѣйствіе, то это приписать должно или худому приготовленію, или долговременному храненію экстракта, который болѣе года не можетъ быть дѣйствителенъ; ибо по отдѣленіи своей фосфорно-известковой соли—*phosphas calcis*, лишается и всего дѣйствія: *Кремль*, *Рейнгольдъ*.—Въ хроническихъ ломотахъ, костныхъ, почныхъ боляхъ, и разнородныхъ застарѣлыхъ сыняхъ, средство это гораздо съ болѣею пользою можно употреблять, нежели въ тѣхъ болѣзненныхъ припадкахъ, которые еще не такъ застарѣлы.—Нужно также наблюдать, чтобы не было при томъ полнокрівія, или стеническаго состоянія, сопровождаемаго воспаленіемъ; а потому, и въ летучей или непостоянной ломотѣ—*arthrititis vaga*, негодится.—Слишкомъ долгое употребленіе ослабляетъ желудокъ, и приводитъ чувства въ онѣмѣніе: *Шпрегель*.

2. Свѣжая трава и корень этого ядовитаго растенія, не осторожно, или по незнанію принятыя, производятъ слабость во всѣхъ членахъ, или пара-

личъ, судорожныя движенія въ лицѣ, желчную рвоту съ поносомъ, головокруженіе, помѣшательство ума, безчувственный обморокъ, и наконецъ смерть!—По такое жестокое дѣйствіе и опасную ядовитость болѣе приписываютъ: *лютику волкобойному*—aconitum lycostonum L., иначе *волчьимъ ядомъ* и *царь-травой* называемому, растущему около рѣкъ Волхова, по горамъ Уральскимъ, Сибирскимъ, и у Чертовой деревни.—Онь у всѣхъ писателей считается весьма острымъ ядомъ, которымъ древніе, по свидѣтельству *Маттіола* и *Бауина*, осужденныхъ на смерть преступниковъ отравляли(*); нынѣ же порошкомъ этого корня смѣшаннымъ съ мясомъ, умерщвляютъ волковъ и лисецъ.—Впрочемъ, траву его козы и овцы ѣдятъ безвредно; а отваромъ корня, въ деревняхъ, моютъ паршивую скотину, и для истребленія вшей.

3. Средства противудѣйствующія ядовитости лютика суть тѣже, которыя упомянуты при описаніи

*) Г. Амбодикъ тоже упоминаетъ въ своемъ Врач. Веществословіи: что въ Римѣ при владеніи Папы Климента VII. а потомъ въ Прагѣ, осужденнымъ на смерть давали внутрь свѣжіи борець для опыта; по принятіи онаго у этихъ несчастныхъ дѣлался обморокъ, съ послѣдующимъ глубокимъ сномъ, и разслабленностью всего тѣла.—которые припадки оканчивались смертію.

бѣлены, дурмана, красавицы и другихъ т. п. усыпительныхъ ядовъ—*venena narcotica*.

4. Прострельный лютикъ, или борецъ, врачевными своими силами, можетъ замѣнять не только баккаутъ—*guaiac. offic.*, но и ядовитое деревцо съверной Америки, наз.—*rhus radicans, et. r. toxicodendron. l.*, которое новѣйшіе врачи отлично одобряютъ въ нервныхъ параличныхъ расслабленіяхъ и весьма упорныхъ ломотахъ.

5. Крѣпкій отваръ этого растенія, какъ прострельнаго, такъ и волкобойнаго лютика, можно употреблять для истребленія вшей, у свиней и удругой скотины размножившихся; онымъ же брызгая, истребляютъ клоповъ, таракановъ и другихъ вредныхъ насѣкомыхъ.

М.

МАЮРАПЪ; ДУШИЦА САДОВАЯ—*origanum
maiorana, l.*

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, въ Россіи садовое, цвѣтущее во все почти лѣто.

Качества. Цвѣтной травы или верхушекъ *запахъ* благовонный, пріятный; *вкусъ*: пряный,

горьковатый, зависящій отъ экстрактаго вещества и летучаго масла, дающаго настоящую камфору: *Прустъ*.

Сила побуждающая, разводящая, желудочная, укрѣпляющая, мѣсячногонная и чихоту возбуждающая.

Употребленіе. Въ застарѣлой простудѣ, мокротной одышкѣ, нервныхъ головныхъ и маточныхъ припадкахъ, особенно въ продолжительномъ насморкѣ, головокруженіи, звонѣ въ ушахъ, трясеніи членовъ, и параличныхъ разслабленіяхъ, происходящихъ отъ дряхлости: *Шпильманъ, Краицъ, Пленкъ*.—Въ падучей болѣзни, цвѣтныя верхушки, растерши съ сахаромъ, давалъ по 30 гранъ *Фонсека*.

Количество. 1 драхма верхушекъ наливается 4 унціями кипячей воды, которую пьютъ вмѣсто чаю; снаружи, въ видѣ чихотнаго порошка, растерши съ сахаромъ, и припарки, или свѣжей катаплазмы, разводящей трердыя грудныя опухоли, хвалитъ *Коггаузенъ*. Гнанымъ маіораннымъ масломъ—oleum destill. m. натираютъ пораличные члены, животъ для утоленія вѣтренной колики, и помазываютъ дѣтямъ въ носу, при завалѣ нозрдей клейкими мокротами, или при недостаточномъ обоняніи—anosmia.—Гнанное масло даютъ внутрь отъ 5—6 капель; снаружи прибавляютъ къ пара-

личнымъ мазямъ и бальзамамъ, какъ упомянуто при описаніи лаванды.

Примѣчанія. 1. Эфирное масло маіорана, при долговременномъ стояніи въ холодномъ мѣстѣ, получаетъ камфорный отсѣдъ: *Bergii*.—Это смолясто-камфорное вещество можетъ дѣйствительно замѣнять камфору: *Бодаръ*.

2. Въ Германіи, это очень пріятное растеніе употребляется для приправы кушанья;—италианцы прибавляютъ къ салатамъ.

3. Маіоранъ, душица простая, богородская трава, базиликъ, лаванда, мята и розмаринъ составляютъ лучшіе *ароматные травныя сборы*—*species aromaticæ*, употребляемые въ видѣ сухихъ и мокрыхъ припарокъ или нервокрѣпительныхъ ваннъ, о которыхъ упомянуто было и въ другихъ мѣстахъ. *О чихотномъ порошокѣ*, полезномъ отъ головныхъ мокротныхъ припадковъ—*colluvies serosa* смѣтри выше.

МАІОРАНЪ КОШЕЧІЙ; КОШЕЧЬЯ ТРАВА—*teucrium marum*, l.

Мѣсто. Полукустарникъ въ умѣренной Россіи садовый; цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іулѣ.

Качества превосходныя, зависящія, отъ летучаго камфорнаго масла; *запахъ* травы и цвѣтныхъ верхушекъ довольно душистый, камфорный; *вкусъ*: островато-горькій, горячительный.

Сила возбуждающая, нервная, противуеудорожная, укрѣпляющая мочу и мѣсячныя крови гонящая. Снаружи разводящая и возбуждающая чихоту.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ слабости нервной системы, спазмахъ, истерикѣ, апохондріи, удушѣ, упорномъ кашлѣ и грудной водяной болѣзни—*hydrothorax*: *Далгренъ* (*), также: въ худосочіи, запорѣ кровей, блѣдноцвѣтн и водяной болѣзни, хвалить *Линсей*; въ сонливыхъ припадкахъ, нервной горячкѣ—*turphus*, боли головы, и забывчивости: *Картеизертъ*, *Пленкъ*, *Шведіортъ*; въ насильственномъ потрясеніи мозга или другой важной внутренности, причиняющемъ обморокъ и расслабленіе, какъ то случается при паденіяхъ, контузіяхъ и проч.: *Бергій*; въ мокротныхъ завалахъ внутренностей и железъ: *Гофманъ*, *Ведель*; въ сывороточномъ пострѣлѣ и ударѣ

(*) *Analepticum summum est et systema nervosum debilitatum torpidumque excitat, serenando et roborando vires suas exerit. Dahlgren, Diss. de Maro, præc. v. Linæ Upsal. 1774.*

астеническаго свойства: *Жилиберъ*.—Нюхаемый въ порошокъ, отвращаетъ долговременный насморкъ, и возстановляетъ обоняніе: *Квинци*.—Оный употребляютъ одинъ, или вмѣстѣ съ маіораномъ, какъ выше сказано.

Количество. Для водяной или винной наливки, полагаются 1—2 драхмы на 6 унц. жидкости; въ порошокъ даются внутрь: отъ 20—30 гранъ, 3 или 4 раза въ день съ виномъ, или съ медомъ въ видѣ каши.—Снаружи, какъ выше сказано; также въ видѣ разводящихъ припарокъ и укрѣпляющихъ ваннъ.

Примѣчанія. 1. Коты и кошки очень любятъ это растеніе, которое они грызутъ и дѣлаютъ съ нимъ смѣшныя прыжки; впрочемъ оно полезно во время повального бѣшенства или падежа кошекъ —*lues felium epidemica* и для приманки, гдѣ нужно имѣть этихъ животныхъ.—Лошадямъ и рогатому скоту для предохраненія отъ падежа даютъ въ пиво, полагая 1 горсть травы на полбутылки жидкости: *Розе*.

2. По своему нервокрѣпительному свойству, растеніе это не уступаетъ корицѣ, кардамону и инбирю: *Бодаръ*.

3. Ежели при броженіи барды, или хлѣбнаго затора полагается это растеніе, то перегонкою извлекается очень пріятная ароматная водка: *Фогель*.

МАІОРАНЪ лошадиный, или конскій чеснокъ; ДУБОВКА
—teucrium scordium, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, въ южной Россіи произвольно растущее на мокрыхъ лугахъ и болотныхъ мѣстахъ; также по Оренбургской линіи и въ Исетской области въ прилѣскахъ, и по низкимъ мѣстамъ.

Качества. Трава имѣетъ *запахъ*: чесночный, тяжелый; *вкусъ*: пряно-горькій, острый, зависящій отъ летучаго масла и горькаго начала: *Жюсье*.

Сила укрѣпляющая, противугниlostная, противуглистная, потъ и мочу гонящая, разбивающая.

Употребленіе. Хвалить въ слабости желудка, и гнилыхъ злокачественныхъ горячкахъ *Галенъ*; внутрь и снаружи, при гниломъ разрѣшеніи влагъ и для укрощенія антонова огня, рекомендуетъ *Бургавъ*; въ брюшныхъ завалахъ, запорѣ кровей и водяной подкожной болѣзни—anasarca: *Клейнкнехтъ*; отъ глисть: *Риверій*; въ ревматизмѣ, шіятикѣ и другихъ простуд-

ныхъ ломотахъ: *Кранцъ*; въ кожныхъ болѣзняхъ, лишаяхъ, нечистыхъ и гнилыхъ язвахъ: *Вельшъ*; въ багровыхъ ушибахъ и антоновомъ огнѣ: *Шведіоръ*, *Бурдахъ*.

Количество. Для наливки полагають 1 или 2 щепоти травы на 6 унц. кипячей воды, или вина, которую принимаютъ по 2 или 3 унціи каждыя два часа.—Внутрь употребляемый вмѣсто чаю, снаружи въ видѣ припарки, по опытамъ *Кранца*, въ ломотныхъ болѣзняхъ оказываетъ такое же дѣйствіе, какъ и баккаутъ—*guaiac*. Снаружи, въ видѣ катаплазмы, укрощающей гнилость, прикладывается трава варенная съ виномъ; порошкомъ сухой травы тоже съ успѣхомъ присыпаются гнилыя язвы; укушенная припарка хорошо разводитъ ушибы и багровыя подкожныя кровоизліянія—*eschumota*: *Турнефортъ*.—Винную настойку свѣжаго и сухаго растенія, *Діоскоридъ* употреблялъ отъ угрызенія ядовитыхъ и бѣшеныхъ животныхъ, и въ злокачественныхъ лихорадкахъ, повально свирѣпствовавшихъ—*f. malignæ, pestilentiales*, полагая 2 горсти цвѣтущей травы на бутылку жидкости.

Примѣчанія. 1. Домашнему скоту, все растеніе, настоящее въ пивѣ, или въ порошокѣ даютъ отъ 1—2 лотовъ, въ гнилой повальной заразѣ.

2. Растеніе это по своему потогонному свойству можетъ замѣнять баккаутъ: *Бодаръ*.

3. *Теріакъ предохранительный*—*theriaca prophylastica*, составляется изъ равныхъ частей сушеныхъ верхушекъ конскаго чеснока, дубровки бѣлой, корня горечавки, кирказона, девесила, мауна и можжевеловыхъ ягодъ, истолченныхъ въ мелкій порошокъ, всего 8 лотовъ, смѣшавъ съ 12 лотами чистаго сотоваго меда. На приѣмъ малолѣтнимъ даютъ по чайной ложечкѣ, взрослымъ по десертной; домашнимъ животнымъ по 2—4 лота.—Средство это можетъ замѣнить: *Фракасторовъ*, *Андромаховъ* и *Митридатовъ* теріакъ, о которомъ было упомянуто.

МАКЪ БѢЛЫЙ САДОВЫЙ—*papaver somniferum*, l.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, во всей Россіи садовое; а не рѣдко самородно произрастаетъ на обработанныхъ поляхъ около пашень, какъ-то: у Горѣлаго кабака, у Рыбачей, и въ другихъ мѣстахъ и огородахъ по деревнямъ.

Качества. Зеленныя маковки имѣютъ запахъ нѣсколько усыпительный; вкусъ: горьковато-травяной; сѣмянъ: сладко-масляный, миндальный.

Сила зеленыхъ маволокъ болсудолительная, снотворная; сѣмянъ: питательная, мягчительная, притуплющая; масло имѣеть тѣже свойства.

Употребленіе. Древніе врачи отваръ маковыхъ головокъ, подслащенный медомъ, давали съ пользою въ простудномъ кашлѣ, и другихъ грудныхъ припадкахъ. Листы и цвѣты также одобряются, какъ снотворное и противусудорожное средство; по опытамъ *Бургава*, всѣ части этого растенія заслуживаютъ большую похвалу, употребляемая съ надлежащею осторожностію!—Бѣлый горьковатый сокъ, нарѣзываніемъ незрѣлыхъ маволокъ извлекаемый, подходитъ нѣсколько къ опию (*).—Онымъ натирають при ужаленіи насѣкомыхъ воспаленную или распухшую часть, также съ желаемымъ успѣхомъ примачивають

(*) Въ Германіи, вмѣсто опиѧ начали употреблять маковый экстрактъ съ удачнымъ успѣхомъ въ замѣну онаго.—Вѣнскіе врачи обратили на этотъ предметъ особенное вниманіе.—Керъ полагаетъ, что въ средней перепонкѣ зеленыхъ маковыхъ сѣмянниковъ содержится настоящій опій, имѣющій усыпительное начало, соединенное съ камедно-смолистымъ усыпительнымъ веществомъ. Въ Англіи *Аллейне*, надрѣзываніемъ свѣжихъ незрѣлыхъ маковыхъ головокъ, извлекалъ сокъ, подобный опию, который, сгустивъ, давалъ по 1 грану.

ядовитыя уязвленія пресмыкающихся живот-
ныхъ.—Одну чайную ложку этого сока,
смѣшавъ съ 1 чайною чашкою воды, я упо-
треблялъ въ глазныхъ воспаленіяхъ, какъ луч-
шую въ своемъ родѣ примочку.—Равнымъ
образомъ и сгущенный сокъ оказываетъ вели-
кую пользу, ежели полдрахмы онаго, растворивъ
въ 1 фунтѣ воды, промывать оною воспалиен-
ныя и болящія глаза: *Деманжонъ*. Свѣжія
маковки, толченныя вмѣстѣ съ листьями, слу-
жатъ болеутолительною припаркою, хвалимою
въ ломотныхъ боляхъ и опухоляхъ: *Пленкъ*.
Одни зеленые листья, съ солью толченые,
удивительнымъ образомъ пособляютъ въ шія-
тичѣ или крестцовой боли—*schiagra*, *soxagra*,
также и подагрическую боль скоро утоляютъ:
Соболевскій.—Цвѣты, наливаемые горячею
водою, или молокомъ, также вареные съ ме-
домъ или сахаромъ, служатъ для дѣтей полез-
нымъ средствомъ отъ бессонницы, простуды,
упорнаго кашля, колики въ животѣ и поносовъ;
молочный отваръ или наливка оныхъ дается
чрезъ нѣсколко часовъ, по столовой ложкѣ;
сиропъ по чайной.—Замѣтитъ надобно, что
ежели дѣтей часто поятъ маковою настойкою,
то онѣ въ продолженіи времени дѣлаются мало-
умными и глупыми! Примѣромъ служатъ Пер-
сіяне, которые незрѣлыми маковками, вмѣстѣ съ
сѣмянами отваривъ въ водѣ, упиваются до

безумія, и таковымъ повтореніемъ въ продолженіи жизни дѣлаются не только безгласными истуканами, но и преждевременно умираютъ въ безуміи: *Келпферъ*.—Маковое сѣмя *Иппократъ* и *Галенъ* хвалятъ какъ нѣжную питательную пищу, которая ни мало не усыпляетъ; но имѣеть свойства, подобныя сладкому миндалю; а потому приготовляемый изъ онаго оршадъ или молоко, даютъ съ пользою: въ воспалительной лихорадкѣ или огневицѣ — ругехіа, мочерѣзѣ, въ болѣзненномъ стволѣ теченіи, кашлѣ, хрипотѣ, и пр. Маковое масло, по своей чистотѣ и пріятности, преимущественнѣе постнаго или льнянаго масла; а потому не только въ пищу употребляется вмѣсто прованскаго и миндальнаго масла, но, не имѣя никакого противнаго запаха, служитъ также для составленія жидкихъ мазей—*linimenta*, предписываемыхъ особенно для нѣжныхъ особъ.

Количество. Маковокъ для отвара полунциі полагается на фунтъ воды, которую кипятятъ, пока останется 8 унц. жидкости. Отваръ этотъ можетъ служить и болеутолительнымъ промывательнымъ, особенно въ коликѣ, и болѣзненномъ теченіи мѣсячныхъ кровей — *menstruatio dolorosa* полезнымъ. Толченныя или истертыя въ порошокъ, и со ржаною мукою смѣшанныя, служатъ болеутолительною ката-

плазмой.—Сѣмянъ 1 унц. полагается на фунтъ воды для эмульси;—масла: отъ 1—2 унц. и болѣе даютъ внутрь въ тѣхъ же болѣзненныхъ припадкахъ.—Растертое сѣмя съ винограднымъ виномъ, *Диоскоридъ* давалъ отъ поносовъ, и женскихъ непомѣрныхъ очищеній—*profluvia muliebria*.

Въ аптекахъ готовятъ:

Грудные составные сборы съ маковками—*species pectorales compositæ* (*), коихъ полторы унции варятъ въ двухъ фунтахъ воды, пока останется полтора фунта отвара; пьютъ оный, подсластивъ медомъ и съ молокомъ, по чайной чашкѣ, нѣсколько разъ въ день.

Примѣчанія. 1. Маковое сѣмя замѣняетъ сладкій миндаль и его масло, какъ для врачебнаго употребленія, такъ и домашняго въ постныхъ кушаньяхъ.

2. Масло это изяществомъ своимъ подобно лучшему деревянному маслу, именуемому прованскимъ, и при жженіи не столь сильно коптитъ, какъ олива.—Я оно часто употреблялъ вмѣсто миндальнаго и клещевиннаго—*ol. ricini* отъ глисты,

(*) *Pharmacop. castrens. R. p. 345.*

смѣшавъ 1 унцію съ 1 драхмою гофмановыхъ капель. Оное годится также для салата, приправы постнаго кушанья, для живописи и составленія чистаго мыла—sapo oleosus, употребляемаго въ аптекахъ.—Опытныя старушки, маковое масло даютъ внутрь по столовой ложкѣ, когда корь будетъ застужена, или падеть на внутренности, которое гошть оную наружу.—Онѣ же, смѣшавъ по равной части маковое или льняное масло съ луковымъ сокомъ и клюквеннымъ, или барбариснымъ, даютъ дѣтямъ отъ глисть на тощакъ: по 1—2 столовыхъ ложки, смотря по возрасту, поделастивъ медомъ, чтобы болѣе привлечь глисты.

3. Остающіяся выжимки послѣ масла, или маковая збойна (макуха), служить питательною пищею для бѣдныхъ, и для откармливанія домашнихъ птицъ.

4. Экстрактъ маковыхъ зеленыхъ головокъ, по опытамъ вѣнскихъ врачей, можно употреблять вмѣсто опія.—Виншую вытяжку оныхъ—*extract. vinosum*, *Бульдюкъ* и *Галлеръ* давали: по 2—3—4 и до 5 гранъ съ хорошимъ успѣхомъ, гдѣ опій предписывается (*).

(*) Гютаръ, изъ 3 фунтовъ маковыхъ головокъ, извлекъ довольно крѣпкаго экстракта $4\frac{1}{2}$ унц., коего 2 грана.

МАКЪ КРАСНЫЙ полевой; дикій мачокъ—*paraveget rhöeas, l.*

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, въ южной Россіи самородно-растущее на поляхъ между нивянными растеніями, и во ржи;—цвѣтеть въ Іюнь и Іюль.

Качества. Свѣжихъ цвѣтовъ *запахъ* нѣсколько усыпительный, непріятный; *вкусъ* гольковато-клейкій.— По разложенію содержитъ: летучее масло, и клейкое начало; горько-усыпительное свойство, зависитъ отъ водотворно-азотныхъ частей: *Шпренгелъ*.

Сила легкая болеутолительная, притупляющая, потогонная.

Употребленіе. Употребляется въ грудныхъ простудныхъ боляхъ, кашлѣ, колотѣ и чревныхъ спазмахъ отъ вѣтровъ, или острыхъ мокротъ: *Багливъ, Шпильманъ, Пленкъ*.— Въ бессонницѣ и высыпныхъ лихорадкахъ, одобряютъ: *де-Рошфоръ* и *Пейриль*.

Количество. Въ видѣ наливки, полагается полунціи цвѣтовъ на 6 унц. горячей воды, которую пьютъ вмѣсто чаю.—Дѣтямъ даютъ

принятые внутрь, произвели сонъ, 6 часовъ продолжавшійся. Смотри: *Memoir des sciences et arts* p. 113.—Объ онихъ, подробно излагается въ моей Матеріи Медикѣ, ч. II. стр. 381 по 195

въ видѣ сиропа—*syrup. fl. rhoeados.* по чайной ложкѣ, нѣсколько разъ въ день; взрослымъ: по 1 унц. прибавляютъ на фунтъ груднаго отвара, который полезенъ въ упомянутыхъ простудныхъ припадкахъ, кровоизлитіи—*haemoptysis* и кровавомъ поносѣ: *Брокесъ.*— По усыпительному свойству, средства эти могутъ служить вмѣсто опіятныхъ.

Примѣчанія. 1. Эти красные цвѣты, приготовленный съ квасцами шелкъ, хлопчатую бумагу и полотно, превосходно окрашиваютъ своимъ цвѣтомъ.

2. Ежели 2 лота свѣжихъ цвѣтовъ полевого маку, и столько же зеленыхъ маковокъ, срезавъ, налить 8 лот. кипячей воды, и настоявъ въ покрытомъ сосудѣ 12 часовъ, потомъ чрезъ полотенцо выжать и поделастить жидкость п. к. сахара или чистаго меда: то такимъ образомъ составляется очень полезный опіятный, или *болеутолятельный сиропъ*—*syrup. opiatus, s. apodynus,* употребляемый, какъ сказано выше.

3. Сгущенный сокъ изъ незрѣлыхъ маковыхъ цвѣтовъ можетъ служить вмѣсто опія, когда дають двойное количество въ сравненіи онаго: *Ариотъ.*

4. Отъ долговременнаго насморка и застарѣлой простуды—*catharrhus chronic.* слѣдующій отваръ

испытанъ съ большою пользою: возми гореть дикаго мачка, и столько же травы несопа; налей 1 бутылку горячей воды, и вскипятивъ однажды, подь конецъ варенія, прибавь гореть изрѣзаннаго солодковаго корня; процеженный отваръ пить ежедневно по 3 стакана.

МАЛИНА—*rubus idaeus*, L.

Мѣсто. Кустоватое растеніе, въ полуденной Россіи садовое: въ сѣверной дико растеть по лѣсамъ и гористымъ мѣстамъ, какъ-то: въ окружности Петербурга: на Поклонной горѣ, въ Парголовѣ, Катерингофѣ, и на островахъ Невы рѣки.

Качества. Свѣжія ягоды имѣють *запахъ* пріятный; *вкусъ* кисловато-сладкій, по содержанію клейко-сахарнаго вещества и ароматной кислоты.

Силу прохладительную, жажду утоляющую и ободряющую.

Употребленіе. Въ воспалительныхъ лихорадкахъ и желчныхъ горячкахъ хвалять: *Геснеръ*, *Бартолинъ*; въ цынгѣ: *Шведіоръ*. Цвѣты полезны въ рожѣ и воспаленіи глазъ; въ багряной угреватинѣ—*ругрига*: *Нейкранцъ*; листы въ видѣ полосканья, отъ жабы и другихъ гортанныхъ воспаленій: *Кранцъ*.

Количество. Больнымъ даютъ свѣжія ягоды кушать по желанію; или выжатый сокъ, смѣшавъ съ уксусомъ по равной части, подкисливаютъ онымъ питье, для одержимыхъ лихорадочными болѣзнями; или даютъ въ видѣ веренья—гообъ, въ питьяхъ и микстурахъ.— Смѣшеніе, состоящее: изъ 3 унцій малиноваго сока и полдрахма поташа, замѣняетъ *Reverievo* соляное питье—*ratio salina R.*, которое и для страждущихъ каменною болѣзнію хорошо. См. при описаніи земляники—*fragara vesca l.*

Въ аптекахъ готовятъ:

1. *Малиновую воду*—*aqua rubi idaei (*)*, которая имѣетъ такое же ободряющее свойство и пріятный духъ, какъ розовая и померанцовая воды.

2. *Сиропъ*—*symp. r. idaei (**)*. Оба эти средства, въ упомянутыхъ лихорадкахъ и горячкахъ, прибавляются къ микстурамъ по нѣскольку унцій.

Примѣчанія. 1. Изъ малины готовятъ превосходный квасъ и уксусъ, которые, сверхъ домаш-

(*) *Pharmacop. Rossica*, p. 191.

(**) Тамъ же, p. 258.

няго употребленія, служатъ также весьма полезными средствами: въ цынгѣ, воспалительныхъ и гнилыхъ горячкахъ, о чемъ было уже упомянуто. Малиновый уксусъ, разведенный водою и подслащенный сахаромъ, составляетъ цѣлебный лимонадъ, въ упомянутыхъ горячкахъ употребляемый: *Парротъ*.

2. Изъ ягодъ, порядочно заквашенныхъ, *Фонъ-Акенъ* выгонялъ прекрасную французскую водку, именно изъ 12 ведеръ этихъ ягодъ получилъ полтора ведра хорошей водки.

3. Можно также готовить вино, подобное шампанскому, или бургонскому, слѣдующимъ образомъ: на 3 штофа зрѣлыхъ очищенныхъ ягодъ красной малины, наливается 5 штоф. чистой воды, и давъ настояться 4 дни въ холодномъ мѣстѣ, выжать массу и процѣженную жидкость слить въ боченокъ, куда прибавляютъ 1 фунтъ бѣлаго выпѣнаго меду, или тоже количество сахару; для произведенія вишняго броженія, полагается въ тоже время кусочикъ бѣлаго обжареннаго хлѣба, намоченнаго бѣлыми свѣжими дрожжами, и при оказавшемся броженіи, прилить 1 штофъ французской водки; потомъ, слегка закупоривъ, поставить боченокъ въ ледникъ; по окончаніи броженія, слить въ сулею вишнюю жидкость для отсѣда, крѣпко

закупоривъ. — Наконецъ свѣтлое вино разлить по бутылкамъ, оставляя шейки неполными, чтобы не перелопались, и закупоривъ пробками, засмолить, и хранить въ погребѣ: *Фрибе*.

МАРЕНА КИЗЛЯРСКАЯ, ИЛИ КРАПЪ—*rubia tinctorum*, L.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, въ южной Россіи произвольно растущее на глинистой почвѣ, изобильно разводится въ Астрахани на Терекѣ; оно также растеть: на Окѣ, Волгѣ, Уралѣ и въ Калмыцкой степи; смотря по климату, цвѣтетъ въ Іюнѣ, Іюлѣ и Августѣ.

Качества корня превосходныя, зависящія отъ экстрактно-вяжущаго красильнаго начала; *запахъ* при толченіи слабый; *вкусъ*: горьковато-вяжущій.

Сила вяжущая, укрѣпляющая, мочу и мѣсячные крови гонящая; при продолжительномъ употребленіи, окрашивающая кости и соки тѣлесные краснымъ цвѣтомъ: *Бельтиеръ*, *Базанъ*, *Дюгамель*.

Употребленіе. Первый *Глиссонъ*, по поводу учиненныхъ опытовъ надъ животными, началъ употреблять съ успѣхомъ въ Англійской болѣзни, иначе называемой сиднями—*rachitis*. *Косниеръ*, *Робертъ*, *Левретъ* и

Реснеръ, тоже многихъ выпользовали имѣвшихъ мягкость костей, опухоли составовъ и выпуклость спиннаго хребта; въ брюшныхъ завалахъ, упорной желтухѣ, и запорѣ кровей, хвалятъ: *Галенъ*, *Гофманъ*, *Сиденгамъ*, *Маркъ* (*). Въ худосочи, блѣдной женской немочи и млечныхъ струпахъ, особенно огникомъ именуемыхъ—*crusta lactea*: *Косnierъ*, *Робертъ*, *Гоме*, *Фоллеръ*; въ дѣтской сухоткѣ—*atrophia*, завалахъ печени и мокротныхъ болѣзняхъ легкаго: *Патеръ*, *Рыверий*; въ поясничной боли, послѣдовавшей отъ надсады, или излишняго насилія—*a nisu nimio*: *Людвигъ*; въ астенической ломотѣ: *Абрагамсонъ*; въ вертлужной боли или шіятикѣ, *Диоскоридъ*; для истребленія багряныхъ или красныхъ прыщей на лицѣ—*scapula*, *Шульце* совѣтуетъ пить отваръ этого корня въ теченіи 20—30 дней, принимая по 4 унціи, по утру и въ вечеру.

Количество. Для отвара полагается унція корня на фунтъ воды, которую кипятить до 8 унцій: процѣдивъ и подсластивъ медомъ, давать дѣтямъ по 2 или 3 столовыхъ ложки на пріемъ, нѣсколько разъ въ день; если же младенецъ не отнять еще отъ груди: въ такомъ случаѣ *Левретъ* совѣтуетъ давать

(*) *Observ. Tedicorum Berolin. 1772 p. 27 seq.*

двойное количество кормилицъ, т. е. по 3 унц., три или четыре раза въ день.—Я замѣтилъ, что крѣпкій отваръ маіоны, приготовляемый съ равною частію вербовой корки—*cort. salicis*, т. е. полунціи каждаго истолокши, варить въ 2 фунтахъ воды, пока останется 12 унц. жидкости, и прибавивъ 1 драхму очищенной воды—*sub-carbonas sodae*, давать выше-сказаннымъ порядкомъ, употребляя при томъ ванны изъ одной вербовой коры, или съ прѣнымъ корнемъ, что въ пользованіи англійской болѣзни, гораздо лучшую и скорѣйшую пользу доставляетъ!—Въ порошокъ даются: отъ $\frac{1}{2}$ —1 драхмы, каждые три часа взрослымъ; малолѣтнимъ: въ видѣ каши, тоже количество порошка, смѣшавъ съ медомъ, даютъ по чайной ложкѣ: 3 или 4 раза въ день.—*Косніеръ* удачно дѣтское увѣчье лечилъ, давая вмѣстѣ съ раковыми жерновками, и т. п. всасывающими веществами—*absorbentia*.

Примѣчанія. 1. Многими замѣчено, что переломленныя кости при употребленіи марены, скорѣе срастаются, и бывають тверже въ изломѣ.

2. Кизлярская марена, весьма употребительна на красильныхъ фабрикахъ, но бухарская потому предпочитается оной, что эту собирають въ 3-й или 4-й годъ послѣ посѣва: *Фолькъ*.—Толченый

корень, настоящий въ слабомъ квасцовомъ растворѣ, будучи осажденъ поташомъ, даетъ розовую краску, называемую баканомъ: *Мериме, Томсонъ* (*).

3. Деревенскія дѣвки, безвредныя румяны составляютъ изъ этого корня, настоящего въ водкѣ, куда прибавляютъ малое количество поташа.

4. *Домашнее лекарство, испытанное отъ Англійской болѣзни*: возми корня марены, собраннаго въ осень и высушеннаго: 2 золотника; столько же травы водянаго трилистника или вахты; изрѣзавъ мелко, налей полбутылки воды, и вари, пока укнпитъ половина жидкости; потомъ къ процеженному отвару прибавь ползолотника поташу, или соды, и подсластивъ сахаромъ или медомъ, дай больному по столовой ложкѣ каждые 2 часа. Кормилица можетъ принимать двойное количество, продолжая ежедневно, пока болѣзнь явственно истребится.

МАРГАРИТКА, или БѢЛАЯ СКОРОСПѢЛКА; БѢЛЫЦЫ;
стоцвѣтъ—*bellis perennis*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, самородно растущее въ умѣренной и сѣверной Россіи по

(*) См. System de Chimie, trad. francaise, F. VIII.

пажитямъ на припекахъ. Цвѣтетъ съ Апрѣля мѣсяца во все лѣто; весьма скоро размножается въ садахъ сѣменами и корешками.

Качества. Свѣжая трава и цвѣты *запаху* не имѣютъ; *вкусъ*: травяной, соленоватый.

Сила разводящая, грудная, раноцѣлительная: *Цезальпинъ*.

Употребленіе. Трава цвѣтная, часто употребляется въ мокротной чахоткѣ. *Кенигъ*, *Венферъ*; въ сухоткѣ—*tabes*: *Шведіоръ*; въ завалахъ чревныхъ внутренностей, и запорахъ мочи: *Бурдахъ*; по совѣту *Миндерера*, многіе кушаютъ эту траву весною вмѣсто салата, для уничтоженія колотья и другихъ припадковъ, послѣдовавшихъ отъ питья холодной воды, при разгоряченіи тѣла.—Снаружи, толченая прикладывается для очищенія и заживленія старыхъ ранъ; *Турнефортъ*.—Отваромъ всего растенія, примачиваютъ затвердѣлые шейные желваки, для разогнанія оныхъ: *Амбодикъ*.

Количество. Горсть травы съ цвѣтами наливаютъ 8 унціями кипячей воды, или сыворотки; выжатого соку, по 1 или 2 унціи тоже съ сывороткою принимаютъ 2, или 3 раза въ день, особенно отъ удушливаго кашля, и мокротной чахотки: *Валдимитъ*, *Баглицъ*.

Примѣчанія. 1. Трава и цвѣты составляютъ хорошее слабительное для малолѣтнихъ дѣтей.— Ни одно животное этого растенія не ѣсть.

2. Траву эту, равно какъ и баранью—agnica m. въ деревняхъ пьютъ разбитые люди, и отъ порухи, или надсады, бывающей отъ поднятія большихъ тяжестей. Они готовятъ отваръ изъ этого растенія цвѣтущей маргаритки, полагая горсти 2 на бутылку воды, которую увариваютъ до половины, и процеженный отваръ пьютъ ежедневно на тощакъ по рюмкѣ, прибавляя печной лоснящей сажки мягко растертой по 30 гранъ, или по чайной ложкѣ; продолжая таковыя приемы пить: 12 дней, или 2 недѣли.—Разшибенной скотинѣ даютъ этого же отвара по стакану, съ примѣсомъ 1 столовой ложки печной истертой сажки. Пользуются также: отъ удущья, чахотки и водяной болѣзни: *Фукетъ*.

МАРЬ БЛАГОВОННАЯ, или МЕКСИКАНСКІЙ ЧАЙ; КУДРЯВЕЦЪ ДУШИСТЫЙ—*chenopodium ambrosioides*, L.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, въ южныхъ краяхъ Россіи произвольно растущее, особливо при рѣкѣ Волгѣ и Иртышѣ, также и въ садахъ разводится, гдѣ сама собою размножается удобно; цвѣтетъ въ Іюлѣ и Августѣ.

Качества травы и сѣмянъ превосходныя, зависящія отъ пряно-камфорнаго начала и летучаго масла, соединеннаго съ камедьно-смолистымъ веществомъ. *Запахъ* имѣеть благоухонный; *вкусъ*: островато-пряный.

Сила побуждающая, нервная, противусудорожная; сѣмянъ: противуглистная, вѣтровогонная.

Употребленіе. Въ слабости нервной системы, дѣйствуетъ подобно мауну и мятѣ—*instar valerianae et menthae piperitae*; въ грудныхъ спазмахъ, судорожной одышкѣ, мокротномъ и гнойномъ кашлѣ, происходящемъ отъ загниенія легкихъ—*tabes purulenta pulmonum*, въ видѣ водяной или молочной наливки, полезное дѣйствіе этой травы многими наблюденіями подтверждають. *Маттіолъ* и *Геурній*; въ истерикѣ, параличѣ ногъ, а особенно въ судорожной витовой пляскѣ—*chorea s. Viti*, многократно испыталъ *Пленкъ*; пользуется также бездѣйствіе языка и другія параличныя расслабленія, случающіяся послѣ аплексическаго удара: *Бурдахъ*; сѣмя одобряется въ трудномъ пищевареніи, вѣтряной коликѣ и отъ глисть: *Шведіоръ*.—Все растеніе, въ видѣ водяной и винной наливки употребляемое, *Герицъ* и *Крамеръ* хвалятъ для страждущихъ каменною болѣзною;—толченое, въ видѣ свѣ-

жей катаплазмы, прикладывается для очищенія ножныхъ язвъ: *Розье*.

Количество. Полунціи травы наливяють 10 унц. кипячей воды, которую, подсластивъ медомъ, пьютъ съ молокомъ вмѣсто чаю (*); растертую траву съ медомъ даютъ въ видѣ каши: отъ 2 гранъ до полудрагмы, 2 или 3 раза въ день.—Сѣмя даютъ въ порошокъ, или съ медомъ: младенцамъ по 20 гранъ; взрослымъ по драгмѣ на приемъ. Въ параличныхъ припадкахъ—*pervorum resolutiones*, новѣйшіе врачи, по совѣту *Лентина*, употребляютъ спиртную настойку этого растенія—*tinctura*, полагая 1 унцію травы на 2 унціи алкоголя, или гофмановыхъ капель—*spirit. vinosus vitriolicus*, которую принимать отъ 20—40 капель: *Бурдахъ*.—Для внѣшняго употребленія, можно готовить *ароматный бальзамъ*: двоеніемъ слабого спирта съ лавендою, розмариномъ и благовонною марью.

Примѣчанія. 1. Сушеную траву держать въ шкафахъ и сундукахъ, для сбереженія платья отъ моли.

(*) Таковая же наливка имѣется: in Pharmacop. castr. R. p. 419.

2. Благовонными качествами своими, можетъ замѣнить: амбору, мекусъ, ваниль и гвоздику.—
 О пользѣ душистаго спирта этого растенія, упомянуто было выше.

МАРЬ ВОИЮЧАЯ, или ВОИЮЧАЯ ЛЕБЕДА; ЖМИЦА;
 СЕЛЕДОЧНАЯ ТРАВА—*chenopodium vulvaria*, L.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, въ умѣренной Россіи произвольно растущее въ садахъ, огородахъ и на обработанныхъ земляхъ.

Качества свѣжей травы превосходныя; *запахъ* имѣеть воиучій, козлиный; *вкусъ*: тоже противный, тошнотавый.

Сила противусудорожная, разводящая, возбуждающая.

Употребленіе. Въ непорядочномъ теченіи мѣсячныхъ кровей, бѣлахъ, и гистерическихъ припадкахъ: *Шведіоръ*, *Турнефортъ*. Снаружи въ видѣ припарокъ и клистировъ, полезныхъ особенно отъ брюшныхъ спазмъ и глисть. *Жилиберъ* утверждаетъ: ежели свѣжіе листы, растерши между перстовъ, положить въ ноздри: то оныя очень скоро укрощаютъ истерическіе спазмы.

Количество. Свѣжая истолченная трава въ мякоть, съ прибавленіемъ сахара или меда,

дается въ видѣ консервы: отъ 1—2 драхмъ и больше, три или четыре раза въ день.— Снаружи, какъ выше сказано; съ прибавленіемъ простаго мыла и вина, служитъ разбивающею катаплазмою твердыя опухоли, ушибы, и пр.— Свѣжая катаплазма полезна отъ глисть, и маточныхъ судорогъ—*spasmi uterini*, прикладываемая къ животу; равно и въ клистирахъ употребляемая, помогаетъ.

Примѣчанія. 1. Трава эта качествами своими можетъ замѣнять маунъ—*valeriana offic.* и воюющую камедь—*f. asatætida*: *Пеириль, Фулеръ.*

2. Сельскія бабки даютъ пить отваръ воючей лебеды въ припадкахъ матки, который употребляютъ также для скорѣйшаго изверженія дѣтскаго послѣда и при недостаткѣ родового кровоочищенія.

3. *Противусудорожный сиропъ*, для дѣтей, и въ упомянутыхъ женскихъ болѣзняхъ употребляемый, въ Англии, готовятъ изъ выжатого сока зеленой воючей лебеды, который на легкомъ огнѣ варятъ съ патокою, или сахаромъ до густоты меда; малолѣтнымъ даютъ по чайной, взрослымъ по столовой ложкѣ.

МАРЬ КРАСНАЯ; ИЛИ ГУСИНАЯ ЛАПКА; ЛЕБЕДА ДИКАЯ—
chenopodium rubrum, L.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, растущее дико въ лѣсахъ около заборовъ, въ огородахъ и по деревнямъ изрѣдка находится, также на Петербургской сторонѣ;—во множествѣ растеть по берегамъ нижняго Урала и въ Сибири около Бюратскихъ юртъ.

Качества травы водяныя, подобныя садовой лебедѣ—*atriplex hortensis*.

Употребленіе такоеже.—Ее весною можно въ кушаньѣ варить вмѣсто другой зелени.—Въ деревняхъ прикладываютъ толченую траву къ ранамъ, ушибамъ и занозамъ, которая разводитъ воспаленіе, умягчаетъ и заживляетъ.

Примѣчаніе. Траву эту ѣсть всякая скотина охотно, кромѣ лошадей.

МАРЬ КУДРЯВЕЦЪ; ТУРЕЦКІЙ ЧЕРПОБѢЛЬ; ЛЕБЕДА ДУШИСТАЯ; БОЖІЙ БЫТЬ—*chenopodium botrys teucritum*, L.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, въ южныхъ краяхъ Россіи произвольно растущее: при рѣкахъ Волгѣ, Иртышѣ и Уралѣ; также при

Сызранѣ, въ Исетской области, и пр., на открытыхъ буграхъ, солнцемъ припекаемыхъ, и на пашняхъ. Цвѣтетъ въ Юль и Августѣ.

Качества свѣжей травы: *запахъ* крѣпкій, тяжело-душистый, бальзамный; *вкусъ*: пряный, не противный; высушенная удерживаетъ тѣже свойства.

Сила и употребленіе такіяже, какъ вышеописанной благовонной мари; но по замѣчанію *Шведіора* нѣсколько слабѣе; однако многіе хвалятъ и эту въ истерикѣ, запорѣ кровей и родового кровоочищенія: *Амбодикъ*; въ судорожномъ кашлѣ, одышкѣ и отъ глисть, *Пленкъ*, *Карпинскій*.—Снаружи, въ видѣ тепловатыхъ припарокъ и паровъ, полезныхъ особенно для роженицъ, когда имѣется опухоль и боль въ нижней части чрева.

Количество. Отъ 2—4 драхмъ сушеной травы полагаютъ для наливки на 6 унц. кипячей воды, которую даютъ вмѣсто чаю, или въ порошокъ, по 1 драхмѣ.

Примѣчанія. 1. Многіе траву эту сушатъ и кладутъ между платья, для сбереженія отъ моли.—Сѣмя душистой лебеды нѣкоторые употребляютъ отъ глисть, вмѣсто цытварнаго.

2. *Искусственный чай*—*thea artificialis*, замѣняющій китайской, предложенъ прежде.—Польза: употребляемый въ видѣ обыкновенной горячей наливки, ускоряетъ отдѣленіе мочи, разводитъ грудныя мокроты, помогаетъ пищеваренію, и во многихъ случаяхъ полезнѣе и преимущественнѣе китайскаго чая: *Бодаръ*.

МАРЬ ТРЕХУГОЛЬНАЯ; ГУСИНЯЯ ЛАПА; МОРАЛЬКИ; САБАЧЬЯ ЛЕБЕДА; ДИКІИ ШПШАТЪ—*chenopodium bonus henricus*, L.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, въ умѣренной Россіи произвольно растущее на необработанной почвѣ, особливо при рѣкахъ Окѣ и Волгѣ;—цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюль.

Качества. Трава *запаху* не имѣетъ; *вкусъ*: травяной, клейковатый.

Сила прохладительная, умягчающая, разводящая, очищающая; въ клистирахъ, слабительная.

Употребленіе. Свѣжіе цѣльные листы, или толченые, прикладываются къ отекрымъ опухолямъ—*oedemata* и нечистымъ язвамъ очень много извлекаютъ острой пасоки, такъ, что каждый разъ перевязка промакивается: *Пленкъ*,—а потому ежедневно прикладываютъ

оную два раза къ остросочнымъ, червивымъ и другимъ язвамъ, сопряженнымъ съ сильною болью—*ulcera dolorosa*. *Паули* хвалитъ эту катаплазму въ подагрическихъ боляхъ; *Дилленій*, для разведенія ножныхъ отековъ; *Бурдахъ* въ глазныхъ сухихъ воспаленияхъ; толченая трава и смѣшанная съ свѣжимъ саломъ, или боровымъ масломъ, въ видѣ мази, полезна также: въ чесоткѣ, лишаяхъ, головныхъ шолудяхъ, струповатой проказѣ, ногтямъ и болящихъ почечуйныхъ шишкахъ: *Пленкъ*, *Шведіоръ*, *Бурдахъ*.

Количество для наружнаго употребленія произвольное; для промывательнаго, уничтожающаго заноры, полагается 1 или 2 горсти травы на футъ воды, которую, вскипятивъ и прожавъ чрезъ полотенце, ставитъ каждый разъ по 6 унцій въ клистирахъ.—Выжатый сокъ изъ свѣжей травы принимаемый по 4 унціи, слабитъ подобно маннѣ калабрской, и полезенъ въ почечуйныхъ припадкахъ: *Жилиберъ*.

Примѣчанія. 1. Горные жители употребляють молодую траву вмѣсто шпината; а въ сѣверныхъ странахъ, по свидѣтельству *Линнея*, стебли ея обвариваютъ подобно спаржѣ, которые приправивъ съ оцтомъ, масломъ и солью, составляютъ довольно вкусную и здоровую пищу: *Берій*.

Въ отварѣ траву пьютъ отъ глистовъ; свѣжую прикладываютъ, для заживленія ранъ.

МАУНЪ, или БАЛДЫРЬЯНЪ дикій, ЗЕМЛЯНОЙ ЛАДАНЪ;
очной корень—*valeriana officinalis*.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, во всей Россіи и Сибири растущее произвольно, по влажнымъ и тѣнистымъ лѣсамъ, по мокрымъ лугамъ и гористымъ мѣстамъ; въ окрестности Петербурга: Царскосельской и Петербургской дороги, и часто попадаетъ на островахъ Невы рѣки;—цвѣтетъ въ Іюль и Августъ.

Качества. Корень мауна, растущаго на сухихъ и горныхъ мѣстахъ дѣйствительноѣ почитается, и болѣе содержитъ летучаго существеннаго масла, соединеннаго съ клейкимъ солянымъ началомъ, и пахучимъ, смолисто-экстрактнымъ: *Тромсдорфъ*. Запахъ имѣетъ тяжелый, козлиный, для кошекъ пріятный; *вкусъ* горьковато-пряный, островатый.

Сила превосходная, противусудорожная, побуждающая и укрѣпляющая нервную систему, противуглистная, испарину, мочу и мѣсячныя крови гонящая.

Употребленіе Въ падучей болѣзни, *Ф. Колумна* первый испыталъ надъ собою, и потомъ многихъ выпользовалъ отъ этой

болѣзни удачно, коимъ другія средства не помогали. *Панаром*, *Шуманнъ*, *Маршантъ*, *Риверъ* и *Шомель* также съ наилучшимъ успѣхомъ пользовали застарѣлую падучую болѣзнь. *Меллинъ* выпользовалъ одну даму, имѣвшую припадки падучей болѣзни при наступленіи непорядочнаго мѣсячнаго кровоочищенія; *Лейтмилль* тоже хвалитъ въ этой болѣзни, происходящей отъ запору кровей—*epilepsia ex retentione mensium*; *Кругеръ*: въ дѣтскомъ родимцѣ, отъ испуга, гнѣва и другихъ причинъ послѣдовавшемъ;—*Маршантъ* замѣтилъ, что послѣ мауна, употребляемаго въ питѣѣ и промывательномъ, глисты выходятъ низомъ, и тѣмъ оканчивается падучая болѣзнь (*). *Тиссонъ* и *Галлеръ* хвалятъ въ болѣзненной чувствительности, или чрезвычайной раздражимости нервовъ—*hyperaesthesia*; въ истерическихъ и гипохондрическихъ припадкахъ, спазмахъ и судорожныхъ корчахъ, именуемыхъ Витовою пляскою—*chorea st. Viti*; *Вермовъ*, *Лейтмилль*, *Гилль*; въ судорожныхъ боляхъ головы, особливо въ половинной части чувствуемой—*haemicrania spasmodica*: *Фордисъ*, *Страудбертъ*; въ слабости зрѣнія, послѣдовавшей отъ излишняго прилежанія и истечения

(*) Mem. de l' Acad. de Paris, 1706, p. 430.

сѣмянн, *Пленкѣ* выпользовалъ одного молодаго чловѣка, который былъ уже близокъ къ слѣпотѣ—*ferre amauroticus*; одобряется также: въ тусклости глазъ, летаніи шариковъ или насѣкомыхъ предъ глазами, и пачинающей слѣпотѣ—*amaurosis incipiens*: *Брадлей*, *Табернемонтанъ*, *Линней*, *Викатъ*; для истребленія глисть и укрощенія глистныхъ припадковъ—*helminthiasis*: *Додоней*, *Муррай*, *Штеркѣ*, *Менхѣ*;—*Даженъ*, давая три дня сряду по драхмѣ мауна съ пережженою яичною скорлупою, выгонялъ тесемочную глисту—*taenia, bandwurum*; *Бризбанъ* хвалить въ не-удержаніи кишечныхъ нечистотъ и мочи, послѣдовавшемъ отъ паденія; *Шведіорѣ* въ кровоплеваніи; въ астеническихъ перемежныхъ лихорадкахъ, нервныхъ и гнилыхъ горячкахъ: *Кулленъ*; также въ желчныхъ, мокротныхъ и сопряженныхъ съ пятнами, и въ параличныхъ разслабленіяхъ разныхъ частей: *Горнѣ*, *Бурдахѣ*.—Въ глистныхъ лихорадкахъ, маунный корень, употребляемый вмѣстѣ съ гравилатнымъ и цвѣтами римской ромашки, смѣшанный по равной части и принимаемый по 1 драхмѣ въ порошокъ, или въ видѣ кашки, 2 и 3 раза въ день, оказываетъ хорошую пользу: *Роке*.—Этимъ средствомъ я многихъ малолѣтнихъ, падучею болѣзнью страдавшихъ отъ глисть, удачно вылечилъ.

Количество. Въ порошокъ даютъ отъ 20—30 гранъ и до драхмы, три или четыре раза въ день, или смѣшавъ съ медомъ въ видѣ кашки; для наливки полагается отъ $\frac{1}{2}$ —1 унціи на фунтъ кипячей воды, или бѣлаго вина, которую поваривъ $\frac{1}{4}$ часа въ покрытомъ сосудѣ и процѣдивъ, давать каждый часъ по столовой ложкѣ;—для клистира употребляется водяной отваръ всего растенія, съ прибавленіемъ ромашки; онымъ же отваромъ промываютъ худосочныя язвы: *Фогель*.

Въ аптекахъ готовятъ:

1. *Наливку мауноваго корня*—infusum rad. valer. sylvestris (*), полезную въ вышеупомянутыхъ болѣзняхъ, которую на *пріемъ* даютъ по 2 унціи и болѣе или менѣе, смотря по обстоятельствамъ.

2. *Настойку эфирную и летучую*—tinctura val. aetherea et ammoniata (**), употребляемая, особенно, гдѣ требуется скорое пособіе летучихъ побуждающихъ средствъ—incitantia diffusibilia, и преимущественно въ нервныхъ припадкахъ, обморокахъ, скоропостижномъ упадкѣ силъ, и пр.—На *пріемъ*

(*) Pharmacop. castrens. Ruthena, p. 272.

(**) Тамъ же, p. 282.

даютъ: отъ 20—50 капель каждыя полчаса, или всякій часъ; либо примѣшиваютъ по три драхмы къ ромашечной наливкѣ, и съ другими приличными жидкостями, отъ $\frac{1}{2}$ —1 унціи.

3. *Мауновъ спиртный экстрактъ*—*extractum valer. spirituosum*, одобряемый въ тѣхъ же болѣзняхъ, даются: отъ 10—15 гранъ три раза въ день, въ пилюляхъ или съ гофмановыми каплями.

4. *Противуглистную кашку*—*electuarium anthelminticum* (*), даютъ на *пріемъ*: отъ 2—6 драхмъ въ день.—Я даю отъ глисть всякаго рода кашку глистогонную—*electuar. vermifug.*, состоящую изъ порошка свѣжо-истертыхъ корней мауна и мужескаго папоротника, травы дикаго аврана и цвѣтовъ римской ромашки, cadaго по 1 драхмѣ, которыя, смѣшавъ съ п. к. слабительнаго масла, совѣтую принимать по 1 золотнику, 2 или 3 раза въ теченіи дня, и при каждомъ дѣйствіи на низъ, запивать по чайной чашкѣ крѣпкою наливкою, состоящею: изъ мауна, папоротника и солодковаго корня, крупно истолченныхъ,—полагая этого порошка: 2 горсти на бутылку кипячей воды, которую, настоявъ часъ въ покрытомъ сосудѣ, пить, какъ сказано, приба-

(*) Pharmacop. Rossica, civil. p. 200.

вляя иногда 2 унціи горькой слабительной соли—*sulphas magnesiae*: ежели тесемочная глиста не совершенно вышла, или перервется.

5. *Мауновое тинное масло*—*ol. valerianaë e rad. destillatum* (*), одобряемое во всѣхъ случаяхъ, требующихъ сильнѣйшихъ побуждающихъ средствъ—*stimulantia intensiva*; или ежели больные не могутъ принимать мауновый корень въ существѣ. — Дается отъ 6—8 капель, на сахаръ.—Оное же, съ порошкомъ померанцовой корки смѣшиваемое, дѣйстви-тельно замѣняетъ средство, изобрѣтенное *Райломъ*: отъ падучей болѣзни—*specificum anti-epilepticum ragoloi* (**).

Примѣчанія. 1. Мауновое масло можетъ совершенно замѣнить каенутное—*oleum sajerut s. melaleucaë leucadendri*, столь многими врачами выхваляемое, также воиющую камедь—*ferula asa foetida*, бобровую струю—*castoreum*, и выхухоль—*moschus m.*

2. Корень дикаго буддыряна и гравилатный—*rad. valerianaë, gei urbani, s. caryorhyllatae*, упо-

(*) Тамъ же, р. 229.

(**) См. въ Медико-хирург. матер. мед. И К. Ч. II. стр. 622., и въ Фармакологіи Г. Еллизена, стр. 200.

требляемые вмѣстѣ, дѣйствуютъ превосходнѣе хины во всѣхъ случаяхъ, гдѣ она предписывается (*), замѣняя вмѣстѣ: корень виргинскаго змѣевика—*aristolochia serpentaria* и контраервы—*d. contrayerva*: *Галлеръ, Тиссотъ, Жилиберъ.*

3. Корень этотъ собирать должно весною, прежде, нежели станетъ въ стволъ ростъ, и очищенный, высушивъ въ тѣнистомъ мѣстѣ, хранить въ стеклянныхъ сосудахъ, хорошо закупоренныхъ, сберегая отъ сырости; равнымъ образомъ, чтобы не потерялъ своего дѣйствія, тереть въ порошокъ при самомъ употребленіи.—Маунъ, не въ свое время собираемый, или выкапываемый на мѣстахъ слишкомъ мокрыхъ, также подмѣшиваемый малымъ булдыряномъ—*valeriana dioica* s. *minor.*, растущимъ въ болотныхъ мѣстахъ, не имѣетъ вышеописанныхъ качествъ, и бываетъ вовсе не дѣйствителенъ; а потому собираемый на сухихъ и возвышенныхъ мѣстахъ, также, по замѣчанію *Фалька*, во множествѣ растущій въ Киргизской степи, предпочитается прочимъ породамъ.

4. Кошки чрезвычайно любятъ этотъ душистый корень, играя и дѣлая смѣшные прижки; но когда потерялъ уже свою силу, то нимало не трогаютъ.—

(*) См. *Extrait du Journal de Medicine par Mm, Carvisart, le Roux et Boyer, Novembre, 1803.*

Козы и овцы ѣдятъ это растеніе охотно; равно и другія животныя прискиваютъ оное съ жаждою.

5. Опытныя старушки, водяною настойкою мауниаго корня, промываютъ глаза, и даютъ нюхать въ порошокъ отъ тусклости зрѣнія; я тоже употреблялъ гнанную воду изъ всего растенія съ успѣхомъ въ глазныхъ примочкахъ, укрѣпляющихъ слабое зрѣніе.

МЕДУЩИЦА АПТЕЧНАЯ, или пятнистая—*pulmonaria officinalis*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, растущее во всей Россіи по тѣнистымъ лѣсамъ; также въ Паргаловѣ, Осиновой рошѣ, и на Дудеровой горѣ въ большомъ количествѣ;—цвѣтетъ съ самой весны.

Качества. Трава *запаху* не имѣетъ; *вкусъ*: травяной, клейковатый, и нѣсколько соляно-горькій.

Сила разводящая, холодительная, вяжущая.

Употребленіе. Одобряется въ грудныхъ припадкахъ, кровоизліаніи, сухоткѣ и чахоткѣ: *Линней, Маттіолъ*; въ воспаленіи легкихъ, долговременномъ кашлѣ, хрипотѣ, завалахъ

печени, желтяницѣ и почечныхъ боляхъ: *Соболевскій*.—Молодую свѣжую траву варять въ супахъ, для больныхъ, одержимыхъ сказанными болѣзнями.

Количество. Горсть сухой травы, наливъ 6 унц. кипячей воды, пьютъ съ медомъ вмѣсто чаю.—Снаружи прикладывается свѣжая истолченная, для заживленія ранъ. *Бухвальдъ*.

Примѣчанія. 1. Козы и овцы траву ѣдятъ охотно; коровы рѣдко, а свиньи и вовсе не трогаютъ.—Пчелы изъ цвѣтовъ собираютъ много меду.

2. Будучи пережжена, даетъ много поташу, т. е. около 7 части своего вѣса: *Гмелинъ*.

МЕЛИССА, или папочная трава; пчельникъ; маточникъ; медовка—*melissa officinalis*, L.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, въ умѣренной Россіи садовое; въ полуденной растущее по гористымъ мѣстамъ произвольно, и цвѣтетъ во все почти лѣто.

Качества травы превосходныя, зависящія отъ летучаго пріятнаго масла, и экстрактаго вещества.

Запахъ свѣжей и сухой травы благовонный, цитронный; *вкусъ*: пряный, островатый; ежели будетъ собрана прежде разцвѣтанія.

Сила слегка побуждающая, нервная, отверзающая, противусудорожная, мѣсячногонная, и мочу гонящая.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ нервныхъ лихорадкахъ—*febres typhodes*, нѣсколько ободряетъ силы и утоляетъ жажду, которую лимонадъ болѣе умножаетъ: *Пленкѣ*; одобряется также въ желудочныхъ спазмахъ, рвотѣ, коликѣ и трепетаніи сердца: *Форестѣ*; въ истерическихъ припадкахъ, головокруженіи, и частыхъ обморокахъ нервного свойства: *Буравѣ*, *Гофманѣ*; въ блѣдной немочи, запорѣ кровей, боляхъ послѣ родовъ, простудной ломотѣ, подагрѣ, и параличныхъ разслабленіяхъ: *Кранцѣ*, *Менхѣ*, *Шведіорѣ*, *Бурдахѣ*.—Ставленіе ногъ до колѣнъ въ теплую воду, и питье теплаго настоя мелиссной травы по стакану, 3—4 раза въ день, много помогаютъ къ открытію мѣсячнаго очищенія: *Камеицкій*.

Количество. Для наливки полагаются двѣ драхмы травы на 6 унц. горячей воды, или бѣлаго вина; сухая дается въ порошокъ отъ 20 гранъ до полдрахмы съ виномъ.—Снаружи въ видѣ припарки, разводящей опухоли;—

свѣжая трава, истолченная съ мукою, составляетъ полезную катаплазму отъ ноготѣды:
Шульцъ.

ВЪ АПТЕКАХЪ ПРИГОТОВЛЯЮТЪ:

1. *Мелиссную консерву*—conserva melissae citratae (*), которая удерживаетъ силу своего растенія, и дается отъ 2—3 драхмъ на пріемъ.

2. *Мелиссовое масло*—oleum melissæ e herba destillatum (**); имѣетъ чрезвычайно ободряющую силу; дается отъ 3—6 капель, два или три раза въ день на сахаръ, или съ бѣлымъ виномъ, или съ гофманскими каплями, которые *Фогель* хвалитъ отъ истерическихъ обмороковъ, и при другихъ нервныхъ ослабленіяхъ—adynamіæ.

3. *Мелиссовый спиртъ*—spirit. melissae (***), которымъ натираютъ разслабленные и параличные части, также простудныя и ломотныя опухоли.

Примѣчанія. 1. Этимъ спиртомъ нѣкоторые напрыскиваютъ платье, для прогнанія комаровъ

(*) Pharmacop. Rossica, p. 192.

(**) Тамъ же, p. 229.

(***) Тамъ же, p. 250.

и другихъ безпокойныхъ насѣкомыхъ.—Моль этого духу тоже не терпигь.—Его даютъ и внутрь по чайной ложкѣ, разведши въ столовой ложкѣ свѣжей воды: особенно отъ обмороковъ и астенческаго удара, или прострѣла.

2. Отваромъ пчельной травы обрызгивая мясо или рыбу, можно сохранять оныя отъ мухъ и червей.—Объ искусственномъ чаѣ, въ составъ коего входитъ и меллисса, сказано выше.

МОГИЛЬНИЦА МАЛАЯ, ИЛИ БАРВЕНКА; БАРВИНОКЪ;
ГРОБНАЯ ТРАВА—*vinca minor*, L.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, въ умѣренной Россіи произвольно растущее: на сѣчахъ, по Тереку, и близь Екатеринскихъ теплицъ.

Качества. Листы или трава *запаху* не имѣютъ; *вкусъ*: горьковатый, непріятный.

Сила вяжущая, и сжимающая шулятную мошонку—*serotum corrugans*.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Одобряется въ слабости легкихъ—*atonia pulmonum*, кровоплеваніи, маточномъ и почечуйномъ кровотеченіяхъ; также въ женскихъ бѣляхъ и чахоткѣ: *Шпильманъ*, *Шведіоръ*, *Бурдахъ*.—Водяной отваръ, съ молокомъ смѣшанный, полезенъ для полос-

канья горла въ жабѣ—супанче: *Турнефортъ*, *Тиссотъ*;—въ гортанныхъ расслабленіяхъ, порчѣ десенъ и шатаніи зубовъ, винный отваръ болѣе помогаетъ: *Бухвальдъ*; свѣжая толченая трава, и въ крѣпкомъ отварѣ въ видѣ примочки употребляемая, унимаетъ наружныя кровотеченія и заживляетъ раны: *Муррай*; припарка разводитъ сгустившееся молоко въ грудяхъ: *Галлеръ*; и въ водяной грыжѣ—*hydrocele* помогаетъ, употребляемая вмѣстѣ съ другими вяжущими растеніями—*stiptica, corrugantia*.

Количество. Унція травы полагается на фунтъ воды для отвара, который пьютъ по малой чашкѣ съ прибавленіемъ краснаго вина, нѣсколько разъ въ день: *Шомель*.—Снаружи служитъ полосканьемъ и примочкою.

Примѣчанія. 1. Трава эта входитъ въ составъ швейцарскаго филтранка, употребляемаго вмѣсто чаю отъ внутреннихъ поврежденій.

2. Сельскіе лекари, отъ порухи и случившихся кровотеченій, даютъ слѣдующій отваръ пить по чайной чашкѣ по утру и въ вечеру: 1 горсть травы барвинка, и 2 корня живокоста—*symphit. offic.*, срезавъ, варятъ въ 1 бутылкѣ воды, пока укипитъ половина жидкости, которую, процѣдивъ

и прожавъ, холодный отваръ употребляютъ, какъ сказано.

МОГУЩИКЪ ГУСИНЫЙ, или ГУСИНАЯ ПАЖИТЬ; СЕРЕБРЕННИКЪ; МОЛКА; ЖАБЛИКЪ—*potentilla anserina*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, во всей Россіи произвольно растущее на влажныхъ и сухихъ лугахъ, по берегамъ рѣкъ, и на мокрыхъ пескахъ во многихъ мѣстахъ;—цвѣтеть въ Іюнѣ и Іюлѣ.—На глинистой почвѣ вырастающее, листы имѣетъ бѣлесоватаго цвѣта, или сребристые, отъ чего и наименованіе свое получило: *Амбодикъ*.

Качества. Корень и трава *запаху* не имѣютъ; *вкусъ*: травяной, вязущій и нѣсколько соляной. — *Жовруа* утверждаетъ, что это растеніе содержитъ нашатырь и квасцы.

Сила укрѣпляющая, мочегонительная, ранозѣлительная.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ нарывѣ легочномъ—*етруема* и чахоткѣ, хвалить *Акрель*: въ поносахъ, теченіи бѣли и кровотеченияхъ: *Пленкъ*; выжатый сокъ изъ всего растенія, даютъ по столовой ложкѣ: предъ лихорадочнымъ ознобомъ; такъ же отъ кровохарканія и для гнанія песка изъ мочевыхъ путей: *Тимей*,

Бергій.—По свидѣтельству *Галлера*, выжатый сокъ изъ свѣжаго серебрянника и зеленой ржи, почитается дѣйствительнымъ средствомъ отъ каменной болѣзни—*lithiasis*: *Соболевскій*;—для изсушенія и заживленія мокнущихъ ранъ: *Галенъ*, *Турнефортъ*.

Количество. Горсть травы, наливаютъ 6 или 8 унц. кипячей воды, которую, подсластивъ, принимаютъ по 3 унціи, нѣсколько разъ въ день; для отвара: 1 унція корня полагается на фунтъ воды; или дается въ порошокъ до полудрагмы; выжатый сокъ изъ всего растенія принимаютъ отъ 4—6 унцій въ день.—Снаружи, въ видѣ промыванья—*injection*, примочки и катаплазмы изъ свѣжей травы, заживляющей раны и застарѣлыя язвы.—*Фогель*, прикладывая ко лбу выжатый сокъ, укрощалъ носовое кровотеченіе—*epistaxis*;—опымъ же, подслащеннымъ медомъ, помазываютъ дѣтскую молошницу въ роту.—Свѣжую траву, петолокши въ ступкѣ, прибавивъ къ оной немного соли и уксусу, прикладываютъ къ ручнымъ кистямъ предъ лихорадочнымъ приступомъ; отъ чего пароксизмы скорѣе бывають прерваны, а иногда и совсѣмъ проходитъ лихорадка: *Амбодикъ*.—Молодые корни онаго, въ кушаньѣ приправленные, англичане употребляютъ вмѣсто пастернака: *Бомаръ*.

Примѣчанія. 1. Мелко рубленную траву, смѣшанную съ пшеничною или другою вареною крупною, даютъ молодымъ индейкамъ, отъ чего онѣ скоро вырастаютъ и бываютъ здоровы; молодая трава эта и для дусей служитъ пріятнымъ кормомъ. Свины жадно пріискиваютъ ея корни, да и всякій скотъ ѣстъ ее охотно. — Сѣмя толченое, старухи даютъ въ кровотокахъ съ водою и виномъ до ползолотника людямъ:—домашнимъ животнымъ отъ кривой мочи по 2 золотника и больше;—выжатый сокъ изъ всего растенія: полфунта на пріемъ: *Розве.*

2. Трава эта заглушаетъ хорошіе луга, и тѣмъ бываетъ вредна для сѣнокосовъ.—При корняхъ ея находятъ червецъ, или польскій кошениль.—Растеніе это, по вяжущему свойству, годится для дубленія.—Корень онаго, отваренный въ водѣ, пьютъ въ деревняхъ отъ кровяного поноса.

3. Гнанная вода съ этимъ цвѣтущимъ растеніемъ, нѣкогда во Франціи почитаема была секретнымъ косметическимъ средствомъ, оживляющимъ свѣжесть лица у пожилыхъ дамъ, и по превосходству названа: l' eau de beauté.

МОГУЩИКЪ ПЯТИЛИСТНЫЙ, или ПЯТИЛИСТНИКЪ; ПЯТИ-
ПАЛЫШНИКЪ; МОХНА—*potentilla reptans*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, растущее на
мокрыхъ лугахъ, также по сухимъ, гористымъ
и песчанымъ мѣстамъ: на Пулковской горѣ,
въ Стрѣлиной, и во всей Россіи по пажитямъ,
и глинистымъ открытымъ мѣстамъ.

Качества, сила и употребленіе сход-
ствуютъ съ вышеописаннымъ растеніемъ.
Шведіоръ хвалитъ: въ простомъ поносѣ, и
подъ конецъ кроваваго—*sub finem dysenteriae*;
Соболевскій давалъ въ отварѣ для поло-
сканья, когда имѣются во рту ранки, или
трещины на языкѣ, также во всякихъ крово-
теченіяхъ.—*Иппократъ* и *Сенакъ* крѣпкій
отваръ всего растенія употребляли въ пере-
межныхъ лихорадкахъ, астеническихъ поносахъ,
кровотеченіяхъ, бѣляхъ, и теченіи сѣмени.—
Оныя приготавливать можно съ водою и крас-
нымъ виномъ, вмѣстѣ съ предыдущимъ рас-
теніемъ, какъ сказано выше. Снаружи прикла-
дываемая толченая трава, тоже унимаетъ крово-
теченія изъ поверхностныхъ ранъ—*vuln. superficialia*,
и заживляетъ оныя: *Фогель*.

Примѣчанія. 1. И эту траву ѣсть всякій
скотъ, кромѣ свиней.

2. Обѣ породы могущика—*potentilla*, равно какъ и завязной корень—*tormentilla*, *Бодарь* полагаетъ въ числѣ средствъ, замѣняющихъ корень кломбы—*rad. columbo*, которые по безвредному своему вяжущему свойству заслуживаютъ вниманіе врачей.

:

МОЖЖЕВЕЛЬНИКЪ донской, или козацкіи; ВЕРЕСЬ; АРТЫШЬ; АРЦА; МОЖЖУХА—*juniperum sabina*, l.

Мѣсто. Дерево низкое, растущее въ южной Россіи и Сибири произвольно на возвышенныхъ мѣстахъ; попадается также: на мѣловыхъ холмахъ на Дону и Медвѣдицѣ, на Уралѣ до Губерлинска, на Колыванскомъ хребтѣ, и пр.; находится также по пещанымъ мѣстамъ и въ Таврической области.

Качества листовъ превосходныя, сильныя, зависящія отъ большаго количества летучаго остраго масла, и смолянаго горькаго вещества. *Запахъ* листовъ и вѣтвей: противно-смолистый, тяжело-ароматный; *вкусъ*: горьковато-острый, горячительный.

Сила побуждающая, мѣсячногонная, и нерѣдко извергающая изъ матки зародышъ—*abortiva*, разводящая, испарину и мочу гонящая, противусудорожная, противуглистная. Снаружи

сѣдающая дичь—*cathæretica*, противугнило-
стная, очищающая.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ астеническомъ запорѣ
мѣсячныхъ кровей, *Куленъ* средство это съ
осторожностію принимаемое, всеѣмъ крового-
ннымъ лекарствамъ предпочитаетъ; впрочемъ,
Галенъ уже замѣтилъ, что это столь острое
средство, сильно дѣйствующее на дѣтородные
органы, не только съ насиліемъ гонитъ мѣсяч-
ныя крови, но вмѣстѣ умерщвляетъ зародышь—
foetum occidit, и извергаетъ изъ матки!!—
Галлеръ, *Алберти* и *Скополи* видѣли та-
ковые несчастные примѣры (*).—По опытамъ
Швенке и *Фрейнда*, отваръ этихъ листовъ
разрѣшаетъ кровь, и доставляетъ ей чрезвы-
чайную красноту. Опытный клиникъ *Годе*,
благоразумнымъ употребленіемъ этого лекар-
ства изъ пяти женщинъ, страдавшихъ запоромъ
кровей, 4-хъ успѣшно выпользовалъ; *Веди-
киндъ* тоже хвалитъ въ слабости матки—
atonia uteri, и оттуда раждающихся мокротныхъ
завалахъ и непорядочныхъ отдѣленіяхъ, осо-
бенно у пожилыхъ женщинъ, также послѣ не-
благополучныхъ родовъ или выкидаша, при

(*) Овидій тоже свидѣтельствуетъ:

Ut temere faciunt, sed non impune puellæ,

Sæpe, suos utero, quæ necat ipsa perit.

Quæ prima instituit teneros avellere foetus,

Malitia fuerat digna perire sua!

недостаткѣ родового очищенія, боляхъ и спазмахъ въ животѣ, истерическихъ припадкахъ, желудочныхъ спазмахъ, кашлѣ, кровохарканіи, всеобщей слабости, худосочи и теченіи острыхъ мокротъ изъ маточнаго рукава, внутреннее и наружное употребленіе этого средства въ видѣ спринцовки, припарки и порошка, принимаемаго отъ 5—10 гранъ съ сахаромъ, оказываетъ желаемую пользу; отъ глисть и застарѣлой ломоты, сопряженной съ опухольями костей, свѣдѣніями—*contracturae* и недвижимоію членовъ, хвалятъ: *Пленкѣ*, *Бурдахъ*; въ параличныхъ расслабленіяхъ и бездѣйствіи частей, тоже оказываетъ большую пользу: *Кранцъ*, *Жилиберъ*, давая по 12 гранъ, растерши съ сахаромъ, удачно пользовалъ: упорныя перемежныя лихорадки и желтуху, сопряженныя съ брюшными завалами.—Ягоды, принимаемыя въ порошокъ отъ 20—30 гранъ съ бѣлымъ виномъ, помогаютъ въ ревматизмѣ и простудной ломотѣ: *Бодаръ*.—Снаружи въ вышеупомянутыхъ случаяхъ для изгнанія глисть, *Галенъ* хвалитъ свѣжіе толченые листы, растертыя съ бычачьею желчью, или съ саломъ;—*Фогель*, для очищенія головныхъ паршей и чесотки, съ успѣхомъ прикладывалъ къ пупку. Порошкомъ присыпаютъ всякаго роду нечистыя язвы, какъ-то: гнилыя, червивыя, раковыя, костоѣдныя, грибовидныя, и проч.—

Фабержъ, этимъ же порошкомъ, истреблялъ бородавки и венерическія шишки—*condylomata syphilitica*; **Генъ**—полипы въ носу и грибовидныя мозговья нарощенія—*fungi cerebri*; **Верлгофъ**, присыпкою и отваромъ, уничтожалъ костоѣдицу—*caries ossium*, и антоновъ огонь; **Фоглеръ** хвалитъ для полосканья, изцѣляющаго гортанныя венерическія язвы и боль зубовъ, производящую отъ гнилости оныхъ—*odontalgia cariosa*; отваромъ омываютъ чесотку, лишай, цынготныя язвы, венерическія и другія нечистыя, испускающія смрадную сукровицу—*ulcera manantia*: **Галлеръ**, **Гофманъ**; въ видѣ ванны и шприцовки, **Пленъ** рекомендуетъ отъ цынготной чесотки и женскихъ бѣлей—*fluor albus*.

Количество. Внутрь даютъ въ порошокъ: отъ 5—15 и 20 гранъ, 2 или 3 раза въ день; для наливки полагается отъ $\frac{1}{2}$ —1 драхмы на фунтъ кипячей воды, или молока.—Въ видѣ крѣпкаго отвара: 1 унцію срѣзанныхъ листовъ варятъ въ фунтѣ воды, пока укипитъ половина жидкости, которую, процѣдивъ и подсластивъ медомъ, принимаютъ чрезъ каждыя два часа по чайной чашкѣ.—**Гофманъ**, свѣжихъ листовъ истолкши 1 унцію, настаивалъ 6 унц. виннаго спирта, которую настойку съ весьма хорошимъ успѣхомъ употреблялъ внутрь

и снаружи, смѣшивая съ отваромъ оныхъ же листовъ.—Снаружи въ видѣ припарки, или ванны—*balneum*, примочки, впрыскиваній, омываній и присыпки; порошокъ, смѣшанный съ медомъ, хорошо укрощаетъ антоновъ огонь, отдѣляетъ костоѣдицу, и очищаетъ гнилыя язвы: *Гуфеландъ*.

Въ Аптекахъ готовятъ:

1. *Сабинное талное масло*—*oleum sabinae e summitat. destillatum* (*), которые внутрь даются при запорѣ кровей и отъ глисть; тоже натираютъ онымъ животъ и параличныя части, съ хорошимъ успѣхомъ. Масло это очищаетъ червоточныя, костоѣдныя и могущія язвы высушиваетъ, прикладываемо будучи на хлопчатой бумагѣ: *Пленкъ*; также помогаетъ въ зубной боли, простудной глухотѣ, шумѣ въ ушахъ, и натираютъ онымъ члены, одержимые ревматизмомъ: *Фогель, Балдингеръ*.

Количество. Отъ 1—4 капель принимаютъ на сахарѣ, или съ яичнымъ желткомъ: *Пидеритъ*.

(*) *Pharmacop. Rossica civil. p. 229.*

2. *Порошокъ пѣдкій составной*—pulvis escharoticus compositus (*), употребляемый снаружи: для травленія мясной дичи—hypersarcosis, и другихъ нечистыхъ нарощеній—supercrescentiae, часто вырастающихъ въ худосочныхъ язвахъ,—ulcera phagedaena: *Виллие*. Ежели высушенные листья истереть въ мелкій порошокъ, и смѣшать съ діахильнымъ пластыремъ, или съ варомъ: то это средство хорошо сгоняетъ мозоли, которые между тѣмъ смазывать должно свѣжимъ коровьимъ масломъ.

3. *Экстрактъ сабинный*—extract. j. sabinae, вывариваютъ такимъ же образомъ, какъ изъ баккаута, который даютъ въ вышесказанныхъ болѣзняхъ: отъ 10—20 и 40 гранъ, въ пилюляхъ или микстурахъ.

Примѣчанія. 1. По свидѣтельству *Дюгамеля*, ветеринары, или скотные врачи, даютъ это растеніе по немногу съ кормомъ, для попровленія тоней и худосочной скотины, особенно рогатому скоту, при потеряннн жвачки.—Для отвара полагаютъ: 4 лота изрѣзанныхъ листовъ, или вѣтокъ на одну бутылку воды, кипятя оную до половины; или на тоже количество листовъ наливаютъ полбутылки горячей сыворотки, которую, настоявъ, даютъ ежедневно

(*) Pharmacop. castr. R. p. 329.

животнымъ, для предохраненія отъ падежа: *Оре-усъ*.—Сокъ, выжатый изъ свѣжихъ листовъ, и принимаемый по столовой ложкѣ, смѣшанный съ молокомъ (1 чайную чашку), служитъ полезнымъ средствомъ отъ глисть, и для изгнанія камешной дресвы: *Фогель*.

2. Киргисцы окуриваются въ худой болѣзни: *Севергинъ*.—На Дону, съ ягодами гонятъ водку, и курятъ оными для пріятнаго запаха.—Этимъ же ароматнымъ дымомъ окуриваютъ отъ ушной, зубной и ломотной простудныхъ болей.

3. Смолистый экстрактъ этого дерева, можетъ замѣнять: баккауттовую смолу—*resina guaiaci*, и абуръ—*aloe*: *Бадаръ, Янъ*.

МОЖЖЕВЕЛЬНИКЪ ОБЫКНОВЕННЫЙ, или яловецъ; ВЕРЕСКЪ—*juniperus communis*, l.

Мѣсто. Дерево, въ умеренной Россіи произвольно растущее на необработанной почвѣ, по сухимъ холмамъ и гористымъ лѣсамъ; въ окружности Петербурга: около Стрѣлиной, Петергофа, у деревни Рябовой и въ другихъ мѣстахъ;—цвѣтетъ въ Маѣ и Іюнѣ, судя по климату.—Ягоды совершенно созрѣваютъ на второе лѣто.

Качества ягодъ зависятъ отъ большаго количества летучаго масла и смолистаго сладко-клейкаго собственнаго начала. *Запахъ* имѣютъ ароматный, пріятный; *вкусъ* сладко-пряный, послѣ горьковатый; молодыхъ вѣточекъ и дерева такія же; но нѣсколько слабѣе, которые содержатъ экстрактно-горькое начало.—Смолисто-ароматное вещество, сообщаетъ мочѣ фіялковый запахъ.

Сила ягодъ, дерева и смолы, иначе называемой сандаракою—*resina sandaraca*, побуждающая, испарину и мочу гонящая: крово-чистительная и поправляющая соки—*alterans, mundificans*; также желудочная, вѣтрогонная.—Въ Аравіи, смолу эту—*sandaracque, ou vernis des Arabes*, извлекаютъ насѣченіемъ древесной корки.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Отваромъ можжевельныхъ ягодъ и дерева—*decocctum baccarum et. ligni*, *Гельмонтъ* съ успѣхомъ пользовалъ водяную болѣзнь, отеки и грудные мокротные завалы; *Волькамеръ, Ридлинъ, Дюверней* и *Фанъ-Свитенъ*, тоже многими опытами, подтверждаютъ о хорошемъ дѣйствіи этого средства въ брюшной водяницѣ—*ascitis*; *Розье* хвалитъ въ мокротномъ поносѣ, происходящемъ отъ слабости пищеварительныхъ органовъ.—*Аколутъ* и *Пизо* замѣчаютъ, что долгое время упо-

требленіе можжевеловыхъ ягодъ можетъ причинить кровавое мочетеченіе, и изнурительное неудержаніе мочи! — Но многіе сѣверные жители благоразумно употребляя пользуются оными: въ почечныхъ мокротныхъ припадкахъ, отъ песку, накопившагося въ мочевыхъ путяхъ, и для предохраненія отъ каменной болѣзни: *Доверъ*, *Кранцъ*. — *Ассюеръ* и *Паули* изгоняли камешки изъ мочеваго пузыря—*uroliti*; *Меишъ* тоже хвалитъ при трудномъ отдѣленіи мочи и въ каменныхъ боляхъ—*dolores calculosi*; *Иппократъ* и *Галенъ* совѣтуютъ на тощакъ по горсти кушать можжевеловыя ягоды тѣмъ, которые слишкомъ мокротны, жалуются на слабость желудка, вѣтры, почечуиные припадки, ипохондрическіе, маточные, и завалы брюшныхъ органовъ; для цынготныхъ тоже полезны эти ягоды. Растертыя съ хлѣбною мякотью, прикладываются къ головной боли, и отъ застарѣлой простуды: *Кунратъ*; въ видѣ куренія, съ прибавленіемъ сандаракowej смолы, поправляютъ смраднѣй и сырой воздухъ въ комнатахъ больныхъ; фланелью или суконкою, нанитанною этимъ ароматнымъ дымомъ, съ пользою трутъ: водяныя опухоли, и простудные отеки; также при слабости частей, ревматизмъ, ломотныхъ опухляхъ составовъ и англійской болѣзни—*gachitis*. — *Иппократъ* совѣтуетъ: при текущемъ насморкѣ и флюсѣ,

втягивать дымъ сандаракковой смолы въ носъ, что помогаетъ также и въ закоренѣлой простудѣ—*catarrhus senilis*; ягоды, истолченныя по равной части съ этою смолою, коихъ дымъ, втянутый въ легкія, помогаетъ въ мокротной одышкѣ и чахоткѣ того же рода, послѣдовавшей отъ долговременнаго простуднаго кашля: *Розье*.—Куреніе это полезно также для одержимыхъ англійскою болѣзнію—*rhachitici*, при наполненіи онымъ комнаты больного, и треніи суконками, напитанными тѣмъ же ароматнымъ дымомъ: *Пленкѣ*. Кожныя болѣзни, особливо чесотка, лишай и проч. съ хорошимъ успѣхомъ натираются мазью, составленною изъ мелкотолченыхъ ягодъ, смѣшанныхъ со свинымъ саломъ; чему помогаетъ и частое омываніе рукъ и другихъ частей, покрытыхъ сыпью, отваромъ можжевеловаго дерева.—Отваръ этотъ не только полезенъ въ вышеупомянутыхъ болѣзняхъ; но притомъ одобряется: въ венерическихъ припадкахъ: *Скополи*; цынготныхъ: *Гофманъ*; личныхъ прыщахъ и паршахъ,—*vitiligo*: *Генникке*; въ глухотѣ, и начинающейся слѣпотѣ—*scrophosis, cataracta incipiens*: *Брухъ*; въ долговременномъ стволовомъ теченіи—*gonorrhoea chronica*, бывающемъ съ мочерѣзомъ и безъ онаго: *Пленкѣ*, *Геккеръ*.—Я давалъ въ астеническомъ перелѣ можжевеловое масло вмѣстѣ съ галлеровымъ

кислымъ эликсиромъ—acid. sulphuric. alcoholisat., смѣшавъ по равной части, на приемъ: по 20 капель, 3 раза въ день на сахаръ, или въ столовой ложкѣ воды.

Сандаракъ, сверхъ куреній, имѣющихъ свойство разбивать и укрѣплять, въ видѣ присыпки и спиртной настойки, способствуетъ очищенію и заживленію гнилыхъ, костоѣдныхъ и другихъ язвъ.—Пластырь, составляемый изъ этой смолы, терпентина, канифоли и воску, одобряется для разогнанія членовыхъ и другихъ холодныхъ опухолей: *Шпретель*.

Количество. Полунциі толченыхъ ягодъ, наливаяють 1 фунтомъ воды, и вскипятивъ однажды, процеженный отваръ пьютъ по чайной чашкѣ; или полторы унциі ягодъ, тоже толченыхъ, наливъ 12 унц. бѣлаго вина, настаивають два дня, и выжатую настойку принимаютъ по 2 унциі, нѣсколько разъ въ день.—Средство это, равно и чай изъ можжевеловыхъ толченыхъ ягодъ, положенныхъ: 1—2 унц. на 2 фунта кипячей воды, которую, настоявъ, пить по чайной чашкѣ, съ прибавленіемъ 3—4 капель гнаннаго масла, очень полезно для одержимыхъ водяною болѣзнью.—Для отвара, древесныхъ коренныхъ стружекъ—*rasura ligni radicis* полагается полуниц. на фунтъ воды, которую кипятить, пока останется 8 унц.

жидкости.—Верхушекъ толченыхъ двѣ щепоти наливаютъ 8 унц. кипячей воды.—Для куренія, полагаются равныя части: верхушекъ или древесныхъ стружекъ, толченыхъ ягодъ и смолы, что часто употребляютъ въ больницахъ, для отвращенія смраднago запаха.—*Розе* совѣтуетъ дѣлать лучшее куреніе, поправляющее дурной воздухъ и гнилыя испаренія укусомъ, настоящимъ съ можжевеловыми ягодами и мятою.

ВЪ АПТЕКАХЪ ПРИГОТОВЛЯЮТЪ:

1. *Рообъ*, или *кисель можжевеловый*—roob bassar. juniperi s. (*), который въ почечныхъ припадкахъ и столовомъ мочерѣзѣ, сопровождающемъ гонореею, *Гофманнъ* и *Геккеръ* хвалятъ; на *пріемъ* дается отъ 1—2 унцій съ наливкою верхушекъ, или толченыхъ ягодъ; въ пилюляхъ, съ прибавленіемъ наперсточной травы—fol. digitalis purp. и горькаго экстракта: *Вилліе* (**).

2. *Гнанное масло можжевеловыхъ ягодъ*—oleum bassar. junip. s. (***), *Ламе*, давая внутрь: отъ 2—5 капель въ клейкомъ

(*) Pharmacop. castr. Ruth p. 331.

(**) Тамъ же, p. 308.

(***) Pharmacop. Rossica civil. p. 229.

отварѣ, выпользовать застарѣлую гонорею, и развелъ твердую опухоль ядеръ; *Шлифть* давалъ съ успѣхомъ въ мокротныхъ лихорадкахъ, за нѣсколько часовъ предъ пароксизмомъ; *Пленкъ* и *Бурдахъ* хвалять отъ глисть; смѣшиваемое съ нашатырно-виннымъ спиртомъ—alcohol ammoniatum, помогаетъ въ членовныхъ боляхъ, свѣдѣніяхъ и параличѣ членовъ; отъ 30—60 капель, смѣшивая съ 1 унціею свиного сала, полезно натирать боляція почечуйныя шишки и чесотку, между пальцевъ выступающую: *Фрице*.

3. *Сборъ кровочистительный съ можжевеловымъ деревомъ*—species purificans с. ligno juniperi (*), употребляемый въ венерическихъ болѣзняхъ и застарѣлыхъ ломотахъ; для отвара полагаются 3 унціи на 3 фунта воды, которую кипятить, пока останется 2 фунта жидкости; процѣженный отваръ пьютъ подслащенный, или съ молокомъ: по 2 фунта ежедневно, въ раздѣленныхъ приемахъ.

4. *Противуцынготный составной сборъ*—species antiscorbuticae compositae (**), тоже служить для приготовления отвара, полезнаго въ цынгѣ—pro d. antiscorbutico.

(*) Pharmacop. Rossica civil. p. 247.

(**) Pharmacop. castrensis Ruthen. p. 346.

Примѣчанія. 1. Можжевеловое дерево замѣняетъ дѣйствіемъ своимъ: сассафрасное и баккаутное—*ligna sassafras et gvajaci off.*: *Гофманъ, Скополи, Платеръ, Брухъ.*—Отваромъ корневыхъ стружекъ *Брассаволь* и *Скалигеръ* вылечивали венерическую болѣзнь еще незакоренѣлую—*lues n. confirmata.*

2. Можжевеловая смола, или *сандаракъ*, по замѣчанію *Линнея*, собираемый въ Швеціи муравьями, и во множествѣ въ Финляндіи находимый въ ихъ кучахъ, качествами своими сходствуетъ съ мастикою—*resina pistaciae lentisci*; а гнанное можжевеловое масло, съ каепутнымъ—*ol. melaleucaee leucadendri*; по чему безъ этихъ дорогихъ чужеземныхъ средствъ, мы можемъ удобно обойтись: *Бордахъ.*—Изъ сандарака составляютъ превосходный спиртовой лакъ.

3. Въ нѣкоторыхъ провинціяхъ Швеціи изъ ягодъ приготовляютъ слабое полниво, именуемое *швадрикою*, которое они во все лѣто и осень употребляютъ вмѣсто обыкновеннаго питья, предохраняющаго ихъ отъ цынги. Изъ ягодной водяной наливки, съ ячною мукою заквашенной дрожжами, выгоняютъ водку: *Декбергъ.*—Ежели эту водку перегнать съ можжевеловыми ягодами: то получаетсѣялій егскій спиртъ, наз. *джиномъ*, или—*eau de*

vie de genièvre, служащій предохранительнымъ средствомъ отъ цынги.—Ягоды, поджаренныя наподобіе кофе, служатъ здоровымъ нитьемъ: отъ брюшныхъ заваловъ, чесотки и другихъ наружныхъ сыпей.—У лапландцевъ питье это въ большомъ употребленіи, вмѣсто обыкновеннаго кофе и чаю: *Шефферъ* (*).

4. Молодые вершинки ѣдятъ охотно козы, овцы и лошади; о свиньяхъ и коровахъ неизвѣстно.—Замѣчено, что эти вѣточки, мелко изрубленныя, равнымъ образомъ и ягоды толченныя, примѣшиваемыя по нѣскольку горстей къ скотскому корму, предохраняютъ ихъ отъ обыкновенныхъ болѣзней и отъ падежа (**).—Конченіе мяса и окороковъ дымомъ можжевельника, доставляетъ онымъ весьма пріятный вкусъ.

5. Въ Смоландіи и Кареліи, изъ можжевеловыхъ ягодъ готовятъ здоровое и вкусное пиво и водку.—Пойло, даваемое дойнымъ коровамъ изъ отвара тѣхъ же ягодъ съ малымъ примѣсомъ муки не только умножаетъ молоко, но и здорово для нихъ во всѣхъ болѣзненныхъ случаяхъ.—Хворымъ

(*) См. Hist. Lappland. Его же: Arkeuthologia, s. juniperi descriptio, Lips. 1679.

(**) Средство, для этого же намѣренія служащее теріакомъ, предложено выше.

овцамъ тоже полезноэто средство, если оное давать имъ пить, немного посоливъ: *Фрибе*.—Простой народъ пользуется отъ водяной болѣзни отваромъ, приготовленнымъ изъ всѣхъ частей этого деревца, т. е. изъ вѣтвей, ягодъ, столовыхъ и корневыхъ стружекъ, мелко изрубленныхъ, полагая 4 горсти на штофъ воды, увариваемой до половины, которой пьютъ по 3 стакана въ день: *Бергii*.

6. Отваръ этотъ, употребляемый внутрь и снаружи, съ прибавленіемъ угольного порошка, для омыванія головныхъ шолудей, истребляетъ оныя въ короткое время.—Мазь, къ тому же годная, составляется: изъ 1 фунта толченыхъ можжевеловыхъ ягодъ и равнаго количества коноплянаго масла, или коровьяго, или свѣжаго сала, которыя варить должно въ новомъ горшкѣ, накрывъ плотно, чтобы составъ не вспыхнулъ; потомъ, прожавъ сквозь холстину, помазывать кисточкою ежедневно паршивые струны.

МОЛОДИЛЬ БОЛЬШОЙ, или дикiй чеснокъ; живучка кровельная; очитокъ; дикiе артишоки—*sempervivum tectorum*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, въ умѣренной Россiи произвольно растущее по старымъ стѣнамъ и утесамъ, также во множествѣ: на

Валдайскихъ горахъ и около Пристаннаго ручья, впадающаго въ рѣку Лугу у горы, въ большомъ количествѣ. — Цвѣтетъ съ Іюня до Сентября въ южныхъ странахъ.

Качества зависятъ отъ яблочной кислоты, соединенной съ известью—*malas calcis*, и вяжущимъ началомъ. Свѣжая трава *zapaхu* не имѣетъ: *вкусъ*: кисловато-вяжущій солодко-ватый.

Сила холодительная, мочегонная, слегка вяжущая, очищающая.

Употребленіе. Выжатый сокъ простоюдины даютъ въ простыхъ огневицахъ и желчно-гнилыхъ горячкахъ; смѣшавъ съ медомъ, намазываютъ въ роту: молошницу, трещины на языкѣ, и воспаленіе десенъ у дѣтей: *Фанъ-Свитенъ*; этимъ же сокомъ полезно примачивать трещины на сосцахъ и воспалительную грудницу, угрожающую ракомъ, также ожоги и мокнуція язвы: *Кранцъ*. Новѣйшіе врачи хвалятъ, примѣшивая къ питью: въ воспаленіи кишекъ, кровавомъ поносѣ, мочерѣзѣ и стволовомъ теченіи—*gonorrhæa*: *Бурдахъ*. Сокъ, смѣшанный по равной части съ виннымъ спиртомъ, дается съ пользою въ хроническихъ конвульсіяхъ, и падучей болѣзни: *Пленкъ*; онымъ же примачиваютъ рожу, превратившуюся въ язвы—*phlegmone ulcerosum*, воспалительныя

и несносную боль причиняющія почечуйныя шишки, ногтоѣду, и притирають лицо для изстребленія веснушекъ—*ephelides faciei*: *Скополи*; толченые листы и смоченные уксусомъ, прикладываются для смягченія ножныхъ мозолей—*clavi pedum*, которые потомъ удобно отдѣляются. *Роде*, прикладывая толченые листы къ главному вѣку, истребляль твердыя маленькія опухоли, именуемая ячменцемъ—*hordeolum*, и помощію выпускаемаго сока уничтожалъ начальное бѣльмо, препятствующее зрѣнію.—*Беймлеръ*, впуская въ слуховой каналъ, уничтожилъ шумъ въ ушахъ, и тяжелое слышаніе.—Растрертыя листы со сливками, прикладываются къ воспалительной грудицѣ—*mastodynia*, и болящимъ трещинамъ сосцовъ: *Кранцъ*.

Количество. Выжатый сокъ дается внутрь по 1 унціи, нѣсколько разъ въ день; снаружи толченые листы прикладываются въ видѣ катаплазмы, или примочки, какъ выше сказано.—*Листодъ* рекомендуетъ для укрощенія головной боли и бреда, бывающаго въ стеническихъ лихорадкахъ.

Примѣчанія. 1. Смолландскіе жители сѣютъ большой молодилъ на соломенныхъ кровляхъ, отъ чего оныя при накопленіи земляной пыли плотнѣе дѣлаются; въ кушарьяхъ употребляютъ его вмѣсто

портулака и другой огородной зелени, служащей прохладительною пищею.

2. Козы и овцы тоже ѣдят охотно.

3. Сочные листья и самый сокъ этого растенія замѣняютъ ледянку—*mesembrianthemum crystallinum*, рекомендуемую особенно въ мочерѣзѣ и другихъ болѣзненныхъ припадкахъ мочевыхъ путей, сопряженныхъ съ запоромъ мочи—*ischuria*.—Бѣлый отсѣдъ молотильнаго сока, получаемый низверженіемъ посредствомъ крѣпкаго виннаго спирта—*alcohol*, составляетъ притиранье, уничтожающее веснушки, и очищающее угриватое лицо, убѣляя онсе подобно салатному бѣлилу—*blanc de fard*.

4. Растертые свѣжіе листья, въ деревняхъ, служатъ общимъ ранозѣлительнымъ средствомъ.— Молодые можно варить въ супахъ вмѣсто портулака, шпината, и проч.

МОЛОДИЛЬ САЙГАЧІЙ, или заячья капуста, толстолистникъ; скрыпунъ—*sedum telephium*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, во многихъ мѣстахъ Россіи растущее по сухимъ лугамъ и каменистымъ полямъ: въ окружности Петербурга: въ Катерингофѣ, на Пулковской горѣ,

въ Паргаловѣ, Осинной рошѣ и въ другихъ подобныхъ мѣстахъ; цвѣтетъ въ Іюнь, Іюль и Августѣ.

Качества. Корень и трава *запаху* не имѣютъ; *вкусъ*: клейковатый, и нѣсколько кислый.

Сила подобная большому молодилу—*sedum majus*, и притомъ ранозѣлительная.—Латинское названіе заимствовано отъ имени *Телефа*, царя Мидійскаго, который, будучи опасно раненъ Ахиллесомъ, вылечилъ свои язвы посредствомъ этого растенія.

Употребленіе. Одобряется въ цынгѣ, излишнихъ мѣсячныхъ и почечуйныхъ кровотеченіяхъ, поносахъ и отъ глисть: испыталъ *Г. Соболевскій*. Снаружи прикладываются коренные толченныя листы къ воспалительнымъ ранамъ, ноготѣдѣ и къ болящимъ почечуйнымъ шишкамъ: *Шведіоръ*; оныя же хорошо умягчаютъ ножныя мозоли; при продолжительномъ прикладываніи этихъ листовъ мозоль бѣлѣетъ, теряетъ чувствительность, и наконецъ отпадаетъ: *Бергій*; къ ожогамъ тоже прикладываютъ свѣжіе истолченныя листы: *Фогель*.

Количество. Выжатый сокъ изъ всего растенія, даютъ по 1 унціи и больше съ сывороткою, или въ иныхъ приличныхъ питьяхъ;

толченые листы и умягченные вареніемъ корни прикладываются снаружи въ видѣ катаплазмы.

Примѣчанія. 1 Молодые листы и стебли наливаютъ горячею водою, чтобы отнять нѣкоторую горечь, и сливъ первую воду, варятъ въ супахъ вмѣсто прохладительной зелени, которая, съ прибавленіемъ уксуса и масла, служитъ пріятнымъ кушаньемъ.

2. Это растеніе содержитъ много минеральной щелочи—soda.

молодилъ остросочный, или мотодилъ; перецъ дикій—sedum acre, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, во всей Россіи произвольно растущее по сухимъ и гористымъ мѣстамъ, по утесамъ на Иртышѣ въ Сооноргіи, также на Поклонной и Пулковской горахъ, въ Паргаловѣ и на островахъ Невы рѣки; цвѣтетъ въ Маѣ и Іюнѣ.

Качества зависятъ отъ остраго щелочнаго начала: *Буркгардъ*; свѣжая трава *запаху* не имѣтъ; *вкусъ*: весьма острый, ѣдкій, подобно водяному перцу—hydropiper; сухая трава не имѣетъ остроты.

Сила раздражающая, рвотная, мочегонительная; снаружи воспаляющая кожу, очищающая.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ цынгѣ хвалятъ *Турне-фортъ*, *Штаркъ*; въ упорныхъ 4-дневныхъ лихорадкахъ, оканчивающихся не рѣдко водяною болѣзнию: *Бурнавъ*, *Линней*. Снаружи, свѣжая толченая трава прикладывается къ гнилымъ цыготнымъ язвамъ, раковымъ, злокачественному вереду—carbunculus, антонову огню и шолудямъ головнымъ: *Муррай*, *Бухольцъ*, *Шведіоръ*. *Квеснай* тоже многими наблюденіями подтверждаетъ, что это растеніе дѣйствуетъ преимущественнѣе самаго болиголова—*scuta*, s. *conium maculatum*: въ ракъ и т. п. злокачественныхъ язвахъ—*ulcera phagedaenica*; толченые листы нѣкоторые съ успѣхомъ прикладывали къ ножнымъ мозолямъ; я имѣлъ случай испытать хорошее дѣйствіе оныхъ въ угрызеніи бѣшеной собаки—*morsus canis rabidi*, давая притомъ внутрь по совѣту *Бурдаха* высушенную траву, собранную весною прежде разцвѣтанія: отъ 20—30 гранъ. Она сначала производитъ рвоту или поносъ; но въ послѣдствіи укрощаетъ судорожныя движенія, и помогаетъ въ падучей болѣзни—*epilepsia* (*).

(*) System der Arzneimittellehre, von K. F. Burdach, 2. B. Leipzig, 1803 p. 295—296.

Лаубендеръ давалъ свѣжую по 15 гранъ, растерши съ сахаромъ, по утру и въ вечеру, которымъ средствомъ тоже возстановилъ двухъ эпилептиковъ, въ теченіи трехъ мѣсяцевъ.— Опыты эти произведены были въ Саксоніи, и съ равнымъ успѣхомъ повторены во Франціи (*).

Количество. Для отвара полагается горсть свѣжей травы на фунтъ молока или пива, которая кипятитъ въ покрытомъ сосудѣ, пока останется половина жидкости; процѣдивъ, принимать по малой чайной чашкѣ, 2 или 3 раза въ день; въ порошокъ дается, какъ выше сказано. *Жилиберъ*, давая выжатый свѣжій сокъ по столовой ложкѣ, смѣшанный съ 1 унц. уксомеда—*oxymel. simpl.*, видѣлъ полезное дѣйствіе въ брюшныхъ завалахъ, желтухѣ, блѣдноцвѣтіи, и въ началѣ водяной болѣзни.— Смѣшивая съ слизью, исцѣлялъ самыя упорныя худосочныя язвы на ногахъ—*ulcera rebellia scorbatica*. Снаружи: въ видѣ катаплазмы трава, вареная съ пивомъ, служитъ припаркою, разводящею цынготныя свѣдѣнія составовъ—*contracturae scorbuticae*; свѣжая толченая трава прикладывается вышеупомянутымъ образомъ; выжатый сокъ, смѣшанный по равной части

(*) См. Journal de Medicine par MM Corvisart, Leroux et Boyer. Т. x, p. 459.

съ виннымъ спиртомъ, очень хорошо укро-
щаетъ антоновъ огонь, и очищаетъ гнилыя
худосочны язвыя: *Пленкѣ*.

Примѣчанія. 1. Козы ѣдятъ это растеніе без-
вредно; другая скотина не трогаетъ.

2. Свѣжая толченая трава, прикладываемая
къ раковымъ и другимъ злокачественнымъ язвамъ,
можетъ замѣнять: дикій американскій вино-
градъ—*phytolacca decandra* L.: *Пеириль*.—Деревен-
скіе жители, растерши съ коровымъ свѣжимъ
масломъ, или съ постнымъ, прикладываютъ для
очищенія шолудивыхъ струповъ или паршей на
головѣ.—Средство это не только очищаетъ, но
и поспѣшествуетъ исцѣленію. *Маркетъ* онымъ
же излечилъ раковыя и антоновымъ онемъ объ-
ятыя язвы.

3. *Простое средство, испытанное отъ цын-
ги*: возьми свѣжаго остросочнаго молодила 8 гор-
стей, налей 8 фунтами пива (4 бутылки), и
отваривъ до половины, процѣженную холодную
жидкость принимай ежедневно на тощакъ по чай-
ной чашкѣ, или малому стакану (*).

(*) См. Misc. N. C. Dec. I, ann., 6. Observ. 22.

молочай болотный; изфонъ—*euphorbia palustris*, L.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, въ умѣренной Россіи растущее по болотамъ и мокрымъ лугамъ, также по берегамъ рѣкъ, особливо около Невы рѣки, на западной сторонѣ Каменнаго острова, около Дудеровыхъ горъ и близъ Нарвы;—порода эта и другія ниже упомянутыя цвѣтутъ въ Іюнѣ и Іюлѣ.

Качества. Корень и листы даютъ млеко-видный острый сокъ, камедьно-смолистаго свойства; *запаху* не имѣютъ; *вкусъ*: сначала непримѣтный, но послѣ жгущій и долго остающийся.

Сила сгущеннаго сока, выжатаго изъ листовъ—*succus fol. spissatus*: ѣдкая, нарывная, возбуждающая сильное чиханіе и жестоко-слаблящая—*drastico cathartica*.

Употребленіе наружное: растворенный въ винномъ спиртѣ, прикладывается для отдѣленія костоѣдицы, и для укрощенія зубной боли, происходящей отъ гнилости кости—*odontalgia cariosa*; растерши съ постнымъ или свѣжимъ коровымъ масломъ, или саломъ, *Шведiorъ* хвалить: для очищенія шелудивыхъ струщевъ—*tinea*, бородавокъ, мозолей и летучихъ огниковъ или лишаевъ—*serpigo*.—Молочайный ѣдкій сокъ, изъ сорваннаго стебелька впускаемый въ

полый гніющій зубъ, тоже иногда помогаетъ въ утоленіи боли.

Количество. Снаружи для присыпки: отъ 8—12 грань и до драхмы; или въ видѣ жидкой мази, растертой съ какою-нибудь слизью—*mucilago*, или съ медомъ.—Для спиртной настойки—*tinctura euphorbii* полагается 1 унц. сгущеннаго сока на 8 унц. виннаго спирта, который, настоявъ 3 дня, процѣдить. Оною примачиваютъ костоѣдныя язвы, и натираютъ для возбужденія параличные члены: *Краницъ*.—Сѣмя, принимаемое отъ 5—10 и 20 грань, сильно слабитъ и гонитъ мочу.—*Бове* и *Буртень* хвалятъ въ отчаянной водяной болѣзни. *Руландъ*, полунци свѣжаго растенія, отваривъ въ 1 фунтѣ молока, давалъ по половинѣ чайной чашки отъ глисть, какъ въ особенности дѣйствующее средство—*specific. anthelm.*

Примѣчанія. 1. Козы ѣдятъ траву эту охотно, овцы мало; коровы, лошади и свиньи не трогаютъ.—Молоко животныхъ, будучи смѣшано съ бѣлымъ сокомъ молочая, дѣлается краснымъ.—Козье молоко и овечье отъ этой травы получаетъ слабительное свойство.

2. Отваромъ этого растенія моютъ чесотку у лошадей; средство это и для другой паршивой

скотины одобряется: *Пленкъ*; равнымъ образомъ свѣжовыжатый сокъ, по равной части съ постынымъ масломъ смѣшанный, хорошо очищаетъ.— Я втиралъ въ животъ этотъ сокъ, смѣшивая съ бычачьею желчью, для изгнанія червей. Сѣмя, смѣшанное съ хлѣбною мякотью, отъ 1—2 золотниковъ, давалъ въ видѣ болюса домашнимъ животнымъ отъ заднепроходныхъ червей.

3. Такія же свойства и дѣйствія имѣютъ: *молочай плащевый*, или *круголистный* и *м. льдкій*—е. *esula*, е. *replis*; *м. придорожный*—е. *lathyris*. и *м. солнечный*—е. *helioscopia*, или *садовый*, растущіе по обработаннымъ полямъ, пашнямъ, садамъ, огородамъ и при дорогахъ (*). — Въ деревняхъ называютъ это растеніе вообще волчьимъ молокомъ, и я видѣлъ, что нѣкоторые крестьяне въ отчаянной водяной болѣзни даютъ отъ 10—20 капель выжатого сока съ сывороткою, или съ молокомъ; — 1 столовая ложка этого сока, растертая съ такимъ же количествомъ мелкаго сахара, и 1 свѣжимъ яичнымъ желткомъ, съ прибавленіемъ 3 столовыхъ ложекъ воды, составляетъ оршадъ, принимаемый чрезъ 2

(*) Равно и другія породы молочая—*variae species euphorbiae*, качествами и силою, всѣ почти сходствуютъ между собою: Косте, Виллеметъ.

часа по 1 ложкѣ, нерѣдко изгоняетъ тесемочную глисту, подобно желтой камеди—*gummi gutta*. — Сгущеннаго сока для этого же намѣренія можно давать: отъ 8—10 и 12 грань, растерши съ сахаромъ, и прибавивъ 1 драхму порошка папортнаго корня—*r. filix mas l.*—Сѣмя, для этого же намѣренія употребляемое, дѣйствуетъ подобно сабадильному—*v. sabadilla*. Снаружи: свѣжій сокъ употребляютъ для согнанія бородавокъ, и очищенія дурныхъ венерическихъ язвъ (фрянокъ).—Смѣшанный по равной части съ свинцовымъ экстрактомъ—*extract. saturni*, особенную пользу оказываетъ въ раковой язвѣ.—Ежели полунціи тогоже сока смѣшать съ 5 унц. терпентиннаго масла, и 2 унц. крѣпкаго виннаго спирта (изъ вина): то такимъ образомъ составляется весьма хорошая мазь: для натиранія параличныхъ членовъ;—трение это помогаетъ и въ вертлужной упорной ломотѣ—*dolor ischiatic*.

4. Древній писатель *Палладій* замѣтилъ, что пчелы, собирающія медъ съ цвѣтовъ упомянутыхъ растеній, когда долго оныя сосутъ, падаютъ на землю и умираютъ; и для того совѣтуетъ траву эту около пасекъ изстреблять.—Рыба, ежели брошенные въ прудъ листья съѣстъ, то получаетъ такую оцѣпенѣлость, что вскорѣ выходитъ на поверхность воды, и тогда можно брать оную руками.—

Для рогатаго скота и овецъ, многія породы ѣдкаго молочая смертоносны!

5. Въ несчастномъ случаѣ, отъ этого яда пособлять должно: сперва питьемъ парнаго молока въ большомъ количествѣ, потомъ давать теплую воду, подслащенную медомъ, или смѣшанную съ свѣжимъ постнымъ масломъ—*ol. cannabis s. lini*, и наконецъ, когда очистится больной чрезъ испражненіе, дать ему паливку маковыхъ цвѣтовъ или головокъ—*infus. fl. v. capitum parav. somniferi*, для успокоенія: *Соболевскій*.— Мыльный водяной растворъ и поташный тоже служатъ хорошими противудѣйствующими средствами: *Розье*.

6. *Г. Жилиберъ* совѣтуетъ испытывать породы молочая въ леченіи венерическихъ болѣзней; вотъ его слова;—*si l'on veut trouver parmi les plantes europeennes un spécifique contre les maladies siphylitiques, c'est dans la preparation des Euphorbes, qu'il faudra le chercher!*—Мнѣніе весьма справедливое; ибо чистотѣль большой—*chelidonium m.*, косатикъ сибирскій—*iris sibirica* и волчій перецъ—*daphne mezereum* суть тоже весьма острия средства; но съ хорошимъ успѣхомъ въ тѣхъ же болѣзняхъ употребляются.

МОРКОВЬ ОГОРОДНАЯ И ЛѢСНАЯ—*daucus carota*, *d. sylvestris*, *l.*

Мѣсто. Растеніе двухлѣтнее, во всей Россіи въ огородахъ сѣмое, и произвольно растущее въ лѣсахъ, по сухимъ полямъ и лугамъ около города Нарвы и пр.—Корни морковные бываютъ желтые, бѣлесоватые и красноватые.

Качества. Морковный корень содержитъ клейкое сахарное начало, имѣетъ большую склонность къ броженію, при которомъ отдѣляется много углекислаго газа—*gaz acid. carbonic.*; посредствомъ онаго оказываетъ свои дѣйствія. *Запахъ* корня и сѣмянъ ароматный, пріятный; *вкусъ*: корня, сладковато-клейкій и слегка пряный; сѣмянъ: горьковато-пряный.

Сила. Морковь притупляетъ острия влаги, доставляетъ питаніе, отражаетъ гнилость, умерщвляетъ глисты и открываетъ брюшные завалы; сѣмена побуждаютъ слабыя пищеварительныя орудія, гоняютъ вѣтры и мочу сильнымъ образомъ—*semina valde diuretica.*

Употребленіе. Морковь служитъ здоровою пищею въ худосочныхъ болѣзняхъ; *Иппократъ* рекомендуетъ въ долговременной хрипотѣ, кашлѣ, чахоткѣ и брюшныхъ мокротныхъ или геморроидальныхъ завалахъ; *Галенъ*

морковный отваръ давалъ въ остановленіи мочи и мочерѣзѣ—*srtanguria*; морковный сокъ и сѣмяна *Гельмонтъ* испыталъ съ хорошимъ успѣхомъ въ каменной болѣзни почекъ—*perphritis calculosa* и для изгнанія песка изъ мочевыхъ путей, давая въ порошокъ съ бѣлымъ виномъ.—Сгущенный сокъ на подобіе сиропа, хвалять въ молошницѣ; также вываренный сокъ моркови, или печеной рѣпы, смѣшанные по равной части съ медомъ, даютъ дѣтямъ по чайной ложкѣ, когда безпокойны бываютъ отъ упомянутой болѣзни; взрослымъ по столовой. Въ дѣтскомъ кашлѣ, сухоткѣ и чахоткѣ хвалять: *Арбутнотъ*, *Шоберъ*.—Въ кровавомъ поносѣ и отъ глисть, давалъ съ пользою *де-ла-Кроа* поутру и вечеромъ или чаще, по столовой ложкѣ; дѣтямъ, страдающимъ мелкими глистами—*ascarides*, *Г. Вилліе* и *Каменецкій*, совѣтуютъ давать сырую морковь ѣсть на тощахъ; морковное сѣмя, тоже имѣетъ противуглистное дѣйствіе, и притомъ гоня вѣтры, уничтожаетъ колику въ кишкахъ—*colica flatulenta*, помогаетъ также истерическимъ женщинамъ отъ остановки мѣсячныхъ и родовыхъ кровей: *Соболевскій*.—Снаружи, свѣжая сочная морковь толченая, или на теркѣ истертая—*rad. radulata*, прикладывается въ видѣ холодной катаплазмы къ раковымъ язвамъ.—*ulcera sangrosa*, венерическимъ,

золотушнымъ и гнилымъ цынготнымъ: *Ришардъ*, *Сульцеръ*; прикладка эта, перемѣняемая по утру и въ вечеру, притупляетъ остроту ѣдкихъ язвъ—*ulcera cacoëthica, s. phagedaenica*, утоляетъ боли, укрощаетъ отдѣленіе смрадной сукровицы, отражаетъ гнилость, умягчаетъ мозолеватые края упомянутыхъ язвъ, и наконецъ приводитъ оныя къ заживленію: *Гибсонъ*, *Готесьеркъ*, *Никольсонъ*, *Шмуккеръ*.—Морковная катаплазма, смѣшанная съ травою пестраго омега—*herba conii maculati*, въ грудныхъ, личныхъ и губныхъ ракахъ—*carcinomata*, гораздо большую пользу оказываетъ, нежели одна морковь: *Бергій*, *Штеркъ*, *Тиссотъ*.—Скобленная морковь или мелко разтолченная, прикладывается къ свѣжимъ ожогамъ: *Дарелль*; въ теченіи 24 часовъ, въ тепломъ мѣстѣ приходитъ въ броженіе, и таковая углекислая катаплазма—*cataplasma fermentans* въ ранахъ и язвахъ, сопряженныхъ съ антоновымъ огнемъ—*ulcera gangraenosa*, оказываетъ чрезвычайное дѣйствіе: *Бурдахъ*.

Количество. Для цынготныхъ больныхъ и другихъ, имѣющихъ испорченные соки, морковь служить пищею и лекарствомъ; выжатаго и сгущеннаго морковнаго сока—*sara dauci* даютъ по столовой ложкѣ нѣсколько разъ въ

день (*). Морковнымъ отваромъ и сокомъ, смѣшаннымъ съ медомъ, полощутъ ротъ отъ жабы, и помазываютъ кисточкою въ дѣтской молошницѣ и оспенномъ слинотеченіи—*ptu-
lismus variolosus*.—Снаружи: въ видѣ ката-
плазмы, на 2 унціи тертой или толченой мор-
кови, полагается 1 унція омеговой травы—
herb. cicutae; или въ видѣ углекислой ката-
плазмы, какъ выше сказано, перемѣняя оную
2 или 3 раза въ день. Сѣмя дается въ по-
рошкѣ отъ $\frac{1}{2}$ —1 драхмы, 2 или 3 раза въ
день; для наливки полуунціи, на 6 унц. кипя-
чей воды; или тоже количество настаиваютъ
въ бѣломъ виноградномъ винѣ.

Примѣчанія. 1. Вываренный изъ моркови си-
ропъ, сверхъ упомянутаго лечебнаго употребле-
нія, служитъ вмѣсто сахарной патоки и меда,
для приправы кушанья и пр.— а для бѣдныхъ,
подслащиваютъ онымъ питье, микстуры и другіе ле-
карственные составы.—Въ Англіи *Горни д' Йоркъ*,
обыкновеннымъ образомъ приведши мятую сочную
морковь въ винное броженіе, выжалъ весьма хоро-
шую водку; такимъ же образомъ можно гнать

(*) Этимъ средствомъ многіе избавились отъ припадковъ
закрытаго почечуя, употребляя оное продолжительно.—
Превосціей совѣтуетъ смѣшивать по поламъ съ сокомъ
почечуйника—*p. persicaria l.*

спиртную жидкость: изъ свекловицы, пастернака, и другихъ т. п. сладкихъ кореньевъ: *Бергий*.

2. Ея коренья лошади, рогатый скотъ, овцы и свиньи ѣдятъ охотно, и отъ этого корму получаютъ вкусное мясо и жирными дѣлаются.— Молоко и масло животныхъ, питаемыхъ морковью, получаютъ превосходныя качества: *Розье*.

3. *Катаплазма, полезная отъ золотушнаго рака*, составляется: изъ 1 фунта истертой на теркѣ свѣжей моркови, травы пестраго болиголова—*sicuta*, и зеленыхъ маковыхъ головокъ съ листьями истолченныхъ въ мякоть, каждаго по 4 лота. Перемѣняа оную 2 раза въ день, смрадная язва очищается, получаетъ хорошее нагноеніе, и приходитъ въ заживленіе. Этимъ однимъ средствомъ, я многія исцѣлилъ худосочныя язвы—*ulcera sasoëthica*.

МОРОШКА, или МАМУРА—*rubus chamaemorus*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, въ сѣверной Россіи и Сибири во множествѣ растущее, особенно въ Финляндіи, по болотамъ и мшистымъ или торфянымъ мѣстамъ; также въ окружности Петербурга около Мурина и въ другихъ подобныхъ мѣстахъ; въ большомъ изобиліи растетъ особенно въ Архангелогород-

ской губерніи.—Удачно разводится на жирной и влажной почвѣ, посредствомъ раздиранія корешковъ, разсаживаемыхъ весною и осенью на мокрыхъ и тѣнистыхъ мѣстахъ.

Качества. Свѣжія ягоды, желтоватыя, *запаху* не имѣютъ; темнокрасныя, приятно пахнутъ на подобіе малины; *вкусъ*: кисло-приятный, винный.

Сила прохлаждающая, утоляющая жажду и превосходная противуцынготная—*praestans rapasea ascorbuticorum!* *Каринскій*.

Употребленіе. Въ лихорадкахъ, цынгѣ, кровоизліаніи и чахоткѣ.

Количество. Свѣжія ягоды даютъ большымъ кушать по желанію; или въ видѣ варенья примѣшиваютъ къ питью, по нѣсколькимъ унціямъ.

Примѣчанія. 1. Красная мамура, растущая въ Финляндіи, служитъ рѣдкимъ десертомъ для приготовления заѣдокъ и виноградныхъ наливокъ.—Княженица и ежевика—*tubus arcticus et r. fruticosus*, качествами своими къ оной подходятъ.

2. Траву морозки коровы, козы и овцы ѣдятъ охотно.— Въ Архангельскѣ, эти незрѣлыя ягоды въ бочкахъ наливаютъ водою, подъ которою онѣ

созрѣваютъ, и такимъ образомъ слѣдующей весной доставляются въ С. Петербургъ.

мухоморъ—*agaricus muscarius*, L.—*amanita muscaria*.

Мѣсто. Грибъ однолѣтній, растущій часто по сухимъ лугамъ и пещанымъ лѣсамъ, въ Юлѣ и Августѣ мѣсяцахъ, во всей Россіи.

Качества ядовитыя, зависящія отъ жирнаго смолисто-остраго вещества, соединеннаго съ солекислою и фосфорною щелочью—*kali muriatic. et phosphoric.* *Вокель.* *Запахъ* имѣетъ вонючій; *вкусъ*: острый.

Сила слабительная, потогонная, очищающая; въ непомѣрномъ количествѣ: опьянѣлость и безуміе наводящая!—мухъ и клоповъ изстребляющая.

Употребленіе. Внутрь, одобряется въ судорогахъ, падучей болѣзни и параличныхъ припадкахъ, послѣдовавшихъ отъ вогнанныхъ внутрь кожныхъ сыпей, или отъ обрѣзанныхъ колтуновъ—*plica polonica abscissa* также въ затвердѣніи гортанныхъ железъ или другихъ частей, и зобахъ — *strumae*: — *Вистлингъ, Бернардитъ*. Снаружи порошкомъ присыпаютъ упорныя злокачественныя язвы—*ulcera maligna*,

антоновъ огонь и гноеватые глазные прыщи—*pustulae corneae*: *Пленкѣ*, *Шведіорѣ*, *Бурдахѣ*.—Свѣжіе эти грибы, собравъ въ свое время и искрошивъ, наполняютъ оными бутылку, которую закупоривъ, зарываютъ въ навозъ, чтобы распустились въ слизистую жидкость, которую натираютъ онѣмѣлые, или параличные члены; иные къ этой слизи прибавляютъ равное количество виннаго спирта, что гораздо бываетъ дѣйствительнѣе.

Количество. Внутри дается корень, истертый въ порошокъ, отъ 10 до 20 гранъ съ уксусомъ, 2 или 3 раза въ день. Снаружи, въ видѣ присыпки.

Примѣчанія. 1. Часть корня, находящуюся въ землѣ, собравъ осенью, очистивъ, высушивъ и стерши въ порошокъ, хранить въ сухомъ мѣстѣ, закупоривши хорошо въ стеклянномъ сосудѣ.—*Шпренгелъ* замѣчаетъ, что это острое средство, неосторожно употребляемое (отъ падучей болѣзни), можетъ причинить опасное воспаленіе!

2. Выжатымъ сокомъ свѣжаго мухомора мажутъ скважины стѣнъ и кроватей, для истребленія клоповъ; растерши въ молокѣ, ставятъ по окошкамъ въ плоскихъ тарелкахъ для уморенія мухъ, откуда грибокъ этотъ и наименованіе свое получилъ.—Камчадалы употребляютъ мухоморъ для

веселья, такъ какъ азіятцы ошіи, и приготавливаютъ изъ онаго пьяный напитокъ.— Грибъ этотъ, по незнацію съѣденный, можетъ причинить смерти!— Противуядныя средства предложены выше.

3. Мнѣ удалось помочь въ *падучей болѣзни*— *epilepsia* слѣд. средствомъ: къ ползолотнику высушеннаго корня, растертаго съ 2 золотниками вишневаго клея, я прибавлялъ 2 лота медоваго укуса— *oximel*, и, разведши 12 лотами чистой воды, давалъ чрезъ 3 часа по столовой ложкѣ, продолжая цѣлый мѣсяць.

МУЖСКОЙ КОРЕНЬ, ИЛИ ПОКРИКЪ; АДАМОВА ГОЛОВА; МАНДРАГОРЪ; СОННОЕ ЗѢЛЪЕ—*atropa mandragora*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, въ южной и умѣренной Россіи произвольно растущее въ Кавказской губерніи и при Арзамасѣ, по мѣстамъ тѣнистымъ и около рѣкъ.—Разводится удобно сѣмянами.

Качества корня ядовитыя, зависящія отъ усыпительнаго остраго начала; *запахъ* свѣжаго корня, противный, усыпительный, оглушающій; *вкусъ*: горьковатый, тошноватый; коренной корки: острый; сушеніемъ уменьшается острота.

Сила, въ маломъ количествѣ, болеуто-
лительная, противусудорожная; въ большемъ:
усыпляющая, ядовитая! — коренной корки—
sort. radicis: слабительная, мѣсячногонная;
въ большомъ приѣмѣ: сильная рвотно—пронос-
ная—drastica, emetico—catarctica!! — Снаружи
разбивающая.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Древніе врачи, какъ-то:
Теофрастъ и *Діоскоридъ*, корень этотъ да-
вали въ хорошихъ малыхъ приѣмахъ: для уто-
ленія болей и доставленія сна, особенно въ
судорожныхъ припадкахъ, истерикѣ, ломотѣ и
меланхолиі. *Шведіоръ*, совѣтуетъ испытать
въ падучей болѣзни? Снаружи чаще употре-
бляется корень истолченный мелко и съ медомъ
смѣшанный; или распаривъ въ молокѣ, въ
видѣ катаплазмы прикладывается съ хорошимъ
успѣхомъ, для разведенія скуловыхъ опухолей—
parotides, шейныхъ золотушныхъ—scrophulae,
скирныхъ затвердѣній, тугихъ паховиковъ и
венерической окръпlosti ядеръ—scirrhus testi-
culorum venereus: *Гофбергъ*, *Пленкъ*.—
Свѣжіе растертые листы тоже служатъ боле-
утолительною и разводящею катаплазмой:
Роке.

Количество. Вѣнскіе врачи начинаютъ
корень этотъ давать внутрь въ наливкахъ—
infusa, весьма малыми приѣмами, полагая 20

грань сухаго толченаго корня на 10 унцій кипячей воды, и настоявъ $\frac{1}{2}$ часа, процѣженную наливку даютъ по столовой ложкѣ, нѣсколько разъ въ день.—Въ порошокѣ, принятый отъ 2—3 грань, производитъ усыпительное дѣйствіе: *Гофбергъ* (*).—*Жилибертъ* давалъ для укрошенія жестокой ломоты и подагрической боли отъ 1—4 грань въ день, растерши съ медомъ, снаружи въ видѣ катаплазмы, или припарки какъ выше сказано; или свѣжіе толченые листы прикладываются, для разведенія скиррныхъ опухолей.

Примѣчанія. 1. Лучшія противудныя средства—*antidota mandragorae* суть: укусъ, молоко и рвотное—*emeticum*.

2. Нѣкоторые этимъ растеніемъ замѣняютъ: дурнишникъ—*xanthium strumarium* l., траву красавицы—*a. belledonna* l. *Петриль*.—Корень онаго, осторожно употребляемый, можетъ замѣнить баккаутъ и целибуху: *Бодаръ*.

МЫЛЬНАЯ ТРАВА, или МЫЛЬНИКЪ—*saroparia officinalis*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, въ умѣренной Россіи самородно растущее на поляхъ и при рѣкахъ, какъ-то: на Волгѣ и пр.

(*) См. К. Aetensk. Acad. Handl. Vol. XXIV, p. 229, st. XXXIV.

Качества мыльные, зависящія отъ большаго количества экстрактнаго начала, соединеннаго съ слизью, которая составляютъ почти 3-ю часть вѣса этого корня. Корень и листы *запаху* не имѣютъ; *вкусъ*: сладковатый, горьковато-клейкій.

Сила притупляющая, разводящая, мочегонительная, очищающая; сѣмянамъ *Гофманъ* приписываетъ противуглистную и отъ падучей болѣзни полезную—*antiepileptica*?

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Корень и листы одобряются въ отварѣ, особенно въ венерическихъ болѣзняхъ, въ соединеніи: съ сладкогорькимъ пасленомъ,—*stipites dulcamarae*, и съ можжевеловымъ деревомъ,—*lignum juniperis*. или съ волчьимъ лыкомъ—*cort. d. mezerei*: *Шталь*, *Нейманъ*; въ ломотныхъ членовныхъ боляхъ, подагрическихъ и застарѣломъ ревматизмѣ, одобряютъ: *Бергій*, *Менхъ*; въ брюшныхъ завалахъ, затвердѣніи железъ, желтухѣ, запорѣ кровей, загноеніи внутренностей и цынготномъ худосочіи—*cachexia scorbutica*: *Бургавъ*, *Септаль*, *Янъ*, *Кемпфъ*; въ простудномъ мокротномъ и удушливомъ кашлѣ, тихой изнури-тельной лихорадкѣ—*f. lenta nervosa*, мокротномъ столовомъ теченіи—*blenorrhoea*, теченіи женскихъ бѣлей—*leucorrhoea*, кожныхъ долговременныхъ сыпяхъ и худосочныхъ язвахъ:

Томмъ, Бурдахъ, Шведіоръ; при воспаленіи легкихъ и печени, мокротныхъ завалахъ—*stases pituitosae*, начальной водяной болѣзни, въ ишохондріи и сухоткѣ, одобряютъ: *Шпренгель, Роке*; въ глистныхъ припадкахъ и задумчивости, хвалитъ *Пеириль*. Снаружи свѣжее растеніе съ корнемъ истолченное въ мякоть, прикладывается для очищенія кожныхъ болѣзней и нечистыхъ язвъ: *Пленкъ*.

Количество. Полунціи корня полагается на фунтъ воды, которую кипятить, пока останется 8 унцій отвара, принимаемаго по чайной чашкѣ, нѣсколько разъ въ день; свѣжихъ листовъ полагается горсть, на тоже количество воды, которую, отваривъ, употребляютъ для омыванія кожныхъ болѣзней, нечистыхъ язвъ, и для припариванія ломотныхъ опухолей; свѣжо-выжатый сокъ изъ всего растенія *Роке* давалъ на тощакъ отъ 5—6 унцій.—Сгущенный сокъ, я давалъ вмѣстѣ съ экстрактомъ вахты: отъ 1—4 драхмъ, въ брюшныхъ завалахъ и водяной болѣзни. Сѣмянъ въ порошокъ отъ 15—20 и 30 гранъ, нѣкоторые даютъ отъ падучей болѣзни.—*Горнъ* и *Бертеле* замѣчаютъ, что продолжительное употребленіе этого клейковатаго отвара ослабляетъ желудокъ; однако съ прибавленіемъ вышеупомянутыхъ кровочистительныхъ средствъ, я этого никогда не примѣтилъ у моихъ больныхъ, и

Бергii утверждаетъ, что при меркуріальномъ леченіи застарѣлой ломоты служить способнѣйшимъ лекарствомъ.

Въ Аптекахъ готовятъ:

1. *Древесные кровочистительные сборы*—species lignor. purificantes (*).

2. *Кровочистительный отваръ*—decoctum lignorum (**), употребляемый въ вышеупомянутыхъ болѣзняхъ, ежедневно по 2 фунта въ день, въ раздѣленныхъ приѣмахъ.—Простѣе и дешевле для сказаннаго намѣренія готовить можно сборъ изъ корней мыльной травы, репейника, можжевельника и хмѣлевыхъ корешковъ, которыя, по равной части срубивъ мелко, употреблять для отвара, вмѣсто дорогихъ иноземныхъ, такъ наз. кровочистительныхъ деревъ—ligna purificantia, полагая 2 лота на бутылку воды, увариваемой до половины; или 4 лота этого сбора варить въ 2 бутылкахъ воды, пока останется 1 бутылка отвара; процеженный пить ежедневно по 3 стакана.

(*) Pharmacop. castrens. Ruthena p. 346.

(**) Тамъ же, p. 248.

Примѣчанія. 1. Корень мыльной травы совершенно замѣняетъ дорогую сарсапариль—*succedaneum smilacis sarsaparilæ*; сассафрасъ—*l. sassafugas* и чапушинскій корень—*smilax china*.

2. Отваръ этого корня для недостаточныхъ людей можетъ служить вмѣсто мыла для мытья бѣлья; и при взбалтываніи или взбиваніи онаго прутникомъ, пѣшится подобно мыльной пѣнѣ, и при мытьѣ полотenceвъ хорошо очищаетъ салныя пятна.—*Трагъ* давно уже замѣтилъ, что монахи, скитающіеся въ пустыняхъ, употребляютъ это растеніе вмѣсто мыла, и въ деревняхъ моютъ этимъ мыльнымъ отваромъ засаленное бѣлье.— Этимъ растительнымъ мыломъ можно мыть и всякія шелковыя матеріи, которое не измѣняетъ цвѣта, и доставляетъ онымъ окръплую плотность: *Пидеритъ*. Стекланые сосуды, бутылки и проч., въ которыхъ было масло, мыльною травою, растертою въ водѣ, весьма удобно очищаются.— Растеніе это годится и для ваннъ, употребляемыхъ въ сказанныхъ болѣзняхъ, особливо въ упорной чесоткѣ, и другихъ долговременныхъ сыпяхъ: *Фогель*.

мята водяная—*mentha aquatica*, I.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, въ Россіи вездѣ на мокрыхъ и водянистыхъ мѣстахъ

произвольно растущее; въ окружности Петербурга: на Московской сторонѣ около заборовъ, въ Стрѣльной, по огородамъ и садамъ самородная; цвѣтетъ въ Юлѣ.

Качества. Трава имѣетъ *запахъ* пронизательный, пріятный, лимоннымъ отзывающійся; *вкусъ*—пряно-горьковатый.

Сила подобная кудрявой мятѣ—*m. crispata*, притомъ хорошая разводящая, укрѣпляющая.

Употребленіе. Одобряется въ тѣхъ же случаяхъ, какъ упоманутая мята, и еще съ большею пріятностію.—Снаружи, свѣжую толченную траву, или въ видѣ припарки, прикладываютъ для разведенія простудныхъ опухолей, грудныхъ и ушибовъ; листья растерты полезны также отъ укушенія осъ и пчелъ; а для укрощенія желудочной боли, сырую катаплазму прикладываютъ къ мѣстоположенію онаго.

Количество. Употребляемая внутрь вмѣсто чаю, когда кладутъ горсть листовъ на фунтъ кипячей воды, утоляетъ желудочную боль и спазмы, притомъ гонитъ мочу; выжатый сокъ, принимаемый по столовой ложкѣ съ бѣлымъ виномъ, гонитъ песокъ изъ мочевыхъ путей, помогаетъ также отъ глухоты—*sophosis*: *Турнефортъ*.

Примѣчанія. 1. Ее для укрѣпленія желудка сырую ѣдятъ съ салатомъ; въ квасу и въ кислыхъ щахъ, тоже очень полезна: *Соболевскій*.

2. Такіяже качества и силу имѣютъ слѣдующія породы мяты: *м. льсная* или *дикая*—*mentha sylvestris, s. spicata*, *м. садовая простая*—*m. gentilis, s. hortensis*, растущія самородно во всей Россіи, по краямъ лѣсовъ, въ садахъ и огородахъ на мокроватой землѣ, особенно при рѣкахъ Окѣ и Волгѣ. Эти породы мяты содержатъ въ себѣ много камфоры: *Бодаръ*, и по своимъ превосходнымъ качествамъ могутъ употребляемы быть вмѣсто кудрявой садовой мяты.

3. Пчелы изъ этихъ растений собираютъ душистый медъ; травы эти полезны также отъ уязвленія осъ, пчель и другихъ наѣдомыхъ.

МЯТА КУДРЯВАЯ—*mentha crispata*, L.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, въ Сибири самородно растущее; въ Россіи вездѣ разводится въ садахъ, и сама разпложается удобно сѣмянами, и разсаживаніемъ черенковъ, или верешковъ.

Качества травы превосходныя, зависящія отъ летучаго масла и экстрактнаго начала.—*Картейзеръ*, изъ 1 фунта мятныхъ листовъ,

получилъ 3 драхмы существеннаго масла. *Запахъ* благовонный, крѣпкій, не столь пріятный; *вкусъ*—горьковато-пряный, горячительный.

Сила побуждающая, вѣтрогонная, желудочная, мочу и мѣсячныя крови гонящая, противуглистная. Снаружи разводящая и унимающая любострастную похоть—*antaphrodisiaca*: *Плмій, Иппократъ*; ранозѣлительная.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ слабости желудка, отвращеніи отъ пищи, вѣтряной коликѣ, брюшныхъ спазмахъ, икотѣ, рвотѣ и истерическихъ припадкахъ: *Гофманъ, Сиденгамъ, Бургавъ*; въ мытѣ—*lienteria*, кровавомъ поносѣ, астенической лихорадкѣ—*typhus*: *Кранцъ, Пленкъ*; въ непомѣрной похотливости—*satyriasis*, и болѣзненномъ бѣшенствѣ матки—*furor uterinus*: *Діоскоридъ, Шведіоръ*. Снаружи прикладывается въ видѣ катаплазмы или припарки: къ ушибамъ, отекамъ, судорожнымъ членовнымъ болямъ; простуднымъ опухолямъ и груднымъ, происходящимъ отъ излишняго накопленія молока или отъ створоженія онаго—*coagulum lactis in mammis*; также для разведенія холодныхъ опухолей—*tumores frigidi*: *Линней, Левисъ*; толченые листы, прикладываемые къ ранамъ, унимаютъ кровотеченіе, изгоняютъ червей и споспѣшествуютъ заживленію оныхъ: *Турнефортъ*.

Количество. На фунтъ кипячей воды полагается сухой травы 1 унція, которую, настоявъ, пьютъ по чайной чашкѣ; наливка эта служитъ также промывательнымъ и припаркою; для разведенія упомянутыхъ опухолей, къ горячей наливкѣ прибавляется немного мыла и молока, которою, напитавъ сложенные полотенца или суконки, перемѣняютъ почаще при остываніи.—Отъ колики въ животѣ, остановки мѣсячныхъ и родовыхъ кровей, припариваютъ животъ, вмѣстѣ сваривъ съ ромашкою; для облегченія головной боли, прикладываютъ мяту, растертую съ хлѣбнымъ мякишемъ, смочивъ немного уксуомъ. Отъ осиплости, свѣжовыжатый сокъ изъ мяты, подсластивъ медомъ или сахаромъ, принимаютъ къ ночи по 3 столовыхъ ложки, продолжая недѣлю.—Растертые листья съ сахаромъ въ видѣ консервы, *Розенштейнъ* хвалитъ для укрѣпленія пищеварительныхъ органовъ. *Бургавъ* давалъ оную съ успѣхомъ отъ мокротнаго и сыраго поноса—*lienteria* отъ 2—4 драхмъ на пріемъ.

Въ Аптекахъ готовятъ:

1. *Мятную гнаниую воду*—*aqua m. crispae destillata* (*), которую въ скорости

(*) Pharmacop. Rossica, civilis. p. 192. et castrensis Ruthena p. 222.

составлять можно: растирая 12 капель мятного масла съ 4 драхмами сахара, прибавляя мало по малу до 12 унцій чистой воды.— Дается по столовой ложкѣ, отъ вѣтровъ, и для укрощенія рвоты; служить также приличною жидкостію, для составленія укрѣпляющихъ микстуръ.

2. *Мятный спиртъ*—*spiritus menthae* с. (*). Одобряется, какъ дѣйствительное побуждающее средство въ упомянутыхъ болѣзняхъ, когда прибавляется къ ободряющимъ микстурамъ по 4 драхмы, и полезенъ особенно для ипохондрикковъ, истерическихъ женщинъ, и въ поносахъ.

3. *Гуанное мятное масло*—*ol. destill. menthae crispae* (**). Дается на сахаръ отъ 3—4 капель въ тѣхъ же случаяхъ, гдѣ и самая мята предписывается. *Фогель* особенно хвалить это масло, для женщинъ, страдающихъ слабостію матки, вѣтрами и спазмами въ животѣ. Спаружи кормилицы, по отнятїи отъ груди младенца, натираютъ себя этимъ масломъ подъ мышками, для уменьшенія прилива молока къ грудямъ, и для разогнанія сгустившагося: *Пленкѣ*.

4. *Ароматные травяные сборы*—*species aromaticaе* (***) , употребляемые въ

(*) Тамъ же. р. 250. (**) р. 229.

(**) Pharmacop. castrens. Ruthena, р. 346, et civilis Rossica, р. 248.

видѣ сухихъ и мокрыхъ разбивающихъ парокъ, какъ выше сказано.

Примѣчанія. 1. Мята, какъ всѣмъ извѣстно, кладутъ въ квасъ и кислые щи, для доставленія онымъ пріятной пряности; настоянная съ уксусомъ, служитъ здоровымъ и благовоинымъ куреніемъ, поправляющимъ воздухъ въ жилыхъ покаяхъ и больницахъ. Молоко отъ мяты медленнѣе створаживается, и уменьшается отдѣленіе онаго въ грудяхъ, когда мята употребляется въ видѣ водяной наливки: *Левисъ, Пиманнъ.*

2. Рогатый скотъ мяту лѣсную, полевую и садовую ѣсть охотно. Замѣчено, что молоко отъ оныхъ не скоро свертывается. Иногда же у коровъ, пасущихся на поляхъ, изобилующихъ упомянутыми растеніями, молоко въ вымѣ вовсе пропадаетъ; чего простолюдины, не вѣдая, часто приписываютъ таковую потерю колдовству: *Линней.*

3. Отъ ушибовъ и свѣжихъ ранъ, мята и отваренная въ простомъ винѣ, служитъ домашнимъ цѣлебнымъ средствомъ: *Бадаръ.*

мята перечная, или англійская—*mentha piperita*, L.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, во всей Россіи садовое. Собирать должно въ Іюль мѣсяцѣ, при появленіи цвѣтовъ.

Качества травы превосходныя, зависящія отъ изобилія летучаго камфорнаго масла. *Запахъ* свѣжей и сухой травы: благовонный, проникательный, камфорою отзывающійся; *вкусъ*: сухаго растенія крѣпче свѣжаго, сначала пряно-острый, камфорный, наполняющій ротъ нѣкоторою горячностію, потомъ чувствуется прохладительный.

Сила, подобная выше описанной мятѣ—т. *сісра*; но гораздо проникательнѣе оной.—Дѣйствуетъ особенно на потъ и урину, изгоняя этими путями изъ тѣла болѣзнетворную матерію: *Индеритъ*.

Употребленіе. Одобряется въ вышесказанныхъ болѣзняхъ; а особенно въ различныхъ видахъ нервной слабости, какъ-то: въ астеническихъ лихорадкахъ, маточныхъ спазмахъ, продолжающихся во время мѣсячныхъ кровей, упорномъ кашлѣ, хрипотѣ, простудномъ ревматизмѣ, запорѣ кровей, блѣдной немочи и теченіи бѣлей; также, въ нервныхъ горячкахъ и лихорадкахъ, сопряженныхъ съ слабостію желудка, тошнотою, рвотою, поносомъ, рѣзью въ кишкахъ, и во всѣхъ астеническихъ припадкахъ, перечная мята служитъ подкрѣпляющимъ и ободряющимъ средствомъ: *Книге*.—Снаружи, для разведенія водяныхъ опухолей, молочныхъ, простудныхъ, подагрическихъ и

самой воспалительной рожи, прикладывается вмѣстѣ съ ромашкою, или съ бузиннымъ цвѣтомъ—*flores chamomillae v. sambuci n.* въ видѣ сухой и мокрой припарки, смотря по обстоятельствамъ: *Менхъ, Шведіоръ, Бурдахъ.*

Количество. Въ порошокъ, сухая трава дается отъ 20—30 гранъ; или въ видѣ наливки, полагая 1 унцію травы на фунтъ кипячей воды, которую подсластивъ медомъ или сахаромъ, пьютъ вмѣсто чаю. Снаружи прикладывается въ сухихъ мѣшечкахъ, и въ мокрыхъ припаркахъ, упомянутыхъ выше при описаніи кудрявой мяты.—Мятная консерва, гнанная вода и масло, даются въ тѣхъ же болѣзняхъ, и такимъ же образомъ, какъ сказано было.

Примѣчанія. 1. Перечная мята, въ водяной и вишней наливкѣ употребляемая вмѣстѣ съ мауновымъ корнемъ—*rad. valerianae*, по методу *Г. Вилліе* (*), замѣняетъ виргинскій змѣевикъ—*arist. serpentaria*, и хину—*cinchona off.*

2. Гнанная мятная вода и масло, какъ кудрявой, такъ и перечной мяты, пряностію и дѣйствіемъ своимъ замѣняютъ померанцовую водку,

(*) *Pharmacop. castrens. Ruthena*, p. 272.

коричневую, каеуптное масло, и самую камфору—*lavrus camphora*, которую содержатъ въ себѣ, въ чемъ удостовѣряютъ насъ химическія испытанія, и самое существенное ея масло, въ продолженіи времени отдѣляющее настоящую камфору: *Gaubii*.—*Бертеле* хвалитъ это летучее и сильно возбуждающее средство: въ чрезвычайной слабости жизненныхъ силъ—*prostratio virium*, параличномъ ударѣ, оцѣпенѣлости—*tetanus*, летучей подагрѣ и бездѣйствіи членовъ; но при стеническомъ или воспалительномъ состояніи и полнокровіи, запрещается. *На приемъ* дается: по 1, 2, 4 и 5 капель на сахарѣ, или съ бѣлымъ виномъ. Снаружи, натираютъ онымъ расслабленныя части, также грудь и животъ: отъ желудочныхъ спазмовъ, вѣтряной колки и въ маточныхъ припадкахъ. Ежели, обмочивъ палецъ, помазать онымъ масломъ подъ глазнымъ вѣкомъ: то оное сильною своею проникающею возбуждаетъ изтеченіе слезъ и укрѣпляетъ слабое зрѣніе: *Bergii*.

Мятныя сахарныя лепешки *rotulæ menthæ* поправляютъ противный запахъ рта, и возбуждаютъ пищеварительныя органы: *Роке*.

МЯХУНКА, или МОЖЖУХА; ВИШНЯ ЖИДОВСКАЯ, МОШПА,
ПУЗЫРНАЯ ТРАВА—*physalis alkekengi*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, въ южной Россіи произвольно растущее въ тѣнистыхъ

мѣстахъ; особливо на Терекѣ, близъ Теплицъ, и въ садахъ удобно разводится сѣмянами и раздѣленіемъ корневыхъ отпрысковъ; цвѣтеть въ Іюнь; ягоды созрѣваютъ въ Августѣ.

Качества. Зрѣлые плоды *запаху* не имѣютъ; *вкусъ*: сначала кислорато-пріятный, послѣ горькій; сѣмянъ и кожицы плодовъ: весьма горькій.

Сила слабительная, сильно гонящая мочу; въ видѣ куренія, утоляющая зубную боль.

Употребленіе. Одобряются въ почечныхъ мокротныхъ припадкахъ, и трудномъ мочеиспращненіи — *dysuria*: *Галенъ*, *Рай*; въ каменной болѣзни собственной — *in se ipso* испыталъ *Кругеръ* (*). — *Мартъ* выпользовалъ одного больного, страдавшаго смраднымъ мочетеченіемъ, или загноеніемъ мочеваго пузыря — *ruugia*; въ водяной болѣзни хвалятъ *Рай*, *Шпильманъ*, *Шведіоръ*; въ ломотѣ, ощущаемой въ составахъ, *Амбодикъ*, *Бурдахъ*. Сухія ягоды, растертыя и съ воскомъ смѣшанныя въ видѣ шарика, бросають

(*) *Ephem. N. C. Dec. III: ann. 7—8.* — Рай, тоже одобряетъ въ каменной болѣзни винную настойку жидовскихъ вишенъ, прибавляя на 1 фунтъ оной слабой соляной кислоты — *acid. muriatic. dilut.* 1 драхму, и 2 унц. земляничнаго сиропа — *symp. fragorum*, принимая какъ ниже сказано.

на раскаленную плитку или горящія уголья, изходящій дымъ, удерживаемый ртомъ, врачуютъ боль зубовъ—*odontalgia*: *Шефферъ*.—*Фогель* и *Пеириль* тоже хвалятъ это, какъ болеутолятельное средство.

Количество. 2 унціи толченныхъ ягодъ наливають 12 унц. бѣлаго вина, и настоянное, прожавъ чрезъ полотенцо, принимаютъ по 1 или 2 столовыхъ ложки, каждыя два часа; средство это *Бухвальдъ* хвалитъ въ кровохарканіи—*haemortysis*. Свѣжій выжатый сокъ и закислый въ видѣ морса тоже принимаютъ по одной унціи, и болѣе на тощакъ съ приличнымъ питьемъ.—*Жилиберъ* давалъ этотъ заквашенный сокъ: отъ 1—4 унцій, какъ превосходное мочегонное средство, полезное въ отекахъ и водяной обрюзлости—*leucophlegmatia*, бывающей послѣ продолжительныхъ трясушекъ;—высушенныя ягоды принимаютъ въ порошокъ: отъ $\frac{1}{2}$ —1 драхмы.

Примѣчанія. 1. Простолюдины называютъ эти ягоды жидовскими вишнями, и глотая по 4, 5 и даже по 6 сырыхъ или вареныхъ ягодъ, пользуются онымъ отъ водяной болѣзни, и желтухи;—нѣкоторые одобряютъ для разшибенныхъ людей. Коровьему маслу этими же ягодами придаютъ желтый пріятный цвѣтъ.

2. Основываясь на опытахъ упомянутыхъ врачей, мяхулкою можно замѣнить: колоцинты—*cucumis colocynthis* и ослиную тыкву—*momordica elaterium*, потому что средства эти, съ чрезвычайнымъ насиліемъ гоня воду, не рѣдко причиняютъ изверженіе изъ матки зародыша—*abortiva*.

3. При собираніи этихъ ягодъ, надлежитъ отдѣлять оныхъ цвѣтную чашечку, къ коей онѣ пристрастаютъ; ибо она содержитъ чрезвычайную горечь, которая причиняетъ тошноту и рвоту: *Амбодикъ*.

Н.

НАПЕРСТОЧНАЯ ТРАВА, ИЛИ НАПЕРСТОКЪ КРАСНЫЙ—
digitalis purpurea, l.

Мѣсто Растеніе двухлѣтное, въ южной Россіи произвольно растущее по лѣсамъ, открытымъ полямъ и гористымъ мѣстамъ, на песчаной почвѣ; цвѣтетъ въ Іюнь и Іюль.

Качества. Трава, при разцвѣтаніи собираемая и бережно высушенная, имѣетъ ядовитое средство, зависящее отъ остраго начала, соединеннаго съ экстрактымъ усыпительнымъ веществомъ.— *Запаху* свѣжая трава и цвѣ-

ты не имѣютъ; высушенныя на солнцѣ, или близъ огня, получаютъ пріятный зеленый цвѣтъ и пахнутъ свѣжимъ сѣномъ; *вкусъ*: острый, тошновато-горькій. — Смолисто-экстрактное вещество и летучія части этого растенія доселѣ еще не довольно изслѣдованы химиками: *Шпренгель*.

Сила уменьшающая раздражимость, ослабляющая жилогіеніе, или замедляющая оное—*pulsum retardans*, умножающая дѣйствіе всасывающихъ сосудовъ, мочегонительная, развоющая.—Въ большемъ количествѣ: рвотно-проносная—*emetico-brastica*, производящая язвы въ роту и пищепроходномъ каналѣ: *Раи*, *Бургавъ*.—Снаружи: ранозѣлительная, рекомендуемая *Мурраемъ*, особенно для золотушныхъ язвъ (*).

Употребленіе. Въ грудной и брюшной водяной болѣзни, происходящей отъ слабости пасочныхъ сосудовъ—*hydrops atonicus*: *Витеринъ*, *Лентинъ*, *Ферріаръ*, *Тилениусъ*. *Индеритъ*; въ меланхолии и помѣшательствѣ ума: *Консбрухъ*, *Коксъ*, *Персиваль* (**). Онъ же совѣтуетъ давать и въ песьемъ бѣшенствѣ, въ такомъ приѣмѣ, который бы произ-

(*) *Apparat. med. Vol. I. p. 492. — et Percival; Pract. Essays. on medical subjects. p. 47.*

(**) *Vn the London medical Journal, Vol. X. Part. 3.*

вель тошноту, рвоту и даже слюнотечение: *Нордъ* въ *Вѣнѣ*, *Юнесъ* и *Коксъ* въ *Англии*, по учиненіи предварительно кровопусканія и прочистивъ слабительнымъ желудокъ, въ упомянутыхъ болѣзняхъ тоже имѣли удачный спѣхъ, отъ употребленія наперсточной травы. — Въ черной слѣпотѣ—*amaurosis*, называемой иначе темною водою, и въ падучей болѣзни, послѣдовавшей отъ изліянія пасоки, или накопленія воды въ мозговыхъ полостяхъ—*epilepsia hydrocephalica*, испытали: *Гарнетъ*, *Горнъ*, *Янъ*. — Новѣйшія наблюденія англійскихъ врачей: *Маклеана* и *Дюнкана*, тоже подтверждаютъ хорошее дѣйствіе этого средства: въ жестокой полуголовой боли—*hemigrania rebellis*, безуміи—*mania*, родимцѣ беременныхъ и роженицъ—*eclampsia gravidar. et puerperar.* и въ апоплексическомъ ударѣ. *Петерсонъ* выпользовалъ одну женщину, которая послѣ родовъ, простудившись, получила сумасшествіе и бѣшенство—*dementia furiosa*, *Юнесъ*—сумасшедшаго, который при свѣтѣ получалъ сильную боль головы и круженіе—*vertigo*; *Коксъ*, тоже вылечилъ одного мужчину, впавшаго въ безуміе, который послѣ дѣятельной жизни, вдругъ предался покою и сидячимъ кабинетнымъ занятіемъ, отъ чего съ начала разпухли у него ноги, а потомъ возпослѣдовало бѣшенное умоизступленіе. — Въ

застарѣлой простудѣ и упорномъ судорожномъ кашлѣ—*pertussis*, хвалять: *Гарольдъ*, *Мосманъ*; въ удушливой жабѣ, не рѣдко у дѣтей случающейся, наз. по англійски:—*the croup*. *s. angina stridula*: *Ферриаръ*, *Маклеанъ*, въ кровоизлитіи и чахоткѣ: *Драке*, *Дарвинъ*, *Беддоеъ*; въ носовомъ изнурительномъ кровотеченіи, почечуйномъ, угрожавшемъ на 3-мъ мѣсяцѣ беременности выкидышемъ, если оныя зависятъ отъ спазмовъ и расслабленности сосудовъ: *Карсонъ*, *Курръ*; въ почечныхъ припадкахъ отъ каменной болѣзни, трудномъ мочетеченіи—*dysuria*, и кровавой мочѣ—*mictus cruentus*: *Маклеанъ*, *Шведіоръ*; въ брюшныхъ завалахъ, желтухѣ отъ скиррнаго затверденія печени, и въ меланхоліи хвалять: *Бурдахъ*, *Бертель*, *Консбрухъ*; въ судорожномъ ущемленіи грыжи и т. п. корчевыхъ сжатіяхъ—*spasticae constrictiones*: *Дуннингъ*, *Гуфеландъ*; въ грудномъ колотѣ, или воспаленіи легкихъ—*pneumonia*, воспалительномъ ревматизмѣ—*rheumatalgia sthenica*, рожѣ, краснухѣ—*rubeola*, и другихъ лихорадочныхъ сыпяхъ—*exanthemata febrilia*: *Гейсеръ*, *Нордъ*, *Кустаницъ*; въ злокачественной оспѣ и кори, особенно павшихъ на грудь: *Маклеанъ*; при внутреннихъ нарывахъ и загноеніи: *Симонсъ*; во внутреннихъ кровавыхъ опухоляхъ, а особенно въ аневризмѣ начальной боевой жилы—

anevrizma aortae, рекомендуетъ *Г. Виллие*; такимъ же образомъ *Брандисъ*, чрезъ побужденіе всасывающихъ сосудовъ, и умноженное мочеизпражненіе въ продолженіи употребленія этого средства, удачно выпользовалъ членовныя водяныя опухоли—*hydrops articuli*.—Снаружи въ видѣ омываній, вспрыскиваній и мази, приготовляемой изъ свѣжей толченой травы съ цвѣтами; или изъ выжатого сока, смѣшиваемаго съ бычачею сгущенною желчью, которая разводитъ золотушныя опухоли железъ, зобы, скиррныя затвердѣнія грудей, и пользуетъ золотушныя злокачественныя язвы—*ulc. scrophulosa phagedaenica*: *Муррай*, *Тилленіусъ*, *Паркинсонъ*.—*Персиваль*, давая внутрь выжатый сокъ ежедневно по столовой ложкѣ, разведши пивомъ, и снаружи прикладывая толченую траву, въ теченіи 14 дней, вылечилъ такія золотушныя язвы на ногѣ, которую надлежало по совѣту другихъ врачей отнять; также одинъ больной, три года страдалъ золотушною опухолью на рукѣ, покрытой смрадными язвами, вылеченъ упомянутымъ способомъ въ одинъ мѣсяць; и одна женщина, имѣвшая чрезвычайную золотушную опухоль на губахъ, и глазомъ вѣкѣ, жаловавшаяся при томъ на безпрестанную боль во всѣхъ составяхъ, много была облегчена; но по сильному дѣйствію этого средства, оставила далѣе про-

должать приемы.—*Галлеръ* тоже приводитъ многіе примѣры, выпользованныхъ имъ отъ наследственной золотухи — scrophula hereditaria (*). *Рихтеръ* и *Мейеръ* (**) внутреннимъ и наружнымъ употребленіемъ выжатого сока въ теченіи 18 дней, разводили скиррныя затвердѣнія груди—mammae scirrhosae.—Свѣжую толченую траву, или выжатый сокъ, смѣшавъ съ свѣжимъ коровьимъ масломъ, или саломъ, въ видѣ мази хвалять въ злой чесоткѣ, и шолудивыхъ струпахъ—tinea squamosa: *Паркинсонъ*, *Бате*, *Андерсонъ*; въ цынготной проказѣ и застарѣлыхъ язвахъ: *Викатъ*.—Свѣжая трава, въ видѣ катаплазмы прикладываемая къ отекамъ и водянымъ опухолямъ, большую пользу оказываетъ; равно и при пасочныхъ застояхъ или завалахъ железъ—tumores lymphatici v. serosi glandul.: *Шпренгель*, *Гуффеландъ*.

Количество. Надобно начинать съ самыхъ малыхъ приемовъ, т. е. отъ $\frac{1}{2}$ до 1 грана два раза въ день, и мало по малу умножать до 2 и 3 гр., прибавляя какую-нибудь пряность, чтобы не ослабить желудокъ.—При нервическомъ воспаленіи легкихъ—pneumonia nervosa, и водяной головной болѣзни стениче-

(*) Historia Stirp. Helvet. N. 330.

(**) Chirurg. Bibl. V. B. III. St. 531 s.

скаго свойства—hydrocephalus acutus, *Шпренгель* совѣтуетъ давать въ соединеніи съ сладкою ртутью—submurias hydrargyri; въ воспалительной жабѣ гнилаго свойства—angina scarlatinosa s. putrida: *Ниманцъ*. Средство это и англійскіе врачи предпочитаютъ всѣмъ рекомендуемымъ лекарствамъ!—Въ видѣ пилюль, разводящихъ золотушныя и другія упорныя опухоли железъ, хорошее дѣйствіе оказываютъ, смѣшанный порошокъ травы съ болюголовнымъ экстрактомъ—extract. conii m. желто-сурмяною сѣрою—hydrosulphuret. stibii aurantiac., и сладкою ртутью (*).—Для наливки полагается 1 драхма сухой травы на 8 унцій кипячей воды, которую, процѣдивъ чрезъ $\frac{1}{4}$ часа. прибавить 1 унцію мятной воды; либо 1 каплю мятнаго масла, растерши съ сахаромъ, и давать чрезъ 2 часа по столовой ложкѣ; для отвара полагается 1 унц. листовъ, на полтора фунта воды, увариваемой до 1 фунта; принимаютъ этотъ отваръ по 2 столовыхъ ложки въ день, прибавляя къ оному 1 унцію ароматной настойки. Выжатый сокъ, смѣшанный съ медомъ, или сахаромъ, въ видѣ сиропа, даютъ по 1 драхмѣ, поутру и вечеромъ; или одну столовую ложку этого сока,

(*) Оные составлять можно по образцамъ, предложеннымъ: in Pharmacop. castr. R. p. 308, 313, 314.

разведенную 12 унц. шива, употреблять въ раздѣленныхъ приѣмахъ ежедневно означенное количество. *Шверинъ*, въ водяной болѣзни съ успѣхомъ давалъ сѣмя наперсточной травы такимъ же образомъ, какъ и сухую траву въ порошокъ.—*Настойка спиртная*, почитается дѣйствительнѣе другихъ составовъ; для приготовленія оной: 1 унцію сухихъ листовъ, наливаютъ 8 унц. виннаго спирта—alcohol, и настоявъ чрезъ 7 дней въ умѣренной теплотѣ, процѣдить съ выжимкою; свѣжей травы полагается 1 унція, на 5 унц. крѣпкаго спирта. На *приѣмъ* даютъ отъ 10—30 капель. Для составленія мази, произвольное количество свѣжей цвѣтной травы—folia с. floribus, мелко истолокши, или выжатый сокъ, смѣшиваютъ съ свѣжимъ коровьимъ масломъ, или съ чистымъ саломъ. Отваромъ, приготовленнымъ изъ 1 унціи сухой травы, налитой 1 фунтомъ съ половиною воды, которую кипятить въ покрытомъ сосудѣ до 1 фунта жидкости, промываютъ и примачиваютъ золотушныя язвы. *Клине*, давая внутрь этотъ отваръ, какъ выше сказано, и примачивая онымъ пасочную опухоль колѣна, уничтожилъ въ теченіи двухъ недѣль.—*Гуфеландъ*, *Дарвинъ*, *Фоглеръ*, *Брера* и *Хретиенъ*, многими наблюденіями свидѣтельствуютъ о большой пользѣ этихъ средствъ.—*Пидеритъ* замѣчаетъ, что при

употребленіи оныхъ 5—6 дней, нужно дѣлать перемежки, оставляя на нѣсколько дней, чтобы не ослабить жизненные силы!

Въ Аптекахъ приготавлиють:

1. *Порошокъ наперсточной травы составной*,—pulv. supertartraris potassae et digitalis p. (*), очень полезный въ разнородныхъ водяныхъ болѣзняхъ; даютъ на *пріемъ* полдрахмы, и умножаютъ исподоволь до полторы драхмы, два раза въ день: *Вилліе*.

2. *Настойку наперсточной травы*—tinctura digit. purp. (**). По опытамъ *Маклена*, принимаемая отъ 15—20 капель, равное дѣйствіе оказываетъ 1 грань порошка листовъ; однако же сначала давать должно по 10 капель и болѣе три раза въ день, разведши съ 1 унціею мятной воды, или съ бѣлымъ виномъ. Запивая лимонадомъ, можно сносить удобнѣе большіе *пріемы* этого лекарства.—*Драке*, съ пособіемъ лимоннаго сока, возвышала *пріемы*: отъ 15—20, 40, 90 и 100 капель, давая оныя въ одной ложкѣ упомянутаго сока, запиваемаго другою.—Въ астениче-

(*) Pharmacop. castr. Ruth. p. 329.

(**) Тамъ же, p. 374.

скихъ маточныхъ кровотокахъ, я давалъ съ хорошимъ успѣхомъ вмѣстѣ съ ирьюю выше упомянутою настойкою, или съ гравилатною—*tinctura gei urbanii*. отъ 15—30 капель, два раза въ день; умножая постепенно, пока больная начала чувствовать тошноту; малолѣтнимъ отъ коклюша или удушливаго кашля—*de group*: по 5 капель съ мятною водою, каждые 4 часа.

3. *Сиропъ наперсточной травы*—*symplic. hb. digitalis p.* по методу *Марціа*, составляется изъ 1 унц. высушенной травы съ цвѣтами, налитыхъ бѣлымъ винограднымъ уксу-сомъ 8 унц., которыя, настоявъ въ умеренной теплотѣ, и процѣдивъ съ выжимкою, прибавить 10 унц. сахару. Средство это даютъ малолѣтнимъ, по чайной ложкѣ; взрослымъ по 1 драхмѣ, 3 раза въ день.

Примѣчанія. 1. Изъ практическихъ наблюде-ній извѣстно, что при употребленіи этого сред-ства, больной иногда чувствуетъ: помраченіе зрѣ-нія, тошноту, боль головы и не рѣдко отъ умно-женныхъ приѣмовъ, особенно излишнихъ, появляется сильная рвота, желудочныя спазмы, икота, поносъ, конвульсіи, холодный потъ и обмороки, оканчи-вающиеся апоплексическимъ ударомъ!— И такъ, примѣтивъ первыя признаки слабости, и упадающій

пульсъ до 54-хъ ударовъ, тотчасъ уменьшить должно количество приемовъ, или вовсе оставить оное.—Тошноту и рвоту въ этомъ случаѣ, весьма хорошо укрощаетъ: *углекислое питье*—*haustus acid. carbonic. evolvens* (*), составляемое: изъ очищеннаго поташа и лимоннаго сока по методу *Riveria*;—поносъ останавливаетъ одинъ поташъ, которой, въ недостаткѣ опія, можно давать въ отварѣ маковыхъ головокъ: *Genevains*; для возбужденія ослабленныхъ силъ, употребляются укрѣпляющія средства, какъ-то: Гофмановы капли, ароматныя, горькія, и т. п., которыя можетъ замѣнить одна ирная настойка—*tinctura rad. a salami*.—При печальномъ отравленіи, дается молоко, съ слизью смѣшанное, въ довольномъ количествѣ для питья, и въ промывательномъ. Снаружи, одобряются нарывныя средства.

2. Наперсточная трава, дѣйствуетъ гораздо превосходнѣе морскаго луку—*scilla maritima*; и по тому можетъ замѣнить всѣ онаго многочисленныя составы.—Высушенный ея корень, изрѣзанный мелко, употребляется отъ 2—4 драхмъ въ видѣ наливки, настоенной 6-ю унц. горячей воды, или сыворотки, которая служитъ проноснымъ и водогоннымъ средствомъ; у сельскихъ лекарей: *Rozze*.

(*) Тамъ же. р. 262.

3. *Вътряница прострѣльная*—*anemone pratensis* качествами своими и врачевнымъ дѣйствіемъ, по испытанію многихъ, оказываетъ подобную неперсточной травѣ пользу.

НИТЧАНКА РУЧЕЙНАЯ, или ТИНА РѢЧНАЯ; ВОДЯНОЙ МОХЪ; ЛЯГУШЕЧНЫЙ ШЕЛКЪ—*conserva rivularis et s. fluviatilis* (Pallas), БОДЯГА.—*spongia fluviatilis* (*).

Мѣсто. Растеніе, къ поростамъ—*algae* принадлежащее, состоитъ изъ тончайшихъ нитокъ, волосамъ подобныхъ, длинныхъ, цвѣтомъ зеленыхъ.—Находится въ ручьяхъ и рѣкахъ, какъ-то: въ Невѣ, рѣчкѣ Карповкѣ, около Крестовскаго острова; также по озерамъ и въ водяныхъ каналахъ на разныхъ тѣлахъ произрастаетъ, особливо въ прѣсныхъ водахъ.

Качества. Испускаетъ большое количество кислотворнаго газа—*gaz oxugenium*, особенно зимою: *Шведіоръ*. *Запахъ* имѣетъ приторный, болотный; *вкусъ*: нѣсколько вяжущій, солоновато-острый; отъ теплоты и сырости воздуха согниваетъ, изпуская смрадъ, животнымъ тѣламъ подобный; высушенная не имѣетъ, удобно растирается въ порошокъ; при жженіи

(*) *Vadiaga minor buxbaumii*. in actis. Petropol. Vol. II. p. 344.

издаетъ дымъ, шерстью животныхъ отзывается.

Сила разводящая.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Свѣжая мокрая тина, прикладываемая къ ушибамъ, хорошо разводитъ багровыя синева и утоляетъ боль: *Соболевскій*; высушенная, имѣетъ сходство съ бодягою.—Оба эти средства, простой народъ, размочивъ въ уксуѣ или сивухѣ—*crematum simplex*, прикладываетъ къ ушибеннымъ синимъ пятнамъ подъ глазами—*livores suboculares s. sugillationes*, которыя очень скоро разгоняютъ.—Я имѣлъ случай испытать хорошее дѣйствіе оныхъ, въ золотушномъ затвердѣніи шейныхъ железъ, и въ язвахъ того же рода—*indurationes et ulcera scrophulosa*.—*Гейс* хвалитъ въ долговременномъ кашлѣ и дѣтской сухоткѣ; вѣроятно, что оныя были также золотушнаго свойства. Надобно испытать: не можетъ ли бодяга, или нитчанка, при внутреннемъ и наружномъ употребленіи, разводитъ зобы—*strumae*, если давать оную вмѣстѣ съ пережженной яичною скорлупою? Ежели корень клеценицы и ластовичный—*rad. ar. m. et a. vincetoxici*, дѣйствуютъ на железы, раздражая оныя своею остротою, то и бодяга также остраго свойства.—*Плиній* описываетъ, что конферною или водяною тиною древніе врачи связывали и

соединяли переломанныя или раздробленныя кости—*fracturae*.

Количество. Внутрь дается малолѣтнимъ въ порошокъ, съ молокомъ или медомъ: отъ 20—40 гранъ. *Г. Пекенъ* совѣтуетъ давать вмѣстѣ съ равнемъ по 10 гранъ, коутру и вечеромъ, отъ дѣтской золотухи; взрослымъ: отъ половины до 1 драхмы: Снаружи, въ видѣ примочки, какъ выше сказано; или, смѣшавъ съ медомъ истертую бодягу въ порошокъ, прикладываютъ въ видѣ мази, заживляющей золотушныя язвы.—Я настаивалъ 2 лота оной, и столькоже корня зубнаго жигунца—*a. rurethrum* l. въ 2 фунтахъ виннаго спирта (1 бутылка) 4 дня; потомъ выжатою настойкою натиралъ параличные члены, отъ которой видѣлъ равную пользу, какъ и отъ бальзамовъ, упомянутыхъ при описаніи иссона и лаванды.—О раздражающемъ натираніи, испытанномъ въ параличномъ расслабленіи членовъ, предложено было выше.

Примѣчанія. *Г.* Донскіе казаки, по увѣренію *Гмеллина* и *Палласа*, бодягу употребляютъ, какъ дѣйствительное противуглистное средство—*anthelminticum presentissimum*.—*Г. Соболевскій* приписываетъ это свойство питчанкѣ развилнестой—*conserva dichotoma*, которую иначе называютъ:

глистогонкою.—Въ порошокъ даютъ оную съ медомъ малымъ дѣтямъ, отъ $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ золотника, взрослымъ людямъ: отъ $\frac{1}{2}$ —2 золотниковъ; или въ отварѣ, полагая 1 унц. на фунтъ воды, подсластивъ морковнымъ сиропомъ.

2. Упомянутыя породы питчанки, могутъ замѣнять корсиканскій глистогонный мохъ—*conserva helminthochorton* 1. употребляемый особенно отъ круглыхъ глистовъ—*lumbrici*.

3. По наблюденіямъ *Ошернова* и *Усова*: первый рекомендуетъ бодягу, какъ испытанное противузолотушное средство, давать малолѣтнимъ внутрь: отъ 5—10 гранъ, два раза въ день; взрослымъ: отъ 20 гранъ, до $\frac{1}{2}$ драхмы и больше 2—3 раза въ день, умножая приемы постепенно; равнымъ образомъ и снаружи, прикладывая, какъ выше упомянуто, къ золотушнымъ и инымъ застарѣлымъ астеническимъ язвамъ, производитъ хорошее нагноеніе и поспѣшествуетъ исцѣленію.—Второй одобряетъ, какъ изрядное и скоро разводящее средство—*discutiens*: багровые ушибы, и цынготныя синія пятна—*maculae lividae*, бывающія на ногахъ у цынготныхъ, размочивъ въ водкѣ, или уксусѣ (*).

(*) См. *Observationes medicochir. Rutheni Imperii, redactae a I. M. Vien, Vol. I. Petropoli, 1805 p. 276—281.*

4. Г. Пекенъ совѣтуетъ, для внутренняго употребленія, сушить предварительно бодягу въ тѣстѣ, изъ ржаной муки приготовленномъ, и потомъ истереть оную въ порошокъ, которой давать 2—3 раза въ день младенцу: отъ 10—15 гранъ, съ водою или съ молокомъ.—Полезно также примѣшивать къ оному и нѣсколько ревеня (*).

5. Порошокъ, испытанный отъ дѣтской сухотки—*pulvis antatrophicus infantum*, составляется: изъ 10 гранъ бодяги, столько же ревеня, 20 гранъ корня клещеницы—*rad. agi m.* и равнаго количества раковыхъ жерновокъ.—Изтерши мелко, давать по 24 грана ежедневно натощакъ, продолжая, пока опухоль живота, брюшныхъ железъ и лихорадка исчезнутъ.—Ежели къ 1 золотнику этого порошка прибавить: 1½ золотицыварнаго сѣмянн, и ½ золотника желѣзнаго купороса—*sulfas ferri*, мелко изтертыхъ, потомъ, смѣшавъ съ 2 лотами морковнаго сиропа, или меда, и давать дѣтямъ по чайной ложкѣ по утру и на ночь: то этимъ средствомъ избавляются они отъ глистовъ, гнѣздящихся въ кишкахъ—*vermes intestinales*.—Мнѣ удалось нѣсколько разъ изгнать у взрослыхъ тесемочную глисту—*tænia lata*, давая

(*) См. въ его сочиненіи, о сохраненіи здравія и жизни. Москва. 1801 г. Ч. II. стр. 399.

въ видѣ болуса—*bolus contra taeniam*, составляемаго: изъ $\frac{1}{2}$ золотника нитчанки развилистой—*conserva d.*, столько же оловянныхъ опилокъ—*limatura stanni* и 2 скрупуловъ горькаго экстракта—*extract. amarum*, сдѣлавъ 3 равныхъ катышка, давалъ по 1, три раза въ день.—Ежели упорно выходитъ, или перервется, то совѣтую каждый часъ пить по чайной чашкѣ наливку папоротнаго корня съ мауномъ и горькою слабительною солью—*sal amarum cathartic.*, какъ сказано было выше.

6. *Кашка отъ зобовъ*—*electuar. antistrumale*, составляется изъ 1 лота бодяги, столько же пережженной яичной скорлупы, 2 золотниковъ анисовыхъ сѣмянъ и 2 лотовъ чистаго меда, кот., растерши мелко и смѣшавъ, сосать по чайной ложкѣ нѣсколько разъ въ день, чтобы дѣйствовала удобнѣе на заваль подбородочной железы.—Снаружи, свѣжая катаплазма изъ клещевницы, тоже много помогаетъ.

НИЩАЯ ТРАВА; БОРОДАВНИКЪ; ЧЕРНЫЕ БОРОДАВОЧНЫЕ ВОЛОСЫ—*clematis vitalba*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтнее, растущее въ южной Россіи на Терекѣ;—цвѣтеть въ Іюль и Августѣ.

Качества зависятъ отъ остраго начала; листы и корень *запаху* не имѣютъ; цвѣтовъ весьма-пріятный, *вкусъ*: острый, кисловато-вяжущій.

Сила вяжущая, мочегонительная, съѣдающая дурныя наросты въ язвахъ—*conglomens* и отдѣляющая гнилость; — средней корки, подобная волчьему лыку — *d. mezereum.*

УПОТРЕБЛЕНІЕ: въ закоренѣлой венерической болѣзни—*lues confirmata*, сопряженной съ грудными припадками, сухоткою или истощеніемъ тѣла—*contabescencia*, *Бурдахъ*; въ водяной болѣзни, чесоткѣ и худосочныхъ язвахъ, *Шведіоръ*.—Снаружи толченые свѣжіе листы и корка, служатъ вмѣсто нарывнаго пластыря. *Витетъ*, прикладывая къ пульсамъ ручнымъ предъ приступомъ лихорадки, укрощалъ этимъ средствомъ самыя упорныя трясучки.—Среднюю корку можно употреблять для открытія фонтанелей.

Количество. Листовъ 2 драхмы, наливають 6 унц. кипячей воды, которую, настоявъ и подсластивъ, пьютъ одну, или съ молокомъ по чайной чашкѣ; для отвара полагается полунціи корня на фунтъ воды, которую кипятить, пока останется 8 унцій. Онъ служитъ питьемъ, полосканьемъ и впрыскиваньемъ; въ

порошкѣ *Жилберъ* давалъ отъ 10—12 гранъ, какъ сильное мочегонное средство.—Свѣжіе толченныя листы, прикладываются для очищенія застарѣлыхъ грибовидныхъ язвъ, или помазываютъ оныя выжатымъ сокомъ, смѣшавъ съ масломъ.

Примѣчанія. 1. Растеніе это имѣетъ свойства подобныя ломаносу—*clematis recta*, и *зубному жишунцу или пулавкѣ огневой*—*anthemis pyrethrum*, котораго мѣсто совершенно замѣнить можетъ, какъ по чувствамъ, такъ и по учиненнымъ опытамъ.

2. Французы назвали нищею травою потому, что нище свѣжими листьями и корою оной нарывають себѣ пузыри на кожѣ, чтобы этою изувѣченностію имѣть больше причины просить милостины.—Деревенскіе жители, масломъ, настояннымъ этими листьями, натирають чесотку, и тѣмъ избавляются.

3. Листы этого растенія даютъ темноцвѣтную каштановую краску.

ноготки; повои воинскій благовоинный—*calendula officinalis*, 1.

Мѣсто. Растеніе двулѣтнее, въ Россіи садовое, и на поляхъ самородно растущее, цвѣтетъ

во все почти лето; размножается сѣмянами.

Качества. Листы и цвѣты, *запахъ* имѣютъ благовоиный, бальзамный; *вкусъ*: горьковато-пряный, зависяще отъ тонкаго летучаго начала, и камедьно-смолистаго вещества.

Сила свѣжихъ цвѣтовъ и травы: потогонная, разводящая; сухіе не имѣютъ.

Употребленіе. Одобряются въ запорѣ мѣсячныхъ кровей, въ маточныхъ спазмахъ и отъ головной боли: *Турнефортъ*; укусъ, постоянный съ этими цвѣтами, служитъ превосходнымъ предохранительнымъ средствомъ отъ повальныхъ, или заразительныхъ болѣзней—*egregium alexipharmacum*: *Димербрекъ*. Снаружи: въ видѣ припарки, разводятъ золотушныя опухоли; толченые листы и цвѣты прикладываются къ бородавкамъ, ножнымъ мозолямъ и язвамъ; *Гекетъ*.—Выжатый сокъ, *Беймлеръ* прикладывалъ для укрощенія зубной боли, происходящей отъ гнилой порчи—*odontalgia cariosa*.

Количество. Для внутренняго употребленія горсть цвѣтовъ наливаютъ 8 унціями кипячей воды, и настоявъ, пьютъ вмѣсто чаю съ медомъ; съ прибавленіемъ 2 унцій настояннаго со цвѣтами укуса—*acetum calendulae*, служитъ

хорошимъ потогоннымъ лекарствомъ, полезнымъ въ простудныхъ лихорадкахъ худаго свойства—*f. catarrhales typhodes*.—Свѣжовыжатый сокъ изъ всего растенія принимаютъ отъ 1—4 унцій, для изгнанія глисть: *Фогель*.—Снаружи, въ видѣ припарки и катаплазмы, какъ выше сказано.—Выжатый сокъ изъ свѣжаго растенія, дается въ тѣхъ же болѣзняхъ, и цынготнымъ; отъ 3—4 унцій: *Роке*.

Примѣчанія. 1. Изъ цвѣтовъ извлекаютъ желтую краску; листы подобно селитрѣ на раскаленныхъ угляхъ трещать. — Примѣчено, что цвѣтки эти въ свѣтлую погоду утромъ въ 9 часовъ отворются, а въ три часа по полудни опять закрываются: *Северинъ*.

2. Многие употребляютъ эту траву или листы въ отварѣ для излеченія шолудей; или 1 фунтъ свѣжаго истолченнаго растенія съ цвѣтами, варятъ съ 2 фунтами свѣжаго коровьяго масла, пока улетитъ жидкость, потомъ густоватую массу, прожавъ сквозь рѣдкое полотенцо, натираютъ оною ежедневно: золотушные струпы, парши головные и животъ: при завалѣ внутренностей и желтухѣ: *Пленкъ*.

3. Въ коммерціи, корыстолюбивые продавцы часто этими цвѣтами подмѣшиваютъ шафранъ.

НОРЫЧНИКЪ УЗЛОКОРЕННЫЙ, или СОБАЧЬЯ ГОЛОВА;
ЗАВАЛЕЦЪ—*scrophularia nodosa*, L.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, въ умѣренной Россіи растущее по рвамъ, тѣнистымъ мѣстамъ и мокрымъ лѣсамъ; въ окружности Петербурга; въ Катерингофѣ, около Царскаго села и на островахъ Невы рѣки; также на Уралѣ, и въ иныхъ мѣстахъ близъ изгородь и заборовъ.

Качества. Корень имѣетъ *запахъ* противный, вонючій, сушеніемъ улетающій; *вкусъ*: островато-горькій, тошноватый, зависящій отъ кислоты чирнильныхъ орѣшковъ — *acidum gallic.*

Сила, превосходная, разводящая, вѣтрогонная, болеутолятельная, противуглистая, потогонная и въ особенности дѣйствующая на пасочную систему.

Употребленіе. Одобряется въ золотухѣ, зобѣ, воспалительной жабѣ въ горлѣ, почечуиныхъ шишкахъ, чесоткѣ и въ другихъ кожныхъ болѣзняхъ: *Гееръ*, *Ридлинъ*, *Шлевогтъ*.—Снаружи листьями припариваютъ разныя твердыя и болящія опухоли; порошкомъ корня присыпаютъ для очищенія и заживленія кожныя язвы. *Бургавъ* и *Линней* тоже подтверждаютъ полезное дѣйствіе этого растенія,

при внутреннемъ и вѣшнемъ употребленіи онаго: въ опухоляхъ железъ, и глухомъ почечуѣ.—Растертая свѣжая трава, прикладывается для заживленія ранъ; также и порошкомъ листовъ присыпаютъ застарѣлыя язвы: *Шомель*.—Выжатый сокъ изъ всего растенія, смѣшивая съ коровьимъ масломъ, или свѣжимъ саломъ, составляетъ мазь отъ чесотки, для людей и домашняго скота полезную.

Количество. Сухаго корня даютъ въ порошокъ по 1 драхмѣ; или въ видѣ отвара, полагая полунци корня на 8 унц. воды, которую кипятить, пока останется пфунта жидкости; подсластивъ давать по малой чайной чашкѣ.—Снаружи отваръ служитъ полосканьемъ и омываньемъ; свѣжіе листы служатъ для катаплазмы, или припарки; высушенные, для присыпки.

Примѣчанія. 1. Траву эту ѣдятъ однѣ только козы; другая скотина по причинѣ противнаго ея запаха не трогаетъ.

2. Я имѣлъ случай испытать пользу этого растенія въ язвахъ и чахоткѣ золотушнаго свойства, употребляя въ отварѣ, который приготовлялъ изъ 2 унцій свѣжаго растенія, налитыхъ 2 фунтами сыворотки, которую, поваривъ $\frac{1}{4}$ часа, процѣ-

женную давалъ пить по чайной чашкѣ, нѣсколько разъ въ день.

3. Другая порода нарычника наз.—*serophularia squarrosa* L., особенно водяная буквица, въ соединеніи съ сѣбною—*s. serpa*, служить для поправленія противнаго вкуса этого слабительнаго средства: *Пеириль* (*).

O.

овесъ—*avena sativa*, L.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, сѣемое во всей Россіи изобильно по полямъ; смотря по климату цвѣтетъ въ Маѣ и Іюнѣ; сѣмяна созрѣваютъ въ Іюлѣ и Августѣ.

Качества. Овсяная мука и крупа *запаху* не имѣютъ: *вкусъ*: мучной.—Овесъ содержитъ много крахмалу, и большое количество сахарныхъ частей: *Шеле*.

(*). Маршантъ и Лохнеръ, тоже подтверждаютъ опытами in Mem. de l' Acad. de Paris, 1701—E. N. C. Cent. VII. obs. 65.

Сила притупляющая, смягчительная, питательная, удобно обволакивающая, и посредством углекислота газа, противуглистая.

УПОТРЕБЛЕНИЕ. Отваръ овсяной крупы служитъ прохладительнымъ питьемъ, въ воспалительныхъ лихорадкахъ и горячкахъ: *Инократъ*; съ прибавленіемъ малаго количества селитры, одобряется въ лихорадкахъ, сопутствующихъ при большихъ ранахъ, ушибахъ, переломахъ костей, нарывахъ и т. п. воспалительныхъ опухоляхъ: *Монти*, *Иленкъ*; овсяная кашлица, вареная съ изюмомъ, или съ молокомъ, дается съ пользою кашляющимъ, сухотнымъ и склоннымъ къ чахоткѣ: *Диоскоридъ*, *Сиденгамъ*, *Кранцъ*; овсяный кисель—*panatella* тоже служитъ здоровою пищей въ лихорадочныхъ болѣзняхъ—*diæta febrilis*. Изъ овсяной крупы, наливаемой холодною водою, и потомъ подвергаемой броженію, процеженная жидкость, и сгущенная умѣреннымъ вареніемъ на огнѣ наподобіе желе, съ прибавленіемъ сахара и бѣлаго вина составляетъ очень полезное питье, укрощающее цыггу.—Снаружи цѣльный овесъ подогрѣтый, или поджаренный на сковородѣ, прикладывается въ мѣшечкахъ, для утолненія простуднаго колотья, брюшныхъ спазмовъ, маточныхъ болей, и въ началѣ ущемленія грыжи: *Гафнеръ*, *Гель*, *Бургавъ*. Овсяную подогрѣтую муку

одну, или смѣшавъ съ ромашечными, либо бузинными цвѣтами, прикладываютъ къ рожѣ—*erysipelas*; сваренная съ молокомъ наподобіе розмазни, служитъ мягчительною катаплазмой: въ воспалительной грудницѣ, абсцессахъ, паховикахъ и т. п. горячихъ опухляхъ, когда чаще оную перемѣняютъ при остываніи. Овсяная мука, смѣшенная съ коровьимъ масломъ, очищаетъ головныя шолуди: *Арбутилотъ*.

Количество. Для отвара, полагаются 3 унціи крупы, на 4 фунта воды, (или 2 бутылки), который служитъ питьемъ и промывательнымъ. Въ первомъ случаѣ прибавляютъ простой медовой уксусъ—*oxumel simplex*, или клюковный медъ—*mel oxucosci*, т. е. для пріятности и большаго прохлажденія; къ обыкновеннымъ клистирамъ, примѣшиваютъ постное масло, и малое количество простой соли—*sal culinare*.—*Ловерово*, поправляющее соки, питье—*ptisana Loweri*, состоитъ: изъ овсянаго отвара, съ прибавленіемъ цыкорнаго корня и селитры; оное пьютъ большею частію для разведенія густыхъ мокротъ, и уничтоженія брюшныхъ заваловъ—*obstructiones*.

АПТЕЧНЫЯ ПРИГОТОВЛЕНІЯ:

1. *Порошокъ всасывающій*—pulvis absorbens (*).

Прикладывается снаружи къ рожъ, и другимъ подобнымъ внѣшнимъ воспаленіямъ—eruthemata, которыя не терпятъ мокрыхъ припарокъ.

2. *Катаплазма углекислая, или бродячая*—cataplasma fermentans (**). Прикладывается къ гнилымъ язвамъ, антонову огню, и для отдѣленія помертвѣлости—sphacelus, и пр. оказываетъ очень хорошее дѣйствіе, особенно въ соединеніи съ угольнымъ порошкомъ.

3. *Катаплазма созрѣвающая, или въ нагноеніе приводящая*—cataplasma pus maturans (***) паховики, нарывы, чирьи, и пр.

Примѣчанія. 1. Породы овса употребительнѣйшія двѣ: одна бѣлая, другая черная; бѣлый овесъ почитается лучшимъ для дѣланія крупъ и муки, употребляемый въ пищу людямъ; а черный лучше служить для корму лошадей, рогатаго скота,

(*) Pharmacop castren. Ruthena, p. 320.

(**) Тамъ же, p. 231.

(***) — —p. 231.

свиной и домашнихъ птицъ, отъ котораго они очень скоро жирѣютъ.—Дойныя коровы, отъ овсянаго поила, даютъ гораздо болѣе молока, если овсяную муку, сваривъ въ водѣ, часто оною поить.—Волы, отъ этого корму скоро утучняются и для убою очень прочными дѣлаются.—Свиньи, упитанныя овсомъ, получаютъ мясо сладкаго вкуса, и ветчина изъ онаго бываетъ очень пріятная.—О курицахъ замѣчено, что онѣ гораздо скорѣе и чаще кладутъ яйца, если ихъ кормятъ нѣсколько поджареннымъ овсомъ: *Амбодикъ*. Овсяная крупа, замѣняетъ сарачинское пшено: *Пеириль*.—Она очень полезна какъ для здоровыхъ людей, такъ и для больныхъ;—питающіеся овсяною крупою и мукою, бываютъ тѣломъ крѣпкіе, здоровые, и получаютъ свѣжій цвѣтъ лица: *Рай*, *Галесъ*.

2. Толокно и саламату, приготовляемую въ деревняхъ изъ овсяной муки, даютъ въ кровохарканіи, сухоткѣ, чахоткѣ, простыхъ и кровавыхъ поносахъ.—Оное же можетъ замѣнять для бѣдныхъ аравійскую камедь и салець: *Камецецкій* (*).

3. Хлѣбъ, приготовляемый изъ овсяной муки, бываетъ черный, горькій и тяжелый для желудка.

(*) См. Краткое наставленіе о леченіи болѣзней простыми средствами, стр. 55 § 116.

Овсяное пиво тоже горькое, и скоро окисаетъ; но для цынготныхъ больныхъ почитается полезнымъ средствомъ.—Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи, изъ овса дѣлаютъ простое вино, которое двоеніемъ даетъ превосходную водку.

4. Въ деревняхъ, подогрѣтымъ овсомъ припариваютъ животъ отъ колики или рѣза въ кишкахъ, также отъ простуднаго колотья, какъ бы насквозь прострѣливающаго отъ груди до спинной кости, нагрѣтымъ овсомъ припариваютъ спину и грудь, давая притомъ пить чай изъ цвѣтовъ бузины или ромашки и другихъ травъ, производящихъ испарину.

5. Наконецъ нужно замѣтить, что испорченный свесъ отъ пыльной ржавчины, прѣлости, гнилости и проч., употребляемый внутрь, причиняетъ помѣшательство ума и совершенное безуміе: *Фабержъ*. *Шильманъ* приписываетъ таковое ядовитое дѣйствіе другому растенію, всегда почти между овсомъ выростающему, которое наз. головоломомъ и цыанишиникомъ—*clolium temulentum*, и потому должно оное вездѣ, какъ вредное, всячески искоренять (*).

(*) *Gleditseh. necrosi Cerealium. Acad. de Berlin, 1756.* — *Ауман; Memoires de Physique etc. Т. III 1760.*

ОГУРЕЧНАЯ ТРАВА; ОГУРЕЧНИКЪ, или СЕРДЕЧНЫЙ
ЦВѢТЬ—*borrago officinalis*, l.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, въ умѣренной Россіи произвольно растущее, особливо на Волгѣ близъ Царицына; также удобно разводится во всѣхъ садахъ и огородахъ сѣменами.—Цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іюлѣ.

Качества. Трава и цвѣты *запаху* не имѣютъ; *вкусъ*: травяной, нѣсколько огуречный и слегка солоноватый, зависящій, по опытамъ *Маркграфа*, отъ селитры, — *nitras potassae*.

Сила листовъ прохладительная, разводящая, мочегонительная; цвѣтовъ: грудная.

Употребленіе. Въ видѣ наливки, также и выжатый сокъ изъ свѣжаго растенія, одобряется въ воспалительныхъ лихорадкахъ именуемыхъ огневицами, особливо при внутреннемъ жарѣ, непомѣрной жаждѣ, сухомъ кашлѣ и запорахъ, происходящихъ отъ той же причины: *Лазермъ*, *Пленкъ*; въ краснухѣ, оспѣ и скарлатинѣ, рекомендуетъ *Роке*;—въ брюшныхъ завалахъ, меланхоліи и ипохондрическихъ припадкахъ, черножелчій и мечтательныхъ привидѣніяхъ, все растеніе, отвариваемое въ молочной сывороткѣ, или выжатый сокъ, принимаемый съ сывороткою въ приемахъ не

столько ограниченныхъ, оказываютъ желаемую пользу: *Ферпель*; одинъ свѣжій сокъ одо-бряется въ каменной болѣзни: *Бульдюкъ*, *Краицъ*.

Количество. Горсть свѣжей травы, нали-вноть 6 унціями кипячей воды или сыворотки; которую пьютъ по чайной чашкѣ, нѣсколько разъ въ день; выжатый сокъ принимаютъ отъ 2—3 и 6 унцій, смѣшивая съ овсянымъ или ячменнымъ отваромъ. — Весною, молодую траву кушаютъ вмѣсто салата, и варятъ въ похлеб-кахъ. Въ прокъ заготавливается въ видѣ кон-сервы.

Примѣчанія. 1. Это растеніе, будучи высушено, на огнѣ всыхиваеетъ, и даетъ селитру. По замѣчанію *Шнльмана*, оное и подобныя ему ра-стенія показываютъ селитроватую почву земли—*solum nitrosum*.

2. Сѣмя, принимаемое съ винограднымъ виномъ, умножаетъ молоко у кормилицъ;—трава и цвѣты, настоянные въ той же жидкости, служатъ жиз-ненной или ободряющею эссенціею: *Бурлавъ* (*).

(*) Мнѣніе это кажется основано на одной только по-словицѣ древнихъ:

Dicit Borrago, gaudia cordis ago.

*Vinum potatum, quo sit maceratum Borrago,
maerorfem cordis dicunt auferre periti.*

3. Растеніе это по одинакимъ качествамъ своимъ съ деяникомъ, или съ ледянкою—*mesembryanthemum crystallinum*, можетъ оную удобно замѣнить, которая одобряется, какъ пріятнохолодящее и разводящее средство, въ болѣзняхъ мочевыхъ органовъ.

ОГУРЕЦЪ—*cucumis sativus*, l.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, во всей Россіи огородное.

Качества сѣмянъ, подобныя арбузнымъ, дыннымъ и тыквеннымъ, съ коими вмѣстѣ употребляются, и замѣняютъ сладкій миндаль; (см. при описаніи оныхъ).—Молодые огурцы *запаху* не имѣютъ; *вкусъ*: водяной, сладковатый.—Сѣмяна содержатъ много масляно-клейкаго вещества.

Сила прохладительная, очищающая, мочегонительная, противучахотная: *Иппократъ*, *Орибазій*.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Огурничныя сѣмяна, дынныя и другія молочно-масляныя служатъ для приготовленія прохладительнаго аршада—*emulsio refrigerans*, полезнаго въ воспалительныхъ лихорадкахъ, почечныхъ припадкахъ, мочерѣзѣ и для чахотныхъ, ежели желудокъ у нихъ не

слабъ.—Свѣжіе огурцы, вареные въ похлебкахъ, по опытамъ *Рая*, составляютъ полезную пищу въ стеническихъ лихорадкахъ и кровохарканіи; *Муцелль* удачно выпользовалъ больного, имѣвшаго чахотную лихорадку, происходящую отъ поврежденія легкихъ; *Шульцъ*, давая по 2 унціи огуречнаго сока дважды въ день, пользовалъ этимъ простымъ средствомъ сухотныхъ и чахотныхъ людей. *Иппократъ* уже замѣтилъ, что свѣжіе огурцы, своимъ сладковатымъ и нѣсколько клейкимъ сокомъ притупляя остроту мокротъ, или гной, всасываемый изъ язвъ легочныхъ—*phthisis ulcerosa pulmonum*, очень полезны для чахотныхъ, изгонняя вредныя влаги уриною, и доставляя тѣлу нѣжное питаніе. Новыя наблюденія *Шмальца*, *Фрица*, *Тода* и *Аскова*, тоже подтверждаютъ, что выжимаемый изъ свѣжихъ огурцовъ сокъ, подслащенный сахаромъ или медомъ, и принимаемый ежедневно по 2 столовыхъ ложки на тощакъ и въ вечеру, оказываетъ желаемую пользу въ сухоткѣ и чахоткѣ; *Пленкъ* хвалитъ огуречный сокъ въ зажной водяницѣ чахотныхъ—*anasarca phthisicorum*.—Огуречный розсолъ, въ этомъ случаѣ, тоже полезенъ; потому что гонитъ мочу, утоляетъ жажду и отвращаетъ запоры. Нѣкоторые пьютъ его съ похмѣлья и отъ угару; *Г. Пекенъ* одобряетъ огуречный розсолъ, какъ легкое слабительное

лекарство, и Московскіе жители, много обязаны этому опытному врачу за оное; слишкомъ мокротные люди могутъ на стаканъ этого раствора прибавлять отъ $\frac{1}{2}$ —1 чайной ложки толченаго нашатыря. — Снаружи, *Геурій*, прикладывая свѣжіе толченые огурцы, вылечилъ головную проказу или шолуди; *Гофманъ*, истолокши и прохладивъ льдомъ, прикладывалъ къ головѣ съ наилучшимъ успѣхомъ: сумасшедшимъ, и въ горячкахъ, сопряженныхъ съ умоизступленіемъ, происходящимъ отъ воспаления мозговыхъ покрововъ—*phrenitis*.—Я имѣлъ случай видѣть, что одна опытная старуха вылечила зажную водяную болѣзнь, обкладывая больнаго солеными, пополамъ разрѣзанными огурцами, производя этотъ опытъ въ истопленной банѣ на полкѣ, и покрывъ его простынею, поддавала паръ обыкновеннымъ образомъ; два или три повторенные таковыя опыты съ перемѣнкою въ недѣлю, причемъ каждый разъ не болѣе часа долженъ больной лежать обложенный огурцами и покрытый на полкѣ, посредствомъ изобильнаго пота, совершенно вылечиваются.—Гдѣ нѣтъ парной бани, тамъ она тотъ же опытъ производима въ Русской печкѣ, какъ обыкновенно парятся деревенскіе.

Количество. Выжатый свѣжій сокъ можно пить по чайной чашкѣ 3 или 4 раза въ день;

сямямъ, 1 унцію растираютъ съ 1 ф. холодной воды, для эмульсии. Снаружи, прикладываются огурцы вышесказаннымъ образомъ.— Кусокъ свѣжаго огурца *Иппократъ* закладываетъ въ задній проходъ, для остановленія излишняго почечуйнаго кровотеченія; толченые, прикладывавъ къ почечуйнымъ воспаленнымъ шишкамъ, для смягченія оныхъ и утоленія боли; выжатый сокъ, съ прибавленіемъ квасцовъ, тоже съ хорошимъ успѣхомъ прикладывается посредствомъ напитанной корпии къ мокнущимъ и болящимъ шишкамъ.

Примѣчанія. 1. Свѣжіе огурцы, употребляемые съ уксусомъ, перцомъ или горчицею и солью, служатъ здоровымъ салатомъ. Соленые умѣренно употребляютъ для приправы кушаньевъ; маленькіе огурчики (корнишоны), приготовляемые обыкновенно въ уксусѣ съ пряностями, тяжелы для слабаго желудка; имѣющіе слишкомъ зеленый цвѣтъ подозрительны и вредны, по причинѣ мѣдныхъ частицъ, сообщенныхъ онымъ при вареніи или настаиваніи въ мѣдной посудѣ.—Лучшій способъ приготовленія корнишоновъ или маленькихъ пряныхъ огурчиковъ, предлагаетъ *Розье*, слѣд. образомъ: вымывъ хорошо холодною водою, положить огурчики въ фаянсовую или муравленную посуду, и наливъ бѣлымъ довольно крѣпкимъ ук-

сусомъ, (на 2 пальца выше огурчиковъ) полагая на каждую пинту (или 1 бутылку уксуса) 2 лота соли; потомъ покрыть деревяннымъ кружкомъ, или однимъ рѣдкимъ полотешкомъ, чтобы сообщаемъ былъ атмосферный кислотворъ, не допускающій плѣсневѣть.—Для пряности прибавляютъ каждый по своему вкусу: укропъ, эстрагомъ, чеснокъ, ямайскій перецъ, гвоздику и лавровый листъ.—Ежели уксусъ потеряетъ свою кислоту и начнетъ портиться: то замѣнить оный свѣжимъ.—Такимъ образомъ сохранять можно пикули 2 года.—Многіе охотники тѣмъ же способомъ заготавливаютъ въ прокъ: молоденкія тыквы, арбузики, дыньки и початки турецкой пшенички.

2. Огуречный свѣжій сокъ, смѣшанный съ порошкомъ толченныхъ сѣмянъ и бобовою или рисою мукою, будучи высушенъ на солнцѣ, служитъ безвреднымъ притираніемъ, очишающимъ и убѣляющимъ кожу, — *cosmeticum*. — Оный же сокъ, смѣшанный съ сахаромъ или медомъ, принимаемый по столовой ложкѣ нѣсколько разъ въ день, хорошо утоляетъ жажду и жаръ у чахотныхъ людей.

3. Огуречный корень, принятый въ порошкѣ до 1 драхмы, производитъ у нѣкоторыхъ людей рвоту.—Огуречный разсолъ служитъ для простаго

народа домашнимъ слабительнымъ лекарствомъ: *Каменецкій* (*).

4. Зелень огуречная (огудина), канустный листъ и морковный, изрубленные мелко и распаренные вмѣстѣ съ отрубями, составляютъ весьма здоровый кормъ для рогатаго скота и свиней.

ДУВАНЧИКЪ, или ПОНОВО ГУМЕНЦО; КУЛЬБАБА; ХА-СИМЪ; ЦЫКОРІИ ДИКІИ; ПЛЕШИВЕЦЪ—*leontodon taraxacum*, l.

МѢСТО. Растеніе многолѣтное, во всей Рос-сіи и Сибири произвольно растущее по лугамъ, полямъ и при дорогахъ вездѣ.—Цвѣтетъ въ Іюнѣ и Іулѣ.

Качества. Свѣжая трава и корень избоблюютъ молочнымъ, горько-соленоватымъ сокомъ, состоящимъ изъ экстрактнаго вещества, соединеннаго съ слизью и селитрою.—*Крелль* полагаетъ: экстрактно-горькое вещество, соединенное съ сахарнымъ.

Сила разводящая, отверзающая, мочегонная.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Для разведенія густыхъ мокротъ и брюшныхъ заваловъ, хвалить:

(*). См. въ упомянутомъ его сочиненіи, стр. 155 № 4.

Делій, Гиршель, Бемеръ, Розенштейнъ; въ завалѣ печени—*heratemfraxis* и желтухѣ; *Фон-Свитенъ, Бергій;* въ упорныхъ четырехдневныхъ трясучкахъ, начальной водянной болѣзни и отекахъ ногъ: *де Генъ, Шленкъ, Менхъ;* въ кожныхъ хроническихъ болѣзняхъ, какъ-то: лишаяхъ, золотухѣ и проказѣ; *Леиден-фростъ, Балдишеръ;* въ начальной чахоткѣ, зависящей отъ затвердѣнія или поврежденія какой-либо внутренности: *Фогель.* Снаружи, въ видѣ отверзающихъ клистировъ, полезныхъ въ затвердѣніи внутренностей, меланхолии и гипохондрическихъ припадкахъ: *Кемфъ.*—Свѣжій корень и листья, истолченные, прикладываются съ большимъ усилѣхомъ, для разведенія твердыхъ и болящихъ опухолей, также для заживленія разнородныхъ нечистыхъ ранъ: *Соболевскій.*

Количество. Выжатый сокъ изъ всего растенія дается съ мясною похлебкою, или съ молочною сывороткою: по 2 унціи, продолжая многія недѣли сряду; или въ отварѣ, полагая отъ 2—3 унцій травы и корня на 3 фунта воды, которую кипятить, пока останется половина жидкости, съ прибавленіемъ 2 растертыхъ яичныхъ желтковъ, пьютъ означенное количество отвара ежедневно. *Бергій* этимъ средствомъ и питьемъ сыворотки, приготовляемой съ свѣжимъ щавелемъ и одуванчи-

комъ, продолжая употребленіе оныхъ чрезъ многія недѣли, или во все лѣто, удачно вылечилъ страдавшихъ затвердѣніемъ печени, желчными камнями—choleliti и брюшною водяною болѣзною.—Молодые листья весною кушаютъ вмѣсто салата, и варятъ въ супахъ. Сухой корень тоже пьютъ въ отварѣ, особенно зимою въ грудныхъ простудныхъ припадкахъ и лихорадкахъ того же свойства.—Выжатый сокъ изъ всего растенія, и помощью броженія приведенный въ спиртоватую жидкость, *Ридшеръ* хвалитъ отъ пьянственной угреватости, или иныхъ красныхъ пятенъ, обезображивающихъ лице; также въ худосочной чесоткѣ, изнурительной тихой лихорадкѣ—f. lenta, cachectica, сухоткѣ, каменной болѣзни и долговременной желтяницѣ, принимая ежедневно отъ 3—4 унцій.

Въ Аптекахъ приготавлиють:

Экстрактъ, или сущенный сокъ одуванчиковъ—extractum taraxaci (*), одобряемый въ упомянутыхъ болѣзняхъ; дается на *пріемъ* отъ 20 грань до половины и цѣлой драхмы

(*) Pharmacop. Rossica, p. 210.

въ пилюляхъ, или микстурахъ съ другими приличными лекарствами.—*Шпренгель* особенно хвалить: въ ипохондріи, упорномъ ревматизмѣ, желтухѣ, худосочныхъ сыпяхъ, водяной болѣзни, каменной и отъ чахотки, съ прибавленіемъ укусно-поташной соли—*kali acetic.*, ревенной настойки—*inctura rhei*, и очищеннаго меда—*mel despumat.*—Въ пилюляхъ: отъ золотушныхъ болѣзней и другихъ долговременныхъ сыпей, дается въ соединеніи съ болнголовнымъ экстрактомъ—*extract. conii m.* и бычачею желчью—*fell tauri.*

Примѣчанія. 1. Свѣжіе листы, употребляемые въ салты, сохраняютъ на зиму, покрывая ихъ землею въ погребахъ.—Коренья имѣютъ одинакія свойства съ цикорнымъ—*cichorium intybus*, котораго, высушивъ и обжаривъ подобно кофе, пьютъ вмѣсто онаго.

2. Его ѣдятъ козы и свиньи охотно, овцы и коровы не много; лошади не трогаютъ.—Кроты тоже собираютъ на зиму эти коренья.—Для рогатаго скота растеніе это служитъ здоровымъ кормомъ.—Пчели изъ цвѣтовъ онаго собираютъ много меду.

ОЛХА, или ОЛХОВНИКЪ; ольшина.—*Betula alnus*, L.

Мѣсто. Дерево во всей Россіи во множествѣ растущее по влажнымъ лѣсамъ, мокрымъ лугамъ и берегамъ рѣкъ, распространяясь многими кореньями, размножаясь очень скоро новыми отпрысками и сѣменами.

Качества. Свѣжіе листы *запаху* не имѣютъ; *вкусъ*: горьковато-вяжущій.—Корка и плоды этого дерева содержать кислоту чернильныхъ орѣшковъ—*acid. gallic.*

Сила разбивающая, уничтожающая молоко въ грудяхъ—*lactifuga*, ранозѣлительная.

Употребленіе. Для уменьшенія большаго отдѣленія молока, или для разведенія и прогнанія огустѣвшаго въ грудяхъ, свѣжіе листы, срѣзавъ и распаривъ на сковородѣ, прикладываютъ къ грудицѣ—*mastodynia lactea* теплые, нѣсколько разъ въ день; въ зимнее время, сухіе листы, распаривъ прежде водою, такимъ же образомъ подогрѣваютъ и прикладываютъ къ грудямъ родильницѣ или кормилицѣ.—*Муррай*, испытавъ это столь простое, но превосходное средство, говоритъ, что таковая припарка, съ прибавленіемъ кервельныхъ листовъ, замѣняетъ всѣ катаплазмы, пластыри, мази и спирты, въ этомъ случаѣ употребляемые!—Толченые съ водою свѣжіе листы при-

кладывать можно съ большимъ успѣхомъ къ гнилымъ и ѣдкимъ язвамъ, бывающимъ на ногахъ—*ulcera crurum coequesiva*: *Крамеръ, Шульцъ, Соболевскій*;—также къ болящимъ уязвленіямъ насѣкомыхъ.

Количество. Внутрь употребляютъ въ видѣ наливки, полагая горсть листовъ на 8 унц. кипячей воды, которую, поделастивъ, пьютъ по малой чайной чашкѣ: въ простомъ и кровавомъ поносахъ, кровохарканіи и другихъ кровотеченіяхъ. Съ прибавленіемъ стараго краснаго вина, а въ недостаткѣ онаго, 1 золотника квасцовъ, я имѣлъ желаемые успѣхи при астенической жабѣ и гортанномъ расслабленіи. Отваръ листовъ и корки служитъ хорошимъ полосканьемъ.—Снаружи: въ видѣ припарки, какъ выше сказано, которую сверхъ упомянутой пользы, *Турнефортъ* рекомендуетъ въ подагрической и членовой боляхъ.—Сухая припарка, изъ ольховыхъ листовъ, производитъ мѣстный потъ и утоляетъ судорожную боль: *Борель, Вельшъ*. — Сухая баня, или ванная изъ подогрѣтыхъ листовъ, одобряется въ судорожномъ дрожаніи членовъ, простудной ломотѣ, подагрѣ, хирагрѣ, параличѣ и отъ припадковъ застарѣлой французской болѣзни: *Амбодикъ*.

Примѣчанія. 1. Кору этого дерева лапландцы жуютъ для предохраненія отъ цыгги, и красятъ себѣ кожу краснымъ цвѣтомъ; изъ оной вывариваютъ темно-бурую, или каштановую краску, способную для крашенія шерстяныхъ деревенскихъ тканей; съ прибавленіемъ желѣзнаго купороса—*sulphas ferri*, или желѣзной ржавчины—*rubigo ferri*, даетъ обыкновенныя чернила, годныя для черченія кожъ. Она же кора и листья служатъ на крашеніе въ желтый цвѣтъ и на дубленіе кожъ.—Самое дерево укрѣпляетъ своими кудрявыми корнями берега; при жженіи горитъ свѣтло и безъ дыма; угля мягкіе и для составленія пороха очень способныя. Зола даетъ хорошій поташъ.—Дровами ольховыми обжигаемая черепица получаетъ желѣзный цвѣтъ. Ольховое дерево, въ продолженіи времени подъ водою твердѣетъ и наконецъ почти каменѣетъ; а потому весьма способно на сваи, подпоры и для фундаментовъ деревянныхъ мостовъ, въ болотныхъ мѣстахъ устроиваемыхъ; также для срубовъ колодезныхъ, водопроводныхъ трубъ, жолобовъ, и пр.—Впрочемъ, для этого должно брать свѣжее и почти еще зеленое дерево, ибо лежавшее на открытомъ воздухѣ скоро повреждается: *Северинъ*.—Художники ольховое дерево употребляютъ въ столярную, токарную и рѣзную работы; также на ме-

лочное строение, и для домашней посуды, которая, будучи покрыта лакомъ, не пропускаетъ мокроты, и для сельскихъ жителей весьма выгодна.

2. Свежіе листы, въ нѣкоторыхъ странахъ, рассыпаютъ по полу, и тѣмъ выгоняютъ блохъ; крѣпкимъ отваромъ этихъ листовъ моютъ кровати и брызгаютъ стѣны, для истребленія возродившихся клоповъ. Средство это годится также и для умерщвленія садовыхъ насѣкомыхъ, пожирающихъ огородную зелень и древесные плоды. Высушенные листы, заготавливаютъ на зиму для корму овецъ; ихъ побираетъ также охотно всякая скотина, кромѣ свиней: *Соболевскій* (*).—Въ осень собранныя и *высушенные шишечки*, даются людямъ и домашнему скоту отъ кроваваго поноса съ великимъ успѣхомъ: взрослому челоуѣку, истерши въ порошокъ: по 1 столовой ложкѣ; коровамъ по 3, повторяя приемы чрезъ 12 часовъ.—Средство это, какъ испытанное и надежное, рекомендуетъ *Г. Фрибе*.

3. Отваръ, употребляемый сельскими лекарями отъ упорныхъ трясушекъ, водяной болѣзни и ве-

(*) По этому корму узнаютъ овецъ, которыя здоровы, или больны. Первыя въ Декабрѣ или Январѣ ѣдятъ оныя листы охотно, напротивъ больныя не скоро за нихъ принимаются.

нерической, готовится изъ ольховой, крушинной и черемуховой древесныхъ корокъ, каждой по 4 лота; истолокши крупно, налить 3 бутылки воды и варить, пока половина жидкости укипитъ; процеженный холодный отваръ пьютъ по 4 чайныхъ чашки въ день.

4. Дикія птички во всю зиму питаются ольховыми сѣменами, и являются стадами тамъ, гдѣ много ольховника находится.

ОМЕГЪ ПЕСТРЫЙ, или БОЛИГОЛОВЪ БОЛЬШОЙ; ГОЛОВОЛОМЪ; МУТНИКЪ; ВЯХА; ВОНЮЧКА; ДЕХТЯРКА—*coniium maculatum*, L.

Мѣсто. Растеніе двулѣтнее, въ южной и умѣренной Россіи произвольно растущее по мокрымъ тѣнистымъ лѣсамъ; находится также на Волгѣ отъ Симбирска до Саратова, и въ окружности Петербурга; на Аптекаарскомъ острову, близъ пороховыхъ заводовъ, на Пулковской горѣ, по Петерговской дорогѣ, и въ другихъ подобныхъ мокрыхъ мѣстахъ, на пашняхъ и въ городскихъ рвахъ.

Качества. Трава, собираемая на сухихъ мѣстахъ въ Іюнѣ мѣсяцѣ, или предъ разцвѣтаніемъ, такъ какъ въ полной своей силѣ, имѣетъ ядовитое свойство—*venenata*, зависящее

отъ усыпительнаго и остраго начала. *Запахъ* свѣжей травы: смраднѣй, мышинный—*murinus*, и кошечью уриною отзывающійся, при недостаткѣ коего бездѣйственною почитается; *вкусъ*: тошновато-острый, горькій и нѣсколько пряно-сладковатый.—По химическому разложению, находится летучее масло и щелочно-летучая соль, остраго свойства: *Ложеръ*.

Сила въ маломъ количествѣ побуждающая, болеутолительная, разводящая, мочегонительная, споспѣшествующая нагноенію, очищающая; въ большомъ: ядовитая, усыпляющая, или оглушающая чувства—*parcoica*, причиняющая опасную рвоту, конвульсіи, сильный бредъ, чрезвычайную слабость и наконецъ смерть! *Эриартъ, Тревъ, Галлеръ*.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Внутрь въ видѣ порошка, или сгущеннаго сока, одобряется въ золотушномъ затвердѣніи и ракъ того же свойства—*cancer scrophulosus*; также въ нечистыхъ раковыхъ и венерическихъ язвахъ—*ulcera sordida*; производитъ хорошее нагноеніе, поправляетъ острую сукровицу, полагаетъ онымъ предѣлы, очищаетъ и наконецъ заживляетъ: *Штеркъ, Лоберъ, Берій*. Снаружи въ мѣшечкахъ прикладываемая трава, распаренная предварительно въ горячей водѣ, либо сваренная въ молокѣ въ видѣ катаплазмы, очень хорошо укрощаетъ

автоновъ огонь, отдѣляетъ помертвѣлость, утоляетъ ломотныя и подагрическія боли, разводитъ членовныя твердыя опухоли, и умягчаетъ костные наросты—*torhi*: *Штеркъ*, *Кралицъ*.—Болиголовною припаркою *Ратлауъ* развелъ чрезвычайную опухоль ногъ, сопряженную съ затвердѣніемъ мускуловъ и рытиками, которую иначе называютъ слоноюю болѣзью—*elephantiasis* (*).—Внутреннимъ и внѣшнимъ употребленіемъ болиголовной травы, *Гееръ* и *Сульцеръ* вылечивали кристалловидныя прыщи, упорную опухоль и окрѣпость конечной плоти—*phimosi pertinacissima*; также скіррное затвердѣніе ядеръ и предстательной железы; даже маточный ракъ—*cancer uteri*, этимъ средствомъ удачно пользовали: *Эргельбергъ*, *Моллиари*, *Ноланъ*, *Ранъ*, *Лотъ*; въ затвердѣніяхъ брюшныхъ внутренностей и многихъ оттуда послѣдовавшихъ болѣзненныхъ припадкахъ, многими примѣрами удостовѣряютъ: *Штеркъ*, *Кваринъ*, *Коллинъ* и другіе; въ упорныхъ четверодневныхъ лихорадкахъ, причиняющихъ не рѣдко брюшныя завалы, долговременную желтуху и водяную болѣзнь: *Гартманъ*, *Гудеманъ*, *Фарръ*, *Парисъ*; въ дѣтской сухоткѣ, происходящей отъ затвердѣнія железъ—*tabes glandularis*, Англійской

(*) Goett. gel. Anz. 1754. p. 285, 477

болѣзни, упорномъ кашлѣ—*pertussis* и чахоткѣ: *Штеркъ*, *Кваринъ*, *Фоттергилль*, *Буттлеръ*; въ застарѣлой головной боли и долговременномъ воспаленіи глазъ: *Стахеръ*, *Цигенгагенъ*; въ личной боли—*prosoptalgia* и скрытномъ рактѣ, сопровождаемыхъ жесточайшимъ мученіемъ, экстрактъ болиголовный вмѣстѣ съ борцовымъ—*extr. aconiti* хвалятъ *Янъ*, *Тилениусъ*, *Шпренгелъ*; въ вечерней слѣпотѣ, именуемой куриною—*haemeralopia*, и начальномъ помраченіи глазъ, наз. темною водою, или внутреннимъ бѣльмомъ—*cataracta incipiens et amaurosis*: *Бридольдъ*, *Шемень* и *МазаръдеКазелль*; въ падучей болѣзни и глухотѣ: *Нолянъ*, *Штеркъ*, *Парисъ*; въ хронической жабѣ, трудномъ глотаніи отъ затвердѣнія железъ гортанныхъ—*dysphagia glandulosa*, и носовомъ полипѣ; *Штеркъ*, *Бридольтъ*, *Готесьеркъ*; въ зобахъ, или подбородочныхъ килахъ—*strumae* г. *Вилліе* рекомендуетъ внутрь и снаружи употреблять болиголовъ, вмѣстѣ съ жженою морскою губкою—*spongia usta*.— Я однажды имѣлъ случай съ успѣхомъ испытать въ Юрбургѣ надъ жидомъ, страдавшимъ головными шолудями и подбородочнымъ зобомъ, давая внутрь болиголовный экстрактъ въ пилюляхъ съ бодягою—*spongia fluviatilis*, и прикладывая густую мазь, составленную изъ меду, бодяги и упомянутого экстракта; больной мой

въ 4 недѣли получилъ большое облегченіе, и чрезъ два мѣсяца совершенно выздоровѣлъ (*). *Балдингеръ* и *Бернъ* хвалятъ болиголовный экстрактъ: въ злой чесоткѣ и другихъ кожныхъ долговременныхъ болѣзняхъ; также въ застарѣломъ стволловомъ теченіи—*blenorrhoea chronica*, женскихъ бѣляхъ—*leucorrhoea*, и бездѣйствіи мужскаго уда—*impotentia virilis*; въ застарѣлой венерической ломотѣ и другихъ принадкахъ того-же рода—*mala venerea inveterata*, какъ-то: въ опухоляхъ костей, недвижности составовъ, жестокихъ почныхъ боляхъ, худыхъ язвахъ, открывающихся послѣ наховиковъ, носовой гноеточниѣ—*ozana*, и гнилости костей—*spina ventosa*, испытали: *Кулленъ*, *Гунтеръ*, *Лохеръ*, *Розенштейнъ*, *Вейкардъ*.

Количество. Сухую траву даютъ въ порошокъ сначала по 1 грану, поутру и ввечеру съ сахаромъ, или солодковаго корня порошкомъ, умножая постепенно до 10—20 гранъ; въ пилюляхъ давалъ я, полагая на одну часть экстракта болиголова, 5 частей истертой мелко бодяги, по 5 гранъ на пріемъ поутру и ввечеру, прибавляя мало по малу до 10

(*) О пользѣ этого средства, болѣе въ общежитіи опытными старухами, нежели врачами, употребляемаго, упомянуто выше.

грань.—Снаружи прикладывалъ, истолкши свѣжую болиголовную траву, къ зобу, перемѣняя два раза въ день; головныя шолуди примачивалъ посредствомъ напитанныхъ известковою водою полотенецъ, и отваривъ оную съ довольномъ количествомъ болиголовной травы. Ежели въ 12 унціяхъ известковой воды—*aqua calcis* растворить 1 или 2 драхмы болиголовнаго экстракта; то она служитъ хорошимъ раноцѣлительнымъ средствомъ для промыванія и примочки вышеупомянутыхъ злокачественныхъ язвъ.—Въ видѣ мази, смѣшиваютъ порошокъ травы съ медомъ, которая тоже хорошо очищаетъ и заживляетъ золотушныя, венерическія и раковыя язвы.—*Цорнъ* свидѣтельствуеть, что деревенскіе мужики вылечиваютъ открытый ракъ—*cancer exulceratus*, прикладывая на язву болиголовныя свѣжіе листы, смазанные медомъ; *Консбуухъ* тоже пользовалъ удачно личныя раки—*carcinomata faciei*, отваривъ болиголовную траву въ известковой водѣ и чаще оною примачивая.

АПТЕЧНЫЯ ПРИГОТОВЛЕНІЯ:

1. *Сущенный сокъ или экстрактъ болиголовный*—*succus spissat. conii m.* (*)

(*) Pharmacop. castrensis Ruthena, p. 362.

дается въ упомянутыхъ болѣзняхъ, отъ 1—2 грань, поутру и вечеромъ въ пилюляхъ, съ примѣсью пятой части порошка травы;—*пріемъ* болѣе 20 грань никогда не возвышается!
Бурдахъ.

2. *Болиголовная составная катаплазма*—*cataplasma cicutæ compositum* (*), прикладывается съ хорошимъ успѣхомъ: къ золотушнымъ членовнымъ опухолямъ, скиррамъ, сопряженнымъ съ чрезвычайно раздражительною, и даже къ антонову огню: *Вилліе.*

3. *Болиголовный пластырь съ аммоніакомъ*—*emplastrum cicutæ cum ammoniaco* (*), который тоже хорошо разводитъ скиррныя затвердѣнія, раковыя и твердыя брюшныя опухоли разбиваетъ, дѣйствуя гораздо превосходнѣе припарокъ: *Карпинскій.*—Для разведенія членовныхъ грибовъ и другихъ холодныхъ опухолей, я составлялъ тоже полезный пластырь изъ свѣжаго сока и порошка болеголовной травы, съ прибавленіемъ п. к. воска, канфоли и варенаго масла бѣлены—*ol. hyosciami coctum.*

(*) Тамъ же, р. 229.

(*) *Pharmacop. civilis Rossica*, р. 204.

Примѣчанія. 1. Болгоголовъ дѣйствуетъ подобно опию, утоляя боли и причиняя заморъ; при умноженныхъ приемахъ, въ продолженіи нѣсколькихъ дней, сильно дѣйствуетъ на кожу, причиняя нѣкоторый зудъ, водяные или красноватые прыщи, и слабое воспаленіе, къ рожѣ подходящее; въ большихъ приемахъ: производитъ чрезвычайное въ организмъ раздраженіе, круженіе головы, трясеніе членовъ и крайнюю разслабленность; а потому *Менхъ* напоминаетъ: ежели средство это при благоразумномъ употребленіи въ продолженіе 4 недѣль желаемой пользы не оказываетъ, или болѣзнь болѣе еще усилится, то оставить должно!

2. Овцамъ, козамъ и коровомъ, ежели попадется это растеніе въ сѣнѣ, не вредитъ; но лошади отъ онаго кружатся; свиньямъ, кроликамъ, гусямъ и собакамъ смертоносно. Людямъ, по невѣдѣнію съѣвшимъ кореня или траву омега вмѣсто петрушки или пастернака, причиняетъ головокруженіе, сумашествіе, судороги и смерть; однакожь употребленіемъ вкорости: рвотнаго, кислотъ и теплой воды, подслащенной медомъ, спасаются.

3. Коновалы даютъ омегъ лошадямъ отъ мыта и затвердѣнія железъ, начиная: отъ 1 золотника, до 6—12 и 14, постепенно умножая; въ продолженіи времени, дѣлаются легкій поносъ и потъ,

послѣ чего животное въ теченіи 20 дней поправляется.—Затвердѣлые желваки и распухшее вымя, разводятъ припаркою изъ травъ: болиголова — *cicuta m.* и пастушей сумки, или чижева глаза — *t. bursa pastoris*, которыя, наливъ кипяткомъ и настоявъ, прикладываютъ сколько можно чаще, посредствомъ наитаннаго полотенца, сложенного вчетверо, чтобы болѣе удерживалось теплой жидкости.—Эта припарка и въ женской грудицѣ, бывающей послѣ родовъ отъ большаго прилива и застоя молока въ сосцахъ, помогаетъ; или возми по 2 горсти болиголовной травы и корвеля, облей 2 стаканами кипячей воды, настой 10 минутъ, прикладывай къ распухшимъ грудямъ, завернувъ въ полотенцо, перемѣняя теплую припарку каждый часъ.—Въ омеговомъ соку варенные орѣхи прогоняють мышей, крысъ и кротовъ, когда оныя положить въ ихъ норы.

ОМЕГЪ МАЛЫЙ, или СОБАЧЬЯ ВОИЮЧАЯ ПЕТРУШКА — *aethusa cynarim*; *cicuta minor*, l.; омегъ водяной, или БОЛИГОЛОВЪ ВОДЯНОЙ; БЕШЕНИЦА ВОДЯНАЯ — *cicuta virosa*, s. *aquatica*.

Мѣсто. Растенія, въ умѣренныхъ краяхъ Россіи и Сибири произвольно растущія; первое въ лѣсахъ, между рѣками Руссою и Систою,

также въ деревьяхъ по садамъ и огородамъ; а второе: въ стоячихъ водахъ, болотахъ, прудахъ и каналахъ въ большомъ количествѣ, особенно въ Катерингофѣ и около Петергофской дороги.

Качества обѣихъ этихъ растений ядовитыя, зависящія отъ большаго количества острого начала. *Запахъ* противный, оглушающій; *вкусъ*: острѣе большаго омега, и позывающій на рвоту.

Сила чрезвычайно усыпительная, разводящая, ядовитая! *Венферъ*;—по замѣчанію *Бодара*, коренные листы этого растенія, весною бываютъ болѣе ядовиты, нежели въ другое время.—Корень онаго очень подобенъ садовому пастернаку, и тоже ядовитъ, по его остро-усыпительному свойству.

Употребленіе. Внутри по своей опасной ѣдкости, никогда не дается; *Венферъ* и *Шпренгелъ* видѣли печальные примѣры отъ ядовитыхъ свойствъ этихъ растений.—Снаружи подобно пестрому болиголову, прикладываютъ свѣжія толченныя растенія и въ припаркахъ: на твердые паховики, золотушные опухоли железъ, зобы и болящія раки—*carcinomata*; подваренныя съ молокомъ и мыломъ, служатъ очень хорошею припаркою, разбивающею всякаго рода затвердѣлыя опухоли—*tumores indurati*, и утоляющею боль: *Соболевскій*.

Примѣчанія. 1. Сушеніемъ теряютъ свою остроту и ядовитость; но свѣжія, особенно весною, бываютъ самыя ядовитыя и опасныя! *Линней* замѣтилъ, что въ Торнео отъ оныхъ свирѣпетовалъ педежь рогатаго скота; ибо молодая оныхъ трава можетъ обмануть всякое животное, не имѣя сначала противнаго запаха и своимъ сладковатымъ вкусомъ, который послѣ оказываетъ ядовитую остроту.—Такимъ же образомъ въ наблюденіяхъ Парижской Академіи: *Нугонъ* приводитъ въ примѣръ трехъ воиновъ, по невѣдѣнію ядовитости оныхъ растеній, вмѣсто петрушки или сельдерея съѣвшихъ и бѣдственно умершихъ; ибо они сначала имѣли жестокую рвоту, конвульсіи или судорожныя движенія во всемъ тѣлѣ, глубокій сонъ, раздутость живота и смерть; въ иныхъ найденъ воспаленный и разѣденный желудокъ, отъ чего таковой страдалецъ чувствуетъ превеликую боль въ головѣ, сухость въ горлѣ, судорожное сжатіе гортани, неносную тоску, иногда кровавую рвоту, послѣ которой слѣдуетъ векорѣ апоплексическій ударъ, прекращающій жизнь.—Этимъ ядовитымъ омегомъ—*cicuta virosa* L. умерщвленъ былъ *Сократъ*.—Въ Аоннахъ давали всегда пить омеговый сокъ осужденнымъ на смерть.—По смерти оказываются на поверхности тѣла пятна, подобныя ожогѣ, которое наконецъ чрезвычайно надувается.

2. Средства, противудѣйствующія этимъ и подобнымъ ядовитымъ растеніямъ, *Буривъ* предлагаетъ слѣдующія: когда человѣкъ самъ глотать не можетъ, то посредствамъ насоса или кожаной трубки, или въ скоромъ времени чрезъ воронку, вставленную въ ротъ, вливаютъ по немногу въ пищепріемное горло теплой воды, смѣшанной съ д. к. льнянаго или коноплянаго масла и меда, повторяя съ перемежкою до тѣхъ поръ, пока вырветъ; и когда больной опомнится, то давать ему кислотоватое питье съ медомъ и уксусомъ, пока получить облегченіе. — Парное молоко, сыворотка и клейкія промывательныя тоже полезны.

3. Свиньи, козы и овцы ѣдятъ эту траву безвредно;—лошадямъ и коровамъ она вредитъ.

ОМЕЛА, или дубовыя ягодки; птичій клей—*viscum album*, l.

Мѣсто. Растеніе деревянистое, вырастающее на дубахъ и дикихъ грушахъ въ южной Россіи; цвѣтетъ, смотря по климату, въ началѣ весны, болѣе же въ Маѣ.

Качества. Деревянистые свѣжіе стебли съ листьями *запахъ* имѣютъ приторный, тошно-

ватый; *вкусъ*: вяжущій; сухихъ клейкій.— По опытамъ *Картейзера*, содержитъ экстрактивно-горькое и смолисто-вяжущее вещество.

Силу заимствуетъ отъ деревь, на коихъ вырастаетъ: *Картейзеръ*;—листамъ приписываетъ *Иппократъ* разводящую; вѣтвямъ, укрѣпляющую: *Вейсманиъ*; сухой омелѣ: клейкую, притупляющую: *Шведіоръ*.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Въ падучей болѣзни, хвалятъ: *Плиніи* и *Парацельсъ*; женщину, одержимую эпилептическими припадками, выпользовалъ *Боиль*.—*Колбачъ* и *Дегенъ* тоже подтверждаютъ многими наблюденіями въ излеченіи родимца—*esclampsia*.—Средство это, по опытамъ другихъ врачей, оказываетъ полезное дѣйствіе также и въ другихъ судорожныхъ болѣзняхъ и спазмахъ, какъ-то: въ корчахъ с. Вита, или судорожномъ трясеніи—*chorea*, судорожномъ удушѣ, истерикѣ, расслабленности членовъ и кровавомъ поносѣ: *Бургавъ*, *Картейзеръ*, *Лезеке*, *Фогель*. Въ астенической ломотѣ, болѣзняхъ пасочной системы, маточныхъ припадкахъ, подагрическихъ боляхъ и трясучкахъ, внутрь и снаружи употребленіе омелы хвалятъ: *Маккебранъ*, *Шомель*.

Количество. Въ порошокъ даютъ отъ $\frac{1}{2}$ —1 драхмы или въ видѣ отвара, по методу *Тиссо*, полагая 2 драхмы омелы и таковое же

количество прибавляя мауннаго корня—rad. valerianaе на 8 унцій горячей воды, которую, вскипятивъ въ покрытомъ сосудѣ, процѣдить съ выжимкою полфунта жидкости, и давать на приѣмъ чрезъ 2 часа по 2 столовыхъ ложки;— я замѣтилъ гораздо лучшее дѣйствіе, ежели порошокъ омелы давать вмѣстѣ съ упомянутымъ отваромъ.

Примѣчанія. 1. Омела, собираемая съ дубовыхъ деревъ—viscum quercuum, предпочитается прочимъ породамъ, —только надобно оную срѣзывать въ Декабрѣ мѣсяцѣ, и хорошо высушивъ, хранить въ стеклянной закупоренной банкѣ, потому что удобно плесневѣеть и чрезъ то теряетъ всю силу:
Колбачъ.

2. Изъ свѣжей толченой корки этого деревца, промываемой нѣсколько разъ въ чистой водѣ, дѣлаютъ охотники клей птицеловный—viscum aucuparium: *Дюгамель.*

3. Мазь отмѣнно полезная, отъ ломотныхъ, подагрическихъ и параличныхъ расслабленій членовъ составляется изъ 3 горстей ягодной омелы, которую изтолокши, вари съ 2 фунтами свѣжаго свиного сала $\frac{1}{4}$ часа, и прожавъ сквозь ветошку, прибавивъ 8 золотн. воску и 2 золотника камфоры, и смѣшавъ, хранить эту мазь въ завязан-

ной говяжьимъ пузыремъ банкѣ.—Способъ употребленія производится такимъ образомъ: во первыхъ вытереть страждущія части взагрѣтымъ виномъ до суха; потомъ втирать въ составы мазь, растертую между ладоней, и послѣ обернуть нагрѣтыми полотенцами или салфетками, повторяя это дѣйствіе три раза въ день.

орлякъ, или папортникъ женскій; п. водяной;
сказанякъ—*pteris aquilina*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, растущее вездѣ въ тѣнистыхъ и влажныхъ лѣсахъ, на заустѣлой и бесплодной почвѣ, въ окружности Петербурга, около Катерингофа, по Петергофской дорогѣ, и въ другихъ подобныхъ мѣстахъ.

Качества. Корень имѣеть *запахъ* тошнотаватый; *вкусъ*: клейкій, горьковато-вяжущій.

Силу противуглистную, отверзающую.

Употребленіе. Одобряется отъ плоской глисты—*taenia* и круглыхъ червей—*lumbriци*: *Турнефортъ*, *Пленкъ*, *Карпинскій* (*); въ Англійской болѣзни, или разслабленіи членовъ—*gachitis*: *Соболевскій*.

(*) Папортникъ женскій служитъ основаніемъ, равно какъ и мужской. изобрѣтеннаго противуглистнаго средства Нуфферомъ; о дѣйствительной пользѣ онаго сви-

Количество. Взрослымъ дается въ порошокъ отъ $\frac{1}{2}$ —1 драхмы съ медомъ, поутру и вечеромъ, или съ бѣлымъ виномъ по драхмѣ, 3 раза въ день; дѣтямъ: по 20 грань съ молокомъ, два раза въ день; а слѣдующаго утра дается слабительное.—По методъ *Бурдые*, крѣпкій отваръ папортнаго корня, полагая 1 унцію на фунтъ воды, отвариваемой до 8 унцій, который процѣдивъ и прибавивъ 2 драхмы сѣрно-спиртнаго эфира—*aether. sulphuric.* принимать ежедневно поутру и вечеромъ по 4 унции, или по чайной чашкѣ, оказался дѣйствительнымъ.

Примѣчанія. 1. Корень этого растенія оказываетъ дѣйствія подобныя мужескому папортнику — *polypodium filix mas*, которыя могутъ удобно замѣнять ямайскую корку—*geoffroya inermis*, корсиканскій глистогонный мохъ—*fucus helminthochorton, s. conserva dichon-*

дѣтельствуютъ: Ф. Гофманъ, Розенъ и Андри.—По методу Нуффера, надобно взрослому больному принять на тощакъ папортнаго корня въ порошокъ 3 драхмы, растворивъ въ чайной чашкѣ чаю изъ лиловыхъ цвѣтовъ, и по прошествіи 2 часовъ, принять горькой слабительной соли 1 унцію, заливая по 1—2 чашки того же чаю каждый разъ, какъ послабитъ, и пока испражнится глста. Ежели окажется затрудненіе въ выхожденіи оной, то чрезъ два часа повторить приемъ той же слабительной соли—*sulphas magnesiæ*.

toma, упомянутой выше. Цытварное сѣмя—*artemisia iudaea* и цытварный корень—*caempferia rotunda* L.—Въ соединеніи съ маушовымъ корнемъ, я многократно изгонялъ глисты разнаго рода, о чемъ во многихъ мѣстахъ было уже сказано.

2. Въ Англіи съ успѣхомъ дѣлали опытъ надъ золою папортниковъ, разведенною въ водѣ, для бѣленія полотна, вмѣсто мыла: *Севергинъ*.—Выщелоченная соль, сходствуетъ съ нашатыремъ и годна для дѣланія стекла, мыла и проч.—Китайцы папортную золу употребляютъ на дѣланіе фаянсовой посуды—Ежели эту золу смочить отваромъ мыльной травы—*saropagia offic.* и, сдѣлавъ шарики, высушить; то оныя могутъ служить для мытья бѣлья, вмѣсто обыкновеннаго мыла.

3. Трава, срѣзанная и высушенная въ Іюнѣ въ тѣнистомъ мѣстѣ, служитъ хорошимъ зимовымъ кормомъ для коровъ и овецъ—Даютъ оную распаривъ горячею водою и немного посоливъ солью.—Корни служатъ для дубленія кожъ.—Крѣпкій отваръ всего растенія пьютъ въ деревняхъ отъ застарѣлаго кашлю, простудной ломоты, и примачиваютъ застарѣлыя язвы—Для дѣтей увѣчныхъ, или одержимыхъ Англійскою болѣзнию, *Бурлавъ* совѣтуетъ дѣлать подушки и покрывала изъ папортныхъ листовъ, смѣшиваемыхъ по рав-

ной части съ огородными пахучими травами и цвѣтами.

4. Согнувшіе листы папортниковъ дають наилучшій черноземъ, къ удобренію парниковъ служащій, и для другихъ садовыхъ потребъ годный.

орѣхъ грецкій, или воложскій—*juglans regia*, L.

Мѣсто. Дерево въ южной Россіи растущее въ садахъ, особенно въ Кіевѣ; удобно разводится при дорогахъ и на поляхъ: въ густыхъ лѣсахъ не удается и требуетъ вспаханной почвы.

Качества зеленой корки или кожуры—*cortex viridis* s. *putamen* незрѣлыхъ орѣховъ зависятъ отъ горько-вяжущаго вещества, соединеннаго съ смолисто-экстрактнымъ и камедьнымъ началами; орѣховыхъ ядеръ, подобныя сладкому миндалю.—*Запахъ* зеленой орѣховой корки тяжелый, непріятный; *вкусъ*: горько-вяжущій; зрѣлыхъ орѣховъ: масляно-сладкій.— Орѣховыя ядра дають нѣжное сладковатое масло, отъ стужи не густѣющее, но скоро горьнущее, въ половину своего вѣса: *Берій*.

Сила внѣшней зеленой кожуры вяжущая, укрѣпляющая, противуглистная, очищающая; орѣховъ и масла: питательная; листовъ мѣсяч-

чно-гонная, противулихорадочная, истребляющая червей, раноцѣлительная: *Баунъ*.

Употребленіе. Для истребленія глистовъ, *Пипократъ* и *Диоскоридъ* уже давали орѣховую зеленую корку своимъ больнымъ въ отварѣ, который однако удобно производить рвоту; а потому *Платеръ* для этого намѣренія болѣе хвалить водяной экстрактъ, или густую выварку изъ упомянутой кожеры, которымъ изгонялъ плоскія и круглыя глисты.—*Ла-Шапельъ*, *Пассерадъ* и *Бинетъ* (*) для истребленія тесемочной глисты—*tania lata*, s. *vermis solitarius*, давали съ хорошимъ успѣхомъ орѣховое свѣжее масло—*oleum nucum iuglandium*: отъ 1 до 2 унцій съ гишпанскимъ виномъ, или съ малагою; въ недостаткѣ онаго, можно запивать померанцовымъ ликеромъ. *Беренсъ* замѣтилъ, что и сухіе грецкіе орѣхи, кушая натошакъ и запивая хорошимъ винограднымъ виномъ, такое же оказываютъ дѣйствіе. (мушкатель, или сладкое вино, въ этомъ случаѣ наиприличнѣйшее).—Сверхъ того, орѣхи доставляютъ хорошее питаніе тѣлу, и во все времена одобряемы были отъ ядовъ, въ сужденіи своего нѣжнаго тучнаго масла; впрочемъ, при долговременномъ храненіи, удобно горкнуть и портятся, и въ такомъ случаѣ

(*) *Journal de Medicine* Vol. VI p. 305,—Vol. XV.

промоглостию своею могутъ причинять вредъ желудку: *Шильманъ*. — Орѣховое масло, холодною выжимкою приготовляемое, *Боиль* хвалить въ мочевыхъ припадкахъ, особенно при каменномъ мочерѣзѣ; *Шейриль*, въ запорѣ мѣсячнаго очищенія и глистныхъ припадкахъ; *Гуфеландъ* для смазыванія кожныхъ сухихъ и мокнущихъ лишаевъ, пятенъ и проч. При сухомъ воспаленіи глазъ совѣтуетъ ежедневно по нѣскольку капель впускать посредствомъ мягкаго перушка. Этимъ способомъ предохраняются глаза отъ пятенъ, бывающихъ нерѣдко послѣ оспы, кори и краснухи—*f. scarlatina*; онымъ же смазываютъ два или три раза въ день ожоги и трещины грудныхъ сосцовъ: *Бурдахъ*. — Выжатый сокъ изъ молодыхъ зеленыхъ орѣховъ и смѣшанный съ медомъ, примѣшиваютъ къ полосканьямъ отъ жабы, воспаленія и опухоли гортанныхъ железъ; въ дѣтской молочницѣ и другихъ язвахъ во рту, тоже полезно смазывать кисточкою, напитанною онымъ подслащеннымъ сокомъ: *Галенъ*, *Пленкъ*. — Отваръ сухой зеленой корки—*decocatura putaminis*, *Этмюллеръ* рекомендуетъ въ венерической застарѣлой болѣзни—*lues confirmata*, въ томъ періодѣ, когда ртутныя средства болѣе уже не дѣйствуютъ. По методу *Поллина*, можно таковой кровочистительный отваръ готовить изъ

песочной осоки—*carex aenagiä*, можжевельного дерева—*lignum radicis iuniperi c.*, высушенной зеленой ореховой кожуры, взятыхъ по 4 унціи каждаго, и 1 унціи сюрьмы—*antimonium crudum.*—Означенное количество этого сбора, отваривъ въ 20 фунтахъ воды до половины (5 бутылокъ), пьютъ оный отваръ при затвердѣніи железъ, опухоляхъ костей, въ грудныхъ припадкахъ и сухоткѣ, послѣдовавшей послѣ долговременнаго леченія, и во всѣхъ закоренѣлыхъ припадкахъ венерическаго свойства, *Шведіоръ* отлично хвалить.—Снаружи промываютъ онымъ же застарѣлыя язвы и опухоли, послѣдовавшія отъ любострастнаго яду, проникшаго по всему составу тѣла.—*Брамбилла* и *Гуичовскій* крѣпкій отваръ ореховой кожухи хвалятъ въ ножныхъ застарѣлыхъ мокнущихъ язвахъ—*ulcera crurum manantia*, также въ золотушныхъ и раковыхъ, не имѣющихъ затвердѣнія и воспаленія; лишайные мокрые струны, шолуди и другія кожныя сыпи—*exanthemata*, появляющіяся на поверхности тѣла отъ остроты пасоки, тоже съ успѣхомъ примачиваются.—Свѣжіе ореховые листья, прикладываемые къ отекамъ, хорошо разводятъ оные, и т. п. холодныя опухоли—*tumores oedematosi*: *Краицъ*. Въ винной наливкѣ употребляемые, умерщвляютъ глистовъ, гонятъ мѣсячныя крови и прекращаютъ знобучую ли-

хорадку: *Турнефорть*; крѣпкій водяной и винный отваръ тѣхъ же листовъ служить примочкою ранозѣлительною, и полосканьемъ отъ гортанной жабы, съ язвами сопряженной—*angina ulcerosa*.—Онымъ промывать можно золотушныя язвы, и принимать внутрь по рюмкѣ поутру и вечеромъ сказанный отваръ, продолжая нѣсколько дней, и притомъ прикладывая къ астеническимъ язвамъ свѣжую изъ листовъ катаплазму, или одинъ только выжатый сокъ оныхъ, который очень хорошо очищаетъ и заживляетъ всякія упорныя язвы: *Розье*.

Количество. Для отвара полагается 1 унція зеленой сухой корки на фунтъ воды, которую кипятить, пока останется 8 унцій жидкости, процѣдивъ, принимать внутрь, и снаружи почаще примачивать упомянутыя язвы, посредствомъ напитанной корки; отваръ этотъ служитъ также полосканьемъ и промывательнымъ отъ мелкихъ проходныхъ червей—*ascarides*. Порошкомъ корки присыпаются гнилыя язвы, вмѣсто хины. Горсть свѣжихъ изрѣзанныхъ листовъ наливаютъ 8 унц. кипячей воды, и подсластивъ, принимаютъ по половинѣ чайной чашки.—Орѣховое свѣжее масло внутрь дается отъ 1—2 и 3-хъ унцій, какъ хорошее противуглистное средство, и отъ каменной боли: *Боиль*. Такого же рода лекарство пред-

ложено выше.—Натираніе тѣла этимъ масломъ, поддерживаетъ силы слабыхъ стариковъ: *Индеритъ*; равнымъ образомъ и для предохраненія отъ чумы какъ это, такъ и деревянное масло, втираемое до 1 фунта въ день, пока окажется у зараженнаго потъ, оказываетъ большую пользу: *Балвинъ Ларрей, Л. Франкъ* (*). *Кейчъ* сл. Американскій врачъ, масляныя втиранія съ прибавленіемъ камфоры—*ol. camphoratum* употреблялъ съ отличнымъ успѣхомъ въ нервной горячкѣ съ пятнами—*typhus petechialis* и заразительной желтой, наз. Американскою—*f. Americana flava*.—Для упомянутыхъ натираний, можно употреблять и другія тучныя выжатые масла, какъ-то: кунжутное, льняное, маковое и другія, гдѣ какое можно имѣть удобнѣе, только бы не были промозглыя—*p. rancida*. Снаружи прикладывается, какъ выше сказано.

Въ Аптекахъ готовятъ:

Экстрактъ, или сущенный сокъ ореховой зеленой корки—*extractum putaminis nucis juglandium* (**), который отъ глисть *Фишеромъ* чрезвычайно одобряется; дается въ

См. Nord. Archiv für Naturkunde, Arzneywiss u. Chirurgie, von Ptaff u. Sdheel. III. B. 4. St. p. 34.

(**) Pharmacop. Rossica. p. 210.

пилюляхъ и микстурахъ отъ 10—20 гранъ и до полдрахмы; или одну драхму этого экстракта растворивъ въ 2 унціяхъ коричневой воды, давать младенцамъ: отъ 1—3-хъ лѣтъ, по 30 капель; взрослымъ по 40 и 60 капель, и по прошествіи 8 дней принимать слабительное.

Примѣчанія. 1. Изъ зеленыхъ орѣховъ приготавливаютъ превосходное веренъе. Кіевское наиболѣе славится, которое полезно для желудка и служить рѣдкимъ десертомъ. Сиропъ или робъ орѣховый, смѣшанный съ бурою—вогах, служить лучшимъ лекарствомъ отъ молочницы во рту и язвъ гортанныхъ, оставшихся послѣ долговременнаго ртутнаго леченія.—Орѣховое старое масло, живописцами предпочитается; ибо съ бѣлилами не скоро чернѣетъ, и доставляетъ картинамъ особенную свѣтлость и лакировку; — для этого прибавляютъ п. к. терпентиннаго масла.—Чистое орѣховое масло, по своему пріятному вкусу, ни мало не уступаетъ миндальному и прованскому;— а потому и замѣняетъ оныя какъ во врачебномъ, такъ и въ поваренномъ искусствѣ.—Сбѣицы орѣховыя служатъ для откармливанія птицъ и домашняго скота;—размягченныя горячею водою, прикладываются къ головнымъ паршамъ.—Съ прибавленіемъ садовой руты и уксуса, служитъ каташаз-

ною, укрощающею антоновъ огонь и гнилость чумныхъ огневииковъ—carbunculi: *Диоскоридъ*.

2. Отваръ зеленой орѣховой скорлупы, полезенъ для истребленія гусеницы и садовыхъ червей, пожирающихъ зелень, которые отъ онаго исчезаютъ;—отваръ этотъ и дождевыхъ червей столько безпокоитъ, что отъ поливанія они выходятъ изъ земли наружу.—Лошадей, взбрызгивая тѣмъ же отваромъ, или изъ листовъ приготовленнымъ, избавляютъ отъ осъ, слѣшней, комаровъ и пр.

3. Древесная кора, корень и орѣховая кожуха употребляются въ желтую краску для пряжи и шерсти:—тѣже части, высушивъ и отмочивъ въ водѣ, съ примѣсомъ желѣзнаго купороса, служатъ для черненія бѣлыхъ деревъ, и для другой столярной черни, которая очень постоянна. Старое орѣховое дерево крѣико, плотно и тяжело, у корней полосато, темнобураго цвѣта, удобно для полировки, и годно для всякой мебели и рѣзной работы: *Севергинъ*.

4. По опытамъ *Шведіора*, зеленая орѣховая шелуха—cortex nigra, можетъ замѣнить противулюбострастную лобелію—lobelia syphilitica, сасифрасное дерево, и другія иноземныя кровочистительныя средства—mundificantia: *Пеириль, Бек-*

лержь.—Вторая корка древесныхъ вѣтвей, собираемая весною предъ разверзаніемъ почекъ, будучи принята въ порошокъ отъ $\frac{1}{2}$ —1 драхмы, служить рвотнымъ средствомъ: *Шредержь*.—Вторая корневая корка, настоянная въ винѣ, имѣеть острое свойство, подобное шнапскимъ мухамъ: *Гофманнъ*.

5. Подъ тѣнью этого дерева снать вредно, по причинѣ усыпительнаго испаренія, выходящаго изъ листовъ.—Сокъ изъ древеснаго ствола выпускаемый, будучи сгущенъ, даетъ патоку сахарнаго свойства: *Бергій*, *Кранцъ*.

6. *Орѣховая ратафія*, полезная для желудка, составляется изъ 12 зеленыхъ волскскихъ орѣховъ, истолченныхъ съ скорлупою, на которые наливъ бутылку пѣнной водки и настоявъ въ закупоренномъ сосудѣ 3 недѣли, потомъ процѣдить и подсластить сахаромъ.

орѣхъ лѣсной, или орѣшникъ; лѣщинникъ—*coagul-
lus avellana*, l.

Мѣсто. Дерево кустоватое, довольно высокое, въ полуденной и умѣренной Россіи произвольно растущее въ лѣсахъ и садахъ, особенно на Волгѣ, подъ Казанью, и на Уралѣ,

также по горнетымъ лѣсамъ въ Паргаловѣ, Осиновой рощѣ, по Дудеровой горѣ, и въ другихъ мѣстахъ.

Качества лѣсныхъ орѣховъ подобныя грецкимъ; орѣховое ядро имѣеть *вкусъ*: сладковатый, масляный. Орѣховыя зрѣлыя ядра даютъ битаго масла въ половину своего вѣса.

Спла питательная, смягчительная.

УПОТРЕБЛЕНИЕ. Орѣховыя ядра, во врачебномъ искусствѣ и въ поваренномъ, служатъ вмѣсто сладкаго миндаля;—изъ растертыхъ съ водою, дѣлають молоко, полезное въ кровохарканіи, сухоткѣ и мочерѣзѣ.—Изъ оныхъ же выжимають тучное масло—*oleum fixum*, которые не скоро горкнеть, не имѣеть противнаго запаха, и во всемъ подобно миндальному, одобряется въ грудныхъ припадкахъ, отъ кашля, перхоты и свинцовой колики—*colica ricinosa*. Снаружи намазываютъ кожныя трещины и ожоги; въ послѣднемъ случаѣ, смѣшанное съ яичнымъ бѣлкомъ, служитъ наилучшею мазью отъ ожогъ—*linimentum ad ambusta*. *Месюе*, орѣховое масло хвалить для роценія волосъ, особливо выльзшихъ послѣ головныхъ паршей—*alopescia tineosa*.—пригорѣлое масло этого дерева—*ol. empyreumatic.*, нѣкогда славилось для утоленія зубной боли, и исцѣленія раковыхъ язвъ: *Руландъ*.

Количество. Масло это дается внутрь такимъ же образомъ, какъ выше описанное грецкихъ орѣховъ, и служитъ для приправы постныхъ кушаньевъ;—для составленія аршада или орѣхового молока, растираютъ 1 унцію очищенныхъ ядеръ въ 12 унц. холодной воды, которую исподоволь приливаютъ, и подсластивъ сахаромъ, даютъ въ грудныхъ, мочевыхъ и ихорадныхъ болѣзняхъ, по двѣ столовыхъ ложки и болѣе, всякій часъ или рѣже. Сырые и каленые орѣхи ѣдятъ обыкновенно вмѣсто десерта; но кожица оныхъ въ желудкѣ не скоро варится, и по своему сушительному и вяжущему свойству, причиняетъ иногда кашель и стѣсненіе въ груди; по чему надобно оную отъ ядеръ отдѣлять посредствомъ горячей воды, и тогда орѣхи оказываютъ болѣе смягчительную и успокоивающую силу: въ почечныхъ припадкахъ, отъ песку и каменной болѣзни.—Впрочемъ имѣющіе слабость желудка, могутъ болѣе еще разстроить оный, кушая много орѣховъ.—Незрѣлые орѣхи, причиняютъ нерѣдко кровавый поносъ.

Примѣчанія. 1. Изъ лѣсныхъ орѣховъ выжатое тучное масло, можетъ совершенно замѣнять миндальное, деревянное и даже лучшее прованское масло.—Старое, гонится для составленія масляныхъ скоро сохнущихъ лаковъ.—Голландскія бабки, на-

ставляютъ родильницамъ промывательное: изъ 1 чайной чашки бѣлаго вина и равнаго количества орѣховаго свѣжаго масла, подогрѣвъ нѣсколько; особливо при задержаніи послѣда, или дѣтскаго мѣста—*retentio placentæ*.

2. Ежели 1 чайную чашку орѣховаго масла и столько же уксуса, разведши двойнымъ количествомъ ветчиннаго рассола, и подогрѣвъ на сковородѣ, дать коровѣ выпить тепловатую жидкость: то это растеніе весьма много помогаетъ отъ заразы во время падежа, хотя бы скотина уже и заразилась. — Натираніе орѣховымъ масломъ, смѣшаннымъ съ уксусомъ и солью, истребляетъ моль, расплотившуюся въ хвостѣ у лошади: *Левшинъ*.

3. Выгоняемое изъ дерева вопочее масло—*oleum emurgetumaticum* оказываетъ полезное дѣйствіе въ судорожныхъ болѣзняхъ, дѣтскомъ родимцѣ, или падучей болѣзни, зависящей отъ глистовъ; снаружи, помазываютъ онымъ у дѣтей пупокъ; у взрослыхъ, члены, одержимые ломотою и расслабленные; также прикладываютъ къ язвамъ сильно-болящимъ. Внутрь даютъ 2—10 капель. Зеленые орѣховые цвѣтники или влагалища, настоянные въ водкѣ на солнцѣ, или въ легкой печной теплотѣ нѣкоторое время, даютъ хорошій раноцѣлительный бальзамъ.

4. Крѣпкою вываркою листовъ, заливая мѣста, гдѣ расплодился клопы, выгоняютъ и истребляютъ оныхъ. Листы этого орѣшника ѣдятъ однѣ только козы, другая скотина не трогаетъ: *Соболевскій*.

5. Толченые высушенные орѣхи, гдѣ имѣются во множествѣ, можно давать рогатому скоту отъ поноса. Дерево по твердости своей даетъ хорошіе угольные карандаши для рисовки; зола—хорошій поташъ; уголь годенъ для составленія пороху.

6. Для десерту, въ зимнее время, сухіе орѣхи можно сдѣлать свѣжими, ежели оныя мочить сутки (24 часа) въ парномъ коровьемъ молокѣ. Этимъ способомъ можно поправлять даже старые прогорклые орѣхи: *Фрибе*.—Иныя сохраняютъ чрезъ всю зиму и даже до появленія новыхъ, полагая довольно созрѣвшіе орѣхи въ глиняные кувшины, которые, засмоливъ, зарываютъ въ погребахъ въ землю.

осина—*populus tremula*, L.

Мѣсто. Дерево во всей Россіи растущее по мокрымъ лѣсамъ, въ окружности Петербурга: въ Осиновой рошѣ и на Дудерѣвой горѣ.

Качества. Почка, собираемая до развитія листовъ, смолистая; *вкусъ* имѣють горьковатый.

Силу смягчительную, притупляющую, открывающую.

Употребленіе. Въ отварѣ, въ простомъ и кровавомъ поносахъ и простудной ломотѣ въ членахъ—*artrodynia rheum tica*. Корку ея также пьютъ въ отварѣ отъ шіатики, или крестцовой боли—*сохага*, и въ задержаніи мочи; молодые толченые листы, смоченные горячею водою, служатъ полезною припаркою, утоляющею ломотныя и подагрическія боли; сокомъ, извлекаемымъ изъ дерева, сгоняютъ лишай и бородавки.—Почки, еще не распустившіяся, растираемыя съ тучнымъ масломъ, или настоянныя съ водкою, служатъ ранозѣлительнымъ средствомъ: *Тейхмейеръ*.

Количество. Почекъ, или смолистыхъ глазковъ и корки, для отвара, полагаютъ по 1 унціи на фунтъ воды, и кипятятъ, пока останется 8 унцій; процѣдивъ и подсластивъ, пьютъ отваръ по чайной чашкѣ, 3 раза въ день. Почки эти настаиваютъ также въ винномъ спиртѣ, и даютъ отъ 20—30 и 40 капель, съ тѣмъ же отваромъ, при внутреннихъ загноеніяхъ.—Снаружи, листья припариваютъ почечуйныя шишки и другія болящія опухоли, какъ выше сказано.

Примѣчанія. 1. Зеленую и подсушеную корку осины кладутъ на горячіе угля, и дымомъ ея выгоняютъ свѣрчковъ изъ жилья.—Черепица, обжигаемая осиновыми дровами, получаетъ синеватый глазурь, и бываетъ очень прочна.—Изъ золы добываютъ поташъ.

2. Листы ея пожираютъ охотно козы, овцы и лошади; о коровахъ не извѣстно; свиньи не трогаютъ.—Листы эти составляютъ также большую часть пищи бобровъ: *Соболевскій*.—Корка служитъ кормомъ для козъ, овецъ и дубленія кожъ.

3. Подобныя качества имѣютъ почки и кора *тополи бялой и осокори черной*—*populus alba et nigra*, въ южной Россіи растущихъ, на мокрыхъ и сухихъ мѣстахъ.—Листья оныхъ служатъ здоровымъ кормомъ для скотины, а дерево пригодно для разной столярной работы.—Изъ хохлатыхъ сѣмянъ тополи можно дѣлать бумагу; изъ осокорной коры, которая губчата и очень легка, можно дѣлать пробки.—Шведскіе рыбаки дѣлаютъ поплавки къ неводамъ вмѣсто пробки, чтобы оныя плавали на поверхности воды: *Северинъ*.—Изъ осокорныхъ почекъ—*gemmae pop. p.* приготовляемая мазь—*ungv. populeum* служитъ превосходнымъ лекарствомъ для смягченія болящихъ поче-

чуйныхъ шишекъ, трещинъ на грудяхъ или сосцахъ и отъ ожоговъ: *Шмидель*; отваренныя съ льнянымъ или орѣховымъ масломъ, оказываютъ такую же пользу.—Масло это одобряется также для утоленія каменной и ломотной болей: *Бурдахъ*. Свѣжовыжатый сокъ изъ листовъ осокори бѣлой или черной прикладываютъ къ зубамъ для утоленія боли; оный же, подогрѣвъ, впускаютъ въ слуховой каналъ, отъ простуднаго шуму или звону въ ушахъ. Изъ этихъ смолистыхъ почекъ, собираемыхъ весною и смягченныхъ кипячею водою, выжимаютъ смолистое вещество, воску подобное, изъ котораго дѣлаютъ свѣчи, хорошо горящія и пахнущія; также ранозѣлительные пластыри, при поврежденіи нервовъ и сухожильныхъ перепонокъ, прикладываемые. Почки черной осокори, въ видѣ горячей наливки употребляемая, сильно гонятъ потъ: *Пеириль*.—Винная настойка оныхъ, полезна въ цынгѣ и грудной застарѣлой простудѣ: *Вейсманнъ*.

4. Тополевая ален служатъ украшеніемъ садовъ, бульваровъ и проспектовъ, дѣлаемыхъ при загородныхъ домахъ; потому что деревья эти вырастаютъ очень скоро, и достигаютъ вышины довольно значительной.

ОСОКА ПЕСОЧНАЯ ИЛИ НѢМЕЦКАЯ САРСАПАРЕЛЬ; ПЕС-
 ЧАНКА ТРАВА—*sageh arenaria et disticha*, l.

Мѣсто. Растеніе многолѣтное, во всей Россіи произвольно растущее на пещаныхъ мѣстахъ, особливо на берегахъ Волги въ большомъ изобиліи; также по пещанымъ берегамъ Невы рѣки, и въ другихъ мѣстахъ.

Качества. Корень свѣжій имѣеть *запахъ* слабый, нѣсколько терпентиномъ, или смолистыми шишками отзывающійся; *вкусъ*: сладковатый, бальзамный; сухаго—мучной, клейковатый.

Сила разводящая, притупляющая, потъ и мочу гонящая, подобно дорогой настоящей сарсапарель—*smilax sarsaparilla*, и баккауту—*guaiacum*: *Гледичъ, Шпренгель.*

Употребленіе. Въ венерической болѣзни, кожныхъ нечистыхъ сыпяхъ и чирьяхъ, простудной ломотѣ, долговременномъ ревматизмѣ, членовныхъ боляхъ и грудныхъ мокротныхъ припадкахъ—*pituita pectus gravans*: *Вилліе, Карпинскій, Соболевскій.* Въ завалахъ внутренностей железъ, каменныхъ и глистныхъ припадкахъ, хвалять: *Сильвій, Ланцизій и Біанхи.*

Количество. 2 унціи изрѣзаннаго свѣжаго или сухаго корня варять въ 2 фунт. воды,

пока останется 1 фунтъ жидкости; процѣдивъ, пьютъ по чайной чашкѣ.—Отваръ этотъ бываетъ гораздо дѣйствительнѣе, ежели готовится вмѣстѣ съ пырейнымъ корнемъ, стебельками паслена сладко-горькаго и сосновыми верхушками.

Въ Аптекахъ готовятъ:

Сборы кровочистительные — species lignorum (*), употребляемые обыкновенно въ отварахъ, полагая 1 унцію на фунтъ воды;—таковые отвары пьютъ обыкновенно послѣ ртутнаго долговременнаго леченія, для искорененія венерическихъ остатковъ.

Примѣчанія. 1. Надобно собирать коренья песочной осоки весною, выбирая тѣ, которые глубже простираются въ землю.—Другая порода, наз.—*carex disticha*, не растетъ на пескѣ, но на мокрыхъ мѣстахъ.

2. Что корни этихъ растений, также пырейной и мыльной травы—*rad. graminis et saropargiae* off. можно употреблять въ замѣну иноземной сарсапарели, удостовѣряютъ насъ о такомъ дѣйствиіи этихъ средствъ не только подобныя ихъ качества,

(*) Pharmacop. castrens. Ruth, p. 346.

но и опыты, многими врачами повторенные въ пользованіи выше упомянутыхъ болѣзней.—Песочная осока излишними также дѣлаетъ: чапушинскій или чувашинскій коренья—rad. chinæ orientalis, s. smilacis chinæ, корень противулюбоострастной лобелии—rad. lobeliæ syphiliticæ, и сплюснутый безстебельный горохъ—rad. astragali exscari: Pallas.

ОСОКОРЬ ДУШИСТАЯ, или ТАКАМАГАКЪ; РАЙ ДЕРЕВО—populus balsamifera, l. et fagara ostandra, (Laquin.).

Мѣсто. Дерево Сѣверной Америки, растущее у насъ въ полуденной Сибири и на Терекѣ, особенно около Енисея; также и въ здѣшнихъ сѣверныхъ климатахъ разводится удобно на мокрой почвѣ, будучи предохраняемо отъ морозовъ.

Качества ароматной смолы, наз.—tасата-наса, которая насѣчкою древесной коры и выжиманіемъ смолистыхъ почекъ весною извлекается, превосходная; *запахъ* имѣеть благовонный, пріятный, отзывающійся амброю, которая болѣе при куреніи пріятно пахнетъ; *вкусъ*: слегка горьковатый, тошноватый.—По опытамъ *Берия*, 4 унц. почекъ даютъ смолистаго бальзама 2 драхмы, растворяемаго въ винномъ спиртѣ.

Сила укрѣпляющая, разводящая, раноцѣлительная.—Въ видѣ куренія, тоже возбуждаетъ ослабѣвшія части, разводитъ отеки или простудныя опухоли, и помогаетъ въ истерическихъ припадкахъ: *Бодаръ*.

УПОТРЕБЛЕНІЕ. Снаружи, смола, намазанная на холстину, прикладывается въ видѣ пластыря къ груди и животу: для унятія рвоты и поноса, происходящихъ отъ слабости кишечнаго канала; этимъ же пластыремъ покрываютъ холодныя простудныя опухоли. — Въ видѣ куренія, одобряется: въ ревматизмѣ, членовныхъ боляхъ, истерикѣ, зубной боли, ушной простудѣ и глухотѣ: *Пленкъ*, *Шведіоръ*, *Бурдахъ*.—Смола, растворенная въ винномъ спиртѣ, или скипидарномъ—of. terebinthinæ, служитъ раноцѣлительнымъ средствомъ, и притомъ укрощающимъ гнилость, а потому съ успѣхомъ прикладывается къ цыготнымъ и другимъ гнилымъ язвамъ, сопряженнымъ съ антоновымъ огнемъ, также къ обнаженнымъ костямъ и костоѣдѣ: *Берній*, *Ергартъ*.—Спиртная настойка такамагакки—*tinct. tacamahacæ* (*) замѣняетъ совершенно мастичную, мирровую и амбровую настойки.—Въ леченіи венерическихъ язвъ, особенно застарѣлыхъ,

(*) Пригот. такимъ же образомъ, какъ мирровая *tinctura myrrhæ*. Pharmacop. castr. Ruth. p. 379.

нашелъ я весьма дѣйствительнымъ средствомъ, прикладывая къ онымъ упомянутую настойку, съ прибавленіемъ по 1 грану сүлемы—*oxymurias hydrargyri*, на каждую унцію. Внутрь давалъ тоже съ хорошимъ успѣхомъ (безъ сүлемы): въ астеническихъ лихорадкахъ, при большой слабости нервной системы и недостаткѣ аппетита, или въ трудномъ пищевареніи, на приѣмъ отъ $\frac{1}{2}$ —1 драхмы съ винограднымъ виномъ; отъ 20—30 капель, принимаемая на сахарѣ, 2 или 3 раза въ день, укрощаетъ продолжительные поносы, зависящіе отъ слабости кишекъ, также теченіе женскихъ бѣлей, и отдѣленіе гноеватой мокроты у чахотныхъ—*sputa purulenta phthisicor.* Въ цынготной порчѣ десенъ и зубовъ, отваръ дубовой корки, съ прибавленіемъ онойже настойки, служить очень полезнымъ полосканьемъ. Почки осокори душистой—*gemmae r. balsamiferae*, толченныя и смѣшанныя съ виннымъ спиртомъ, терпентиннымъ, или съ свинымъ саломъ наподобіе мази, тоже одобряются для заживленія застарѣлыхъ ранъ и язвъ: *Менхъ.*

Примѣчанія. 1. Смола, именуемая *такамагакка*, вытекающая сама собою изъ дерева бѣдными каплями, по своей чистотѣ для внутренняго употребленія предпочитается получаемой

чрезъ надрѣзываніе коры, которая бываетъ темно-краснаго или бураго цвѣта. Выжимаемая горячимъ прессомъ изъ древесныхъ почекъ, тоже употребляется единственно снаружи для заживленія ранъ, и составленія желудочнаго пластыря, именно изъ 7 драхмъ осокорной душистой смолы, 1 драхмы мятнаго масла, и 8 капель анисоваго: *Имманиль*.—Пластырь этотъ я съ большою пользою прикладывалъ малолѣтнимъ, для унятія рвоты, и кишечной рѣзи—*tormina infantum*, которую простолудины называютъ обыкновенно дѣтскою грыжею или грызью.

2. Въ Италіи, изъ смолистыхъ почекъ душистой осокори и тополи, приготавливаютъ искусственный воскъ.

3. Ежели эту душистую смолу извлечь изъ почекъ осокори посредствомъ виннаго спирта, то она имѣетъ свойства, подобныя стираксу, и качествами своими можетъ замѣнять: *мастику*—*pistacia lentiscus*, *мирру* или *смирну*—*laurus murrha*, *росной ладонъ*—*styrax benzoin*, *л. простой*—*iuniperus lycia* и *перувианскій бальзамъ*—*myrohylon peruiferum*.

осоть, или огородный молочникъ; заячья капуста.—
sonchus oleraceus. I.

Мѣсто. Растеніе однолѣтнее, растущее произвольно вездѣ по пустырямъ, обработан-

нымъ мѣстамъ, садамъ и огородамъ; цвѣтеть во все почти лѣто.

Качества. Свѣжая трава *запаху* не имѣетъ; *вкусъ*: горьковатый, млечно-сочный, зависящій отъ смолистаго вещества.

Сила прохладительная, разводящая, укрѣпляющая.

Употребленіе. Сокъ, выжатый изъ всего растенія, одобряется въ завалахъ брюшныхъ внутренностей, желтухѣ, гипохондрическихъ и почечуныхъ припадкахъ; по утверженію *Крацца* дѣйствительнѣе дикаго цикорія—*leont. taraxacum*; *Бокконе* съ успѣхомъ давалъ въ грудномъ колотѣ—*pleuritis*; *Тиссонъ* въ воспаленіяхъ груди, печени и кишекъ желчнаго свойства—*phlegmasiæ biliosae*. *Соболевскій* и другіе писатели утверждаютъ, что это растеніе умножаетъ молоко у роженицъ и кормилицъ; — молодые листы онаго, смѣшанные съ другою зеленью, варятъ въ похлебкахъ и другихъ кушаньяхъ; въ салатахъ тоже употребляютъ.—Снаружи, толченая свѣжая трава и вареная прикладывается въ припаркахъ, разводящихъ твердыя болящія опухоли, отъ загустѣнія пасоки или крови произходящія; и въ воспалительной грудницѣ тоже полезна.

Количество. Свѣжо-выжатый сокъ дается отъ 1—3 унцій съ сывороткою; или горсть

свѣжей травы варять въ 1 фунтъ мясной похлебки.

Примѣчанія. 1. Траву эту ѣсть всякая скотина охотно, особливо зайцы и кролики.

2. Касательно врачебнаго и домашняго употребленія, во всемъ почти сходствуетъ съ огуречникомъ—*Boorrago offic.*

3. Нѣкоторые утверждаютъ, что это свѣжее растеніе умножаетъ грудное молоко.

К О Н Е Ц Ъ.