


Ричард Хеллэм

Консультирование
по проблемам
тревожности



Ричард Хеллэм

**Консультирование
по проблемам
тревожности**

**Richard Hallam
Counselling
for Anxiety Problems**



ООО «ПЕРСЭ»

Институт консультирования и системных решений
Москва
2009

УДК 159.9
ББК88.4
Х 36

Под научной редакцией,
доктора психологических наук, профессора
В.М. Астапова
Перевод: В.М. Астапов, А.С. Григорович
Редактор: Ю.М. Кузнецова

Хеллэм Р.

Х 36 Консультирование по проблемам тревожности. - М.: ПЕР СЭ;
Институт консультирования и системных решений - 191 с.

ISBN 978-5-9292-0184-4 (ПЕР СЭ)

ISBN 978-5-91160-019-8 (Институт консультирования
и системных решений)

© Richard Hallam, 1992
© В.М. Астапов, редактирование, перевод и 2009
© А.С. Григорович, перевод, 2009
© ООО «ПЕРСЭ», оригинал - макет, оформление, 2009
© Институт консультирования и системных решений, 2009

Научное издание

Хеллэм Ричард

Консультирование по проблемам тревожности.
Художник: П. П. Ефремов
Компьютерная верстка: Ю. В. Балабанов

Лицензия ИД №01018 от 21 февраля 2000 г.,
Издательство «ПЕР СЭ»

129366, Москва, ул. Ярославская, 13, к. 120
тел./факс: (095) 682-60-95, e-mail aperse@psychol.ras.ru
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.П.001292.09.03 от 03.09.2005 г.

Подписано к печати 2.02.09. Формат 60х90/16. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Печ. л. 12. Тираж 2000 экз. Заказ № 1479

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов в ОАО ордена «Знак Почета»
Смоленская областная типография им. В. И. Смирнова.
214000, Смоленск, пр-т им. Ю. Гагарина, 2.

Содержание

1. Теоретические подходы к проблеме тревожности.....	5
Что такое тревожность?.....	5
Тревожность как житейское понятие.....	7
Называние тревожности и формирование «тревожных воспоминаний».....	8
Биологические аспекты проблем тревожности.....	15
Рекомендуемая литература.....	22
2. Генезис проблем тревожности.....	23
Процессы, которые порождают или поддерживают проблемы тревожности.....	25
3. Общие положения эклектического подхода.....	32
Особенности работы с клиентом.....	33
Особенности тревожных клиентов и контракт.....	35
Консультирование проблем тревожности - главные цели.....	38
Первая цель - побудить клиента относиться к своим проблемам осознанно.....	38
Вторая цель - модификация преувеличенной или нереальной угрозы.....	39
Третья цель - развитие уверенности и адаптированности.....	39
Четвертая цель - развитие проблеморазрешающих стратегий клиента.....	40
4. Формулирование проблем тревожности.....	41
Бихевиоральное описание и функциональный анализ.....	42
Когнитивный анализ.....	46
Случай т практики, иллюстрирующий бихевиоральный и когнитивный анализ.....	48
Рекомендуемая литература.....	58
5. Оценка в консультировании по проблемам тревожности.....	59
Методы оценки.....	59
Первые оценивающие интервью.....	60
Развернутая оценка основных проблем.....	63
Схематическое изображение проблем клиента.....	69
Постановка целей и определение плана вмешательства.....	75
Рекомендуемая литература.....	75
6. Принципы конфронтации.....	78
Оценка выраженности стимула.....	80
Выбор отправной точки.....	82
Выбор способов конфронтации.....	84
Ориентирование клиента на эффективную конфронтацию.....	84

Планирование терапевтической встречи.....	86
Частота встреч.....	89
Завершение программы.....	89
Дополнительные замечания о работе с тревожностью.....	90
Традиционные методики.....	92
Рекомендуемая литература.....	97
7. Приступы паники и сопутствующие фобии.....	98
Случай паники и их описание.....	98
Последствия паники.....	100
Оценка паники и сопутствующих.....	105
Дополнительные рекомендации по применению конфронтационных методов.....	108
Саморегуляция при конфронтации с тревожащими ситуациями.....	117
Вмешательство: когнитивное реструктурирование.....	125
Страх болезни.....	137
Рекомендуемая литература.....	142
8. «Обеспокоенность» социальная тревожность и другие виды распространения проблемы тревожности.....	143
Обеспокоенность потенциальными опасностями в будущем.....	143
Нерешительное и непостоянное и неэффективное решение проблем.....	145
Дисфункциональные установки.....	148
Неспособность расслабиться.....	153
Диффузная социальная тревожность.....	162
Рекомендуемая литература.....	170
9. Сложные вопросы и завершение отношений консультирования.....	172
Сложности ориентирования клиента.....	172
Препятствия для адекватной оценки.....	173
Что может помешать успеху вмешательства.....	180
Завершение консультирования.....	183
Рекомендуемая литература.....	184
Приложение А. Материалы дня начинающих: анкеты и книги.....	185
Приложение Б. Тезисы по тревожности.....	186
Список литературы.....	189

Теоретические подходы к проблеме тревожности

Эффективное консультирование по проблемам тревожности подразумевает хорошую ориентацию в теоретических подходах. В первой главе анализируется содержание термина «тревожность» как языкового концепта и обосновывается различие между явлениями, *называемыми* беспокойством, и *вызывающими* беспокойство. Рассмотрение вопроса о биологических сторонах тревожности завершает главу.

Что такое тревожность?

Обычно мы используем слово «тревожность» не заботясь о его точном значении. Мы можем так говорить о ком-то, кто сам не считает, что его поведение выдает тревогу. Иногда мы используем этот термин, чтобы объяснить, почему мы повели себя определенным образом («наверно, это из-за тревоги»). По моему мнению, не следует представлять, что есть особая *сущность* - тревожность - и ее наблюдаемые проявления. В житейском употреблении содержание этого слова имеет отношение к сложному динамичному взаимодействию между человеком и ситуацией. Формами такого взаимодействия могут быть (1) поведенческие и физиологические реакции, вызванные непосредственно ситуацией; (2) оценка реакций и их последствий; (3) намерения человека в конкретной ситуации; и (4) оценка доступных в данной ситуации ресурсов. Сама по себе ситуация может быть неприятна (или сигнализировать о возможности неприятных последствий), но при этом провоцируемая ею тревожность возникает не автоматически, а в зависимости от того, насколько человек склонен к предвосхищению неприятностей. Здесь важно то, что человек *чувствует*, однако, как было выше отмечено, термин может использоваться и в тех случаях, когда сам человек о своих переживаниях не сообщает.

Признав, что житейское понятие «тревожность» описывает не только собственные переживания человека, следует предположить, что вряд ли мо-

жет быть обнаружен такой набор психологических или биологических факторов, которые ее однозначно определяют. Тревожность нельзя рассматривать как исключительно объективное состояние организма. Разные люди могут использовать это по-своему, а один и тот же человек - по-разному в разных случаях. Короче говоря, неточность и приблизительность содержания слова «тревожность» и производных терминов позволяют применять их для широкого круга явлений. При необходимости человек может давать более тщательную оценку ситуации, учитывать собственные намерения, отношение со стороны окружающих, всевозможные переживания и чувства.

Таблица 1.1

Общее между словами, обозначающими тревожность

Компоненты негативного опыта, описываемые терминологической последовательностью с полюсами «напряжение» - «ужас»
Осознание неизбежной опасности или вреда, вне зависимости от того, могут ли действительно быть определены его источники
Опыт физических ощущений, преимущественно связанных с активацией вегетативной нервной системы
Сильная потребность в безопасном убежище
Снижение контроля над мелкой моторикой
Беспокоящие или неприятные мысли, которые плохо поддаются контролю
Неспособность мыслить логически или действовать скоординировано особенно в нестандартных, конфликтных или угрожающих ситуациях

NB: «Тревожность» *других* определяется на основе (1) наблюдаемого поведения, соответствующего вышеперечисленным характеристикам; (2) возникновения переживаний напряженности или небезопасности в ситуации общения; и (3) других признаков, таких, как выражение лица или тембр голоса.

Общее между словами, обозначающими тревожность, представлено в Таблице 1.1. Широта диапазона значений свидетельствует о разнообразии психологических и биологических факторов, определяющих тревожность. Поэтому фактически все направления теоретической психологии – учения о врожденных биологических защитах, моделях стресса, самосознании, социальной оценке, поведении, когнитивных способностях, решении проблем, обучения и т.д., - могут быть адекватны при описании тревожности.

Тревожность как житейское понятие

Человек, называя себя тревожным, не только пытается дать определение своего умонастроения, но и стремится к определенным целям в социальном взаимодействии. То неприятное, что связано с тревожностью, заставляет обратить на себя внимание и, таким образом, ведет к признанию наличия проблемы. Неспособность распознавать собственную «тревожность» делает человека неготовым к развитию ситуации. Знание о том, что он «тревожен», заставляет окружающих учитывать возможность непродуктивности взаимодействия. С другой стороны, тревожный заручается поддержкой. Неслучайно, что мы в наибольшей степени доверяем наиболее спокойным людям - таким, как пилотам пассажирских самолетов. Для них сказать «я тревожусь» означает: «вот что-то, с чем я раньше не сталкивался и еще не думал, что с этим делать». Судя по голосу, который мы при этом слышим, никакой помощи не требуется.

Далее, мы полагаем, что человек *учится* называть тревожность и говорить о ней. Это значит, что наблюдаемый здесь *вербальный/когнитивный* процесс в некоторой степени независим от процессов, порождающих переживания, определяемые нами как тревожность. Без сомнений, когда мы овладеваем речью и соответствующими понятиями, вербальная информация может действовать как мощный стимул беспокойства. Информация о том, что только может случиться, может вселять в нас ужас. При дальнейшем изложении мы увидим, что контроль основанных на биологических механизмах реакций со стороны процессов, имеющих символическую природу (таких, как умозаключение, предположение или интерпретация) может рассматриваться как причина тревожности, становящейся проблемой.

Вербальные и когнитивные способности, позволяющие нам назвать наши эмоции и отнести к ним с точки зрения других людей, развиваются под воздействием субкультуры семьи и социальной среды в целом. Родители отличаются, например, по степени настойчивости, с которой они обращают внимание своих детей на потенциальные угрозы («*Никогда* не разговаривай с незнакомыми людьми») или на физические ощущения и чувства («Ты чем-то расстроен - такой возбужденный, взволнованный»). Указания родителей и реальный жизненный опыт определяют чувствительность ребенка в отношении тех угроз, которые в нашей культуре рассматриваются как существенные. Наряду с биологически унаследованными страхами (боязнь темноты, высоты, взгляда глаза в глаза, маленьких животных и т.д.), есть и постоянные источники

тревоги. Они касаются нашего физического выживания (смерть, болезнь, материальная безопасность), а также опасений по поводу потери других, страха отрицательной оценки и отвержения со стороны окружающих. По-видимому, значительные индивидуальные различия в том, насколько человек хочет или может признаваться в такого рода страхах, связаны с «эмоциональным воспитанием», полученным в детстве. Например, известно, что эмоциональное воспитание мальчиков и девочек различается.

Предлагаемое мною различие между житейским понятием эмоции и теми явлениями, которые ему соответствуют, имеет некоторые интересные следствия. Иногда то, что говорит человек о наличии/отсутствии угрозы, не соответствует его поведению. Один человек может выглядеть скованным и отчужденным, но отрицать наличие тревожности. Другой может постоянно волноваться о том, что может произойти, но ничего при этом не предпринимать, а свое волнение считать бессмысленным. Третий может чувствовать тошноту или сердцебиение в реально напряженных ситуациях, но отрицать, что ситуация угрожающая, или отрицать, что испытывает тревогу. Эти примеры подчеркивают сложность проблем тревожности. Признаваемому большинством исследователей несоответствию между вербальными/ когнитивными выражениями «тревожности» и другими поведенческими и физиологическими проявлениями эмоций достаточно сложно дать теоретическое объяснение. Можно рассматривать множество факторов, но на данном этапе мы обратимся к описанию следствий, вытекающих из различения «называния эмоции» и «того, что называется».

Называние тревожности и формирование «тревожных воспоминаний»

Когда мы анализируем собственное поведение и поведение других людей, используя слова для того, чтобы назвать ситуацию и сообщить о ней, слова вмешиваются в анализ и влияют на него. Они возникают в виде звуковых паттернов и образуют ассоциации с другими воспринимаемыми компонентами ситуации. Как вид ночного кладбища вызывает ощущение чего-то зловещего, так и слова приобретают способность напоминать о тех поведенческих и физиологических реакциях на ситуацию, с которыми они ассоциировались, и начинают жить собственной эмоциональной жизнью. Слово, или вербальное описание, объединяющее в целое элементы вызывающей страх ситуации, сохраняется вместе с памятью об этой ситуации, и помогает воспроизведению, если человек под воздействием инструкции или собственной фантазии захочет ее припомнить.

Звуковые паттерны, которыми являются слова, связаны с огромным количеством пережитых нами конкретных ситуаций. С другой стороны, они представляют собой символы языка, благодаря которому мы рассуждаем, планируем, упорядочиваем, категоризируем и т.д. Наша способность уста-

навливать на вербальном уровне ассоциации между не связанными во времени и пространстве событиями открывает широчайшую возможность «запугивать себя до потери рассудка». Мы можем тревожиться или бояться, когда именно этого делать не следует. Одна из форм ассоциации возникает на основе физического сходства стимулов-элементов первоначального опыта переживания страха. Этот механизм (*генерализация стимулов*) задействует физические свойства стимулов. Садовый шланг может быть воспринят как змея; звуки некоторых сирен могут напоминать о сигнале воздушной тревоги. Тревожные воспоминания могут возникать и из-за того, что на письме некоторые слова похожи по своему написанию (например, **eyelash** и **car crash**¹).

Вторая форма ассоциации основана на рассуждении и логическом выводе. Так как употребление в пищу сырых яиц опасно, поскольку является причиной сальмонеллеза, можно сделать вывод о том, что и яйца всмятку вызывают болезнь или смерть. Это одна из форм *обобщения символов*. Несомненно, способность устанавливать связи между событиями на основе их абстрактных признаков относится к числу важнейших когнитивных свойств. Во многих случаях вывод подтверждается опытом; если это не так, то наша предвосхищающая тревожность оказывается неоправданной и бесполезной. Выводы о неприятных событиях могут быть основанными на дезинформации, религиозной вере или общепринятом суеверии. В таких случаях ассоциации между репрезентациями соответствующих событий в нашей памяти созданы другими людьми, а мы присваиваем их произвольно. Значительная часть этого культурно передаваемого знания обладает высокой ценностью.

При другой форме генерализации символов устанавливаются связи с событиями, изображенными в книге или на картине, или событиями, которые мы наблюдаем со стороны. При этом мы принимаем роль другого человека и реагируем так, как будто это случилось с нами.

Тревожные воспоминания представляют собой ассоциативную сеть, в которой установлены семантические связи между представлениями о ситуации и реакциями на нее. Некоторые особенности тревожных воспоминаний определяют предрасположенность к возникновению связанных с тревожностью проблем. Деятельность памяти, побуждаемой обстоятельствами или произвольным усилием, ведет к укреплению ассоциаций между элементами и формированию новых связей в соответствии с описанным принципом генерализации. Требуется всё меньше и меньше стимулов, чтобы вызвать воспоминания, и спустя какое-то время стимуляция одного элемента приводит к активизации всей сети. Например, тревожные воспоминания активизируют репрезентации стимула, отражающего физическое возбуждение - учащенное сердцебиение, прерывистое дыхание, потение и дрожь. Эти стимульные элементы могут быть вызваны и обычными повседневными действиями, например, когда человек взбегает по лестнице или выпивает чашку крепкого кофе. Физи-

¹ В переводе: «ресница» и «автокатастрофа» - Прим. пер.

ческое возбуждение, вызванное физическими упражнениями, подобно физическому возбуждению, связанному с тревожностью. Поэтому упражнения могут вызывать тревожные воспоминания. Связанные друг с другом элементы тревожной памяти восстанавливаются и вспоминаются, если затронут один из них, например: «Этот быстрый пульс означает, что у меня сердечный приступ». Из-за вполне безвредного ощущения человек может впасть в настоящий ужас.

Получается, что для того, чтобы справиться с тревожностью, человеку достаточно выявить структуру, образуемую тревожными воспоминаниями, и вычленив не соответствующие требованиям логики или реальному опыту элементы. В подобном рассуждении содержится зерно правды, но здесь игнорируются некоторые аспекты психологии человека, такие, как *осознанность, привычки, настроения, физические и личностные факторы*.

Осознанность

Ассоциативные связи в тревожной памяти не всегда доступны для исследования. Например, существуют глубоко укорененные в культуре представления (что происходит после смерти или что такое «безумие»), которые принимаются без какого-либо сознательного исследования, и вообще не могут быть предметом для рациональных рассуждений. Некоторые ассоциации просто находятся в предсознании и поэтому могут выявляться в процессе консультирования. Так, ситуация могла связаться с каким-то мелькнувшим образом, скажем, визуальной картиной разрывающегося кровеносного сосуда. Клиенту будет трудно сказать, какие мысли или образы связаны с этой картиной, поскольку она мелькнула так быстро и возникла неизвестно почему. Облегчать доступ к предсознательным ассоциациям может управляемая фантазия, которую проводят в состоянии глубокого расслабления или гипнотического транса. Если воскрешаются тревожные воспоминания, могут возникать совершенно неожиданные ассоциации, особенно когда клиент как бы вновь переживает некие события. Например, при помощи управляемой фантазии человек, который испытывал страх «сонного паралича» (состояние, наблюдаемое в момент пробуждения, когда «разум бодрствует», а тело остается неподвижным как во время сна), припомнил несколько событий из прошлого, которые были связаны с его страхом. Представив себе на сеансе управляемой фантазии состояние паралича, этот клиент обнаружил, что теряет способность говорить и чувствует себя застывшим посреди безлюдного пространства небытия. Ощущение насильственной обездвиженности возникло в связи со следующим всплывшим образом: клиент вспомнил, что когда он был подростком, в драке противник, сдавив горло, почти задушил его.

Сложность доступа к таким образам может объясняться тем, что они настолько неприятны, что активно подавляются защитными механизмами. Возможно также, что, являясь воспоминаниями далекого детства, они не бы-

ли в свое время закодированы (так как ребенок не вербализует свой опыт), и поэтому их трудно извлекать.

Привычка

По-видимому, ассоциативные связи между элементами тревожных воспоминаний будут укрепляться каждый раз, когда человек заново сталкивается со своей «тревожностью». Например, крайне неприятный «приступ паники» (см. Главу 7), который может длиться до тех пор, пока человек не укроется в безопасном месте, очевидно усиливает ассоциации между всеми вовлеченными элементами (физические ощущения, пугающие мысли, характеристики среды, избегание и т.д.). Кроме того, как только «приступ паники» кодируется как неприятное переживание, которое следует избегать любой ценой, каждый намек на возможность его повторения связывается с приступом и становится новым элементом памяти. Чем больше тревожность беспокоит человека, тем тщательнее будет обследоваться внешняя и внутренняя (телесная) среда, с целью обнаружения сигналов, свидетельствующих о приближении приступа паники. Вследствие этого возникает озабоченность телесными ощущениями или тем, чтобы не попадать в такие места, которые расцениваются как опасные с точки зрения вероятности возникновения паники.

Известно, что сознательное стремление *не* думать и *не* помнить о своей тревоге ведет к укреплению и постепенному расширению тревожной памяти. Человек избегает тревожащих ситуаций и пытается обуздать страшные фантазии. В целях поддержания чувства безопасности он отказывается от любой активности, вызывающей «тревожность». И все это ведет к тому, что в память не поступает новая информация, которая могла бы способствовать позитивным изменениям.

Не удивительно, что, по мере того, как умножаются проблемы, связанные с тревожностью, она сама превращается в трудно преодолимую привычку. Тревожность становится иррациональной, так как выраженность переживаемого беспокойства не соответствует степени реальной угрозы. Не соответствуя собственным рациональным представлениям о том, какая степень беспокойства является «нормальной» или «допустимой», человек начинает ощущать себя «глупым», «невротиком» или «потерявшим контроль».

Вследствие этого одним из механизмов усугубления связанных с тревожностью проблем является постоянный рост числа сигналов опасности (устанавливаются связи между новыми ситуациями и случаями переживания тревожности) и неспособность к анализу реальности (если поступает сигнал об опасности, наблюдается бегство из ситуации). Другой механизм действует по принципу порочного круга (см. Главу 2). Порочный круг возникает, когда реакция человека на тревожность не улучшает, а стабилизирует провоцирующую тревожность ситуацию. По указанным выше причинам нельзя выйти из порочного круга, просто поняв, что могло вызвать проблему тревожности.

Обычно для этого требуется применение бихевиоральных техник, подразумевающих разрушение устоявшихся привычек.

Настроение

Чем больше доминирует тревожность или депрессивное настроение, тем бóльшая трудность возникает у клиента при попытке применить позитивное мышление и конструктивные защиты. В особо сложных случаях негативное мышление серьезно препятствует попыткам изменить восприятие клиентом ситуации. Находящиеся в постоянном волнении люди всегда способны увидеть новый повод для тревоги или еще раз отвергнуть доказательства того, что их оценка угрозы завышена. В некотором отношении негативное мышление кажется вполне обоснованным: в конце концов, мы все умрем, а перед этим нас могут ждать страдания и мучительные болезни. Однако даже такие жестокие истины могут быть переосмыслены, особенно когда нет причин считать, что клиенту не повезло больше, чем кому-то другому.

Сильно взволнованные или расстроенные клиенты нуждаются в более продвинутой интервенции, включающей медикаментозное лечение, а также более интенсивном или продолжительном консультировании. Однако применяются и описанные в данном руководстве методы. Особое внимание следует уделить организации вмешательства. Клиент вряд ли успешно справится с проблемой тревожности, когда, например, у него нет возможности находиться в безопасности, или возникают проблемы на работе или в личных отношениях из-за недостаточной уверенности в себе, или в его жизни присутствует постоянно действующий стрессор. Вообще говоря, к этим проблемам следует обращаться до начала, или, по крайней мере, одновременно с курсом консультирования.

Физические факторы

Обязательно следует ознакомиться с медицинской историей клиента и при любом подозрении на соматическую болезнь его нужно направлять к врачу. Многие проблемы тревожности усложняются физическими болезнями. Они могут быть такими простыми, как плохое зрение, или такими сложными, как гормональные сбои. Важно, чтобы клиент понимал связь между своим психологическим состоянием и физиологическими факторами, когда такое влияние присутствует. Информация о физическом состоянии может быть необходимой, когда возникают необычные ощущения или неадекватно оценивается серьезность состояния здоровья. В некоторых случаях выявляются излечимые болезни. Список физических факторов, о которых должен знать консультант, приведен в Таблице 1.2.

Общей проблемой тревожных клиентов является учащенное дыхание, последствия которого объединяются под названием *синдрома гипервентиля-*

ции. Они вызываются непатогенными колебаниями соотношения кислорода и углекислого газа в крови. Проявления синдрома разнообразны. Поскольку эта тема сама по себе важна (некоторые теоретики утверждают, что именно гипервентиляция лежит в основе большинства проблем, связанных с тревожностью), то ниже она будет рассмотрена более подробно (см. Главу 7). Есть специальные терапевтические программы, когда человека обучают более медленному темпу и правильному использованию диафрагмального и грудного дыхания.

Личность

Относительно немного известно о личностных предпосылках развития тревожности. Однако есть основания утверждать, что существует генетическая предрасположенность к тревожности. В течение жизни проявление такой генетической уязвимости характеризуется нестабильностью. Так, приступы паники редко наблюдаются у детей, а многие взрослые, у которых они возникают, раньше могли не наблюдать у себя признаки «нервозности».

В проблемы тревожности вовлечено множество психологических процессов, поэтому в форме их проявления могут отражаться многие особенности личности клиента. Средства, с помощью которых человек приспосабливается к своей тревожности, не следует принимать за ее причины. Например, независимые и коммуникабельные люди могут стать замкнутыми и зависимыми, пережив серию серьезных приступов паники.

Я уже отмечал большой вклад мыслительных процессов в развитие проблем, связанных с тревожностью. Поэтому на эффективность консультирования значительное влияние оказывает то, насколько клиент способен к следующему: выделять существенное; мыслить гибко, в противоположность дихотомическому мышлению, не учитывающему никаких цветов, кроме черного и белого; избавляться от размышлений о маловероятных отрицательных исходах ситуаций; переносить неопределенность; иметь адекватную самооценку. По большому счету, консультант помогает клиенту развить эти способности. Обсуждая конкретные случаи консультирования, мы убедимся в этом.

Таблица 1.2. Основные соматические заболевания, проявления которых воспринимаются как тревожность

Гормональные нарушения

Гипертиреозидизм – следствие избыточной секреции щитовидной железы.

Гипопаратирео(ид)зм – следствие снижения секреции околощитовидной железы.

Синдром феохромоцитомы Кушинга – следствие повышенной циркуляции кортизола, редкая опухоль, вызывающая чрезмерную секрецию катехоламина (адреналина и норадреналина).

Гипогликемия – недостаток сахара в крови в острой или хронической форме, вызывающий слабость, потение, головокружение, тремор и т.д.

Височная эпилепсия – ощущения, возникающие вследствие возбуждения коры.

Сердечно-сосудистые нарушения – проявляются в ощущениях сердцебиения и сердечных перебоев.

Нарушения в равновесии – проявляются как головокружение, тошнота, неустойчивость или падения*.

*См. также *McCue и McCue (1984)*.

Биологические аспекты проблем тревожности

Представление о том, что многие аспекты тревожности определяются биологически, имеет надежные обоснования. Млекопитающие разных классов и видов отвечают на угрозу нападения или вторжения на свою территорию схожими способами. Однако под этим видимым сходством скрываются существенные различия. Избегание и нападение – две главных формы защиты, и они могут чередоваться. То же самое можно сказать и о физиологических изменениях, подготавливающих организм к защитной реакции. Мы можем наблюдать их чередование и у клиентов с проблемами тревожности; при этом между избеганием угрожающей ситуации и склонностью к агрессии на человека или вещь (или на себя), которые воспринимаются как источник угрозы, может возникать конфликт.

У людей рациональная оценка информации значимо влияет на проявление простых «инстинктивных реакций». Однако в очень опасных ситуациях наши реакции рефлекторны и плохо контролируемы: например, крик или испражнение. Даже в умеренно напряженных ситуациях, типа угрозы опоздать на поезд, мы склонны «впадать в панику» вместо того, чтобы спокойно подумать, как перейти с одной платформы на другую.

Существуют различные взгляды на то, как врожденные и приобретаемые (главным образом, культурные) аспекты проблем тревожности связаны друг с другом. Согласно одной точке зрения, действие культуры заключается всего лишь в предпочтении одной «базовой» эмоциональной реакции перед другой. Однако более верным кажется представление о том, что это двусторонние отношения, благодаря которым так называемые «инстинктивные эмоциональные реакции» на самом деле приобретаются в процессе социального научения. Это хорошо соотносится с проблемами тревожности, когда в наблюдаемом поведении отсутствуют признаки страха. С другой стороны, проблемы, связанные с тревожностью, должны рассматриваться как затрагивающие личность в целом и взятую в социальном контексте. Это так, поскольку большинство форм активности человека разворачивается между полюсами оппозиции безопасность-опасность. Люди постоянно стремятся к безопасности и защищенности, чтобы избегать угроз реальных или предполагаемых болезней, бедности, экологических катастроф, старости и т.д.

С биологической точки зрения, диапазон поведенческих паттернов, охватывающих континуум безопасность-опасность, может быть разделен на три зоны: безопасность, настороженность и реакция на уже возникшую опасность. Рассмотрим последовательно каждую зону.

Безопасность

Безопасность является важным условием успешного отражения угрозы. Чтобы исследовать мир, маленький ребенок нуждается в присутствии родителя. Взрослый человек ощущение безопасности получает из многих источников – например, стабильные отношения, дом, близкие друзья, обеспечивающая финансовую безопасность профессия. Работая с проблемой тревожности, консультант неявным образом предлагает клиенту себя в качестве источника безопасности. При использовании методов, направленных на помощь клиенту в открытом столкновении с угрожающей ситуацией, консультант обеспечивает безопасность в явном виде. *Сигнал безопасности* – технический термин, обозначающий стимул, который снижает выраженность защитного поведения в пугающей ситуации. Сигналы безопасности работают, по крайней мере, двумя способами:

Во-первых, сигнал указывает на то, что угроза менее вероятна или менее серьезна. Например, в присутствии консультанта клиент более рационально оценивает реальную опасность и прислушивается ко мнению консультанта относительно этой угрозы. Или же клиент может чувствовать себя в безопасности, нося амулет или выполняя некие ритуальные действия, которые благодаря прошлому опыту ассоциируются у него с отсутствием угрозы. В качестве сигнала безопасности может выступать что угодно, если это объективно или субъективно снижает степень или вероятность неприятных событий.

Во-вторых, сигнал безопасности способен редуцировать сами защитные реакции. Строго говоря, это не сигнал, а средство подавления. «Рука на плече» – обычный способ успокоить волнующегося человека. Прикосновение редко используется консультантами (потому что это может быть неправильно истолковано или вызвать неприятные ощущения), но все-таки иногда применяется в консультировании. Другие сигналы безопасности данного типа представляют собой противодействующие защитам реакции. С этой целью в терапии использовались прием пищи, агрессивные действия или намеренное расслабление. В основе таких приемов лежит процесс *«реципрокного торможения»*.

Таким образом, определенные особенности проблем тревожности могут объясняться стремлением к безопасности. Клиенты могут рассказывать, что они чувствуют себя более безопасно, одевая темные очки, нося с собой пузырек с успокоительным (даже если никогда его не принимают) или толкая тележку в магазине. Консультанту нужно попытаться обнаружить главные для

клиента источники ощущения безопасности и защищенности и максимально их задействовать. Возможно привлечение компаньона или помощника для того, чтобы извне обеспечивать переход между безопасностью и опасностью до тех пор, пока благодаря росту доверия к себе клиент не научится двигаться по этому маршруту самостоятельно. Как уже было сказано, клиенту необходима надежная точка опоры, благодаря которой он сможет исследовать угрозу и противостоять ей. Если оказывается, что такие опоры исчезают (например, вследствие увольнения, бездомности, развода, судебного преследования), то содействие в решении этих практических проблем будет лучшей помощью, которую может оказать консультант на первом этапе работы с клиентом.

Настороженность

Между безопасностью и опасностью находится большая серая зона, где потенциальная угроза сочетается с неочевидностью лучшего способа действий. Любой, кто наблюдал за клюющими хлебные крошки птицами, замечал чередование пищевого поведения и поиска в окружающей среде определенного движения или звука. Если соответствующий стимул превышает некий порог, птицы взлетают. Подобным образом, если боящегося змей человека просят в терапевтических целях подойти к живой змее, он, вероятно, будет попеременно демонстрировать то позу расслабления, то характерную позу страха (легкий наклон, сгорбленные плечи, зафиксированный на угрожающем объекте взгляд), то явную готовность убежать. Тот же смысл имеет поза клиента, сидящего на краешке стула - так проявляется готовность применить маневр избегания. Избегание и другие защитные реакции связаны с телесными процессами, физиологически обслуживающими ощущение тревоги.

Реагирование на фоне настороженности несколько отличается от реакции на непосредственную опасность. Угрожающее событие еще не произошло и вообще неизвестно, когда это будет, насколько плохо это будет и можно ли будет с этим разобраться. На уровне организма происходит настройка на все изменения стимула и ориентация на источник этих изменений. Повышенная готовность к реакции и чувствительность к изменениям стимула или сигналам тревоги немедленно сказывается на протекании организмических процессов. Сердечный ритм замедляется, периферийные кровеносные сосуды сжимаются, препятствуя току крови, и, таким образом, увеличивая кровяное давление. Эти изменения физиологических функций позволяют подготовить организм к защитному действию; увеличивается приток крови к скелетным мышцам, глюкоза и жирные кислоты высвобождаются из тканей для того, чтобы обеспечить энергию.

Следует заметить, что в контексте проблем тревожности состояние настороженности выглядит как непрерывный поиск опасности и многократные прерывания нормального течения процессов в организме. Движения утрачивают плавность, напрягаются мышцы, затрудняется деятельность па-

мости и способность к концентрации, поскольку внимание перегружено потоком нерелевантной информации. Дыхание становится неравномерным, нарушаются пищеварительные, выделительные и сексуальные функции. В значительной степени данные изменения являются результатом активации *симпатической составляющей вегетативной нервной системы*, благодаря чему организм готовится к решительным действиям. Именно эти изменения становятся причиной многих жалоб тревожных клиентов.

Реакция испуга может быть вызвана любым внезапным изменением стимула. При этом если угроза знакома, то внимание будет направлено на поиски ее признаков. Так, внимание боящегося змей человека будет привлекаться к предметам типа свернутых веревок. Соматическая или психическая болезнь часто представляют собой основной источник угрозы для тревожных клиентов. Это означает, что клиенты склонны отыскивать признаки ненормальности в собственных физических ощущениях, реакциях или психических процессах. К сожалению, такое чрезмерное внимание может нарушать обычное поведение и вызвать физиологические реакции, которые оцениваются как ненормальные. Возникающий порочный круг усугубляет проблемы, связанные с тревожностью.

В состоянии активации человек может суетливо двигаться, вскакивать с места, бесцельно ходить, притопывать ногами. Поводом для обращения к консультанту могут быть жалобы клиента на мышечную напряженность и неспособность расслабиться. Такое перевозбужденное состояние может сопровождаться бессонницей.

По результатам клинических исследований пациентов мы знаем, что именно *надвигающаяся* опасность или *угроза* срыва в жизни человека чаще всего связаны с жалобами на тревожность. Напротив, депрессивное состояние будет следствием потери чего-либо ценного (например, здоровья), а не угрозы этой потери. Важной целью работы консультанта является усиление ощущения безопасности у клиента посредством помощи в осмыслении угрозы, подготовке к ней и, по возможности, ее нейтрализации. Угроза может быть настолько ужасной, что невозможно о ней думать; однако только интеллектуальное усилие способно обеспечить представление об опасности, необходимое для подготовки к ее отражению. Мыслительная работа по описанию угроз, их наименованию и оценке альтернатив могут значительно снижать выраженность беспокойства.

Реакция на опасную ситуацию

Теперь я рассмотрю различные реакции страха в опасной ситуации, а также биологические основы отношения к определенным видам стимулов как пугающим.

Реакции страха

У млекопитающих, в том числе людей, наблюдаются два основных типа реакции страха:

- оцепенеть и онеметь;
- отпрянуть, закричать, убежать.

Вторая реакция более привычна, но нам случается и сказать о ком-то, что он «онемел от страха» или «застыл в испуге». В последнем случае человек не может двигаться (хотя парализация мускулов может быть кратковременной), говорить и кричать; тело дрожит, мерзнет, цепенеет и становится невосприимчивым к боли.

Характерные особенности сильной реакции второго типа перечислены в Таблице 1.3. Эти проявления не обязательно наблюдаются одновременно; они могут сменять друг друга; так чередуются страх и агрессия. Центральным компонентом субъективного переживания страха, без сомнения, является ощущение сильно выраженного телесного изменения, которое вызывается деятельностью вегетативной нервной системы. Называемые клиентами страхом, паникой или тревогой ощущения включают в себя широкий спектр состояний: снижение остроты зрения, чувство слабости, затрудненность дыхания и др. Иногда на первый план выходит ощущение ужаса, иногда – стремление убежать, а иногда – неприятные физические реакции и ощущения. Все эти аспекты страха/тревожности могут возникнуть как отдельно друг от друга, так и одновременно. Один клиент говорит, что находится в панике, и при этом спокойно сидит на стуле. Другой отрицает, что испытывает тревогу, демонстрируя при этом поведенческие или физиологические признаки страха.

Таблица 1.3 Сильный страх - реакция избегания

Чувство ужаса
Стремление убежать и спрятаться
Крик
Сильное сердцебиение
Повышенное кровяное давление
Мышечное напряжение
Учащенное дыхание
Бледная потная кожа
Стоящие дыбом волосы
Сухость во рту
Позывы к мочеиспусканию или испражнению
Расширенные зрачки
Слабость в руках и ногах
Чувство дурноты, обморок

Стимулы, вызывающие страх. У млекопитающих разных видов страх вызывают различные ситуации. Номенклатура страхов может быть сопостав-

лена с описанием среды обитания конкретного биологического вида. Потенциально физическую угрозу представляет собой любой компонент окружающей среды, также существует угроза, исходящая от других животных, в том числе, представителей собственного вида. Человек биологически предрасположен к угрозам, перечисленным в Таблице 1.4. Имеются индивидуальные различия в степени данной предрасположенности, кроме того, ее выраженность зависит от привычки и способности к когнитивной обработке.

Скорее всего, страхи младенцев определяются преимущественно именно биологической предрасположенностью. Кроме того, прежде чем сформирована взрослая рациональность, дети легко поддаются влиянию пугающей символической информации типа историй о призраках или страшных изображений. Обычно младенческие страхи исчезают в дошкольный период, однако некоторые из них (например, боязнь животных) усиливаются и отмирают позже. Множество страхов и фобий взрослых людей возникают в детстве. Боязнь незнакомцев может трансформироваться в застенчивость. Боязнь крови и ран или маленьких животных также часто возникает в детские годы. Подробный опрос иногда выявляет наличие в раннем опыте чрезвычайно неприятных переживаний. Примером может служить ситуация, когда на сидящего в коляске младенца с лаем нападает собака. В подавляющем большинстве случаев инфантильная боязнь животных отмирает, но при подобных неблагоприятных условиях она становится стабильной.

Таблица 1.4. Биологическая предрасположенность к угрозе

Физические угрозы

- Чрезвычайные холод и жара
- Очень громкие звуки
- Внезапная потеря опоры
- Боль
- Высота
- Освещенные открытые пространства
- Темнота
- Заключение в маленьких замкнутых пространствах
- Новые неизвестные объекты, места или ощущения
- Неожиданные движения
- Маленькие животные (например, змеи или пауки)

Социальные угрозы

- Незнакомые люди (особенно у младенцев 8-24 месяцев)
- Контакт/близость (со стороны незнакомых людей)
- Быть объектом наблюдения (особенно пристальный взгляд)
- Одиночество (особенно у маленьких детей)

Реализация опасности сама по себе не может привести к сильной защитной реакции у представителей определенного биологического типа. Мы с раннего возраста учимся, как нужно избегать повреждения, сопротивляться враждебности, отклонять критику. Было высказано предположение, что в лю-

бой потенциально угрожающей ситуации мы в первую очередь оцениваем размер угрозы и ресурсы, которыми располагаем для ее преодоления. Нет необходимости в том, чтобы всегда эта оценка была точной и осознаваемой, хотя иногда она может быть такой, если мы специально размышляем об угрозе. Нападение или избегание - эмоциональные реакции на угрозу, их можно считать оборонительными действиями, предпринимаемыми против такой опасности, которую нельзя обойти или преодолеть, хладнокровно применив имеющиеся в распоряжении навыки или знания.

Постоянная готовность убежать или застыть - не то состояние, которое требуется для решения задач повседневной жизни. Угрозы, которые порождают такую готовность, характеризуются наличием следующих признаков:

- Неизвестна природа или степень серьезности угрозы;
- Неизвестно, будет ли угроза реализована, или когда она будет реализована;
- Неизвестно, владеет ли человек навыками или материальными /эмоциональными ресурсами для противостояния;
- Имеющиеся в распоряжении средства несочетаемы друг с другом;
- Неизвестно, насколько вредоносны вторичные и косвенные последствия неудачного сопротивления.

Так как отсутствие знания снижает подготовленность, последнюю можно определить как способность знать заранее, как и когда будет восстановлена безопасность. Тревожность подразумевает, что есть надежда на успешное развитие ситуации, ведь если угроза *определенно неконтролируемая*, то скорее мы будем наблюдать смирение и отчаяние.

Усложняет картину то обстоятельство, что выражение испытываемого страха некоторые люди считают признаком потери самоконтроля, душевного расстройства или глупости. Тогда одним из последствий неудачной попытки совладать с угрозой будет страх нарушения психологической целостности или самооценки. Выражать страх опасно. Позже мы увидим, что это – важный аспект проблем, связанными с тревожностью.

Рекомендуемая литература

Всесторонний обзор теоретических подходов к проблемам тревожности сделан Barlow (1988). Краткий обзор этой темы можно найти у Warren and Zgourides (1991). Rachman (1990) предлагает хорошо написанное введение в тему, в том числе теоретические проблемы. Полезные компилятивные работы, описывающие многие подходы – Tuma and Maser (1985), Last and Hersen (1988) и Michelson and Ascher (1987). Концепция сигналов безопасности обсуждается Himadi (1987) и Rachman (1984). Подробное рассмотрение биологических аспектов тревожности приведено Marks (1987). Альтернативный лингвистический/контекстный подход описывает Smail (1984).

Генезис проблем тревожности

Содержание житейского понятия тревожности отсылает нас к процессам, имеющим важное значение для поддержания жизни. Иногда «нормальная тревожность» мешает думать ясно или действовать скоординировано, однако по большому счету, неприятные ощущения, в которых отражается возможность угрозы, побуждает человека подготовиться и эффективно противостоять угрозе. Вопрос заключается в том, почему тревожность становится постоянной, чрезмерной и не полезной. На этот вопрос не существует простого ответа, потому что «тревожность» связана с целым кругом сложнообусловленных обстоятельств и событий. Обсудим некоторые процессы, традиционно рассматриваемые в качестве возможных причин тревожности.

В современных психологических теориях важную объяснительную роль играет такое качество человеческого поведения, как способность к рефлексии. Имеется в виду, что в процессе реализации спонтанных действий какая-то часть нас самих наблюдает, комментирует и направляет эти действия. Например, мы краснеем из-за неловкости, думаем о том, как это выглядит со стороны, а после ведем себя в зависимости от того, что именно подумали. Наблюдается сложная последовательность реакций, и иногда они складываются в порочный круг, что усиливает исходное состояние дискомфорта. Покраснев, мы не успокаиваемся, а заливаемся краской все больше, мы спасаемся бегством, а потом понимаем, что вернуться трудно.

На этом примере можно увидеть непосредственные и долгосрочные последствия первоначальной реакции. Именно такая комбинация непосредственных и долгосрочных последствий и является причиной *распространения проблемы тревожности вокруг изначального очага и ее постоянства*.

Поэтому то, что человек делает, чтобы справиться сначала с угрозой, а затем с последствиями этих действий, имеет определяющее значение.

Рассмотрим сначала, как вызывающая тревогу ситуация может быть разрешена успешно вплоть до превращения в безопасную. Публичные выступления – хороший пример ситуации, которой боится большинство людей. Успешная подготовка к предстоящему выступлению включает в себя следующие этапы:

1. Признать в ситуации публичного выступления наличие реальной, но при этом преодолимой угрозы, которая, таким образом, не отрицается или минимизируется («Это вообще не проблема для меня»), но и не преувеличивается до невообразимости («Меня не заставишь выступить перед аудиторией»);
2. Встретиться с ситуацией – репетировать, чтобы достичь ощущения уверенности, или просто стиснуть зубы и идти вперед;
3. Оценить успешность выступления;

4. Повторить шаг 2, возможно, с некоторыми изменениями в соответствии с оценкой, сделанной на шаге 3.

Большинство из нас успешно прошло все эти шаги, выступая перед публикой, учась плавать или знакомясь с кем-то неприступным, но наиболее наглядным примером все-таки считается публичное выступление. Проблема тревожности, связанной, скажем, со страхом смерти или решением о разводе, представляет собой более сложный случай. Однако легко увидеть, что в обоих этих случаях неспособность пройти описанные выше этапы может породить проблему тревожности. Если угроза не признается или оценивается нереалистично, то реакция на нее не может быть адекватной. Невозможно противостоять и справляться с теми объектами, ситуациями или психическими образами, которые систематически избегаются. Нежелание допустить некоторую степень дискомфорта блокирует выработку нового навыка. Неспособность видеть позитивные изменения подрывает мотивацию к дальнейшим действиям.

Такого рода элементарные препятствия могут принимать множество форм в проблемах тревожности. Найти способ обойти эти препятствия - значит найти ключ к эффективному консультированию. При этом акцент смещается от одного человека, типа проблем и времени к другому. Так, сначала приоритетным может быть оценивание содержания угрозы, личных ресурсов или иррациональных представлений о катастрофических результатах. Затем основное внимание может быть уделено самой угрожающей ситуации – как свести ее к меньшей, поддающейся решению задаче, и, таким образом, создать возможность совладания. На последнем этапе целью консультирования может быть самооценка клиента и мотивация к изменению.

Некоторые руководства используют термин «справиться с тревожностью», как если бы тревожность была высокой температурой, которую нужно сбить. И тренинги релаксации предстают там аналогичным аспирином противоядием. Действительно, некоторые виды вмешательства специально разработаны для изменения поведения, но они предназначены для разрыва порочных кругов (см. стр. 67), которые могут фиксировать проблему. В данном руководстве основное внимание уделяется изменению *причин* тревожности, а не управлению рассматриваемой как психологическое нарушение тревожностью.

Процессы, которые порождают или поддерживают проблемы тревожности

Рассматривать тревожность как целостную эмоциональную реакцию на определенную угрозу - значит неадекватно упрощать положение вещей. Нерешительным, беспорядочным или неконтролируемым поведение может стать по самым разным причинам, и все это будет переживаться как «тревож-

ность». Например, родитель, которого ребенок забрасывает вопросами, не сможет действовать эффективно, пока не «установит контроль» над собой или ситуацией. Конечно, верно, что беспокойство может усиливаться из-за ощущения того, что Я находится под угрозой (например: «я не справляюсь так, как должен, поэтому я никуда не поеду»), но изначальным глубинным источником поведенческой дезорганизации будут являться проблемные обстоятельства. Часто угроза перерастает в стресс, потому что в порочный круг проблем тревожности вводится новый элемент. Сложно создать исчерпывающий список процессов, потенциально порождающих и поддерживающих существование проблем тревожности. Рисунок 2.1 представляет попытку дифференцировать отдельные процессы. Опишем каждый из них по очереди.

Постоянный источник поведенческой дезорганизации

Проблема может заключаться во внешних или внутренних источниках дезорганизации. Самые очевидные внешние источники – это угрозы, которые человек не способен контролировать (например, потеря работы, разрыв отношений, ситуации, вызывающие страх). Внешние источники дезорганизации другого типа связаны со внутренними конфликтами и неуверенностью по поводу жизненно важных решений (например, решения о женитьбе или разводе), или заболеваниями, приводящими к снижению и утрате возможностей. Чрезмерные требования, предъявляемые человеку работой или семьей, – еще один фактор. Некоторые дезорганизующие события являются менее явными, например, осознание недостижимости значимых целей или разочарование в личной философии, которая организует и структурирует жизнь человека. Дезорганизация может проявляться во множестве форм, включая откладывание действий, телесное перевозбуждение, неприятные физические ощущения, неуклюжесть, неустойчивость или просто ощущение нереальности происходящего.

Источники дезорганизации преимущественно внутреннего происхождения могут быть классифицированы следующим образом.

1. *Дезадаптивное представление о проблемах.* Клиент может иметь твердое убеждение о том, что причинами проблем являются: физические нарушения; отношение к прошлым или текущим обстоятельствам, на которые он не желает или не может повлиять; дефекты личности и так далее. Если клиенты не желают пересмотреть эти убеждения, им мало чем можно помочь.

Постоянный источник поведенческой дезорганизации

- (1) Внешние источники, такие как: угроза, неуверенность, конфликт требований, физические нарушения
- (2) Внутренние источники, такие как:
 - Дезадаптивные представления
 - Некоммуникабельность
 - Нехватка навыков решения проблем
 - Дисфункциональные установки
 - Непреодоленная травма



Рисунок 2.1. Процессы, порождающие или поддерживающие существование проблем тревожности

2. *Нехватка навыков решения проблем.* Дезадаптивные представления о проблеме могут не проявляться, однако клиент может не представлять себе, как взяться за ее решение. Такой клиент все время «в стрессе» и переходит от одного кризиса к другому. Ему могут помочь методы «управления стрессом» и «решения проблем» (см. Главу 8), в которых внимание уделяется определе-

нию проблем, расстановке приоритетов, разбиванию проблем на компоненты, сравнению альтернативных решений и т.д.

3. *Некоммуникабельность.* Клиент может испытывать трудности в оценке социальных ситуаций или нехватку навыков взаимодействия с другими людьми (см. Главу 8). Основная проблема - нехватка уверенности в себе.

4. *Дисфункциональные установки по отношению к себе, другим или миру.* Клиент имеет глубоко укорененные убеждения, из-за которых его суждения являются ригидными и категоричными, благодаря чему ни сам человек, ни люди, чье поведение он считает для себя важным, с его точки зрения никогда не могут соответствовать требованиям ситуации. Жизнь становится постоянным источником неудовлетворенности и разочарования (см. Главу 8).

5. *Непроработанные травмы.* Источником вызывающих беспокойство навязчивых мыслей, тревожащих образов или эмоциональных страданий могут являться непреодоленные воспоминания о таких травматических событиях, как смерть любимого, несчастливое детство, война. Консультант может помочь клиенту, используя специальные конфронтационные техники (см. Главу 6); другие руководства из данной серии посвящены более детальному рассмотрению данной проблемы.

Ситуативные порочные круги (страх страха)

Различные аномальные ощущения и признаки поведенческих дезорганизаций, которые замечает клиент, могут стать источником того, что я отношу к *вторичным угрозам* (см. Табл. 2.1). Клиент определенным образом относится к себе (или к своему образу Я), и возникающий при этом порочный круг может усугублять проблему. Такая вторичная угроза может стимулировать процесс самопознания.

Клиенты внимательны к «ошибкам памяти», необычным физическим ощущениям и любым другим доказательствам того, что их самые худшие опасения оправданны. Если замечено что-нибудь не соответствующее ожиданиям, клиент расстраивается еще больше, активность симпатической нервной системы увеличивается, благодаря чему в распоряжении клиента оказываются даже более серьезные доказательства таких расстройств, как психическая болезнь, потеря контроля, социальная дезадаптация.

Недостаток понимания и дезинформированность

Ключ к эффективному консультированию - увеличение степени осознанности таких аспектов жизни человека (воспоминания, конфликты, ситуации, представления, требования и так далее), которые могут рассматриваться в связи с их влиянием на наличную проблему тревожности. Другим фактором может быть недостаток информации. Инсайта редко бывает достаточно. В этом пособии описаны техники, направленные на помощь клиенту в поиске альтер-

нативных объяснений ситуаций, определение различных источников склонности видеть в ситуации угрозу, перемену стиля жизни, принятие жизненно важных решений, снижение физического возбуждения и изменение поведения.

Избегание

Избегание встречи с источником проблемы тревожности поддерживает существование проблемы. Разумеется, консультанту не следует подводить клиента к столкновению с реальными *причинами* тревожности, если клиент не готов принять такой вызов. То же самое относится к самой *проблеме* тревожности. Здесь необходима реалистичная самооценка. Например, человеку, чья тревожность порождена страхом потери партнера, нужно помочь точно оценить причины такого развития ситуации и возможные преимущества отдельного проживания. Консультант может помочь клиенту переформулировать альтернативы и усилить его ресурсы прежде чем перейти непосредственно к работе с проблемой тревожности.

Таблица 2.1. Типичные для проблем тревожности вторичные угрозы

Физические угрозы

Сердечный приступ, паралич, опухоль, старость, смерть, рана и т.д.

Психологические угрозы

Потеря контроля над разумом/эмоциями/собой; например, совершить самоубийство, сойти с ума, напасть на кого-нибудь

Социальные угрозы

Стать объектом насмешек или позора, стать изгоем, стать никому не нужным и т.д.

Материальные угрозы

Потеря дохода или других форм материального обеспечения.

Клиент может справиться с проблемой тревожности, приняв психотропные препараты, алкоголь или что-то подобное. Самолечение не позволяет встретиться с источником угрозы лицом к лицу, и поэтому в целом является препятствием для консультирования (см. Главу 9). Однако в ряде случаев медикаменты могут облегчать конфронтацию, помогая клиенту преодолеть барьер неуверенности.

Окружающие клиента люди, часто не желая, могут поддерживать избегание. Кроме того, клиент может извлекать определенное удовлетворение благодаря вниманию и заботливости, которые обращены на тревожных людей. Для партнеров или членов семьи может быть желательно усиление зависимого и избегающего поведения. Такие паттерны взаимодействия могут быть обнаружены только с помощью тщательных наблюдений и опросов.

Клиенты, из-за проблемы тревожности отказывающиеся от контактов или активности, склонны к депрессивному настроению. Некоторые клиенты чувствуют себя заклеенными теми ярлыками, которые приобретаются во время лечения или навязываются коллегами. При этом уязвляется чувство собственного достоинства клиента. Поэтому в форме избегания могут проявляться утрата интереса, безнадежность и социопатия. Тем более важно представить клиенту информацию относительно природы проблемы и возможность увидеть перспективу постепенных изменений.

Фокусирование на себе

Страдания клиента могут настолько заботить его, что он полностью концентрируется на «симптомах» и не хочет обратить внимание на другие трудности, считая это невозможным и одновременно «очень тревожным». Психическая жизнь клиента состоит из беспокойства, навязчивых мыслей или внимания к физическим ощущениям. Кроме того, что сами по себе такие сбои нежелательны, можно видеть, что чем более тревожным становится человек, тем более прицельно фокусируется его внимание на потенциальных угрозах. Исключаются приятные мысли и рассеивающие внимание действия. Мысли утрачивают гибкость и спонтанность.

Частично это является следствием сверхбдительности клиентов по отношению к сигналам потенциальной угрозы (в форме «странных ощущений» или признаков «психического заболевания»). Клиентам может быть нужна поддержка в развитии внешнего фокуса внимания и ослаблении хватки самонаблюдения.

Отсутствие приемлемых альтернатив

Жизнь, организованная вокруг избегания, все-таки организована. И ведь источник угроз можно настолько успешно обходить, что его влияние на жизнь человека будет исчезающе мало. Поводом для поиска помощи может послужить изменение обстоятельств (необходимость лететь за границу, выступать перед аудиторией, заботиться о ребенке). Избегание может безболезненно переноситься, если удовлетворение жизненных потребностей с ним совместимо. Например, момент поступления ребенка в школу может стать критичным для матери, которая боится одиночества. Вплоть до этого времени присутствие ребенка нейтрализует страх и определяет направление деятельности в течение дня. Мать ребенка-школьника проводит время сама с собой и (если только она не запланировала ничего другого) в отсутствие отвлечения, раньше обеспечиваемого ребенком, ее внимание будет концентрироваться на страхах. Точно так же потом, когда родитель поставил детей на ноги или приближается выход на пенсию, из-за утраты внешних интересов избегание начинает расширять зону своего действия и приобретает доминирующую роль в жизни человека. Эта проблема остро стоит для клиентов, которые, скажем, лет двадцать боялись выйти из дома, а затем, потеряв близкого,

столкнулись с независимостью. В таких случаях консультант может помочь клиенту усилить личные и материальные ресурсы и приобрести новые интересы и роли. Практически это значит выявить интересы и способности и предложить способы развития социальных контактов (например, посредством групп самопомощи или возможности получения дополнительного образования).

Инструментальные факторы

Как отмечено выше, выражение тревожности может служить для того, чтобы вызывать внимание и сочувствие других. Партнеры или члены семьи могут быть рекрутированы клиентом для поддержания чувства безопасности и защищенности, подбадривания перед лицом потенциальных угроз или оказания практической помощи, например, в покупках.

Однако для консультанта слишком уж легко использовать такого рода аргумент для того, чтобы объяснить отсутствие прогресса в консультировании. Лучше оставить его для клиентов, которые активно сопротивляются терапевтическому воздействию, направленному на расширение их поведенческого репертуара. При выявлении данного вида сопротивления фокус консультирования может быть смещен на него.

Долговременные порочные круги

Долговременные последствия проблемы тревожности могут заключаться в: избегании социальной, профессиональной и релаксационной активности; стигматизации вследствие наличия определенной проблемы; чувстве вины из-за неспособности выполнять действия, которые прежде приносили радость, а также из-за использования алкоголя, транквилизаторов или наркотиков для совладания с проблемой и сопутствующими социальными последствиями; подавленном настроении из-за утраты удовлетворения от жизни или надежд на будущее. Повышенная активация симпатической нервной системы и/или мышечное напряжение могут затруднять расслабление, сон, пищеварение, сексуальную и другие телесные функции.

Легко понять, что такие последствия проблем тревожности могут обострять, по принципу порочного круга, исходную проблему. Ряд приводимых ниже примеров поможет убедиться в обоснованности данного представления.

Общие положения эклектического подхода

Данное руководство посвящено описанию знаний и навыков, которые могут быть полезны в консультативной работе с клиентом, имеющим *серьезную* проблему тревожности. Серьезность проявляется в том, что проблема не поддается анализу и не разрешается на уровне здравого смысла и рассуждений, мешает человеку и снижает качество его жизни. Далее в тексте представлены описания стратегий оказания помощи, широко используемых в консультативной практике.

В изложенных ранее концептуальных положениях упор делался на то, что проблемы тревожности многоаспектны и каждый аспект требует деликатной и адекватной реакции консультанта. Оптимальным подходом является сочетание прямых и косвенных методов. Некоторые техники заставляют клиента встретиться лицом к лицу с источником тревожности, причиняя ему страдания. У плохо ориентирующегося в данном подходе консультанта это может оставить тяжелое впечатление. Любые сомнения по поводу использования конфронтационных методов такого типа обычно рассеиваются благодаря той очевидной и скорой пользе, которую они приносят клиенту. Кроме того, чувство дискомфорта клиента можно минимизировать, грамотно планируя ход сеанса. Как правило, хотя успешность консультирования зависит от типа проблемы тревожности, при наличии высокой мотивации клиентов на избавление от страданий вероятность позитивного исхода весьма высока.

Эклектичность подхода в этом контексте подразумевает признание того, что проблема тревожности может принимать множество обликов. Надежнее всего путь по этому лабиринту прокладывать, используя анализ и наблюдения, на основе данных которых принимаются обоснованные практические решения. Предлагаемый подход не является примером из учебника по «технологии преодоления тревожности». В самом деле, эклектичность не может означать, что техники последовательно испробуются до тех пор, пока одна из них не «сработает».

Я попытаюсь описать принципы оценки и вмешательства в абстрактной форме, чтобы они могли применяться гибко. Методы представлены таким образом, чтобы можно было понять, как организовать и на что нужно обращать внимание в предоставляемой клиентом обратной связи, чтобы оценить эффективность их применения. Выбранный метод вмешательства может быть при необходимости изменен, но изменение должно являться результатом тщательного обдумывания, а не проб и ошибок.

Принципы, описанные в данном пособии, являются по своей сути когнитивно-бихевиоральными. Можно заметить, что консультанты, которым данный подход не симпатичен или не знаком, не смогут эффективно применять его. И это будет справедливо относительно любого подхода. Важно и то, что от клиентов требуется понимание и принятие логики применяемых кон-

сультантом методов. Мое пристрастие к эклектике не простирается до призывов к тому, чтобы с одним клиентом одновременно работали разные консультанты или терапевты. Даже если клиент проходит курс медикаментозного лечения, консультант имеет право контролировать его, включаясь во взаимодействие с проводящим курс специалистом (или, по крайней мере, консультант должен получить от клиента гарантии своевременного оповещения о любом увеличении, уменьшении, изменении или прекращении приема лекарственных препаратов). Решение о направлении клиента за альтернативными формами помощи всегда остается за консультантом, и это решение может быть принято совместно с клиентом до или после когнитивно-бихевиорального вмешательства.

Особенности работы с клиентом

Когнитивно-бихевиоральное консультирование подразумевает сотрудничество и нацеленность на разрешение проблем; работа в таком стиле осуществляется с клиентом:

- которому помогают определить свои основные проблемы (включая их причины и последствия);
- которому помогают осознать, что эти проблемы являются формами приобретенного поведения;
- которого вовлекают в процесс приобретения новых форм поведения путем обсуждения, экспериментирования и домашних заданий.

Клиент и консультант сотрудничают на основе:

- взаимного уважения;
- стремления договариваться об общих целях; и
- признания практической модели переобучения.

Некоторая часть первой встречи посвящена введению указанных положений в явном виде. Клиенту можно предложить прочесть материалы, в которых содержится информация о предлагаемом подходе и вероятном течении консультирования (см. Приложение А). Неправильное проведение этого начального этапа «пред-консультирования» часто становится причиной неудач и непонимания в дальнейшем.

Получаемая от клиента информация (в форме самоотчета или дневниковых записей) вместе с данными наблюдения консультанта подвергается анализу с целью решения проблем клиента. Когда консультант предлагает свою, объективную точку зрения, для клиента открывается возможность, проделав анализ ситуации, отнестись к ней как к разрешимой, и, благодаря этому, дистанцироваться от проблемы тревожности. Клиенту нужно суметь описать свою проблему в терминах медицинской теории, личной философии или психодинамической модели. Важно на начальном этапе убедиться в том,

что клиент способен принять когнитивно-бихевиоральный подход, а также согласовывать предлагаемую логику консультативной работы со своими взглядами на проблему и личными ценностями.

Человек, уверенный в том, что его болезнь имеет органическую природу, вряд ли обратится за консультативной помощью. Однако и у тех клиентов, которые в принципе способны принять предлагаемый подход, может возникать сопротивление или потребность в том, чтобы его эффективность была доказана. Правильнее всего исходить из того, что интерпретация «проблемы» – это постоянный пункт повестки дня, к обсуждению которого приходится возвращаться.

Проблемы большинства клиентов множественны и взаимосвязаны, поэтому могут потребоваться различные типы вмешательства. Установление относительной важности проблем и определение соответствующих методов является задачей специального компонента процесса - оценивания (см. Главу 5). В реальности же сбор и оценка информации о клиенте осуществляются на протяжении всего процесса консультирования. Положение дел неизбежно и непрерывно изменяется.

Особенности тревожных клиентов и контракт

Трудности, возникающие при работе с данной группой клиентов, связаны с природой тревожности как таковой. К примеру, такие клиенты нуждаются как в *сдерживании*, так и в *выражении* своих тревог, *желание* быть утешенным сосуществует с *сопротивлением* утешению, а *стремление* к быстрому результату - с *нежеланием* встретиться лицом к лицу с неприятными ситуациями. Консультант с неизбежностью воспринимается как человек утешающий и поддерживающий, принимающий на себя часть тяжести проблемы. Это оказывает определенное влияние на ход работы консультанта. Общей характеристикой людей с проблемами тревожности является их зависимость от поддержки окружающих в ситуации стресса. Поэтому в контракте должны быть четко определены временные рамки работы, чтобы консультант не становился для клиента единственным оплотом безопасности в угрожающем мире, к которому можно прибегать в любое время дня и ночи. Моя практика не дает оснований считать, что такая позиция полезна (а если консультант впадает в роль утешителя, возможен именно такой сценарий).

Одна из полезных процедур заключается в установлении правил взаимоотношений, что позволяет клиенту максимально использовать консультанта в качестве источника безопасности (и веры в конечный результат), и в то же время минимально - для подтверждения оправданности преувеличенных страхов, отвлекающих (необоснованных) соматических жалоб или «необходимости» избегания. Консультант формирует установку на то, что спокойные, продуманные и упорные действия приведут к желаемым результатам. Достигнув доверия со стороны клиента, консультант может перехо-

доть к применению более энергичных конфронтационных техник. Общие особенности процедуры можно описать следующим образом.

Контракт на неопределенный срок

Данный вид контракта основан на согласованном представлении обеих сторон о том, что в итоге консультирования будет достигнут определенный прогресс. Предварительное решение о контракте может быть принято после первых 3-5 встреч, когда устанавливается сама возможность прогресса в данном случае. Контракт на неопределенный срок устраняет опасения клиента по поводу того, что его заставят встретиться лицом к лицу со своими страхами, а потом бросят на произвол судьбы (эти опасения имеют рациональное зерно и могут объясняться предыдущим негативным опытом получения психотерапевтической помощи). Он также устраняет ощущение загнанности в угол, нередко сопровождающее работу в рамках краткосрочного контракта, когда напряжении возникает из-за необходимости завершить курс к определенному сроку. Тревожные люди, как правило, не выносят такого напряжения. Наконец, контракт на неопределенный срок ясно указывает на то, что позитивные изменения могут потребовать длительного времени и значительных усилий.

Моя практика показывает, что работа по неопределенному по сроку, но при этом структурированному контракту не провоцирует развитие зависимости клиентов. Частые в начале работы сессии (до нескольких раз в неделю), быстро сменяются еженедельными, потом - проходящими раз в две недели, и, наконец, раз в 3-6 недель. Для клиентов важно знать, что консультант доступен для контакта (ему можно позвонить или попросить о незапланированной встрече), хотя данная возможность используется редко или вообще никогда.

Обычно консультирование длится от 5 до 20 встреч. Однако некоторым клиентам для достижения позитивных изменений требуется 3-4 года и более при относительно небольшом количестве встреч. Длительность встречи зависит от применяемой техники и часто не равна общепринятому одному часу. Встречи должны длиться столько, сколько необходимо для решения задачи оценивания и проведения техник, предусмотренных когнитивно-бихевиоральным подходом.

Не в интересах клиента затягивать этап консультирования, на котором ему приходится встречаться лицом к лицу с травмирующими переживаниями. Как правило, встречи, на которых клиент работает с угрозой, проходят спокойно. План встречи составляется таким образом, чтобы поддержать у клиента ощущение контроля над ситуацией. И нередко клиент уходит воодушевленным.

Сопереживать, но не сочувствовать

Сопереживать – значит посредством профессионально поставленных вопросов и обратной связи показывать, что мысли и чувства клиента

правильно понимаются. Некоторым клиентам приятно сочувствие (по сути, соболезнование), но реакцией тревожных людей на него является образование «симптомов». Сочувствующий консультант может подозревать, что своим отношением укрепляет болезненные фантазии, и, стремясь исправить положение, начинает давить, в чем-то убеждать или переубеждать клиента. Важно помнить, что именно сопереживание обеспечивает клиенту возможность свободно делиться стыдными, тягостными или нелепыми мыслями. Вместо того, чтобы заикнуться на критике одобренных мыслей, консультанту следует начинать с согласия, чтобы позволить им проявить себя полностью; может быть, даже предлагать еще более устрашающие сценарии, которые клиент будет отвергать.

Однако и сопереживание не может гарантировать продуктивное консультирование. Клиент с многочисленными жалобами на соматические заболевания может вовлечь консультанта в бесконечные и бесполезные беседы о существовании или возможности различных воображаемых ситуаций. Это может стать непреодолимым препятствием для эффективной работы. Для решения данной проблемы следует сказать о ней клиенту и договориться, что обсуждаться будут только условленные темы. Если клиент нарушит данное правило, консультант вправе, указав на это, просто молчать до тех пор, пока клиент не вернется к теме текущей встречи. Целью данной тактики не является убеждение клиента в том, что его тревоги или озабоченности не имеют никаких оснований; на самом деле, они могут становиться предметом вмешательства.

Право на свой путь и неудачи

С течением времени проблема тревожности может значительно трансформироваться. То, чего клиент достигает сегодня, завтра может стать невозможным. Клиенты должны знать о таком непостоянстве и уметь его принять. Так часто наблюдаемые при проблемах тревожности порочные круги в процессе консультирования формируются на основе негативной оценки клиентом своих действий или плохо скрываемого неодобрения консультанта, возникающем из-за того, что клиент не выполняет домашние задания. Обсуждая прогресс, важно делать акцент на достижения и разрабатывать долгосрочную перспективу. Причины неуспеха следует тщательно анализировать, рассматривая их как источник полезной информации. Разумеется, ответственность за отсутствие прогресса несет консультант. Поэтому в случае низкой мотиваций клиента на выполнение рекомендаций и правил консультант обязан отнестись к этому как к вопросу первостепенного значения. Граница допустимости нарушений со стороны клиента определяется реальным противоречием с целями консультирования. Если клиент не понимает, почему его действия разрушают процесс консультирования, это следует подробно обсудить. Конкретными примерами являются: сокрытие важной информа-

ции, самостоятельно принятое решение об изменении или прекращении приема лекарств, посещение консультации в состоянии опьянения. Многие условия контракта, обеспечивающие процесс консультирования, должны быть прояснены на стадии «пред-консультирования».

Вовлекать окружающих там, где это целесообразно

Партнеры, друзья, члены семьи и т.д. могут вовлекаться в консультирование со следующими целями:

- определить их представления о клиенте и вообще получить полезную информацию;
- предоставить им информацию о целях и процедурах, поскольку консультирование может каким-либо образом отразиться на их собственной жизни;
- найти помощников, например, для усиления способности клиента встретить определенные ситуации лицом к лицу вместо того, чтобы избегать их;
- договориться о том, что в случае отсутствия позитивного результата окружающие отнесутся к этому хотя бы нейтрально;
- подтолкнуть к размышлениям и предоставить необходимую информацию людям, которые невольно способствовали развитию проблем тревожности;
- привлечь помощников и волонтеров, деятельность которых организована на более постоянной или формальной основе.

Близким для клиента людям может быть полезно прочесть о том, что такое проблема тревожности и какие виды техник помогают ее преодолеть (см. Приложение А).

Консультирование проблем тревожности – главные цели

Главные цели определяются в соответствии с концептуальной моделью, описанной в Главе 1. Проблемы тревожности проявляются в поведении, имеющем цепную или циклическую структуру. Свой вклад вносят мысли, действия и физиологические реакции. Поэтому в то время как основные цели остаются неизменными, используемые методы могут значительно различаться.

Первая цель – побудить клиента относиться к своим проблемам осознанно

Достижение этой цели должно предшествовать всем прочим мероприятиям, проводимым в процессе консультирования с использованием описанных в данном пособии методов. Методы сами по себе несут скрытое послание, усиливающее воздействие логических рассуждений консультанта. Рань-

ше, чем начинать какое-либо вмешательство (хотя бы просить клиента вести дневниковые записи), необходимо объяснить его смысл, чтобы клиент убедился в его необходимости. Кроме отсутствия знаний по психологии страха и стресса, что исправить совсем не трудно, часто встречаются ещё два препятствия на пути к формированию проблеморазрешающего отношения. Первое из них – уверенность клиента в том, что причиной его психического и физического дискомфорта является соматическое заболевание. Второе препятствие – употребление лекарств и алкоголя с целью снижения тревожности.

Вторая цель – модификация преувеличенной или нереальной угрозы

Нереалистичная оценка угрозы составляет ядро проблем тревожности. Её следует отличать от робости или «трусости», которые в свою очередь можно определить как высшую степень непереносимости дискомфорта, вызываемого повседневными жизненными трудностями. В основе нереалистичных оценок могут лежать:

- ложная информация;
- преувеличение вероятности или значимости угрожающих событий;
- низкая оценка клиентом своей способности противостоять угрозе.

Прямая модификация нереалистичной угрозы может быть достигнута когнитивными или бихевиоральными методами, косвенная возможна с помощью вмешательства, направленного на общее поднятие духа. Когнитивные техники развивают способность клиента рассуждать логически и более оптимистично. Бихевиоральные методы, в том числе конфронтация, позволяют пересмотреть оценку угрозы, поскольку выясняется, что последствия встречи с ней менее губительны, чем ожидалось.

Третья цель – развитие уверенности и адаптированности

Тревожность редко существует как изолированная проблема, не связанная с общим уровнем адаптированности. Фобия, имеющая конкретный объект (к примеру, страх змей) кажется исключением из этого правила, но даже в этом случае существование фобии будет разрушительно действовать на жизнь человека и может вести к снижению самооценки. Преодоление же проблемы делает возможным укрепление уверенности и ощущения благополучия.

У некоторых клиентов низкая самооценка и другие психологические трудности являются скорее причинами проблем тревожности, чем их последствиями. Если мы допустим, что тревожность есть противоположность стабильности/безопасности/доверия, то следует признать, что последнее настолько важно, насколько способно устранять первое. Трудности, испытываемые клиентами, как правило, проявляются в следующих областях:

- интимные и другие межличностные отношения;
- проблемы хронического стресса, связанные либо с истинными трудностями, либо с отсутствием умений справляться со стрессовыми факторами;
- неспособность преодолеть последствия посттравматического состояния.

Консультирование по проблемам тревожности нельзя отделять от консультирования по данным проблемам. Для иллюстрации этого утверждения будут даны примеры из практики.

Четвёртая цель – развитие проблеморазрешающих стратегий клиента

Тревожность может стать результатом общей неспособности справиться с повседневными проблемами. Помогать таким клиентам в преодолении какой-либо специфической проблемы малопродуктивно. Тревога возникает опять, как только клиент встречается с новыми трудностями и стрессорами. Такая «предрасположенность к тревожности» может быть связана с неуверенностью, страхом неуспеха, низкой самооценкой или другими поведенческими установками. Задача консультанта – научить общим проблеморазрешающим стратегиям, применяя их к конкретным ежедневно возникающим трудностям. Со временем благодаря повторяющемуся успеху в разрешении конкретных проблем клиент учится применять данную стратегию уже без помощи консультанта. Другими словами, стратегия присваивается.

Формулирование проблем тревожности

Формулирование проблемы клиента является началом вмешательства. На практике этот процесс продолжается на протяжении всего консультирования. Анализ причин, по которым вмешательство не имеет успеха, может позволить улучшить формулировку и начать новое вмешательство. Вмешательство следует планировать в строгом соответствии с формулировкой, то есть оно должно быть основано на психологических гипотезах о факторах, которые порождают или усиливают проблему.

При формулировании проблемы консультант пытается определить ее смысл, привлекая для этого общие законы или эмпирические обобщения. Когнитивно-бихевиоральные формулировки имеют разнообразные теоретические источники, перечень которых в настоящее время настолько обширен, что трудно составить законченное описание концептуальной модели. Поэтому при создании формулировки мы можем опираться на положения любых подходящих научных направлений.

Консультанты, работающие в русле когнитивно-бихевиорального подхода, являются прагматиками, и поэтому обоснованность теоретических представлений оценивают по тому, насколько эффективны связанные с ними техники. Обязательность научной оценки и самокритики гарантирует использование только таких техник, для которых известно, как они работают. От одних теорий отказываются, другие развиваются. Ниже обсуждаются некоторые важные теоретические положения.

На практике формулировка может быть довольно проста и определять основные проблемы и тип событий, порождающих и поддерживающих существование этих проблем. Поддержание существования проблемы обеспечивает механизм, благодаря которому ее проявления способствуют ее упрочению и фиксации существующей формы. Поддерживающим событием может быть улыбка одобрения или «легкость», возникающая, когда избавляются от каких-то неприятностей. Нужно научить клиента наблюдать за тем, какие события предшествуют и следуют за проблемным поведением, и тогда развитие формулировки будет происходить в направлении включения в нее сведений о факторах, усиливающих и ослабляющих страдания. Зная, на какие события следует обращать внимание (в том числе, собственные мысли), клиент получает возможность предупредить и контролировать проявление проблемы. Не следует недооценивать терапевтический эффект простого называния и перечисления проблем.

Клиент должен ознакомиться с формулировкой, но как именно это произойдет, зависит, частности, от степени его продвинутости. Консультант должен держать в уме и те гипотезы и формулировки, которые не озвучиваются потому, что клиент пока не поймет их, или же, очевидно, не примет их нико-

гда. Тем не менее, целью является открытое сотрудничество, базой и плацдармом которого становится понимание клиентом своей проблемы.

В формулировке учитывается влияние происходивших ранее или происходящих сейчас событий, которые нельзя изменить. Несмотря на это, такие события требуют своего осмысления, потому что вмешательство – это всегда компромисс между идеальным и достижимым. Например, клиент может понять, что определённые проблемы неразрешимы в том виде, как он их формулирует. В процессе консультирования нужно помочь ему принять это и создать более подходящие варианты формулировки.

Формулировка определяет, какие и в каком порядке выдвигаются цели. Первый шаг заключается в описании проблем в терминах бихевиорального и когнитивного подходов и проведении функционального анализа.

Бихевиоральное описание и функциональный анализ

Акцент на учет контекста при описании поведения является принципом бихевиоральной терапии и поэтому при его осуществлении используются соответствующие специфические термины. Конечно, действия человека в реальных ситуациях нельзя описывать с объективной точностью, какая достигалась при исследовании поведения крыс в ящиках Скиннера, но это и не составляет цель бихевиорального описания. Такое описание должно быть однозначным и содержать как можно меньше ссылок на подразумеваемые мотивы или общие личностные характеристики. В описании «Билл посмотрел в зеркало» подразумеваемого содержания меньше, чем во фразе «Билл любовался своим отражением в зеркале». Оба высказывания могут быть верны, но последнее исключает другие интерпретации, например, что Билл разглядел прыщик или заметил, что забыл побриться, и так далее. Для всех этих случаев различна связь со средой. Мы должны подойти к действию Билла с зеркалом как к составляющей части потока поведения, то есть в связи с предшествующими и последующими событиями. Установление связи между событиями называется функциональным анализом. К примеру, если Билл отправился в ванную комнату и начал бриться, мы можем с большим основанием считать, что посмотрев в зеркало, Билл вспомнил о необходимости побриться (*различительный стимул*), а не просто любовался собой. То, что действие с зеркалом было самопроверкой, подтверждается и тем обстоятельством, что бритьё оказалось необходимым. (Выяснение того, чем поддерживается сама необходимость бриться, потребует дальнейшего анализа.)

Разделение потока поведения на причину – поведение – следствие (АВС) – очень гибкая схема, в которой, к примеру, следствие одного поступка может стать причиной другого. Некоторые бихевиористы считают мысли внутренней речью, а мышление для них предстает в роли как реакции, так и стимула. Физиологические реакции организма также входят в цепочку потому, что они, во-первых, сопровождают действия человека, а во-вторых, такие

ощущения, как учащённый пульс, мышечное напряжение или переполнение мочевого пузыря, сами являются внутренними стимулами.

Последовательность АВС может быть интерпретирована как причинно-следственная связь, если можно показать, что наличие, отсутствие, время или частота появления одного элемента зависит от наличия другого. Простой пример: клиент проявляет беспокойство при виде пауков, но не жуков, бабочек или муравьёв. Пауки в данном примере – это стимул-причина, предшествующий тревожному поведению. Далее: бегство от пауков порождает следствие - «отсутствие пауков». Отсутствие пауков можно рассматривать как причинное событие, которое подкрепляет бегство. Мы вправе делать такой вывод, потому что если бы бегство не привело к отсутствию пауков (от них нельзя было убежать), мы могли бы ожидать появления какого-либо нового поведения, такого как борьба с пауками или, наоборот, замирание на месте. В терминах теории научения бегство ведет к *угасанию*. Этот процесс имеет место, когда исчезает результирующее событие, поддерживавшее некое поведение. Перечень действий, которые человек будет совершать в определенной ситуации, называется *поведенческим репертуаром*. В данном случае, если реакция бегства угасла или была подавлена как-то иначе, ее место в репертуаре займут другие реакции - оцепенение или борьба.

Для проблем тревожности важно, что причинами, поддерживающими тревожное поведение, часто являются реальные или воображаемые события или ситуации чрезвычайно неприятного характера. К примеру, при виде паука человек может представлять, как насекомое заползет на него и кусает. До сих пор мы говорили о причинно-следственных связях событий как «существующих» в реальном мире. Когда же речь идет о *воображаемых* событиях, мы имеем дело с внутренними представлениями человека о внешнем мире. Это *когнитивный* элемент, к которому мы еще вернёмся. То, какими человек представляет себе вещи, часто считается их *реальными* свойствами, хотя иногда человек понимает, что его представление о событиях неправильно (но непреодолимо).

Вернёмся к нашему примеру: человек, боящийся пауков, может знать, что пауки не опасны, но при этом не способен прекратить вести себя по отношению к ним как к представляющим опасность, и продолжает думать об этой опасности - например, о противоречащей природе пауков способности кусать. Во многих случаях именно эта воображаемая последовательность (*символическое представление*) событий и определяет линию поведения. Этот символический или когнитивный аспект поведения может стать таким же автоматическим и привычным, как реакция побега.

Консультирование можно представить как процесс, способствующий *переучиванию*. На то, как человек думает о себе самом или о ситуации, можно повлиять вербальными средствами (например, сообщая о ходе событий в «реальном» мире, демонстрируя возможность по-разному интерпретировать события, проводя убеждающие беседы) или же бихевиоральными методами. Изме-

нить свое поведение человек может потому, что ему дали такую *инструкцию* (иногда это называют «поведенческой пробой») или его *поощряют и убеждают* вести себя по-другому. При использовании первого приема клиент получает возможность увидеть, что реальность отличается от его представлений и, благодаря этому, изменить свои представления. Во втором случае человек учится не только думать по-другому, но и реагировать более адаптивно (для этого могут потребоваться специальные рекомендации, моделирование или тренинг адаптивных реакций).

Информация сама по себе – например, когда человеку говорят, что пауки не кусаются – редко ведет к изменениям. Информация, полученная благодаря собственному опыту, обычно более действенна. Обнаружив, что на самом деле пауки – это безвредные и дружелюбные существа, человек, как правило, перестает их бояться. Процессы, лежащие в основе бихевиоральных и когнитивных методов, могут не сильно различаться. Однако, представления о мире (например, что X ведет к Y, или действие A порождает B) не всегда могут быть легко оформлены в виде слов или образов, и поэтому для организации изменений вербальные техники могут оказаться неэффективными.

Бихевиоральный и функциональный анализ дает возможность выделить те события, которые предположительно выполняют функцию причины. Благодаря этому определяется стратегия вмешательства с целью изменения выявленных связей. Перед тем, как перейти к обсуждению когнитивной терминологии, давайте рассмотрим классификацию отношений между событиями в бихевиоральных терминах.

Если разделить последствия на «позитивные» и «негативные», число типов различных схем, описывающих причинно-следственные связи, оказывается невелико. Эти схемы, или *формы научения* моделировались и изучались в лабораторных условиях (см. Таблица 4.1) с целью выявления их характерных особенностей. Разумеется, по результатам ABC-анализа трудно сразу же определить, какая именно схема описывает существующее положение дел. В этом и заключается искусство когнитивно-бихевиоральной терапии. К примеру, когда младенец, которого укладывают в кроватку, кричит - это потому, что он оказывается в темноте (последствие 1) или остается один (последствие 2)? Сделав выбор, мы сможем найти подходящую схему научения и определить соответствующий вид вмешательства. Корректный анализ, дополняемый дальнейшим наблюдением и экспериментированием с ключевыми событиями, имеет решающее значение в достижении успеха.

Данное вступление в бихевиоральную теорию является очень кратким; для получения более полной информации рекомендуется обращение к первоисточникам.

Таблица 4.1. Схемы научения

<i>Последовательность событий</i>	<i>Название</i>	<i>Пример</i>	<i>Результат</i>
Реакция сопровождается позитивное последствие	Подкрепляемое научение. Положительное подкрепление	Одобрение за выполнение задания	Растет частота реакции (выполнения заданий)
Реакция сопровождается отсутствием (ожидаемого) позитивного последствия	Угасание. Фрустрирующее неподкрепление	Отсутствие ожидаемого одобрения за выполнение задания	Сокращается частота реакции (выполнения заданий)
Реакция сопровождается лишением позитивного последствия (неожиданно)	Цена реакции. Тайм-аут	Штраф за несанкционированную парковку	Сокращается частота реакции (несанкционированных парковок)
Реакция сопровождается негативным последствием	Наказание. Пассивное избегание	Человек начинает разговор, но его игнорируют	Сокращается частота реакции (начинать разговор)
Реакция устраняет негативное последствие	Выученное избегание	Уход из пугающей ситуации	Растет частота реакции (ухода из пугающей ситуации)
Реакция сопровождается устранением (ожидаемого) негативного последствия.	Отрицательное подкрепление Активное избегание	Избегание пугающей ситуации	Растет частота реакции (не попадать в пугающую ситуацию)

Когнитивный анализ

Когнитивный анализ обращен на символические представления клиентов о мире и о своем месте в нём. Для этого подхода характерно рассматривать в качестве причин проблем тревожности неадекватные или иррациональные способы мышления. В отличие от бихевиорального анализа, в котором основное внимание уделяется средовой детерминации проблемы, здесь к событиям, происходящим в окружающем мире, относятся как к источнику подтверждения или опровержения правильности мышления человека.

Процесс представления мира и оперирования этими представлениями частично бессознателен. Мы не обязательно осознаём интерпретации, даваемые событиям. Тем не менее, мы можем излагать свои соображения, формулировать представления, метафорически или образно описать и уловить сущность того, как и что мы думаем и чувствуем. В когнитивном анализе эти осознаваемые проявления нашего мышления называют внешними мыслями, чтобы под-

черкнуть их отличие от *внутренних представлений* или *глубинных установок*. Последние составляют как бы правила, определяющие самую основу нашего мышления. Внутренние представления менее доступны, но более важны, потому что внешние мысли базируются преимущественно на них. Непокколебимость некоторых внутренних представлений порождает серьезные трудности. Клиентам с такими проблемами можно помогать озвучивать и обсуждать внутренние представления, определяющие их внешние мысли.

У тревожных клиентов внешнее мышление в провоцирующих беспокойство ситуациях может принимать следующую форму: «Должно быть, я серьёзно болен», «Если так будет продолжаться, я не вынесу», «Что делать в случае катастрофы», «Она должна считать меня глупым», «Все смотрят на меня» и так далее. Мы можем исследовать эти мысли, то, как они ведут к другим мыслям и, в конечном счете, к более общим представлениям о мире. При этом можно дойти до скрытых негативных внутренних представлений. К примеру, внутреннее представление «У меня ничего не выйдет» может лежать в основе внешнего страха смерти супруга. Когнитивные терапевты утверждают, что удержание негативных и неадекватных представлений такого типа является основной причиной проблем тревожности, связанных с ними неприятных ощущений и оборонительного поведения. Поменяйте образ мыслей, и проблема уйдёт.

В определенном смысле это так и есть. Если мы знаем, что наш друг находится на терпящем крушение самолете, мы будем сильно переживать; если выяснится, что это ошибка, мы мгновенно успокоимся. Однако сущность когнитивных техник не исчерпывается исправлением ошибочных представлений. Нереалистичное мышление укрепляется и усиливается, несмотря на наличие опровержений. Для его преодоления необходимы более мощные средства. Можно использовать бихевиоральные техники, например, когда задания составляются таким образом, чтобы клиент увидел, что мир устроен не совсем так, как он его представляет. Другим способом является обсуждение, поиск истины с помощью вопросов, отвечая на которые клиент обосновывает свои представления о мире. Эти методы, применение которых будет проиллюстрировано ниже, заставляют усомниться в (1) ложных или неадекватных убеждениях; (2) крайних (абсолютных) оценках; (3) непродуктивных способах мышления, когда, например, игнорируется не соответствующая определённому видению мира информация или реальность видится в строго чёрно-белой гамме.

Внешнее мышление тревожных клиентов обычно принимает форму цепочки из всё более угрожающих интерпретаций событий, заканчивающейся образом чего-то совсем катастрофичного. Угрожающие интерпретации запускают физиологические изменения и такое поведение, благодаря которому возникают дополнительные доказательства обоснованности уже имеющихся опасений и подготавливается почва для возникновения нового страха. Таким образом, создаётся порочная спираль. Компоненты цепи могут сильно различаться у разных клиентов. Компонентами могут быть ощущения, чувства и

другие виды переживаний, поведение и его следствия, уже имеющиеся интерпретации. Компонентами могут быть события собственной жизни или мысли/поведение других людей. Компоненты связываются между собой с помощью *выводов* (поэтапного логического увязывания элементов друг с другом) или *оценок* («Это плохо, ужасно, кошмарно...»).

Например, мысль «Я не могу справиться с тревожностью» может вести к мысли «Я должен быть способен справиться» (оценка), и дальше «Должно быть, я никчёмный человек» (вывод: раз я не могу справиться, значит, я должен быть никчёмным). Данный вид цепочки, демонстрирующей нарастание катастрофичности событий или падение самооценки, является принципиально важным для некоторых проблем тревожности. Применение когнитивных методик позволило добиться значительного повышения эффективности консультирования в этой сфере.

Тревожное мышление проявляется при определенных условиях: беспокойство или упадок духа. Следовательно, когнитивные методики имеет смысл применять в том случае, клиент реально испытывает тревожность. Воссоздание пугающих ситуаций с помощью управления воспоминаниями или воображением клиента позволяет обеспечить необходимое состояние. При возникновении негативных или неадекватных мыслей консультант побуждает клиента занять критическую позицию. Процесс прослеживания цепи нереалистичных мыслей требует особой деликатности, тем более, если сами клиенты считают свои мысли нелепыми, постыдными или отвратительными. Примеры когнитивного анализа приведены в Главах 7 и 8.

Случай из практики, иллюстрирующий бихевиоральный и когнитивный анализ

Биографические данные. 35-летний мужчина снимает квартиру вместе со своим пожилым отцом, которого считает страдающим от депрессии. Его мать умерла шесть месяцев назад. С тридцатилетнего возраста, после своего развода, он жил с родителями. У него нет профессии, и с 15 лет он работает на должностях, не требующих квалификации. В данный момент он безработный. Свободное время он посвящает выпивке с друзьями, картам и ночным клубам. У него есть несколько давних друзей, но он замечает, что ему самому приходится быть инициатором встреч.

Причина направления на психотерапию. Психиатр в своем направлении отметил приступы паники, а также проблемы в отношениях с женщинами. Клиент жалуется главным образом на «напряжении» и «депрессию». Он рассказывает, что три года назад подавился пищей, когда во время еды почувствовал панику. Теперь он испытывает страх, что не сможет проглотить пищу, не подавившись, и избегает есть в общественных местах. Он говорит, что ему не хватает уверенности, и он не в состоянии работать из-за «напряжения».

История обращений за профессиональной помощью

25 лет: Обратился за помощью к своему терапевту по поводу «нервов».

29 лет: При повторном обращении называл себя «безнадёжным», «ни на что не годным», «пессимистом». Отказался от предложенной групповой терапии.

32 года: Обследовался в больнице на предмет заболеваний уха, горла и носа, объективных симптомов не выявлено. Раз в неделю в течение нескольких месяцев встречался с консультантом.

33 года: Получил направление на групповую терапию, но посетил лишь несколько занятий. Считал, что нуждается в медицинском, а не психотерапевтическом лечении. Продолжал получать психиатрическую помощь в течение двух лет.

Последние десять лет он принимал разные слабые транквилизаторы. Его не устраивали побочные эффекты антидепрессивных средств, и он прекратил приём препаратов. Вообще лекарства принимать не любит, но считает, что транквилизаторы помогают ему успокоиться.

Общая история. Он рос в неблагополучном районе и нередко подвергался насмешкам сверстников. Он был очень привязан к своей маме, весёлой, доброй, но властной женщине. Сейчас он чувствует себя виноватым за «те проблемы, которые он доставлял матери». Своего отца он описывает как пассивного человека, который не умел в достаточной мере его контролировать. Теперь он не уважает своего отца. Он говорит, что в юности в немногочисленных отношениях с девушками испытывал робость. В 27 лет после трехлетнего знакомства он женился. Через три года развелся. В настоящий момент он не упоминает о каких-либо сексуальных проблемах, но в присутствии женщины, которую он рассматривает в качестве потенциальной партнёрши, чувствует тревогу и неуверенность.

История жалоб на тревожность. Будучи ребёнком, он сильно боялся темноты, а в подростковом возрасте - смерти. Его первое посещение терапевта по поводу «нервов» было вызвано ощущением того, что в его голове «легко и пусто». У него возникал страх перед вождением автомобиля на дорогах с оживлённым движением, но он преодолел его сам. В возрасте 32 лет получили развитие некоторые соматические симптомы, включая ощущение того, что «дыхание останавливается», особенно во время вождения. Годом позже он поперхнулся пищей и «не мог восстановить дыхание в течение 30 секунд». Впоследствии он обнаружил, что не может свободно глотать жидкость или пищу, давась при каждой второй попытке.

Подавленное настроение. Он описывает себя как человека в общем спокойного, не склонного к перепадам настроения. В настоящий момент его настроение

довольно неустойчиво, а время от времени появляются мысли о самоубийстве. Он склонен к самообвинению и считает себя человеком недостойным. Хотя он утверждает, что подавлен «большую часть времени», это не отражается на его сне, аппетите и сексуальном желании. Он глубоко опечален смертью матери и всё ещё избегает разговоров о ней или посещения тех мест, которые ее напоминают.

Комментарий. Прежде, чем рассматривать текущие проблемы поведения, следует сделать некоторое предварительное резюме. Было бы ошибкой считать, что изложенная выше информация получена за одну беседу и в представленном здесь виде. Материал расположен здесь в таком порядке, потому что это помогает нам составить представление о его проблемах. На данном этапе мы можем утверждать следующее:

1. Как и у многих клиентов, его жалобы на тревожность являются составной частью других проблем, таких, как трудности в отношениях с женщинами, сожаление о недавней смерти матери, недавний развод, отсутствие работы.
2. Тем не менее, проблемы тревожности имеют свое собственное развитие, проявляются в нарушении восприятия (голова «легкая и пустая») и затем в «удушьи» при приеме пищи. Его детские страхи предполагают предрасположенность к тревожности.
3. Он хочет получить медицинскую помощь и вообще не видит связи между своими «симптомами», историей и образом собственной жизни.
4. Есть данные о том, что ему сложно решать повседневные проблемы. Ему нелегко контролировать свои импульсы, и он признаёт, что «жил в мире фантазий».

Консультирование должно было быть и действительно было сфокусировано на проблемах, не имеющих отношения к заявленным жалобам на напряжённость и соматические симптомы. При этом проблема тревожности рассматривалась как первостепенная в силу того разрушительного воздействия, которое она оказывала на его жизнь, например, на способность работать и общаться. Поэтому дальше речь пойдет именно об этом аспекте.

Бихевиоральный и когнитивный анализ текущих проблем. Анализируемая здесь информация была собрана в ходе бесед о недавних эпизодах беспокойства, описанных в дневнике, и наблюдения за поведением в критических ситуациях. Цель заключалась в том, чтобы определить:

1. поведение/мысли/чувства, которые являются нежелательными и представляют собой проблему;
2. поведение/мысли/чувства, *отсутствие* которых представляет собой проблему;
3. стимулы, которые наблюдаются до и после вышеперечисленных проявлений.

ний;

4. внешнее мышление и внутренние представления, связанные с (1) и (2);
5. общие стили решения проблем, создающие трудности для клиента.

Были выявлены следующие проблемы:

Плохое настроение. Описываемое как напряжение, тревожность, обеспокоенность, оно ассоциировалось с различными мыслями о себе самом. (Я неудачник; ничего хорошего; ненормальный; настроенный на провал; если начистоту, мои друзья – мои враги? Я плохо обращался с матерью.) Было сложно определить стимулы, предшествующие такому негативному самовосприятию, но было замечено, что оно возникало, если клиента побуждали думать о конкретных проблемах, с которыми он сталкивался (отношения, работа и др.). Наиболее очевидными последствиями негативного самофокусирования были приём транквилизаторов и отсутствие попыток решить проблему.

Соматические ощущения. К примеру, удушье, тяжесть в груди и мышечное напряжение. Наш клиент сообщал, что неприятные телесные ощущения могут возникать не только в наиболее тревожных ситуациях, но и практически в любое время. Частота этих ощущений нарастала в присутствии сочувствующего слушателя. Он хотел, чтобы специалисты давали утешительный диагноз, но эффект от такого утешения был кратковременен.

Неспособность принимать пищу в общественных местах. Эта проблема проявилась в эпизоде, когда клиент «подавился». Во время интервью была получена следующая информация.

Клиент

- может без затруднений принимать пищу дома с близкими или наедине где угодно;
- избегает есть в присутствии других людей, мужчин или женщин, при этом ему труднее принимать пищу в людном ресторане (особенно если он сидит не рядом с выходом), чем в баре, а в баре - труднее, чем дома у друга;
- боится, что если он поперхнётся, окружающие начнут на него смотреть, и это настолько выбьет его из колеи, что придется срочно покидать ресторан (при этом не расплатившись);
- боится задохнуться и умереть;
- проглатывает жидкость почти с таким же трудом, как твёрдую пищу.

Следующим шагом в исследовании проблемы было наблюдение за тем, как клиент ест в закусочной. Он согласился выпить чашку чая в присутствии консультанта, сидя на расположенном близко к выходу месте. Здесь, в ситуации, когда клиент явно испытывал тревогу, его попросили рассказать о том, какие мысли/чувства его посещают. С помощью прямого наблюдения удалось

подтвердить реальное существование представлений клиента о серьезности проблемы и содержании его негативных мыслей. Дальнейшее наблюдение (во время приёма пищи в кафе) позволило также отметить необычную скорость, с которой он ел. При разговоре с ним выяснилось, что в его семье не было принято есть, собравшись вместе за одним столом. Для него было привычным делом принимать пищу полулежа перед телевизором. Быстрая еда соответствовала его быстрым нервным движениям, непрерывному курению и склонности к скороговорке.

Формулирование

Целью формулирования является выдвижение психологических гипотез, объясняющих трудности клиента, с учетом сложных связей между проблемами и временного характера действия некоторых причин их возникновения. Ценность формулирования для определения целей консультирования станет понятной, когда мы специально поговорим об этой процедуре. Процессы определения и достижения целей консультирования отделён от формулирования проблем, хотя они взаимосвязаны. С одной стороны, консультанту не следует поддерживать клиента в постановке недостижимых, неадекватных или неэтичных целей. С другой стороны, у клиента не будет мотивации на достижение целей, которые не являются его собственными. Разработка и проведение вмешательства должно проходить с учетом и формулировки, и целей.

Теперь мы можем рассмотреть трудности нашего клиента в терминах причинно-следственных связей и поддерживающих факторов, описанных ранее (Рисунок 2.1).

1. Постоянно действующие источники дезорганизации поведения. Два возможных источника уже были упомянуты – это отсутствие работы и его неспособность построить длительные отношения с женщиной. Два этих фактора определяют низкий уровень его самооценки, разрушительно воздействующий на способность выработать конструктивное отношение к проблемам. Однако, поскольку он считает, что не может пригласить куда-либо женщину или искать определенную работу из-за своей неспособности есть в общественных местах, эти проблемы могли бы начать разрешаться сами по себе, если бы был устранён его страх принимать пищу на публике. Поэтому помощь, направленная на проблемы с работой или интимными отношениями, должна оказываться позднее. Кроме того, он продолжал переживать из-за смерти матери. Поскольку его печаль была адекватной и все менее интенсивной (а сам он не считал её проблемой), не было необходимости делать её центральным аспектом консультирования.

2. *Ситуативные порочные круги.* Пугающие последствия удушья и непреодолимого желания убежать можно рассматривать как элементы ситуативной порочной спирали. Тревожное ожидание этих последствий вызывает телесные реакции (такие, как сухость во рту, неспособность проглотить, мышечное напряжение), которые усугубляют проблему приёма пищи. Входя в места общественного питания, он направляет внимание на то, что происходит в горле, обнаруживает, что горло сдавлено, и боится дальнейшего ухудшения.

Его ожидание удушья в определенной степени отражает реальность. Он действительно задыхался, хотя, как можно понять, это не было смертельно. При планировании вмешательства необходимо поставить цель подавления или замещения реакции удушья. Иначе переживания будут подтверждать его страхи. Хотя такие опасности, как стать посмешищем для публики или задохнуться насмерть, значимы для клиента, эти «катастрофы» ожидаемы только в ситуации приёма пищи и в них не проявляются или с ними не связаны глубинные дисфункциональные установки.

3. *Недостаток понимания и дезинформированность.* Наш клиент был не столько дезинформирован, сколько просто не имел информации о том, как тревожность отражается на телесном состоянии. Ему рассказали о роли вегетативной нервной системы и порочных кругах в возникновении телесных ощущений, а так же о том, в чем состоит цель конфронтации: ожидается, что постепенно ситуация приёма пищи будет вызывать все менее выраженный страх.

Была проведена работа как с его представлениями о наличии «психического заболевания», так и с медицинской интерпретацией его «симптомов». В его повышенном внимании к соматическим ощущениям проявлялось не знание о том, что он чем-то болен, а беспокойство по поводу любого вновь возникающего ощущения и стремление от этого беспокойства избавиться. Ему объяснили, что в норме ощущения сопровождают стресс и физическое возбуждение.

Его соматические жалобы могли выступать формой реакции избегания, позволяя не думать о внушающей беспокойство перспективе встречи с трудностями реальной жизни. Я уже отмечал, что он рассматривал своё «психическое расстройство» (которое подразумевало приём транквилизаторов) не только как постыдное, но и дающее повод для того, чтобы не искать пути конструктивного решения проблем.

4. *Избегание* Он практически полностью исключил из своей жизни ситуации приёма пищи в общественных местах. Благодаря этому его страх последствий (смущение, удушье, смерть) оставался неприкосновенным. Избегание сразу после первого инцидента быстро генерализировалось и систематически усиливалось, когда повторялись случаи удушья или иного дискомфорта. Более того, его воображение хорошо поработало над различными негативными послед-

ствиями удушья в общественном месте (например, он убегает из ресторана, не оплатив счёт, и за ним гонится хозяин).

5. Отсутствие приемлемых альтернатив В связи с тем, что клиент избегал принимать пищу на публике, он не мог увидеть никакого конструктивного пути выхода, кроме как принимать пищу в одиночестве. Он не представлял себе, как можно справиться с беспокойством. Вообще-то у него были навыки работы, обаяние, обходительность, но воспользоваться этими своими ценными качествами он не мог из-за боязни есть на людях. Ему также не хватало уверенности в своей способности поддерживать близкие отношения с женщиной.

Его оценка своего брака и нереалистичные, по большей части, представления об идеальной партнёрше свидетельствовали, что до тех пор, пока он не сможет изменить свои ожидания и своё поведение в этой сфере, проблемы в отношениях будут сохраняться.

6. Инструментальные факторы Необходимо понять, даёт ли клиенту наличие проблемы какие-либо преимущества. Мы уже отмечали, что проблема тревожности позволяет ему избегать встречи с другими трудностями. При этом избегание скорее являлось результатом беспомощности, чем активного сопротивления изменениям, поскольку его тактика заключалась в отказе от каких-либо достижений.

7. Долговременные порочные круги Одним из наиболее долгосрочных последствий проблемы тревожности клиента являлось снижение самооценки. Практически это значит, что он относился к своей «тревожности» как к препятствию для работы и отношений. В известной мере его депрессия была проявлением общих пессимистических представлений о будущем. Поэтому вне зависимости от других проблем адаптированности, мы можем считать, что именно проблема тревожности играла ведущую роль в его деморализации. Он не может найти работу и построить новые отношения из-за своей «проблемы тревожности», а решить свою «проблему тревожности» ему вряд ли удастся без достижения успеха в этих сферах. На данном примере хорошо видна сущность порочного цикла.

Постановка целей

Были согласованы четыре промежуточные цели:

1. принять по отношению к проблемам практическую и конструктивную точку зрения, а не фокусироваться на «симптомах»;
2. спокойно принимать пищу на публике;
3. получать поддерживающее консультирование и по мере необходимости советоваться по поводу работы, отношений и семейных вопросов (для подготовки к консультированию с более четкой фокусировкой в даль-

нейшем);

4. постепенно отказаться от лекарств.

Следует подчеркнуть, что эти задачи не включают в себя снижение «напряжённости» или «общей тревожности». Это так, потому что:

- иначе было бы подкреплено его стремление к фокусированию на симптомах и медикаментозном лечении;
- ожидалось, что при достижении первой и второй целей подавленное состояние будет преодолено;
- было известно, что клиент слишком неуравновешен для успешного применения телесно фокусированных методов, например, тренинга релаксации.

Вмешательство

Был выбран скорее бихевиоральный, нежели когнитивный подход, поскольку клиент испытывал трудности в выработке рациональной и систематичной позиции по отношению к своим проблемам. Информация предоставлялась ему в краткой дидактической форме.

***Первая цель.** Обучение проблеморазрешающей стратегии осуществлялось с помощью следующих приемов:*

- формулирование плана каждой встречи;
- игнорирование упоминаний о симптомах и возвращение к плану;
- постановка перед клиентом задач по разрешению проблем в ходе встреч и между ними.

Достижение второй цели фактически являлось средством для демонстрации того, что решение проблем (таких, как приём пищи на публике) может быть поэтапным.

***Вторая цель.** Была разработана программа постепенного совладания с ситуациями приёма пищи на людях (см. Главу 6). Программа включала ряд пунктов:*

1. уверенное привыкание к ситуации, ведущее к исчезновению страха;
2. развитие уверенности клиента в том, что он может предотвратить удушье;
3. установление и обсуждение причин, лежащих в основании его опасений стать посмешищем в глазах публики или умереть от удушья (в ситуации приёма пищи).

Мы попросили нашего клиента закрепить то, что он узнал во время встреч, попробовав совладать с тревожащими ситуациям самостоятельно или в компании друзей (см. Главу 7). Наш клиент поверил в свою способность предотвратить удушье, выполняя простую инструкцию о мерах предпринимаемых в случае возникновения затруднений глотания. При этом нужно:

1. прекратить есть или пить;

2. отложить столовые приборы;
3. не пытаться проглотить;
4. расслабиться и подождать, пока не успокоишься и не сможешь продолжить приём пищи.

Наблюдая за клиентом, консультант определял, когда наступает пора применить эти правила. Он громко проговаривал инструкции. После проведенной спокойно паузы всегда непроизвольно происходило глотание. Через некоторое время клиент стал соблюдать эти правила после напоминания, а ещё позже он сам научился определять необходимость их применения.

Ситуации еды на людях были оценены с точки зрения возрастания их сложности, основанный на предварительно установленной «иерархии» (см. Главу 6). Клиента просили рассказывать, какие мысли возникают у него, когда он находится в таких провоцирующих тревогу ситуациях. По отношению к выказанным нереалистичным страхам применялись следующие приемы:

- выявление их обоснованности; например, посмотреть, кто из сидящих в кафе людей наблюдает за поведением клиента; доказать, что они посчитали его поведение нелепым;
- поиск возможных «путей отступления» в случае материализации его катастрофического сценария; например, вообразить, что после панического бегства из кафе он быстро успокаивается и возвращается, делая вид, что был вынужден выйти из-за того, что плохо себя почувствовал, и при этом ему не нужно испытывать неловкость из-за неуплаты по счету.

Обеспечивая чувство уверенности, эти альтернативы так и негодились клиенту в реальной практике.

Третья цель. Консультирование было полезным и в ситуациях, связанных с работой и подругами. Благодаря этим ситуациям были выявлены его ожидания и способы совладания. Данные аспекты не будут обсуждаться, поскольку они прямым образом не связаны с целями нашего пособия.

Четвёртая цель. Медикаментозное лечение было сокращено в соответствии с рекомендациями, представленными в Главе 9.

Результат

Этот клиент полностью преодолел проблему приема пищи на людях за пятнадцать месяцев, и теперь ест на работе. Встречи с консультантом в течение первых 12 недель происходили каждую неделю, а затем раз в 4-6 недель. За это время он нашёл устраивающую его работу, а общее негативное состояние и самоотношение снизились до приемлемого уровня без прямого воздействия.

Рекомендуемая литература

Основные принципы бихевиорального и функционального анализа можно найти в большинстве учебников по бихевиоральной или когнитивно-бихевиоральной терапии, в связи с проблемой тревожности рекомендую ознакомиться с Emmelkamp (1982) и Hawton et al. (1989). По теме когнитивного анализа читайте Beck et al. (1985), Blackburn и Davidson (1990) и Trower et al. (1988).

Оценка в консультировании по проблемам тревожности

Цель оценки – собрать необходимую информацию для того, чтобы сформулировать проблему (проблемы) и принять решение о первоначальном вмешательстве. Данная цель, как правило, достигается за одну–две встречи, если же этого срока недостаточно, правильнее будет продлить период оценки, но не приступать к работе, не имея полной картины. Консультанту следует постоянно быть внимательным и учитывать, что на протяжении всего терапевтического процесса будет всплывать новая важная информация. Для этого применяются стандартные вопросы, когда речь заходит о чем-то, имеющем отношение к теме консультирования, но не по спонтанно всплывающим темам.

В данной главе будут описаны методы систематического сбора информации. Сначала процесс сбора направлен на формулировку проблемы, затем - в основном для проверки терапевтических гипотез.

Методы оценки

Основными методами оценки являются:

1. интервью (с клиентом или значимыми окружающими);
2. наблюдение за поведением (в искусственно созданных или реальных ситуациях);
3. самонаблюдение (например, ведение дневниковых записей о событиях, вызывающих беспокойство);
4. опросники и анкеты;
5. исследование фантазий о проблемных темах.

Мы обсудим, как данные методы соотносятся с разным целям оценки. Мы сосредоточимся на процедуре *оценивания* проблем тревожности, предполагая, что консультанты уже обладают навыками установления раппорта, отделения нерелевантных проблем и ведения интервью в соответствующем особенностям клиента стиле.

Первые оценивающие интервью

Первоначальная оценка направлена на то, чтобы:

1. Составить общее представление об основных проблемах и оказываемом им влиянии с точки зрения его широты, а не глубины. Полезно получить такую общую «зарисовку», прежде чем углубляться в детали;
2. Собрать биографические данные - возраст, семейное положение, происхождение, условия проживания, религиозная/этническая идентичность, род занятий, образование, общественные интересы, досуг;
3. Выявить историю развития основных проблем и связанных с ними жизненных событиях и обстоятельствах;

4. Выявить краткую историю медицинского и психиатрического лечения (если таковая имеется), обратить внимание на текущий прием лекарств, особенно психотропных средств, и на их дозы. Здесь же учитывается история депрессии и эмоциональное состояние на данном этапе;
5. Оценить реакцию клиента на предшествовавшие лечение/ терапию/ консультирование, его отношение и мотивацию к предлагаемой форме консультирования;
6. Получить более детальное представление о тех проблемах, для решения которых клиент обращается за помощью (их история, оказываемое на настоящее и будущее влияние, частота, длительность и связь с жизненными ситуациями).

Из вышеперечисленного не следует, что интервью должно иметь жёсткую структуру, так как ценная информация обнаруживается чаще всего по ходу разговора случайно. Консультанту следует фиксировать интервью письменно или с помощью аудиотехники.

Таблица 5.1. Перечень распространённых страхов и тревог

<i>Боязнь животных</i>	<i>Общественные места</i>
Змей	Прогулка по улице
Пауков	Магазины
Собак	Поездка в метро
Кошек	Путешествие на автобусе
Птиц	Путешествие на машине
Пчёл или ос	Полёт
Крыс или мышей	Театр или кинотеатр
	Мосты
<i>Социальные страхи</i>	Возвышенности
Выступление перед аудиторией	Глубокая вода
Встреча с влиятельными людьми	Лифты
Встреча с представителем противоположного пола	Кресло парикмахера
Спор	<i>Плохое самочувствие, травма, болезнь</i>
Быть подвергнутым критике	Посещение больницы
Быть объектом наблюдения для окружающих	Вид крови
Посещение вечеринки, компании	Укол
Совершение ошибки	Острые предметы
Выглядеть глупо	Посещение дантиста
Слышать громкие злые голоса	Врачи
	Остановка сердца
<i>Разнородные</i>	Психические заболевания
Темнота	Хирургическая операция
Гром и молния	Микробы
Остаться в одиночестве	Мысль о смерти
Пользоваться общественным	Обморок

туалетом
Поместить свою подпись первым
в списке

Рвота или наблюдение
Удушье

Оценка основных областей проблемы на основе самонаблюдения

Многие проблемы клиента могут быть выявлены еще до первого интервью с помощью опросников и анкет. Полученная таким образом информация может быть дополнена в беседе. Некоторые наиболее часто используемые перечни вопросов для самонаблюдения приведены в Приложении А. Список страхов и причин тревоги дан в Таблице 5.1. Перечень психических и физических проявлений, сопутствующих проблемам тревожности, представлен в Таблице 5.2.

Основные проблемы устанавливаются в течение 10-15 минут первого интервью, которое обычно строится на основе содержания направления к консультанту, полученного клиентом от обследовавшего его ранее специалиста. Отсутствие желаемого поведения – это такая же проблема, как и наличие жалоб по поводу трудностей, от которых клиент предпочёл бы избавиться. Более глубокое исследование происходит в ходе дальнейших интервью.

Таблица 5.2. Чувства и ощущения, обычно испытываемые при проблемах тревожности

Сердечно-сосудистая система

Прерывистый пульс
Периоды учащённого пульса
«Отсутствие» сердцебиения
Сильное сердцебиение

Холодная и липкая кожа
Побледнение кожи
Покраснение кожи
Вспышки жара и озноба
Сильная пульсация

Дыхательная система

Неспособность «вздохнуть полной грудью»
Сопение
Прерывистое дыхание
Давление или ощущение тяжести в груди
Боли в груди

Одышка
Сдавленность в груди

Опорно-двигательная система

Вздутие
Диарея
Запор
Затрудненное мочеиспускание
Частое мочеиспускание или частые позывы

Сон и отдых

Трудности засыпания
Пробуждение по ночам
Раннее пробуждение
Ночные кошмары
Неглубокий сон
Неспособность отдохнуть

Неспособность расслабиться
Лунатизм

Слух, равновесие, зрительно-моторная координация

Затуманенное зрение
Суженное зрение
Неспособность удерживать равновесие
Головокружение

Тремор
Дрожь
Мышечное напряжение
Судороги
Мышечная слабость
Скрежетание зубами

Мышечное подёргивание
Чрезмерное надавливание при письме или похожей деятельности
Мигание
Напряжённые лицевые мышцы
Головные боли от напряжения
Дрожащие «резиновые» ноги
Временная потеря речи
Быстрая/сбивчивая речь
Заикание

Пищеварительная и выделительная системы

Сухость во рту
Ком в горле
Затруднённое глотание

Рвота

Тошнота
Расстройство желудка
«Желудочная дрожь»
«Твердый желудок»

Кособокость
Неустойчивость
Звон в ушах
Временная потеря слуха

Другие аномальные физические ощущения

Покалывание
Онемение

Физические боли
Усталость
Рассеянность
Потеря сознания

Аномальные психические переживания

Ощущение отдалённости от мира
Ощущение собственной нереальности, роботообразности
Неспособность к концентрации

Высокая отвлекаемость
Забывание хорошо известных вещей
Неспособность освободиться от неприятных мыслей
Сильное беспокойство о незначительных вещах
Трудно думать
Пустота в голове

Углубленная оценка основных проблем

Хронология

Важно тщательно восстановить хронологию событий, связанных с основными проблемами, поскольку это позволяет выявить причины и, наоборот, исключить некоторые объяснения. Клиенты могут датировать событие, указывая год или свой возраст, а также описывать только последовательность, если не помнят дат. Для записи данной информации пригодится лист бумаги с расчерченными графами, как показано в Таблице 5.3.

Таблица 5.3. Бланк для записи истории жизни

Дата	Возраст клиента	Событие и сопутствующие ему обстоятельства

Цель заключается в выявлении:

- возможной причинно-следственной связи между событиями;
- стабильной формы проявления или содержания проблем;
- различий в частоте и силе проявления проблемы и связанных с ней событий;
- циклических эффектов, предположительно имеющих психологическую природу;
- в конечном итоге - составление связного описания жизни клиента.

Информация об отношении клиента к имеющемуся у него опыту получения психологической помощи позволяет определить его мотивацию, предпочтительный для клиента и предположительно наиболее эффективный тип вмешательства. Если удастся определить точное время возникновения проблемы, то полезным будет детальный анализ того, что тогда происходило.

Текущая ситуация и последствия основных проблем

Цель данного этапа – рассмотреть проблемы в контексте:

- ситуации, в которой они проявляются;
- возникающих в это время мыслей клиента;
- непосредственных последствий;
- долговременных последствий.

Клиенты обычно дают более чёткое описание контекста, если обсуждаются конкретные примеры. Вопросы могут быть сформулированы следующим образом:

«Расскажите мне о последнем случае, когда произошла подобного рода неприятность? (или о первом случае, о самом тяжёлом случае и т.д.)»

«Опишите ваш типичный день, начиная с того, как вы просыпаетесь»

«Что бы вы отметили в своей проблеме в первую очередь?»

«Какие мысли посещают вас, когда проблема возникает?»

Информацию о контексте проблемы можно записать так, как показано в Таблице 5.4.

Таблица 5.4. Бланк для проведения функционального анализа

Для каждой выявленной проблемы			
Ситуативно предшествовавшие события	Описание проблемы	Непосредственные последствия	Долгосрочные последствия
Когда, где, с кем	(1) Поведение: Наличие Отсутствие..... (2) Ощущения (3) Мысли	Результат реакции, изменение ситуации, сенсорные или эмоциональные последствия	Результат для других, отказ от деятельности, стратегия совладания и т.д.

Для выявления долгосрочных последствий могут помочь такие вопросы.

«Что случится, если проблема будет существовать и дальше?»

«Препятствует ли эта проблема какой-либо вашей деятельности?»

«Как ваша жизнь изменилась после?»

«От чего вам пришлось отказаться из-за этой проблемы?»

«Что это значило для (вашего партнёра, друзей, семьи)?»

«Что бы вы сделали, если бы смогли справиться с этой проблемой?»

При получении информации о контексте с помощью интервью отсутствует непосредственность и спонтанность прямого наблюдения. Это можно компенсировать одним из следующих способов.

1. При проведении интервью моделируются реальные или придуманные случаи, в которых проявляются темы тревожности, например, договорившись с клиентом, играть роль персонажа, вызывающего у клиента тревогу. Воссоздается обстановка, характерная для ситуаций тревоги, после чего клиента просят сказать, что при этом чувствуется и думается, или продемонстрировать его обычную реакцию.
2. Воспроизведение ситуации, провоцирующей беспокойство клиента, с тем, чтобы провести наблюдение реального поведения и получить его отчет о мыслях.
3. Клиента просят отчётливо вообразить проблемную ситуацию и описать, что он чувствует, думает или делает. Предлагается внести изменения в воображаемом сценарии, что позволяет выявить значимость элементов контекста. (Для применения метода направленного фантазирования клиенту нужно закрыть глаза и пребывать в состоянии относительного покоя.)

То, как клиенты описывают беспокоящие образы, часто больше говорит о значимых аспектах проблемы, чем взвешенная и обдуманная информация. Часто мысли и образы, возникающие у клиентов, удивляют их самих. Пример

использования фантазирования с целью исследования приведен на следующих страницах. Анализ информации о контексте, полученной из данных фантазирования и других источников, приведён в Таблице 5.5. В ней содержится иллюстрация того феномена цепочки мыслей, ведущих к катастрофическому результату, который описан в Главе 4.

Выдержки из протокола направленного фантазирования с клиентом, страдающим клаустрофобией (Кл = клиент, Ко = консультант)

Клиентка испытывала панику в автобусе.

Высказывание	Комментарий
Кл: Обычно я езжу в автобусе, если в нем нет людей. Обычно я нахожу место внизу, но из-за забастовки водителей было слишком людно. Поэтому мне пришлось подняться наверх.	
Ко: Что вы почувствовали, когда это увидели?	Фокусирование на ощущениях.
Кл: Автобус действительно переполнен. Пересыхает во рту, когда я начинаю думать о таких вещах.	Уже этот образ способен вызывать страх.
Ко: У вас сейчас сухость во рту, да?	Фокусирование на настоящем для усиления реакций.
Кл: И по всему проходу стояло много народа, обычно стоит около 20 человек, но тогда стояло, должно быть, вдвое больше. Даже дверь не могли закрыть.	Кл не нуждается в подсказках.
Ко: Хорошо, можете ли вы припомнить, где вы сидели?	Фокусирование на конкретных деталях для усиления образа.
Кл: Наверху, первое место сзади.	
Ко: И вы сидели рядом с кем-то?	Детализация
Кл: Я сидела рядом с молодой женщиной. Окно запотело, и ничего не было видно. Все окна закрыты, но холодно. Я открыла окно, но кто-то из сидящих сзади закрыл его, поэтому я почувствовала, что не могу дышать. Я протёрла окно, чтобы можно было посмотреть на улицу. Когда автобус начал движение, я немного успокоилась. Я думала, на следующей остановке люди начнут выходить, но этого не случилось. На станции выходила толпа народу. Некоторые люди кричали оттого, что не могли выйти, другие не могли войти.	
Ко: Остановитесь на минутку. Можете ли вы мне сказать, как вы себя чувствуете в данный момент? Вы сказали, у вас была сухость во рту. Что-то ещё?	Фокусирование на настоящем.
Кл: Немного встревожена, но не так, как прошлым вечером.	
Ко: Как вы чувствуете встревоженность?	Детализация.

Кл: Моя грудь, я чувствую сдавленность.	
Ко: Сдавленность в груди, ага. И вы сказали, что в автобусе не могли нормально дышать?	Прояснение.
Кл: Да. Я подумала, надо открыть окно.	
Ко: Когда вы сказали, что не могли дышать, что именно вы имели в виду? Что же произошло прошлым вечером?	Усиление давления.
Кл: Я чувствовала себя запертой.	
Ко: Вы почувствовали себя запертой?	Отражение и возможность продолжать.
Кл: Да.	
Ко: Что же случилось с вашим дыханием?	Усиление давления.
Кл: Я почувствовала, что задыхаюсь.	
Ко: Задыхались? Вы не могли вздохнуть ...?	
Кл: Вздохнуть полной грудью. Вот почему я протёрла окно платком. Это не очень помогло. Может быть, чтобы посмотреть в окно и понять... Там было окно.	
Ко: Вы почувствовали, что ваше дыхание остановилось?	Попытка прояснения.
Кл: Такое чувство, будто кто-то обхватил горло руками и душит. Нет, не то, чтобы чьи-то руки действительно были на моём горле. Это воображение, выдумка.	Ко ещё некоторое время продолжал задавать вопросы на эту тему, но безуспешно. (Позже выяснилось, что страх удушения имеет этиологическую значимость.)
<i>Некоторое время спустя.</i>	
Кл: Ну, я ощущаю дрожь, моё сердце колотится, руки становятся липкими. Я хочу убежать. Я хочу встать, сойти вниз и выйти.	Классическая реакция побега.
Ко: Вы чувствовали это прошлым вечером, что вам хотелось убежать?	
Кл: Да, но это чувство пропало, потому что я заговорила с женщиной, сидящей рядом со мной, чтобы переключиться.	Клиент использует переключение внимания.
Ко: Я хочу, чтобы вы представили себе ту ситуацию настолько чётко, насколько можете. Вы наверху, люди стоят в проходе.	Ко пытается усилить образ и эмоции, чтобы выявить мысли.
Кл: Да, и вокруг меня.	
Ко: Итак, вы со всех сторон окружены людьми. Теперь я хочу, чтобы вы представили себе те ощущения. Вы не можете вздохнуть полной грудью, во рту пересохло, ваше сердце колотится, ваши руки потеют. Постарайтесь почувствовать это, думая «Я не могу выбраться отсюда»; «Я не могу даже посмотреть в окно»; «Я не могу даже открыть окно»; «Я хочу выскочить отсюда».	Усиление напряжения.
Кл: Да.	
Ко: Постарайтесь представить себе те ощу-	

<p>щения. Попробуйте пережить их снова. Ваша грудь сдавлена. Ваше сердце колотится. Вы думаете про себя «Как мне выбраться отсюда?» Вы заперты там, заперты на своём месте. Если бы вы попробовали выбраться, это трудно было бы сделать. Вам бы пришлось проталкиваться между всех этих людей. Вообразите это и опишите свои переживания.</p>	
<p>Кл: Это не очень приятно. У меня сейчас нет тех ощущений, что были на самом деле. Но есть сухость во рту. Но у меня нет желания убежать.</p>	
<p>Ко: Отлично. Когда вы были в автобусе, вы пытались отвлечься, заговорив с соседкой. Опишите мысли, от которых вы хотели отвлечься.</p>	<p>Прояснение мыслей теперь, когда она действительно вовлечена.</p>
<p>Кл: Ну, я думаю: Как нелепо, я чувствую себя запертой. Я должна с этим бороться, я говорю с этой женщиной, потому что мне отсюда не выйти.</p>	
<p>Ко: Ага, это для того, чтобы преодолеть свой страх и бороться с ним. Замечательно. Но вы делали это, чтобы избавиться от своих ощущений. Верно?</p>	<p>Проверка достоверности фактов. Усиление давления.</p>
<p>Кл: Да, я не хотела выглядеть душой.</p>	<p>Мысль определена!</p>
<p>Ко: Так.</p>	
<p>Кл: Потому, что так уже было, я была заперта в квартире. И это засело в голове. Моя подруга забыла о моей клаустрофобии и ушла, закрыв меня. Она была восьмью этажами выше, а я не могла открыть дверь. И она не могла открыть дверь. Я сидела у двери, скрючившись, как ребёнок, и звала на помощь. И я не хотела повторения подобной ситуации. Вот что было в голове.</p>	<p>Кл вспоминает свои мысли по поводу своей нелепости.</p>
<p>Ко: Хорошо, о том же самом вы думали и прошлым вечером?</p>	
<p>Кл: Да. И это случилось восемь или девять лет назад.</p>	
<p>Ко: Итак, вы сидели скрючившись. О чём вы думали тогда, сидя под дверью?</p>	<p>Переход к прошлому травматическому воспоминанию и выяснение его смысла.</p>
<p>Кл: Просто умоляла, чтобы кто-нибудь поскорее выпустил меня оттуда. И дверь взломали.</p>	
<p>Ко: Вы сказали, что не хотели поставить себя в глупое положение – вы чувствовали себя глупой тогда?</p>	<p>Повторение предшествующих мыслей.</p>
<p>Кл: Да, но никто не смеялся надо мной, когда дверь открыли.</p>	

Кл: Но вы чувствовали себя глупо?	
Кл: Да, чувствовала.	
Кл: А ваша подруга так не думала?	
Кл: Она очень расстроилась, что забыла про мою клаустрофобию.	
Кл: Я совсем забыла об этом до прошлой ночи.	Забытое содержание восстанавливается при сильных эмоциях.

Самонаблюдение

Иногда основным приемом терапевтического вмешательства является процедура творческого воображения, описанная в Главе 6. Другим методом оценки является *самомониторинг*. Клиенты получают задание отслеживать свои мысли, чувства и действия, возникающие в промежутках между встречами, и записывать эту информацию в дневник, форма которого воспроизводит содержание первых трёх колонок Таблицы 5.5. Дальнейшие рекомендации по использованию дневников можно найти в Главе 7. Маловероятно, что клиент сразу сумеет правильно вести дневник. Нужно одобрять записи, и при этом предлагать улучшать качество информации. Когда становится ясно, что дневник представляет собой полезный инструмент, клиент приходит к пониманию важности его ведения.

Самоконтроль по сути можно считать собственно вмешательством (см. Главу 7); кроме того, в большинстве форм вмешательства он играет роль вспомогательного средства при обучении клиентов навыкам формирования более ясных представлений о своей проблеме и её контексте, а также для отслеживания переноса новых форм поведения из ситуации консультирования в повседневную жизнь. Занесенные в дневник сведения анализируются и обсуждаются в начале встречи.

Таблица 5.5. Функциональный анализ информации о контексте, полученной с помощью управляемого воображения

Ситуативно предшествовавшие события	Описание проблемы	Непосредственные последствия	Долгосрочные последствия
Сидение в автобусе. Выход заграждён людьми в проходе.	1. Поведение – стремление вырваться из автобуса. 2. Ощущения / чувства – пересохший рот, сдавленность в груди, сильное сердцебиение, удушье. 3. Мысли – я буду выглядеть глупо,	Заговорила, чтобы отвлечься. В конце концов - бегство в поисках безопасности.	Постоянный страх замкнутого пространства. Избегание некоторых видов общественного транспорта. Снижение самооценки. Супружеские проблемы.

	если поведу себя как ребёнок и кричать, что мне необходима помощь.		
--	--	--	--

Обычно клиента просят дать подробную оценку. Элементы контекста, которым в своё время не придавали значения, могут быть внимательно рассмотрены. Качество дневниковых записей улучшается по мере того, как клиент учится определять относительную важность событий.

Описанные в дневнике эпизоды можно рассматривать как естественные эксперименты, исход которых служит обоснованием для той или иной формулировки проблемы. К примеру, супружеская пара обнаружила, что в отпуске у них гораздо лучше складывались отношения друг с другом и они занимались любовью намного чаще, чем на протяжении многих месяцев до этого. По возвращении домой женщина стала чувствовать напряжение, раздражение и уныние, когда супруг требовал заняться любовью, а ей этого не хотелось. Анализ противоположных случаев выявил, что секс на отдыхе был «спонтанным» и дневным. Дома же любовью обычно занимались вечером и супруг это планировал. У неё выработалась, по её словам, «фобия» вечеров.

Женщина постоянно чувствовала себя объектом эмоционального манипулирования и контроля со стороны матери, и любое требование, которое, как она чувствовала, ограничивало свободу выбора, вызывало у неё негодование. Обсуждение этих дневниковых записей привело её к новой формулировке своих «сексуальных проблем тревожности». А именно: она поняла, что ей не свойственна неприязнь к сексу, но то, как партнер сообщал ей о своем желании, было критично для её удовлетворения. Как отмечено выше, напряжение, связанное с ситуациями, в которых она ощущала чрезмерное «эмоциональное давление», повлияло на готовность выполнять любые предложения.

Новая формулировка побудила ее к обсуждению трудностей в сексуальных отношениях со своим партнёром, то есть сделать то, чему она до этого сопротивлялась, так как «проблема» казалась ей неразрешимой. На этом примере видно, как самоконтроль становится методом вмешательства, основанного на приеме домашних заданий.

Схематическое изображение проблем клиента

Рисование схем, показывающих, как события жизни клиента соотносятся друг с другом, может применяться консультантом для составления чётких предварительных формулировок. С такой схемой можно ознакомить клиента не только для того, чтобы выяснить, достаточно ли точно отображает она его проблемы, но и потому, что это способствует взаимопониманию и позволяет определить характер вмешательства.

Схемы строятся на основе данных наблюдения или стенографических записей и могут включать такие обобщающие характеристики, как «неуверенность». Такая схема неизбежно является умозрительной, и в большинстве случаев не позволяет проследить причинно-следственные связи. Просто принимается, что один элемент воздействует на другой или определяет другой. Предполагается, что один элемент влияет на другой, если первый влечет ухудшение либо вследствие *повышения* значимости/частотности, либо путём *подавления* распространённости или частотности второго. Также может быть отражена роль позитивных элементов. Прошлые события важны, поскольку определяют ожидания от текущих ситуаций. Подобным же образом и ожидание будущих событий оказывает влияние на текущее поведение. Следовательно, схема позволяет рассматривать события в психологическом «пространстве-времени», при этом считается, что реальные события могут быть изменены или что реальные события способны изменить ментальные образования.

Лучше всего иллюстрирует вышесказанное пример из практики. Сначала рассмотрим словесное описание, а затем попробуем составить схематическое изображение проблемы (см. Рисунок 5.1). Миссис Дж., компьютерный программист 25 лет, она недавно вышла замуж. Её муж – администратор, загруженный работой и часто уезжающий за границу. В фирме миссис Дж. попросили завершить проект в очень короткий срок. Она берётся за работу, но чувствует себя в напряжении. Страдает её способность к концентрации, она переживает «приступ паники» на работе. Учащается пульс, трясутся руки, и она оказывается не в состоянии сосредоточиться на клавиатуре. Она испытывает непреодолимое желание уйти из офиса, что она и делает. Позже она возвращается, но сконцентрироваться ей всё ещё трудно. Неделью спустя «паника» возникает вновь, и она уходит домой, сославшись на плохое самочувствие.

Дома ее волнение усиливается, она не может решить, нужно ли возвращаться на работу, и каждый день переживает приступ паники. Её терапевт, учитывая крайнюю взволнованность и хроническую нерешительность пациентки, идет на чрезвычайные меры и направляет ее на короткое время в палату интенсивной терапии психиатрического отделения. Выясняется, что тот же врач лечил отца миссис Дж. от депрессии, но тот во время лечения совершил самоубийство. Врач по понятным причинам осторожен и не хочет рисковать. Он договаривается с клиенткой о подложном диагнозе «вирусное заболевание» с тем, чтобы ни работодатель, ни родственники не знали истинной причины помещения её в больницу.

Миссис Дж. проводит достаточно много времени со своей матерью, которая оказывает эмоциональную поддержку, но так же, как и дочь, не может выработать определенное отношение к проблеме ее работы – вернуться или уволиться. Кроме того, мать так же тревожится по поводу состояния дочери, как и сама дочь. Мать сильно боится, что у дочери разовьется психическое

заболевание, как в свое время у её мужа. Муж самой миссис Дж. не может оказать ей поддержки, поскольку много работает. Он в курсе событий и предлагает жене бросить работу. Миссис Дж. расстроена, что муж реагирует не достаточно эмоционально.

Во время первого интервью Миссис Дж. описывает специфические проявления соматического расстройства и демонстрирует признаки постоянного возбуждения. Она чувствует «напряженность» большую часть времени, грызёт ногти, неспособна сконцентрироваться, расслабиться или быстро заснуть. Она проявляет крайнее непостоянство в ситуациях выбора, особенно если дело касается её работы. Соматическое расстройство проявляется в горячей испарине, спазматических болях в груди и «желудочной дрожи». Она оценивает свою уверенность в себе как «очень низкую», чувствует себя «ленивой», потому что не работает, и виноватой за то, что причиняет неприятности своей проблемой матери и мужу.

Когда ее спросили, какой бы она хотела себя видеть, она отвечает «организованной, компетентной, добивающейся результата и не ленивой». Академические достижения всегда были важны в её семье и, хотя она получила университетскую степень, но с большим трудом. Будучи ребёнком, она занималась дополнительно с репетиторами и всегда испытывала огромный стресс из-за экзаменов. Ничто другое особенно не тревожило ее и она никогда не обращалась за психологической помощью. Она не считает себя «академически одарённой» и хотела бы иметь первоклассный ум. Для неё важны высокие стандарты, и она чувствует, что опускается сама и разочаровывает других, когда жертвует ими. Высоко ценит чёткость и порядок.

Миссис Дж. ценила свою компетентность и мнение о ней окружающих так высоко, что не смогла отказать в просьбах взяться за дополнительную работу. В этом отношении, но не в других, она была уверена в себе. Она знала, что хорошо выполняла свою работу, что другие считали ее компетентным специалистом и что способности её руководителя ниже её собственных. Однако это знание не уменьшало давления тех требований, которые она предъявляла самой себе.

Было понятно, что, пока миссис Дж. находится в столь тревожном состоянии, она не может продолжать работать. Выявление того, что значит для неё увольнение, позволило найти объяснение силе внутреннего конфликта, связанного с решением, бросить ли ей работу или остаться. Когнитивный анализ был проведён в соответствии с описанием, приведенным в Главе 4. Уволиться - значит признаться себе в том, что она воплощает в себе все отвергаемые ею характеристики – неорганизованность, некомпетентность, неуспешность и лень. Такое отношение к вещам является примером иррационального мышления, - ведь при этом считается, что данное решение будет определяющим для ее личности в целом и всегда (сверх-обобщение), а не представляет собой временный маневр, после применения которого она сможет вновь добиться высокого статуса на новой работе. Напротив, последствия

увольнения связывались у неё с двумя катастрофическими сценариями: (1) муж и его семья будут воспринимать её как несостоявшегося профессионала, и это может привести к крушению брака (она уже подозревала, что родители мужа критически оценивали её, и стремилась подтвердить свою состоятельность); (2) если бы она уволилась с работы, это означало бы, что она «глупая» и точно также не приспособлена к жизни, как её отец. Она боялась сорваться и психически заболеть. Этот страх усиливался тревогой матери и терапевта.

Общую картину проблемы миссис Дж. можно передать графически, как показано на Рисунке 5.1, который позволяет видеть:

- сложность проблем тревожности и взаимосвязь прошлых, настоящих и будущих событий, реальных или воображаемых;
- роль глубинных ассоциаций либо в усилении тревоги, либо в неспособности найти источник защищенности/безопасности;
- что вмешательство должно вести к принятию трудных жизненных решений (например, уволиться или нет с хорошо оплачиваемой работы);
- что проблема определяется многочисленными компонентами этой сложной сети поведения, мыслей, физиологических реакций, решений, ценностей и отношений.

Рисунок 5.1. Сложная проблема тревожности



психическая болезнь

На этом этапе я не буду говорить о том, какие вмешательства были предприняты или упоминать о результате. Я укажу, в каких направлениях могло бы происходить вмешательство, чтобы показать, что на взаимосвязанные элементы можно влиять по-разному. Не все из этих рекомендаций применимы в разбираемом случае.

- Повлиять на стандарты достижений клиента.
- Научить клиента контролировать приступы паники.
- Коррекция иррационального мышления и катастрофизации.
- Супружеское консультирование: например, побудить мужа к более поддерживающему поведению.
- Повлиять на отношения матери и терапевта с клиентом.
- Выработать уверенность в себе.
- Побудить клиента бросить работу и начать карьеру заново на менее стрессогенной должности.
- Научить расслабляться и справляться со стрессом.
- Предложить начать принимать транквилизаторы и возвращаться к работе.

Порочные круги и жалобы на тревожность

Рисунок 5.1. иллюстрирует то, как порочные круги событий могут ухудшить и без того сложную ситуацию. Миссис Дж. всё более тревожилась из-за внутреннего конфликта по поводу того, уволиться или остаться на работе, росло физическое возбуждение и падала эффективность умственной деятельности. Это значит, что она действительно превращалась в «психически больную», неспособную работать и поэтому некомпетентную и глупую. Она представляла, что брак рушится, а она работает непрестижной должности. Она могла не осознавать эти мысли, когда возникала паника, но когнитивный анализ показал, что работали именно эти убеждения. Вероятно, мысли носили кратковременный и автоматический характер, или проносились в уме как образ. Этот ситуативный порочный круг в общей форме представлен в Рисунке 5.2. Примеры даны в Рисунке 5.3.

Долговременные порочные круги складываются из последствий проблемы тревожности, влияющих на обстоятельства жизни. Миссис Дж. было трудно принять перспективу оставить работу и потерять самоуважение, определяемое её профессиональным статусом. Её муж не знал, как помочь, и их отношения стали напряжёнными. Мать и терапевт только усиливали это мнение клиента о себе. Нетрудно представить, как происходило ухудшение ситуации.

Рисунок 5.2. Ситуативный порочный круг в проблемах тревожности




Рисунок 5.3. Примеры ситуативных порочных кругов.







Рисунок 5.3. Примеры ситуативных порочных кругов (продолжение).



Постановка целей и определение плана вмешательства

В процессе оценки мы достигаем этапа, на котором:

- принимаются решения о целях консультирования;
- формулируется проблема (предварительно);
- выбираются предпочтительные формы вмешательства;
- принимается решение о порядке осуществления вмешательств.

Основание для принятия этих решений будет объяснено и проиллюстрировано в следующих главах.

Рекомендуемая литература

Для дальнейшего изучения вопросов оценивающего интервью смотрите Kirk (1989) и Trower et al (1988). Barker (1985) - фундаментальное пособие по оценке поведения. Разнообразные методики практической когнитивной оценки описаны у Beck et al (1985).

Принципы конфронтации

Можно говорить о двух направлениях терапевтического вмешательства: изменение *реакций* на специфические сигналы и изменение *реагирования* в различных ситуациях. В последнюю категорию попадают занятия по релаксации, обучение умению разрешения проблем и тренинг уверенности в себе.

Здесь мы будем обсуждать первое направление. Способность к конфронтации с ситуацией, являясь целью модификации реакций страха и тревожности, формируется в ходе переучивания. При этом целью может становиться как овладение новыми видами реакции, так и устранение старых. Реакции страха могут быть вызваны двумя видами сигналов: внутренними (самопродуцируемыми), например, ощущение учащённого дыхания, или внешними. Среди самопродуцируемых сигналов выделяется особая группа связанных собственно с тревожностью. Способность сопротивляться выученным формам реакции на такие сигналы может потребовать создания в ходе вмешательства специальных провоцирующих тревожность ситуаций.

Мы знаем, что в процессе консультирования конфронтация провоцирующим тревожность ситуациям обычно приводит к субъективному переживанию снижения беспокойства, но о том, как именно конфронтация вызывает изменения, до сих пор спорят. Перечислим некоторые варианты объяснения данного процесса:

1. *Угасание*. Тревожные реакции могут быть опосредованы ожиданием, что конфронтация с провоцирующей ситуацией приведет к опасным или неприятным последствиям. Проще говоря, «тревожность» станет нестерпимой и это принесёт вред. Для клиентов, ожидающих такого развития ситуации, само наличие первых признаков «тревожности» является провоцирующей ситуацией, которая подкрепляет ожидание. Угасание – технический термин для обозначения процесса ослабления ответной реакции при устранении подкрепления. В данном случае подкрепление – это нежелательное событие (например, что-то опасное). Благодаря конфронтации выясняется, что опасность не возникает или не является такой уж страшной.
2. *Привыкание*. Данный процесс имеет отношение к ослаблению ответной или врождённой реакции в ходе многократного предъявления одного и того же стимула. Например, реакция испуга на неожиданный громкий звук притупляется при повторении звука. В терапевтическом смысле привыкание представляет собой один из видов процесса ослабления ответных реакций (включая рефлексy испуга, ориентировки и страха) посредством многократного освоения определенной ситуации.
3. *Развитие навыков совладания*. Конфронтация позволяет человеку выработать адаптивный способ реакции, например, научиться с достоинством встречать язвительную критику. Наличие адекватной реакции устраняет потенциальную угрозу. Навыки совладания формируются, в частности, в процессе обу-

чения произвольному подавлению тревожных реакций. Например, можно научиться расслабляться и замедлять дыхание.

4. *Когнитивное изменение.* Ниже будет дана иллюстрация того, как человек учится перестраивать провоцирующую ситуацию с целью снижения сопряженной с ней угрозы. Клиент может обнаружить скрытые ресурсы для совладания с угрозой, убедить себя, что предположительно угрожающее событие является на самом деле нейтральным, переосмыслить вероятность или тяжесть угрозы и т.д. Когнитивное изменение может возникать в ходе вербального взаимодействия с клиентом или «бихевиорального эксперимента», в котором привычные клиенту представления о мире входят в противоречие с последствиями новых способов действия.
5. *Реципрокное торможение.* Некоторые типы поведения ведут к подавлению тревожных реакций. Среди них - злость, поглощение пищи и произвольное расслабление. При организации конфронтации тревога и тормозящая реакция могут быть вызваны одновременно, чтобы вторая ослабляла первую.

Действие описанных гипотетических процессов необходимо учитывать при создании программы конфронтации. Разработка и осуществление программы происходит в несколько этапов:

- оценка выраженности стимула;
- выбор отправной точки;
- выбор способов конфронтации;
- настраивание клиента на эффективную конфронтацию;
- планирование терапевтической встречи;
- проведение встреч;
- завершение программы.

Оценка выраженности стимула

В большинстве случаев мы имеем ясное представление о том, в каких мыслях, образах, объектах или ситуациях находит выражение проблема. Может быть непонятно, *почему* стимул вызывает беспокойство, но сам факт, что он это делает, определяется чувством субъективного дискомфорта, нарушениями активности, стремлением к избеганию и другими телесными реакциями. Содержание и выраженность стимулов, вызывающих большинство проблем тревожности, в основном, варьируют незначительно. Первой задачей является определение возможных тем тревожности и составление для каждой из них перечня реальных или воображаемых ситуаций, имеющих к ней отношение. При использовании конфронтационных техник на основе воображения ограничений по тематическому содержанию не существует. Если же предполагается конфронтация в реальных ситуациях, необходимо определить, какие из них могут быть реализованы посредством прямого контакта, моделирования или ролевой игры.

После группировки по темам клиент в каждой из них ранжирует ситуации по степени беспокойства, которое они вызывают, и каждая ситуация получает соответствующий порядковый номер в списке. Этот список называется «иерархия тревожности». Для оценивания удобна шкала 0-10, где 0 = «совсем не беспокоит» и 10 = «самое сильное из пережитых беспокойство/ тревога/ паника». (Формулировки соответствуют терминам, в которых описывается проблема). Клиенты могут не суметь оценить, насколько их будет тревожить та или иная ситуация. По отношению к ситуациям, которые они привыкли старательно избегать, это вполне понятно. Клиенту будет легче представить свои реакции, если он закроет глаза и вообразит, как развивается такая ситуация. Другой метод заключается в побуждении клиента к тому, чтобы попасть в страшную его ситуацию и сообщать о своём беспокойстве по мере приближения к ней. Это называется «поведенческой пробой». В любом случае нужно учитывать, что ранг пункта в иерархии изменяется со временем.

Можно предложить ранжировать пункты по степени выраженности реакции избегания (например, «не стал бы избегать», «изредка избегаю», «обычно избегаю», «всегда избегаю»). Процедуру ранжирования по признаку тревожности и избегания можно использовать для диагностики эффективности консультирования. Клиенту сравнение результатов исходного и повторного ранжирования помогает увидеть достижения.

Описание пунктов иерархии должно быть конкретным, устраняющим какую бы то ни было неопределённость значения ситуации. Например, формулировка «ехать по автомагистрали между городом А и городом Б» лучше, чем «ездить по автомагистралям». При этом повышается валидность пункта как средства измерения прогресса. Пример иерархии дан в Таблице 6.1.

Таблица 6.1.

Пример иерархии страхов/тревожности, связанных с насекомыми

Пункты ранжированной иерархии	Ранг выраженности страха/тревоги (0-10)
Мёртвая муха	2
Маленький мёртвый мотылёк	4
Бабочка, летающая в поле	5
Большой мёртвый мотылёк	6
Бабочка в одном помещении с клиентом	7
Маленький живой мотылёк в стеклянной банке	7
Бабочка, садящаяся на голову клиента	8
Большой живой мотылёк в стеклянной банке	8
Большой мотылёк, летающий в помещении	10
Большой мотылёк, садящийся на голову клиента	10

Ключевые стимулы тревожных реакций не всегда идентифицируются на ранней стадии оценки и могут выявляться только благодаря конфронтации. Тщательное наблюдение за невербальным поведением клиента во время конфронтации помогает установить значимость отдельных стимулов. Необходимо побуждать клиентов к тому, чтобы самоотчеты о возникающих у них мыслях или тех стимулах, которые они считают значимыми, были максимально полными.

Данные первоначального ранжирования следует считать временными. Время от времени можно возвращаться к процедуре ранжирования и наиболее полезно это делать, воссоздав одну из оцениваемых ситуаций. Рейтинги могут использоваться для мониторинга прогресса и для составления плана очередной конфронтации. В последнем случае может потребоваться ввести промежуточные пункты, чтобы переход к конфронтации следующей степени был бы более комфортным; например, имитировать движение мёртвых мотыльков, перебрасывая их с ладони на ладонь и побуждать к осторожному прикосновению к маленьким бабочкам.

Выбор отправной точки

При выборе отправной точки возникают два критических вопроса: с какой иерархии и с какого пункта иерархии начинать? Некоторые критерии для выбора общих целей и порядка вмешательства были описаны в Главе 5. Прежде всего следует учитывать, насколько определенная тема тревожности разрушительна для жизни клиента и важна для него самого, а также насколько быстро может быть достигнут успех, способный мотивировать клиента на максимальные усилия.

Частично выбор пункта иерархии, с которого начинается конфронтация, зависит от применяемого метода. При этом следует помнить о некоторых теоретических положениях. Снижение тревожности, связанной с одной иерархией, вряд ли будет иметь общий эффект и скорее всего, для работы с каждой темой тревожности потребуются специальное вмешательство. Однако в рамках одной иерархии снижение тревожности по одному пункту распространяется на остальные. Если, к примеру, сначала проведена конфронтация по отношению к пункту из середины списка, клиент будет менее тревожно реагировать на ниже расположенные пункты, даже если он никогда не пытался справиться с ними напрямую. В определенный момент времени следует осуществить конфронтацию с самыми высокоранговыми пунктами, иначе при столкновении с ситуацией в будущем (или при повторном переживании её в воображении), тревога клиента будет усиливаться.

Когда определённые травмирующие воспоминания (например, автомобильная авария) всё ещё очень тягостны, может появиться необходимость применить технику конфронтации по отношению к образам памяти. При этом бывает достаточно организовать конфронтацию по отношению к ситуациям,

связанным с воспоминанием (например, посещение больницы или кладбища, езда на машине с высокой скоростью), для снижения его разрушительного воздействия.

В принципе, весомого теоретического обоснования нежелательности начинать работу с верхних пунктов иерархии не существует, на практике же следует придерживаться следующих правил:

Клиент должен чувствовать уверенность, что сможет справиться с ситуацией, отраженной в пункте. Нужно обеспечить собственное желание клиента действовать. Допустимо осторожно направлять клиента, но право решения остается за ним. Обычно клиенты довольно уверенно излагают свои представления о том, что им кажется достижимым, но консультанту следует помнить о чрезмерной уверенности. Как только клиентам в целом станет понятен метод, они самостоятельно могут предлагать следующий шаг. Со своей стороны, консультант может задавать вопрос: «К чему вы готовы дальше?»

Суть конфронтации должна быть подробно объяснена клиенту. Неожиданное введение новых страшящих элементов контр-продуктивно и может привести к ухудшению. Клиентам следует сказать: «Некоторые люди считают это внушающим беспокойство; вы вправе прервать нашу встречу – вас это устраивает?» Напомните клиенту с самого начала: «Мы можем остановиться в любой момент, если вы почувствуете чрезмерное беспокойство, поэтому не скрывайте от меня ничего, говорите сразу». «Мы можем продвигаться так медленно и осторожно, как вам захочется – важно, чтобы чувствовали себя уверенно на каждом этапе». Консультант должен всегда четко придерживаться разработанного плана встречи.

Когда консультант не знает, какова будет реакция клиента, конфронтацию следует начинать с пунктов из нижней части иерархии. Например, клиент, боящийся пауков, может начать с рисования паука. Продвижение вверх будет более быстрым, если какой-либо пункт совсем или частично не причиняет беспокойства.

Если консультант начинает с пункта, вызывающего сильную тревогу, необходимо, чтобы для формирования более спокойной реакции во время встречи у клиента было достаточно времени.

Иногда без работы с высоко стрессовой ситуацией обойтись нельзя. Например, может быть невозможно постепенно входить в конфронтацию с каким-либо травматическим воспоминанием. Как отмечено ранее, важным компонентом провоцирующей тревожность ситуации может явиться субъективное и физиологическое состояние возбужденности. Основанные на постепенности методы, не позволяющие клиенту соприкоснуться с «большой паникой», будут неэффективными, потому что маскируют действие внутренних ключевых стимулов. В любом случае, необходимо разрабатывать структуру и план вмешательства таким образом, чтобы они гарантированно соответствовали возможностям клиента.

Выбор способов конфронтации

Клиента можно попросить *вообразить* провоцирующую беспокойство ситуацию или *действительно столкнуться* с ней в реальности, в игре или в форме аудио- или видеозаписи. Процедура конфронтации может осуществляться под управлением консультанта или самого клиента. Как правило, применяются оба метода.

При выборе методик конфронтации принимаются в расчет следующие практические соображения:

1. Если у клиента слабо или совсем не развито воображение, воображаемый материал вряд ли станет эффективным стимулом.

2. Там, где ключевые стимулы не могут быть воспроизведены или смоделированы в реальности, фантазирование становится необходимым (например, определённые ситуации, связанные с отношениями, сексом, смертью или болезнью). Однако в большинстве случаев возможно разработать программу саморегуляции, с помощью которой критические ситуации переносятся в реальную жизнь.

3. Если клиент крайне боязлив и не может даже думать о конфронтации в реальной жизни, можно применять основанную на постепенности технику конфронтации с воображаемым или символическим материалом.

Остальные рекомендации предлагаются в конце данной главы, где описываются отдельные методы.

Ориентирование клиента на эффективную конфронтацию

Как уже говорилось, клиент получает информацию о принципе действия применяемого подхода, а также рекомендации по чтению доступной ему литературы. Клиенты сильно различаются по тому, как они проявляют беспокойство и что они чувствуют в отношении человека, наблюдающего за ними в таком состоянии. Один и тот же консультант, действующий в одной и той же манере, может восприниматься одним клиентом как бесстрастный и сухой, а другим – как сердечный и сочувствующий. Эти индивидуальные различия в характере отношений определяют выбор подхода для работы с каждым конкретным клиентом. Однако можно дать некоторые общие рекомендации по введению клиентов в ситуацию консультирования:

1. Не применяйте техники, вызывающие сильное беспокойство, до тех пор, пока не достигнуто согласие и доверие и пока клиент не поймёт логическое обоснование.
2. Формулируйте цели встречи ясно и чётко, но оставляйте пространство для манёвра. Например, будьте готовы внести в план изменения при возникновении временного кризиса или неожиданном резком снижении настроения клиента.

3. Старайтесь отличать истинное нежелание, вызываемое сильным страхом, от нерешительности или недостаточной вовлеченности в процесс.
4. Клиент должен понимать, что вы знаете об ожидающих его неприятных переживаниях.
5. Демонстрируйте уверенность и спокойствие, чтобы клиент чувствовал, что вы готовы к любым случайностям. Клиент занимается релаксацией для выполнения некоторых техник конфронтации, но нет никакой необходимости или пользы проводить релаксацию в начале каждой встречи.
6. Во время встречи внимание клиента должно быть сосредоточено на вызывающих тревогу ситуациях или фантазиях: уход от ситуации или отрицание её влияния нежелательны. Одним из способов поддержания внимания клиента является просьба описать наиболее значимые признаки ситуации и классифицировать его собственные реакции. Желательным является отношение клиента ко всему, что происходит, с полным принятием и отстранённым любопытством. Клиентам, отрицающим угрожающие аспекты ситуации, относясь к ней как к «нереальной», подавляя свои эмоции или отвлекаясь, сложно добиться снижения тревожности. Так бывает, если клиент не готов к работе с теми пунктами, которые выбрал консультант; в этом случае следует вернуться к более низкому в иерархии пункту. Другой путь заключается в том, что внимание клиента обращают на защитную стратегию, предлагают другие варианты реакции, еще раз объясняют логику работы и т.д.
7. Помогите клиенту изменить отношение к переживаниям. Побуждая клиента к отстранённому любопытству, мы помогаем переинтерпретации переживаний в терминах обычных психологических и физиологических процессов. Понимание того, что представляет собой неясно определяемое состояние «тревожности», и какие признаки ситуации его вызывают, дает ощущение предсказуемости и контроля. Клиент вскоре узнает и убедится в том, что реакции угасают через сравнительно короткий промежуток времени. Клиенту помогают понять, что неприятные переживания вызываются кратковременными нормальными процессами, связанными со специфическими ситуациями, и что неправомерно приписывать воздействию тревожности глобальный, постоянный и сугубо негативный характер. Например, некоторые клиенты считают, что тревожное поведение подразумевает слабость, невроз или глупость. Помогая процессу переинтерпретации, консультант может напоминать клиенту о том, что:
 - «Учащённый пульс, испытываемый вами, обусловлен действием гормона адреналина»
 - «Я вижу, что вы в сильной панике, но если вы подождёте, она затихнет и пройдёт»
 - «Я понимаю, что ваша тревога - крайне неприятное состояние, но опасности физического вреда нет»
 - «Я думаю, что сейчас ваш страх еще усилится, потому что привычные

способы избежать его недоступны и вам некуда деваться»

Клиенту предлагают задать вопросы о сути переживаний и изменении их характера. В свою очередь, консультант просит клиента рассказать о том, как он сам относится к этим явлениям. Таким способом клиенту предоставляется информация о детерминантах тревожности, и клиент начинает более продуктивно относиться к своим мыслям и чувствам.

Планирование терапевтической встречи

Как правило, чем интенсивнее реакция на определенный пункт иерархии, тем больше времени требуется клиенту на совладание с ситуацией и достижение состояния спокойного удовлетворения. Некоторые техники конфронтации подразумевают предъявление стимула на короткое время, измеряемое несколькими секундами или минутами, в другое время предъявления составляет от 40 минут до нескольких часов. Если краткосрочная конфронтация с сильно тревожащими ситуациями разрешается реакцией немедленного бегства, то результатом будет повышение чувствительности клиента и его склонности считать такие ситуации угрожающими и неприятными. Для достижения эффекта десенсибилизации необходимо увеличить длительность предъявления, что дает клиенту время поработать со своими реакциями на угрозу. Рекомендации по определению длительности конфронтации даны ниже. Говоря в общем, консультант должен предлагать перейти к какому-либо пункту (например, в конце сеанса) только в случае, если времени для работы с ним достаточно.

Каждый отдельный эпизод конфронтации (например, в рамках одной иерархии) содержит элементы, манипуляция которыми повышает ее интенсивность или эффективность. Легче всего это делать с воображаемым материалом, дающим практически безграничные возможности модификации. При реальной конфронтации с животным (такими, как собака) можно предусмотреть высокий или низкий уровень его активности, разместить его головой к клиенту или от него и т.д. Важно учесть эти возможности при планировании встречи. При использовании некоторых методов конфронтации продвижение по иерархической лестнице протекает без строгого предварительного планирования; решения принимаются при необходимости в связи с реакциями клиента. Сущность этого приема состоит в том, что конфронтация ранжируется, повторяется и продолжается до тех пор, пока клиент не обретёт спокойствие и ощущение власти.

При определении длительности конфронтации и скорости перехода от одного пункта иерархии к другому консультанту могут помочь следующие рекомендации:

1. Беспокойство клиента снизилось до низкого или приемлемого уровня. Для оценки уровня беспокойства могут использоваться данные наблюдения поведенческих признаков, свободные самоотчеты клиентов, а также ре-

зультаты шкалирования, при котором клиентам предлагается оценить от 0 до 10 баллов степень выраженности беспокойства. Каких-то твердо установленных правил не существует, но процесс следует продолжать, пока из 10 возможных баллов уровень не снижается до 3-4. (При использовании метода десенсибилизации для перехода к следующему пункту необходимо достигнуть минимального или нулевого уровня.)

Определенные ситуации могут вызывать у клиента беспокойство настолько сильное, что результаты всей проделанной работы идут насмарку, и по поводу того, не следует ли в таких случаях допускать избегание, идут споры. По-видимому, решение должно приниматься исходя из общего настроя и самооценки клиента. Клиенты, полагающие, что смелость, терпение и настойчивость позволят им достичь своей цели (и знающие, что она достижима), могут переживать состояние «успеха» при противостоянии в процессе консультирования тому страху, который раньше воспринимали как «непереносимый». Это справедливо особенно в отношении таких ситуаций, которые в реальности никогда не возникали, но заранее вызывали сильные опасения (например, первое посещение огромного супермаркета). Напротив, неожиданное возникновение тревоги в ранее управляемой ситуации разрушает уверенность, ведёт к переоценке угрозы и усилению осторожности. Такого рода «рецидивы» чаще возникают при использовании техник саморегуляции. Они не произойдут во время плановой встречи, подготовка которой позволяет предусмотреть возможные проблемы. Если же консультант во время встречи сталкивается со спонтанным избеганием, следует организовать постепенное возвращение клиента к пугающей ситуации. При тщательном контроле уровня беспокойства с помощью систематической самооценки вероятность неожиданного усиления тревожности снижается.

2. Нужно проработать все элементы стимула, соответствующего определенному пункту иерархии, а работу с данным пунктом повторять до устойчивого закрепления достигнутого снижения уровня беспокойства, и только после этого переходить к следующим пунктам. Например, при освоении программы саморегуляции поездок в наземном транспорте клиент должен пережить ситуации коротких остановок поезда в туннеле и привыкнуть к ним.

3. Следует учитывать возможность спонтанного возвращения страха или тревожности между встречами. По этой причине каждую следующую встречу следует начинать с конфронтации на уровень *ниже* последнего достигнутого.

4. Следует иметь в виду, что способность клиента переносить беспокойство и базовый уровень самого беспокойства нестабильны во времени. У некоторых клиентов такие изменения весьма значительны. Колебания могут иметь или не иметь какой-либо определенной логики. Необходимо тщательно учитывать именно сегодняшнюю чувствительность и устойчивость клиента по отношению к внешним воздействиям.

5. В течение встречи клиентам могут потребоваться короткие передышки. Следует обеспечить время для обдумывания полученного опыта, восстановления душевного равновесия и просто для отдыха.

Частота встреч

Длительность интервала между встречами определяется, в частности, природой проблемы. В программах по формированию саморегуляции темп задаётся преимущественно самим клиентом. Если стимульные сигналы локальны и не связаны с постоянно происходящими в жизни клиента событиями, встречи могут происходить часто. Длинные интервалы не полезны, поскольку клиент проводит больше времени в ожидании следующей встречи, иногда и с тревогой. Можно планировать 2 или 3 сеанса в неделю, в зависимости от взаимной доступности консультанта и клиента. При освоении программ саморегуляции роль консультанта значительно отличается, поэтому интервал между встречами, как правило, составляет 1-4 недели и увеличивается с течением времени. Клиент систематически проживает тревожащие ситуации в соответствии с согласованным планом домашних заданий. Необходимость встреч определяется тем, как часто значимые ситуации воспроизводятся в реальности или могут быть специально организованы.

Завершение программы

Клиенты обычно имеют достаточно четкое представление о том, чего они хотят добиться. Как правило, речь идет об устранении затруднений в повседневной жизни. Например, люди хотят обрести способность отдыхать, делать покупки в престижных магазинах, открывать окна летними ночами, когда летают ночные бабочки.

Можно считать, что клиент достиг удовлетворительного результата, если в жизненных ситуациях его беспокойство не достигает разрушительной степени, и при этом он понимает, что опасные и угрожающие ситуации нельзя исключить из жизни полностью.

Клиентам желательно приобрести *избыточные навыки* совладания с провоцирующими тревожность ситуациями (например, покупки в многолюдных, обычно избегаемых ими магазинах в центре города), даже если подобные ситуации маловероятны. Это правило нужно применять с осторожностью в отношении ситуаций, которые действительно опасны, например, быстрая езда по автомагистрали.

Цели имеет смысл планировать реальные, достижимые и приносящие удовлетворение. Достижение одной цели побуждает клиента стремиться к следующей, таким образом, за одним улучшением следует другое. Цели продолжают возникать, и клиент работает с ними уже самостоятельно. Обычно

организуются проверочные встречи, чтобы, если потребуется, дать совет или помочь разрешить какие-либо оставшиеся противоречия.

Дополнительные замечания о работе с тревожностью

Структуры опыта клиента

Побуждение клиента к противостоянию провоцирующим тревожность ситуациям необходимо, но не всегда достаточно для снижения беспокойства. Необходимо заботиться о том, что клиент делает со своим новым опытом, и так организовывать конфронтацию, чтобы она могла способствовать развитию уверенности. У клиента формируется уверенность в том, что он способен к совладанию, в общем, с любой ситуацией вне зависимости от различных обстоятельств. Клиентам, которые объясняют успех в конфронтации тем, что их глаза были закрыты, рядом был терапевт, действовали успокоительные лекарства или конфронтация происходила в «хороший день», гораздо труднее поверить в свою способность совладать с тревожностью в данной ситуации. Конечно, это не значит, что чувство стабильной уверенности формируется без промежуточных стадий полу-овладения, на которых надежда на благополучный исход подпитывается дополнительной поддержкой. Допустимо использовать любую опору, если она представляет собой временное средство достижения результата и может быть отброшена позже. Следующие приемы способствуют формированию уверенности клиента:

- показать, что справиться со сложными ситуациями можно, разбив их решение на несколько этапов;
- предложить использовать сигналы безопасности, а затем постепенно отказаться от них;
- помочь клиенту выработать для всех возможных неблагоприятных случаев план либо активного поведения, либо тактического отступления (например, «запасные пути»);
- анализ защитных манёвров, используемых клиентом для частичного или полного избегания ситуаций, и предложения по тому, как от них избавиться;
- организация этапов программы, например, консультант берет в руки паука и показывает его клиенту.

Изменение защитного поведения

Переживание страха и стремление избегать провоцирующие тревожность ситуации снижаются по мере осуществления конфронтации. Однако, в некоторых случаях защитная реакция формирует порочную спираль тревожности, и тогда должны быть найдены средства для нарушения действия механизма обратной связи. Иллюстрацией может служить приведенный в главе 4 рассказ

об изменении скорости поглощения пищи. Вот несколько рекомендаций по достижению изменений.

1. *Реконструкция угрозы.* Целью является не отвлечение внимания от ситуации как таковой, а перенаправление его на нетревожащие или представляющие позитивный интерес аспекты. Для человека, испытывающего страх перед пауками, это бы означало рассматривание пауков с позиции натуралиста. Человеку, испытывающему страх публичных мест, можно рекомендовать обращать внимание на то, что происходит на улице, на деревья или цветы или на предметы в витринах магазинов.

2. *Произвольная релаксация.* Клиент может достигать спокойствия, преднамеренно изменяя позу и другие телесные реакции. Консультант дает указания, когда и как это следует делать, но обычно с течением времени клиенты начинают осознавать возникновение напряжения и предпринимать необходимые меры по его снижению. Клиенту дают следующие указания:

- принять общую позу расслабления;
- разжать пальцы;
- развести ссутуленные плечи;
- замедлить темп дыхания.

Некоторых клиентов полезно обучить навыкам глубокого расслабления. Также их можно обучать приему быстрой релаксации в ситуации возникновения напряжения или страха (см. Главу 8). Релаксацию как средство избавления от определенных защитных реакций можно применять сначала в присутствии консультанта, а затем в реальных провоцирующих ситуациях.

3. *Предупреждение оборонительной реакции.* Непроизвольные реакции тревожного клиента могут приводить к возникновению угрозы. Например, человек, испытывающий затруднения речи, может беспокоиться по поводу отношения со стороны других. Сексуальная неудача может привести к страху отвержения со стороны партнера и разрыва отношений. Трудности глотания ведут к боязни подавиться. Во всех подобных случаях ожидание угрожающего последствия усиливает исходную произвольную реакцию защиты. Формы действия механизма обратной связи бесчисленны. Для секунды или минуты, данный процесс может иметь непропорционально серьезные последствия. Два правила помогут нейтрализовать его действие:

1. Не допускать или подавлять защитную реакцию, ведущую к негативным последствиям. Средство может быть простым, как рекомендация клиенту *держаться паузу* до тех пор, пока он не будет готов к адекватной реакции.

2. Активно помогать клиенту в приобретении адекватных форм поведения, что устраняет первичный источник угрозы, например, обучать уверенному реагированию, навыкам публичных выступлений, такому поведению, которое способствует сексуальному возбуждению.

Традиционные методики

Систематическая десенсибилизация

Данная методика была предложена в 50-е годы двадцатого века Дж. Вольпе, одним из создателей поведенческой терапии. Используется преимущественно *воображаемое* предъявление пунктов иерархии и, хотя этот метод потеснили более быстродействующие техники, действующие реальные жизненные события, он все ещё сохраняет своё значение.

Для данного подхода характерна постепенность, поэтому иерархии обычно состоят из множества выделенных с равным шагом пунктов. Вначале клиента обучают приемам релаксации. Основопологающим для оригинального метода явилось представление о том, что релаксация реципрокно подавляет тревожную реакцию на воображаемую ситуацию. Действительно ли функция релаксации такова, или эффект объясняется иначе, доподлинно не известно. Та или иначе, в состоянии релаксации, при низком общем уровне физиологического возбуждения, клиентам проще создавать живые образы и выделять различные составляющие телесного компонента образа. Техника заключается в следующем:

- Клиент достигает состояния релаксации, находясь в удобном кресле или на кушетке в помещении, где его внимание ничем не отвлекается (например, нет яркого света или шума). Глаза клиента закрыты.
- Дается описание самого нижнего пункта иерархии, клиента просят представить это событие и подать сигнал (например, подняв вверх указательный палец), когда образ станет ясным и живым.
- Клиенту дают инструкцию продолжать представлять событие в течение короткого периода (обычно 10-60 секунд), а затем его просят прекратить делать это и снова сконцентрироваться на релаксации.
- По завершении фантазирования клиент дает сигнал о том, вызвал ли образ тревожность (например, поднимая указательный палец другой руки или каким-либо другим заранее определенным способом).
- Клиент продолжает релаксацию в течение следующих 1-2 минут, затем предлагается вообразить следующее событие; если три последовательные пробы представить предыдущее событие не сопровождались тревогой, переходят к следующему (в большей степени провоцирующему тревожность) пункту иерархии.

Описанная процедура продвижения вверх по пунктам иерархии занимает около 30-40 минут.

Консультант просит клиента сообщать о затруднениях, возникающих при попытке представить какое-либо событие, или о том, почему определённые события упорно вызывают реакцию тревоги. Трудности в представлении образа иногда свидетельствуют о том, что исходящая от него угроза слишком сильна, и процедуру следует повторить со стоящим ни-

же или вновь введенным пунктом. Представляемое событие может непредсказуемо трансформироваться, при этом проявляются его скрытые прежде угрожающие аспекты. С учетом такого обратного действия может потребоваться пересмотр используемых иерархий.

Эффективность отслеживается с помощью повторного определения рангов пунктов иерархии, оцениваемых по выраженности вызываемого ими субъективного беспокойства по шкале 0-10 или 0-100 баллов. При работе с несколькими иерархиями эффект достигается в среднем за 20-40 встреч, в то время как альтернативные методы обычно дают схожие результаты за 5-20 встреч. Распространение снижения тревожности с воображаемых на реальные жизненные ситуации не всегда происходит автоматически, и обычно для этого клиентам задаются домашние задания, причем консультант должен позаботиться о том, чтобы задания не были сложными и дестабилизирующими.

Внутренняя отработка

Постепенно стало понятно, что стоит уделять больше внимания тому, как клиент представляет собственное положение в воображаемой ситуации – к примеру, какова степень воображаемой подверженности клиента действию источника угрозы. Прием внутренней отработки заключается в том, что клиенту дают инструкцию представить активное совладание с ситуацией. Воображение процесса совладания, если трудности ситуации представляются реалистично, оказывается более эффективным по сравнению с фантазиями о достижении легкого успеха. Техника может применяться в сочетании с релаксацией, как описано выше, или с *прикладной релаксацией*, то есть навыком совладания с провоцирующим тревогу событием, целенаправленно используя технику быстрой релаксации (см. главу 8).

Клиент рассказывает о том, как формируется образ, и консультант пользуется этой информацией, чтобы понять, как можно изменить процесс фантазирования при переходе к следующим событиям. Цель заключается в том, чтобы помочь клиенту выработать адекватные реакции, минимизируя его беспокойство. Большинство клиентов знают, какая реакция является адекватной, и умеют ее демонстрировать в ситуации обучения, – проблема заключается в том, что в реальных ситуациях защитная реакция побеждает и препятствует адаптивному поведению. Клиенты получают домашние задания, позволяющие закрепить отработанные в воображении способы поведения.

Затопляющая фантазия

Эта техника предназначена для конфронтации клиента с провоцирующими тревожность образами в течение 40-60 минут. Консультант описывает событие в ярких и конкретных деталях, ситуативный смысл которых выявляется

заранее. Событие может дать возможность пережить необычные ощущения, которые нельзя вызвать иначе, или включить элементы, которые невозможны в реальности (например, наблюдение за тем, как относятся другие к смерти клиента). То, какой материал используется, определяет клиент, но консультант может творчески разработать его во время фантазирования. Пример приведён ниже.

Отрывок из сценария затопляющей фантазии

Данный сценарий был разработан для мужчины, который время от времени впадал в «сонный паралич» - состояние кратковременное, не часто повторяющееся и безвредное, но у него вызывающее настоящий ужас. Страх выявил консультант, когда в процессе обучения релаксации обнаружил, что клиент не может закрыть глаза. Заранее подготавливаемые и импровизируемые темы были рассчитаны на 40 минут; в промежутках клиент составлял рейтинги тревожности, которые показали систематическое снижение в ходе отдельных встреч и от одной встречи к другой:

«Ты просто просыпаешься утром. Ты хочешь пошевелить рукой, но рука парализована. Ты не контролируешь ни свою руку, ни какую либо другую часть своего тела. Ты парализован. Твой мозг работает и бьет тревогу, и у тебя начинается паника, когда ты понимаешь, что не можешь пошевелиться. Ты пытаешься позвать жену. Ничего, даже хрипа ты не можешь издать. Тебя ещё сильнее охватывает паника, сердце бешено колотится, пот капает с твоего лица. Никто не может прийти к тебе, никто не может помочь тебе. Ты представляешь себя навеки потерянным, как будто ты выпал в космос из своего космического корабля, ты беспомощно паришь, совершенно один, без надежды на возвращение. Космос и пустота вокруг тебя, бесчеловечное пространство небытия. Чувство полной изоляции окутывает тебя и паника усиливается. Ты чувствуешь, что больше не в состоянии терпеть эту панику, так много ощущений, исходящих от тела, пронзают твоё сознание [и т.д. и т.п.]».

Клиент в определенные моменты оценивает свое беспокойство, поэтому можно отслеживать влияние фантазирования. Один и тот же образ, провоцирующий тревожность, повторяется до тех пор, пока не уменьшится его негативное воздействие. Для снижения уровня беспокойства требуется, по крайней мере, 20-30 минут. Следовательно, 40 минут – это минимальная рекомендуемая продолжительность встречи.

Когда этот метод был впервые предложен, теоретически полезным считалось использование материала, в котором потенциально содержащиеся в определенной ситуации угрозы представлены в предельной своей выраженности. В некоторых случаях даже худшие мыслимые угрозы еще больше усиливаются – отсюда термин «затопление». При таком подходе существует риск дестабилизации клиента, и, в любом случае, эти разработки недостаточно обоснованы. Но это не означает, что нельзя работать с сильно выраженной

угрозой. Всегда можно найти какие-то способы, позволяющие применить к ней основанные на постепенности приемы консультирования. Поэтому можно рекомендовать использовать, скорее, не затопляющую, а пролонгированную фантазию и тогда придерживаться описанной выше логики распределения материала.

Преимуществом обсуждаемой техники является то, что телесное возбуждение, вызываемое фантазией, переживается в безопасных условиях. Внутренние сигналы, порождаемые физиологическими процессами, часто воспринимаются как заключающие угрозу, не говоря о том, что они неприятны. Во время фантазии консультант может обратить внимание клиента на этих сигналы и их значение.

Управляемая фантазия

Это более длительное фантазирование с меньшими ограничениями и более выраженным взаимодействием клиента и консультанта. Его применение для оценивания было проиллюстрировано ранее (глава 5). Клиента просят описывать вслух, от первого лица, в настоящем времени эпизоды, связанные с беспокойством. Управление фантазией происходит следующим образом:

- Давать задание более подробно рассказать о различных аспектах (событиях, телесных реакциях и т.д.).
- Побуждать клиента к реакции на новые элементы (представьте, что произошло X или сказано Y, что вы сделаете?).
- Предлагать отрабатывать альтернативные способы реагирования и отмечать последствия.
- Консультант вовлекается в процесс в большей степени, играя роль, на которую клиент реагирует в воображении.

В терапевтических целях управляемая фантазия применяется для того, чтобы помочь клиенту обнаруживать угрожающие элементы и конфронтировать с ними, вырабатывать адекватные реакции. Она также даёт консультанту возможность вовлечь клиента в когнитивную перестройку опыта (см. Главу 7).

Продолжительность управляемой фантазии обычно составляет 15-60 минут. В процессе консультирования прием фантазирования может применяться время от времени, когда нужно предъявить тему, получить обратную связь, дать объяснение или инструкции и т.п.

Саморегуляция при конфронтации с тревожащими ситуациями

Для некоторых проблем тревожности, таких, как боязнь общественных мест или социальные страхи, программа овладения навыками саморегуляции конфронтации является наиболее предпочтительным подходом, так как в данном случае конфронтация постоянна и неизбежна в промежутках между встреча-

ми. Во время же самих встреч можно посвящать разработке соответствующих домашних заданий и вспомогательным методам поведенческой отработки или воображаемой конфронтации. Детальные рекомендации даны в главе 7.

Рекомендуемая литература

Теоретические основы конфронтационных методов обсуждались Barlow (1988; Глава 8), Foa and Kozak (1986), Goldfried (1986), Watts (1979) Williams (1990) и Wilson (1986).

Приступы паники и сопутствующие фобии

Случаи паники и их описание

Источник большей части проблем тревожности может быть прослежен в эпизодах неприятного искажения ощущений или чувств, которые могли длиться всего нескольких минут. Причина этих эпизодов в основном всё ещё остаётся загадкой, хотя известно, что многие из них возникают в условиях длительного стресса. Обычно указывают такие стрессоры, как смерть или болезнь близких, собственная болезнь, межличностный конфликт и измененные состояния сознания, вызванные анестезирующими или психоактивными препаратами.

Природа первоначальных эпизодов сильно различается у разных людей. Они не всегда описываются как проявления тревожности или паники – чаще их объясняют физическим или психическим заболеванием. Трудно сказать, являются ли все первые жалобы на странные состояния проявлениями «тревожности»; они могут становиться таковыми в результате восприятия их как сигналов какой-то угрозы. При этом в одних случаях первым эпизодом становится внезапный и необъяснимый приступ страха или паники. В других случаях процесс развивается по нарастающей и каждый следующий эпизод (на протяжении дней, недель или лет) отличается от предыдущего большей интенсивностью и переживается как более страшный. Некоторые клиенты упорно убеждены в своем физическом заболевании, и повлиять на это представление трудно. Типичные проявления данной проблемы отражены в Таблице 7.1.

Следующие фрагменты дают понятие о том, как клиенты описывают первые эпизоды.

Клиент А

Я шёл по дороге, когда вдруг почувствовал что-то вроде головокружения. Я подумал: «Что происходит?» У меня бывали сердцебиения, но не до такой степени. Я хотел идти дальше, но мне стало хуже; ноги перестали меня держать; я чувствовал, что со всем моим телом что-то так; я не мог дышать; я постоянно сглатывал; казалось, моё горло закупорилось и мне хотелось закричать: «кто-нибудь, помогите».

Клиент Б

Ну, я чувствовал себя в порядке, проезжая по этой дороге, и тогда, без всякой видимой причины, я почувствовал, что поднимаюсь. Какая-то дрожь прошла по всему телу. Я не стал обращать внимание и выбросил это из головы. Две недели спустя, на этой же самой дороге, случилось то же самое. Еще не доезжая до подъема, я его почувствовал, а когда въехал на него, стало еще

хуже, чем в прошлый раз. Я спросил себя: «Что это?» Я никому не стал об этом рассказывать, думал, пройдет.

Таблица 7.1. Каким образом паника может превратиться в проблему

1. Повторение эпизодов необычных ощущений, сначала незначительных и не обязательно относимых к проявлениям «тревожности», но постепенно становящихся все более пугающими.
2. Внезапный, но полноценный «приступ паники», сопровождающийся интенсивными соматическими ощущениями и стремлением к бегству.
3. Жалобы соматического характера, обращенные к врачу (такие, как боль в сердце, головокружение, боль в груди, затруднённое дыхание, проблемы с глотанием, слабость, расстройство желудка).
4. Зависимость или злоупотребление алкоголем или другими химическими седативными препаратами и транквилизаторами. «Проблема тревожности» маскируется или обнаруживается только при попытке прекратить прием ПАВ.
5. Переживанием человеком нереальности мира (дереализация) или нереальности и неестественности себя (деперсонализация). Впервые может возникнуть как второстепенный эпизод или в связи с начальным главным эпизодом.

Клиент В

Я переходил дорогу, и когда я был на середине, и никого рядом, я вдруг почувствовал панику. Я видел, что вокруг меня не за что ухватиться. Я занервничал, выступил холодный пот, я чувствовал, как бьётся моё сердце, и мне пришлось бежать на другую сторону и прислониться к фонарному столбу. Это повторилось через несколько месяцев, потом это часто происходило, когда я переходил улицу или шел по парку. Я обнаружил, что не могу спускаться по лестнице, по крайней мере, посередине лестницы. Мне нужно держаться за перила и идти очень медленно. Если я смотрел вниз, я чувствовал головокружение и думал, что сейчас упаду. Иногда было проще развернуться и практически сползть вниз по ступенькам задом наперёд.

Обычно первоначальный эпизод возникает в умеренно стрессогенной ситуации, часто связанной с переживанием попадания в ловушку. Например, первоначальные эпизоды могут возникать, когда человек едет в автобусе или метро, идет по высокому мосту, переходит дорогу. Однако во многих случаях ситуация не кажется стрессогенной. Не так редко человек начинает бояться заснуть, однажды ночью пробудившись от кошмара.

Часто клиенты называют соматические ощущения из числа приведенных в Таблице 5.2. Сам эпизод может длиться от нескольких минут до часа, но обычно - 10-15 минут. Некоторые клиенты считают, что с ними во время паники может случиться какая-то ужасная катастрофа. Часто встречающиеся варианты катастрофических ожиданий перечислены ниже. Другие клиенты говорят о неопределенных страхах или неприятных телесных ощущениях. Если катастрофические страхи не имеют явного выражения, то для того, что-

бы клиент сумел о них рассказать, может потребоваться значительное время. Иногда они оказываются связанными с травмирующими событиями в прошлом, в том числе, физическим или сексуальным насилием, и это требует перехода к другим видам консультирования. В некоторых случаях связанных с паникой катастрофических мыслей не обнаруживается.

Часто упоминаемые катастрофические ожидания, связанные с паническими действиями, чувствами и ощущениями

Смерть
Обморок
Физическое истощение
Физическое заболевание
Сердечный приступ
Опухоль мозга или инсульт
Непроизвольное испражнение или мочеиспускание
Нервный срыв
Психическое заболевание
Паралич
Истерика
Потеря памяти
Потеря связи с реальностью
Громкий крик
Невыносимые страдания
Публичное унижение
Неспособность действовать (работать и т. п.)
Потеря партнёра/супруга
Наброситься на кого-либо и ударить его
Поддаться суицидальному импульсу
Устроить сцену
Выставить себя посмешищем

Последствия паники

Схожие с паникой эпизоды случаются практически с каждым, но чаще всего они не имеют последствий. И лишь в малой части случаев они становятся отправной точкой развития проблемы тревожности. По мнению консультантов, не менее чем в половине случаев проблемы тревожности возникают описанным образом. Обычно клиент боится следующего «приступа» и при этом крайне озабочен тем, что же означает пережитый эпизод. Возможные последствия:

Развивается *осознание существования и зависимость от наличия* определенных *сигналов безопасности*, таких, как физическое присутствие другого человека, поддержка по телефону или безопасность привычного окружения (например, дом или машина). Некоторые примеры сигналов безопасности приведены ниже. Многие, хотя и не все, клиенты стремятся избегать места,

которые считают относительно опасными, поскольку полагают, что здесь их может настигнуть паника. В «безопасных» условиях вероятность эпизодов мала, но полной гарантии их отсутствия не может быть никогда. Уступая своему стремлению не попадать в связанные с риском ситуации, человек начинает бояться публичных мест, что в психиатрии называется агорафобией или агорафобическим синдромом. Этот термин, обозначающий боязнь публичных мест, употребляется неверно, так как страх вызывает возможность паники в таких местах, а не он сами.

Сигналы безопасности – ситуации, снижающие риск возникновения паники

Быть с человеком, вызывающим доверие
Сидеть или стоять близко к двери или к выходу
При ходьбе находиться близко от физической опоры (например, стены)
Иметь доступ к телефону или другим средствам получения помощи
Держать, нести, двигать что-то (например, зонт, тележку в магазине, сумку)
Находиться со своим домашним животным
Носить солнечные очки
Носить талисман (например, медальон Св. Кристофера)
Носить с собой транквилизатор

Развивающаяся фобия может иметь локальный характер, если особенно первоначальные эпизоды возникли при определенных обстоятельствах - например, закрытое пространство или возвышенная местность. Фактически тип фобии, вырастающей из паники, может определяться случайной связью между паническим эпизодом и характером ситуации, в которой он происходил. Однако не все локальные фобии возникают именно так.

По отношению к признакам надвигающегося «приступа» проявляется *повышенная настороженность*. Эпизоды частично предсказуемы на основе внешних или внутренних (психических/телесных) сигналов. Часто встречающиеся ситуативные признаки повышенной вероятности паники перечислены в Таблице 7.2. Людные места неприятны не столько из-за необходимости вступать в контакт, сколько потому, что толпа блокирует пути побега. Наблюдение со стороны другого человека для клиента, особенно находящегося в панике, усиливает смущение и вызывает страх выглядеть глупым или ненормальным. Ситуациями риска оказывается посещение мест, умеренно стрессогенных для большинства (яркий свет, громкие звуки, возвышенная местность, темнота, присутствие других людей на близком расстоянии), из которых затруднен выход или вообще ограничивающих свободу передвижения (например, место в середине ряда или кресло парикмахера). Напряжение может вызывать выполнение договоренности о встрече, например, визит к друзьям, или посещение таких мероприятий, как свадьба. Эти мероприятия в норме доставляют удовольствие, если не растягивается период ожидания, а идти или нет решает сам человек. Фиксированные встречи вызывают беспо-

койство, потому что отклонить их нельзя, и приходится идти несмотря на паническое состояние.

Повышенная настороженность в отношении к признакам ситуации может привести к увеличению количества превентивных действий и избегаемых ситуаций. Наличие проблемы неизбежно ограничивает возможности работы, путешествия, отдыха, установления личных отношений. Могут пострадать интимные и семейные отношения, развивается депрессия.

Таблица 7.2.
Ситуации, увеличивающие риск возникновения паники

	Возможные признаки стимулов*								
	ЗП	ОВ	Н	ОП	Ф	ОС	СО	В	Б
Удаление от дома или машины		+	+	+					
Незнакомая обстановка			+						
Широкое, высокое, открытое пространство	+								
Тесное, закрытое пространство	+	+							
Высокое место	+							+	
Близость к краю платформы, парапета и т. п.	+							+	
Ожидание в очереди (например, на автобус, к кассе)		+							+
Стрижка в парикмахерской		+							
Многолюдное место		+							+
Договор о встрече		+							
Пребывание в одиночестве				+				+	
Жаркая погода, яркий солнечный свет	+				+				
Пасмурная или холодная погода						+			
Темнота						+		+	
Усталость, подавленность					+	+			
Физическое заболевание					+	+		+	
Физическое усилие					+				
Кофеин (чай или кофе)					+				
Обдумывание проблем					+	+			
Домашние ссоры				+	+	+	+		
Быть объектом наблюдения со стороны других (например, в поезде)		+					+		+
Ощущение своей подчиненности, незначимости						+	+		

*ЗП – зрительно-пространственные; ОВ – ограничение возможностей выхода; Н – новизна; ОП – отсутствие помощи/поддержки; Ф – физиологические факторы; ОС – общие стрессоры; СО – социальная оценка; В – возможность причинения вреда самому себе; Б – присутствие других людей на близком расстоянии.

Внутренние состояния, действующие как сигналы тревоги, делятся на две группы – психические и телесные. Человек начинает настороженно

наблюдать за собой, и часто с целью выявить «симптомы». Он систематически посещает медиков различной специализации, надеясь услышать от них, что симптом не «серьезен». Если первоначальные эпизоды происходили на фоне измененного состояния сознания (например, ощущение нереальности), с бóльшей настороженностью клиенты относятся к таким психическим признакам, как провалы в памяти, замешательство или возвращение чувства нереальности.

У большинства клиентов воспринимаемый риск паники зависит от тонких оттенков настроения и ощущения уверенности в конкретный день. Клиенты знают, будет ли для них день «хорошим» или «плохим». Хотя источник какого знания часто трудно определим (например, «дрожь»), но клиентам оно представляется достаточно обоснованным. Склонность к панике - характеристика нестабильная: некоторые клиенты не проявляют каких-либо признаков беспокойства на протяжении недель, месяцев или даже лет. Однако, сформировавшись, подверженность панике сохраняется часто в течение десятилетий, пока не будет получена эффективная помощь.

Некоторые женщины отмечают, что они более склонны к панике перед менструацией. Иногда влияние оказывают депрессивное состояние или напряженные межличностные отношения. Представления клиента о том, что является определяющим, можно и нужно подтверждать с помощью анализа дневниковых записей о панических эпизодах. Картину проявлений паники можно сопоставить с корректируемыми физиологическими факторами. Предварительное медицинское обследование желательно для всех клиентов, но направление к терапевту становится необходимым, если в дневниковых записях фиксируются необычные психические или телесные состояния, которые не могут объясняться действием известных физиологических или средовых факторов.

К другой группе настораживающих клиентов внутренних сигналов относятся такие телесные ощущения, как нерегулярное или ускоренное сердцебиение, звон в ушах, потеря опоры, головокружение, туман в глазах и многие другие. Эти ощущения могли сопровождать «приступы» в прошлом, а в настоящее время воспринимаются как признаки «приступа» надвигающегося. Предсказательная ценность этих телесных ощущений неочевидна, поскольку они сопровождают массу таких не имеющих отношения к панике явлений, как физическая нагрузка, эмоциональное возбуждение, выпитый крепкий кофе, простуда или расстройство желудка. Они также присутствуют в обычных повседневных стрессовых или провоцирующих тревожность ситуациях. Так как телесное ощущение связывалось в прошлом с эпизодами сильного беспокойства, человек может рассматривать его как признак приближения подобного эпизода. Ощущение угрозы сопровождается возбуждением вегетативной нервной системы (ВНС), что повышает вероятность подтверждения предчувствия. Таким образом, сосредоточенность на телесных ощущениях вместо того, чтобы предотвратить развитие паники, в действительности провоцирует

ее. В ряде случаев внимание к телесным ощущениям используется для оправдания бегства в безопасное место, употребления таблеток или алкоголя. Поэтому не происходит снижения уровня тревоги, привязанной к определенному телесному ощущению; избегание уничтожает любую возможность убедиться в том, что ничего страшного *не* происходит.

К настоящему времени благодаря клиническим исследованиям получены надежные подтверждения важной роли телесных ощущений в провоцировании эпизодов тревоги и паники, и разработаны стратегии терапевтического вмешательства, направленного на разрушение этой связи.

К использованию химических успокоительных веществ клиенты могут прибегать, пытаясь справиться с паникой. Алкоголь очень эффективен для подавления тревожного состояния на короткое время, и у некоторых людей злоупотребление начинается именно поэтому. На протяжении терапевтических встреч вопросы об употреблении алкоголя должны быть постоянными. По мере того, как действие, оказываемое алкоголем, становится менее выраженным, *чаще* появляются высказывания клиентов о чувстве «слабости» и подверженности тревоге. При таком развитии событий, когда клиент продолжает лечить себя алкоголем, зависимость не заставит себя долго ждать.

В основном так же обстоит дело и с употреблением транквилизаторов. Зависимость возникает вследствие роста толерантности к средству. Для достижения прежнего эффекта требуется всё большая доза. При прекращении приёма препаратов возможно как возобновление прежних жалоб на тревожность, так и возникновение некоторых новых, например, на бессонницу или ночные кошмары (см. Главу 9). Поэтому если клиенты проходят курс лечения транквилизаторами, важно, чтобы эти препараты принимались в строго определённое время во избежание ухудшения состояния (это не касается нерегулярного приёма единичных доз в особых случаях).

Оценка паники и сопутствующих фобий

Первые интервью следует нацеливать на выявление названных выше особенностей проблемы. Наиболее информативными будут рассказы о недавних панических эпизодах, но клиент может не обращать внимания на те детали (например, сопутствующие мысли), которые необходимо учесть при оценке. Поэтому тревожность вызывается и наблюдается консультантом непосредственно в ходе встреч. При этом процесс оценки встраивается в обучение клиента и модификацию его мыслей и образов. Другими словами, мысли и поведение клиента, описываемые им при рассказе о недавних событиях или обнаруживаемые консультантом, являются тем материалом, с которым работают клиент и консультант.

Систематичность при фиксировании сущности, частоты и выраженности эпизодов приносит очевидную пользу. Позитивные изменения, особенно если они постепенны и равномерны, клиенту могут быть сразу не заметны. Более того, когда клиенты сосредоточены на полном избавлении от проблемы, они могут недооценивать даже очевидные перемены в своём поведении.

Прослеживание эпизодов по дневниковым записям – это один из способов увидеть, что есть успехи. Результаты по желанию можно отображать графически. Некоторые клиенты достигают успеха настолько быстро, что не нуждаются в специальной демонстрации его наличия. Однако для большинства, особенно для тех клиентов, которые сталкиваются и с другими проблемами или сложностями, сроки консультирования могут увеличиваться, в наиболее трудных случаях до нескольких лет. Фиксация продвижения помогает мотивировать клиента на продолжение работы. Важно общее направление, клиенты должны знать, что прогресс может быть неравномерным и прерываемым временными неудачами. Консультант должен уметь показать, что вновь возникающее затруднение не настолько серьезно, как предшествующие, описанные в дневнике, и, учитывая опыт их преодоления, можно ожидать, что и эту проблему клиент сумеет разрешить.

Прогресс проявляется в изменении:

- количества избегаемых ситуаций и степени, с которой клиент стремится к их избеганию (учитывая, что клиенты при входе в ситуацию могут быть изначально настроены на поиски сигналов безопасности, а некоторые клиенты вообще мало склонны к избеганию);
- рейтинговой оценки выраженности беспокойства, вызываемого различными ситуациями;
- частоты эпизодов паники и тревоги.

Таблица 7.3. Выраженность и степень избегания ситуаций

Рейтинговая оценка избегания: нет (не избегается); иногда избегается; обычно избегается; всегда избегается.

Ожидаемая выраженность беспокойства: 0 = беспокойство отсутствует; 10 = самые сильные тревога, паника, беспокойство из всех пережитых.

Перечисленные ситуации – это те, вхождение в которые клиент ожидает без тревожности, и которые имеют отношение к целям клиента.

Пример	Избегание	Ожидаемая выраженность беспокойства
Поехать в гости к матери на своей машине	Нет	2
Поехать в местный супермаркет на своей машине	Нет	2
Выпить кофе с соседом	Иногда	3
Пригласить на обед свою семью	Иногда	3
Делать покупки в местном супермаркете	Нет	4
Пойти на обед к другу	Иногда	4
Пойти в местный супермаркет	Обычно	6
Поехать в местный супермаркет на автобусе	Всегда	6

Пойти в ресторан с партнёром	Обычно	6
Провести 10 минут в местном торговом центре в одиночестве	Иногда	6
Провести 1 час в местном торговом центре с партнёром	Иногда	6
Провести 1 час в местном торговом центре в одиночестве	Всегда	10
Уехать на выходные с партнёром на машине (более 50 миль)	Всегда	10
Полететь за границу на праздники с партнёром	Всегда	10

Записи типа показанной в Таблице 7.3 полезны для оценки изменений, происходящих в течение длительного времени, а для контроля прогресса на протяжении недели лучше использовать дневник, в который заносится информация о реакциях на запланированные (домашние задания) и случайные, но значимые события повседневной жизни. В дневник заносятся как достижения, так и проблемы, что дает консультанту возможность высказывать свое мнение или хвалить клиента за успешное достижение целей. Общий прогресс проявляется в способности к конфронтации с новыми ситуациям (которые до этого избегались) и снижении рейтинга уровня беспокойства в регулярно случающихся ситуациях (например, посещение определённого супермаркета, ужин в ресторане). Соответствующий формат дневника приведен в Таблице 7.4. При ведении дневника не следует стремиться к сложности. Простая запись, фиксирующая событие, лучше, чем сложная, в которой ничего не отражено. Следует побуждать клиентов к тому, чтобы они достигали необходимой точности и полноты записей, например, делая их сразу же после события и обязательно в тот же день. Клиенту удобнее будет делать это, если он носит с собой записную книжку и ручку. Следует обсудить значение отдельных пунктов на шкале, а также способ представления в записи отдельных эпизодов паники (например, отражать длительность и тяжесть эпизода или тип ощущения). Частота эпизодов не обязательно является точным индикатором прогресса, так как она зависит от числа ситуаций конфронтации. Частота и тяжесть эпизодов паники, возникающих неожиданно и вне связи с признаками ситуации, могут быть более информативны в этом отношении.

Таблица 7.4. Дневниковые записи о тревожности и панике

Краткая запись

Дата	Деятельность и ситуация	Продолжительность деятельности	Высшая оценка (0-10)	Комментарии (например, последствия, мысли)

--	--	--	--	--

Подробная запись

Можно добавить следующие колонки:

- Время начала деятельности
- Время окончания деятельности
- Деятельность в одиночестве или с кем-то
- Рейтинговая оценка уровня беспокойства в начале и в конце деятельности
- Сопутствующие негативные мысли
- Стратегии разрешения ситуации (например, отвлечение внимания или лечение)
- Подробные характеристики приступов паники (продолжительность, интенсивность, предшествовавшие события, связанные с приступом психологические и физические признаки)

Подробная запись (см. Таблицу 7.4) даёт более точную информацию о временных характеристиках деятельности и снижения беспокойства, о содержательных характеристиках паники и об используемых стратегиях совладания. Такую информацию не следует использовать без основательной причины. Например, консультант может обратить внимание на трудности дыхания и использовать стратегии медленного дыхания, прикладной релаксации, идентификации иррациональных мыслей и т.д. Краткое обсуждение дневника нужно планировать вначале встречи. Советы по использованию такой информации приведены на с. ?.

Дополнительные рекомендации по применению конфронтационных методов

Данные рекомендации дополняют приведенные в Главе 6, и их необходимость вызвана тем, что у рассматриваемого класса проблем тревожности имеются некоторые специфические особенности. К ним относятся:

1. многочисленность и повсеместное распространение причин, вызывающих проблемы. Клиенты могут добиться лишь относительной защиты от панических эпизодов. Паника может случиться без видимых провоцирующих событий, и поэтому проблема оказывает влияние практически на все стороны жизни клиента.
2. важность таких внутренних сигналов, как телесные ощущения, воображаемые образы и пугающие мысли. По своей природе эти сигналы неустранимы, хотя отвлечение внимания и произвольное подавление мыслей иногда несколько ограничивают их воздействие.

3. вовлечение в проблему окружающих клиента людей, решающих за него жизненные задачи, связанных с ним или обеспечивающих ему поддержку.

Перечисленные особенности проявляются, во-первых, в серьезных сложностях, сопровождающих попытки контролировать, воспроизвести или просто выявить события, оказывающие причинное стимулирующее воздействие; во-вторых, том, что влияние проблемы на жизнь клиента часто осложняет и запутывает вопрос. Очевидно, что центральной задачей является модификация реакции на вызывающие панику признаки. Другими словами, клиента знакомят с методами снижения интенсивности панического состояния и со способами предотвращения увеличения количества эпизодов паники. Перечислим основные этапы:

1. Идентифицировать сигналы паники.
2. Предъявить данные сигналы в контролируемой обстановке.
3. Нейтрализовать угрозу, связанную с сигналами, с помощью:
 - привыкания в ходе пролонгированной конфронтации;
 - формирования вместо отношения к сигналам как угрожающим представления о них как о нейтральных и не приносящих вреда;
 - оказания клиенту помощи в обретении контроля над внутренними сигналами, которые представляются угрожающими.

Методы идентификации причин и стимулов паники обсуждались ранее. Такая причина, как прогулка по улице, может быть очевидной, но точно определить конкретные стимульные признаки трудно. Отсутствие такой информации, однако, не препятствует использованию метода пролонгированной конфронтации. Рекомендации по применению этого подхода будут даны после обсуждения действия внутренних стимулов, таких, как учащённое дыхание и переживание пространства и движения.

Таблица 7.5. Ощущения, связанные с учащенным дыханием

Булавки и иголки (ощущения покалывания, обычно в кончиках пальцев)
Онемение частей тела
Обморочное состояние, головокружение
Приступы жара и озноба
Сильное сердцебиение или трепещущее сердце
Чувство неустойчивости
Слабость в ногах
Расстройства зрения
Ком в горле

Внутренние сигналы, вызываемые учащенным дыханием (гипервентиляцией)

Когда человек выполняет физические упражнения или испытывает эмоциональное возбуждение, увеличивается скорость и глубина дыхания. Возрастающая при этом физиологическая потребность в кислороде удовлетворяется увеличением потока воздуха, поступающего в лёгкие. Кроме изменения скорости и глубины дыхания наблюдается тенденция перехода от диафрагмального дыхания (возникающее вследствие поднятия и опускания живота) к дыханию с помощью поднятия плеч и расширения грудной клетки (грудное дыхание). Гипервентиляция возникает при таком дыхании, когда кислорода в лёгкие поступает *в избытке*, превышающем требуемый объём. Лишний кислород вызывает выделение из крови двуокиси углерода, вследствие чего повышается показатель ее щелочности. Данный процесс сопровождается определёнными телесными ощущениями, которые безвредны, но могут восприниматься как неприятные. Сокращение содержания двуокиси углерода в крови автоматически регистрируется мозгом, который посылает сигнал о снижении частоты дыхания. Субъективно же это может переживаться как неспособность дышать или как затруднённое дыхание. Может возникнуть ощущение недостатка воздуха, за которым следует попытка принудительного вдоха; также может быть ощущение сдавленности грудной клетки.

Наличие гипервентиляции можно предполагать, когда клиенты сосредоточены на своём дыхании и упоминают ряд ощущений, описанных в Таблице 7.5. (Следует заметить, что перечисленные в таблице ощущения могут быть вызваны и другими причинами.)

Покалывание и головокружение могут наблюдаться большую часть времени, даже в отсутствие жалоб на затруднённое дыхание или на тревожность. Ряд признаков гипервентиляции иногда вызывается лёгкой физической нагрузкой (например, подъем по лестнице). С помощью наблюдения за клиентом во время интервью или при проведении двигательной пробы можно выявить неравномерное, поверхностное или грудное дыхание. Можно провести прямое измерение уровня двуокиси углерода в крови, но это не всегда доступно. Попросив в качестве диагностической пробы клиента учащенно подышать в течение двух минут, можно установить, наблюдаются ли похожие ощущения в течение или перед приступом паники. Не существует количественных данных о том, для какого числа клиентов гипервентиляция играет существенную роль в формировании проблем тревожности, но некоторые исследователи считают, что оно высоко.

Клиенту объясняют, что некоторые проблемы тревожности возникают из-за учащённого дыхания, и что проба на гипервентиляцию поможет установить, так ли это в его случае. Клиента предупреждают (не углубляясь в детали), что проба может сопровождаться какими-то немного неприятными, но безвредными ощущениями. В идеале, пробу нужно провести до конца, но клиент имеет право закончить раньше (или совсем отказаться).

Инструкции по проведению пробы на гипервентиляцию. (NB: противопоказаниями для проведения являются: ограничения по сердечно-сосудистой или дыхательной системам, эмфизема, бронхит, эпилепсия, нарушения обмена веществ или гормональные, любое серьёзное физическое расстройство, беременность). Ощущения, вызываемые данной пробой, легко устраняются, если клиент повторно вдохнет воздух, который выдохнул в *бумажный* пакет, плотно прижатый к носу и рту. (Консультант дает эту инструкцию, готовит подходящий пакет и может показать, как это делается.)

1. Клиент сообщает о любых ощущениях, которые он испытывает *до* пробы.
2. Сидя, клиент учащённо дышит в течение двух минут носом и ртом, стараясь выдохнуть каждый раз как можно полнее. Сначала консультант показывает это сам, придерживаясь темпа приблизительно 30 вдохов в минуту (норма – 8-12 вдохов).
3. Клиента просят продолжать и напоминают инструкцию.
4. Клиент останавливается по истечении двух минут (или раньше) и сообщает о своих ощущениях. (Если клиент поднимется, это вызовет другие ощущения, которые тоже могут быть интересны.)

Ощущения фиксируются вместе с другими поведенческими проявлениями во время пробы. Фиксируется также, в течение какого времени дыхание клиента было учащенным. Если ощущения длятся более нескольких минут, клиенту можно предложить одну-две минуты дышать в бумажный пакет или замедлить дыхание, делая остановки после каждого выдоха.

Влияние гипервентиляции можно констатировать, если в качестве реакции у клиента возникают сильные эмоции и он обнаруживает сходство испытываемых ощущений с переживаемыми во время эпизодов паники. Так как проба проходит в безопасной обстановке, выявленное сходство не вызовет у клиента сильное беспокойство. На обнаруженные в ходе пробы проявления учащённого дыхания можно сослаться при обсуждении оправданности имеющейся у клиента негативной интерпретации тех ощущений, которые с данного момента получают естественное объяснение. Стратегии, которыми может пользоваться консультант для оказания помощи клиенту в отнесении причин ощущений к гипервентиляции, описаны ниже.

Стратегии вмешательства для случаев тревожности, вызываемой гипервентиляцией. Когда существует действительное сходство между ощущениями, испытываемыми во время паники и во время пробы на гипервентиляцию (а также присутствуют другие признаки учащенного дыхания), для клиента будет полезно направить усилия на изменении способа дыхания. Гипервентиляция может быть дополнительной, если не основной причиной паники.

1. *Переопределение.* Целью приема является убеждение клиента в том, что ощущения, ассоциируемые с паникой, имеют причиной всего лишь гипервентиляцией, а не что-то страшное. Однако, проба на гипервентиляцию может быть не особенно убедительной, если клиент дышал в учащенном ритме недостаточно долго или чувствует себя в безопасности в присутствии кон-

сультанта. В ответ на сомнения, высказываемые клиентом, можно спросить его, что было бы, если бы он дышал учащенно дольше, оставаясь один в пугающей ситуации и т.п.

Следует проинформировать клиентов о том, что в состоянии тревоги частота дыхания увеличивается, хотя человек этого может не осознавать. Можно привлечь внимание к *первым* ощущениям, переживаемым во время паники, и к тому, можно ли объяснить их учащенным дыханием. Как вообще при использовании метода когнитивного реструктурирования, консультант избегает чтения лекций, задавая вместо этого наводящие вопросы, которые позволяют клиенту делать свои собственные выводы. Тем не менее, консультант вносит существенный вклад, предлагая объяснения ранее непонятных явлений. Например, боль в груди можно объяснить тем, что она возникает в результате учащённого дыхания в течение длительного времени, когда в легких слишком много воздуха (то есть, в ответ на учащённое дыхание напряженные межрёберные мышцы начинают сжиматься). Можно обратить внимание и на такие составляющие учащенного дыхания, как физическое усилие и состояние утомления.

2. *Формирование навыка медленного диафрагмального дыхания.* Стратегия преследует две цели: клиенты обучаются, во-первых, применению техники, которая может быть полезна в ситуации тревоги и учащённого дыхания; во-вторых, стилю дыхания, требующему меньших усилий и способствующему общей релаксации (см. Главу 8). Процесс дыхания обычно не является объектом внимания. Поэтому клиентам, начинающим осознанно контролировать этот процесс, может казаться, что дышать в медленном и размеренном ритме сложнее. Когда клиент находится в состоянии тревоги или паники, достаточно дать ему следующие несложные инструкции по регуляции частоты дыхания: «Просто не забывайте расслабить плечи, когда вы выдыхаете весь воздух. Затем сделайте паузу на короткое время или посчитайте до трёх. Не думайте о вдохе – он произойдёт сам собой».

Данную методику можно практиковать во время тренинга релаксации, сначала с консультантом, а затем дома под аудиозапись, содержащую инструкции и советы по замедлению дыхания указанным способом. Релаксационные записи легко найти в продаже, но они редко содержат достаточно детальные инструкции по дыханию. Я использую запись собственного набора инструкций, которую копирую для клиентов. (Запись в желательном случае сделать на хорошем оборудовании в звуконепроницаемом помещении; рекомендации по содержанию смотрите в Главе 8.)

Когда медленному дыханию обучают как технике совладания, клиент совершает серию учащенных вдохов и выдохов в течение 15 секунд, после чего осуществляет маневр контролируемого дыхания (замедленное дыхание или дыхание с использованием бумажного пакета). Для освоения методики и генерализации её использования консультант может рекомендовать клиенту

прибегать к ней при конфронтации с реальными или воображаемыми ситуациями, провоцирующими тревожность.

Некоторые эксперты считают необходимой постоянную практику спокойного дыхания в домашних условиях с использованием специальных аудиозаписей. Эти записи состоят из медленно произносимых команд «вдох» и «выдох», скорость повторения которых несколько ниже, чем темп спокойного дыхания человека. Цель состоит в том, чтобы постепенно добиться результата 8-10 вдохов в минуту. Голосовые команды постепенно становятся тише по мере того, как спокойное дыхание становится сознательно контролируемым.

Внутренние сигналы, вызываемые потерей равновесия и головокружением

Сохранение равновесия – это сложная, неосознаваемая и преимущественно автоматическая функция тела. Равновесие контролируется благодаря многочисленным средствам сенсорной информации, которая, поступая в мозг, интегрируется и служит основой для выработки команд, направленных на обеспечение моторной координации и сохранение положения тела в пространстве. Главными сенсорными системами, обеспечивающими равновесие, являются зрение, внутреннее ухо (вестибулярный аппарат), рецепторы осязания и давления, мышечные рецепторы, комбинированные рецепторы шейного отдела позвоночника. Если одна из этих систем не функционирует или повреждается, создаются центральные компенсаторные механизмы с опорой на альтернативные сенсорные каналы.

Вестибулярно-окулярные рефлекс участвуют в сохранении стабильности видимого мира при движении тела относительно него. Ощущение (истинного) головокружения – это чувство *вращения* мира (или наблюдателя), знакомое любому, находившемуся в состоянии опьянения. Это проявление зрительно-пространственной дезориентации, при которой под воздействием искажения восприятия или физического расстройств определяющих функцию механизмов нарушается стабильность видимого мира. Истинное головокружение следует отличать от дурноты или обморочного состояния, при которых отсутствует ощущение кружения. В действительности, то «головокружение», о котором говорят тревожные клиенты, редко когда является истинным.

Так или иначе, нарушения равновесия (в том числе, истинное головокружение) обычно приводят к жалобам на тревогу и страх, возникающим в общественных местах. Неудивительно, что эпизод головокружения порождает страх, поскольку он может сопровождаться падением на землю, тошнотой, рвотой, состоянием общей слабости и обессиленности после приступа. У человека может развиваться оправданный страх потерять контроль во время вождения автомобиля или почувствовать себя плохо при каком-либо затруднении.

Симптомы некоторых физических заболеваний (например, вирусных инфекций), в число которых входят дурнота и потеря равновесия, со временем ослабевают, хотя некоторые объективные признаки болезни остаются. В других случаях, например, при болезни Меньера или некоторых центральных дисфункциях, рецидивы дурноты и потери равновесия появляются время от времени или в условиях дефицита или искажения сенсорных данных.

До настоящего времени неясно, могут ли психологические факторы быть первоначальной причиной истинного головокружения и потери равновесия. У некоторых людей «симптомы» появляются в условиях стресса или эмоционального возбуждения. Каким бы образом ни взаимодействовали физические и психологические факторы, среди клиентов с проблемами тревожности можно выделить людей, которые особенно подвержены влиянию *стимулов пространства и движения* или чьей реакцией на воздействие стрессоров является дурнота или потеря равновесия. «Фобия пространства» включает страх падения, когда не на что опереться, а ориентация затруднена из-за недостатка зрительных стимулов. Некоторые клиенты, смотря на зигзагообразные линии, движущиеся огни, чередующиеся светлые и темные полосы, чувствуют дискомфорт или тревогу. Истинное головокружение может отсутствовать, но клиент описывает смутные ощущения неустойчивости, покачивания или вращения.

Клиентам с подозрением на расстройство чувства равновесия следует обращаться к медикам, но исследование может не привести к постановке однозначного диагноза. Испытываемый в перечисленных в Таблице 7.6 ситуациях дискомфорт может объясняться низкими порогами восприятия стимулов пространства и движения.

Таблица 7.6. Ситуации, в которых проявляется повышенная чувствительность к стимулам пространства и движения

Дефицит зрительных стимулов, используемых для ориентации

- открытое поле или дорога
- темнота

Вестибулярная стимуляция

- поворот или изменение скорости машины (особенно для пассажира)
- катание на аттракционах
- встряхивание головой
- поездка в лифте

Искаженные или сложные стимулы пространства и движения

- смотреть в окно машины
- смотреть кино на широком экране
- наблюдать за движением объектов, имеющих полосатую окраску
- смотреть во время проезда через туннель на фонари
- спускаться вниз по неподвижному эскалатору
- смотреть на предметы на полках супермаркета
- плыть в лодке по морю

Клиенты, проявляющие такую чувствительность, не обязательно страдают какими-либо заболеваниями. Снижение порогов может быть связано невозможностью удерживать равновесие или неадекватностью применяемых средств его поддержания.

Стратегии вмешательства при повышенной чувствительности к стимулам пространства или движения Когда налицо объективная причина расстройства равновесия или хроническое заболевание, имеющее в качестве симптомов дурноту/неустойчивость, перед началом реализации описанных ниже стратегий целесообразно получить консультацию у лечащего врача клиента.

1. *Обучение и переопределение.* Относительная значимость стимулов пространства и движения может выясняться в ходе обсуждений дневниковых записей, посвященных эпизодам тревоги или паники. Клиенту следует рассказать о роли данных стимулов в возникновении необычных ощущений и потере равновесия. Клиент мог ошибочно считать их признаками психического расстройства. Определение и название таких состояний с использованием нейтральных терминов помогает перестать видеть в них признаки катастрофы.

2. *Тренаж вестибулярного аппарата.* Если причиной является вестибулярная стимуляция (например, ускорение, замедление, вращение), ощущение легкого головокружения можно вызывать специально, систематически и постепенно усиливая. Этого можно добиваться, совершая движения головой (варьируя силу и продолжительность положения, в котором возникает легкое головокружение), физические упражнения или занятия спортом, требующие движения всего тела. В качестве хорошо контролируемого стимула можно использовать вращение на крутящемся офисном кресле, которое можно ускорять и тормозить. Общее правило, которого надо придерживаться, состоит в том, чтобы каждый сеанс стимуляции головокружения завершался соответствующим восстановительным периодом, после которого можно переходить к следующему сеансу. (Продолжительность головокружения после вращения будет становиться короче при систематическом повторении.)

3. *Конфронтация.* Клиентам, которые чувствуют беспокойство, если рядом нет физических опор (например, при переходе дороги или стоя на крыше), обрести полную уверенность обычно помогает постепенная конфронтация. Клиенты, испытывающие страх падения или слабости, могут убедиться в его необоснованности. Клиентов, которые переоценивают вклад зрительного восприятия в чувство ориентации, можно учить больше доверять механизмам интероцепции (например, можно идти, не глядя перед собой или восстанавливать равновесие с закрытыми глазами).

Фиксация взгляда на неподвижном объекте является полезной стратегией, если нужно справиться с ощущением вращения.

Другие внутренние сигналы, связанные с паникой и тревожностью

Любой телесный сигнал, связанный с физическими или эмоциональными стрессорами, может восприниматься как первый признак надвигающейся катастрофы или неминуемой паники. Интенсивность некоторых телесных ощущений возрастает, если на них направляется всё внимание. Например, сердцебиение или потоотделение усилятся, если человек обратит на них внимание, почувствует напряжение, а затем тревогу. Интенсивность других телесных ощущений, воспринимаемых как угрожающие (например, шум в ушах, предвестник эпилептического припадка) не изменяется подобным образом, поскольку не зависит от деятельности вегетативной нервной системы.

Во всех случаях, когда тревожность вызывается внутренними ощущениями, следует придерживаться принципа постепенности при разработке системы упражнений и обеспечения безопасности обстановки при предъявлении стимула. Для некоторых клиентов угроза, о наличии которой свидетельствует ощущение, заключается в опасности серьезного физического заболевания или дает повод для тревоги о здоровье в целом. Страх болезни вносит дополнительные сложности в процесс консультирования, поэтому данная тема обсуждается отдельно в конце этой главы.

Саморегуляция при конфронтации с тревожащими ситуациями

Вначале использования когнитивно-бихевиоральных техник для консультирования по проблемам страха публичных мест общая практика заключалась том, что консультант сопровождает клиента при столкновении со всеми ранее избегавшимися ситуациями. В настоящее время центральным приемом стало воздействие на когнитивный компонент паники, хотя не отрицается и польза присутствия консультанта. Наличие иррационального мышления позволяет выявить анализ дневниковых записей об эпизодах, а также кабинетное наблюдение за реакциями клиента на предлагаемые консультантом упражнения. Для работы с реакцией избегания проблемы клиент должен выполнять плановые домашние задания. Цель заданий заключается в постепенном расширении границ территории, на которой клиент чувствует себя комфортно.

Переход от заданий в реальной жизни к кабинетным занятиям имеет несколько причин:

- Наличие клиентов, для которых избегание не характерно (не считая приступов паники) или которые обращаются за помощью практически сразу после первых эпизодов, до того, как сформируется избегание. При этом приступы паники составляют основное содержание проблемы.
- Исследования показали, что освоение техники саморегуляции в ситуации конфронтации и работа над проблемой в присутствии консультанта дают одинаковые результаты.
- Была выявлена ведущая роль реакций на внутренние стимулы и иррацио-

нальные убеждения в формировании и закреплении порочного круга. При работе с данными компонентами кабинетные техники дают хорошие результаты.

В настоящее время признается, что эффективность консультирования определяется не только фактом устранения реакции избегания. Клиент может нуждаться в более масштабном изменении всего стиля жизни. Например, перед избавившимся от избегания клиентом встают новые проблемы, связанные с общением и уверенным поведением, у него возникают новые интересы и хобби.

Как отмечено выше, присутствие консультанта при конфронтации клиента с пугающими ситуациями преследует *несколько* целей. Консультант может оказывать помощь в выявлении негативных мыслей, когнитивном реструктурировании ситуации, анализе задачи, выделении этапов ее решения и использовании стратегий совладания. Отсутствие консультанта как источника безопасности, определяющее специфику техникой саморегуляции при конфронтации с угрожающими ситуациями, необходимо учитывать при разработке соответствующих рекомендаций. Задача консультанта при этом заключается в том, чтобы помочь клиенту усвоить систему правил для последовательного выполнения домашних заданий и управления сложными ситуациями. Важно также, чтобы клиент избегал ситуаций, способных вызвать приступы неконтролируемой паники, после которых исчезает желание дальше работать над проблемой. Рекомендации по саморегуляции при конфронтации с угрожающими ситуациями предусматривают сведение к минимуму вероятности таких событий. Также клиент получает советы по совладанию с неожиданно возникшей паникой.

Цели и принципы

Конечной целью является достижение клиентом такого состояния, когда он может заниматься, чем хочет, и не беспокоиться, что ему помешает сильная тревога или приступ паники. Сам клиент может ожидать, что его жизнь станет полностью свободной от любого дискомфорта, и наличие таких иррациональных ожиданий следует учитывать в процессе консультирования. Клиенты должны быть готовы к тому, что приступы паники *будут* неожиданно повторяться, однако, как показывает практика, их сила и частота снизятся. Если клиенты преследуют только скромные цели (например, делать покупки в магазине, проводить отпуск за границей, ужинать в ресторане), то при столкновении с более сложными ситуациями будет по-прежнему проявляться их склонность впасть в тревогу. Оставив непроработанными источники мощной угрозы, мы рискуем получить постепенное восстановление уровня чувствительности и, как следствие, утрату достигнутых частных результатов. Клиенту следует знать о возможности такого развития событий.

Главные цели саморегуляции при конфронтации с угрожающими ситуациями заключаются в том, чтобы помочь клиенту:

- узнать, что такое тревожность и паника, когда это может происходить, как нужно на это реагировать. Данную цель достигают, давая прямые разъяснения, предоставляя материал для чтения, обсуждая описанные в дневнике эпизоды;
- научиться переносить и справляться с неприятными психическими и телесными ощущениями. При кабинетной работе для этого используют упражнения, в ходе которых клиент воспринимает специфические внутренние стимулы. В промежутках между сеансами клиенты вступают в конфронтацию с теми ситуациями, которые привыкли избегать; стараются вынести возникающие при этом ощущения паники и тревожности; увеличивая время пребывания в таких ситуациях и упражняясь в применении техник совладания, приобретают уверенность в собственной способности управлять тревогой;
- распознавать и сопротивляться иррациональным убеждениям, подпитывающим угрозу. Такие убеждения выявляются при анализе эпизодов тревожности, описанных в дневнике, или возникающих во время кабинетных упражнений. Работа с убеждениями происходит в форме *заданий*, направленных на исследование реальности вытекающих из убеждения ожиданий, или *обсуждения* убеждений в стиле сократовского диалога.

Рекомендации по саморегуляции при конфронтации с угрожающими ситуациями

Программы составлены с учетом приведенных в Главе 6 рекомендаций по техникам конфронтации, а эффективность оценивается, как описано ранее, посредством дневниковых записей. Консультант помогает клиенту составить план действий на каждый день и справиться с избеганием. В случае возникновения стресса или особых событий (например, семейные праздники или отпуск) целесообразно провести специальную консультацию.

1.Осторожный оптимизм. Клиент постепенно усваивает принципы, позволяющие принимать решение о том, когда можно стремиться к более сложной цели; когда лучше отступить назад, чтобы не впасть в неконтролируемую тревогу; как упрощать ситуации путём пошагового планирования и обеспечения путей отступления. Процесс усвоения происходит в ходе обсуждения с консультантом эпизодов беспокойства (и управления ими), описанных в дневнике. Применять принципы следует гибко, в соответствии с непостоянным уровнем уверенности клиента в собственных силах, который каждый день может быть разным. Точно определить причины такого колебания сложно, но следует иметь в виду, что влияние могут оказывать следующие факторы: настроение, стрессогенные жизненные события, разочарование, ожидание неприятного события.

При любой возможности клиента нужно побуждать к воспроизведению достигнутых в повседневной жизни успехов (например, посещение прачечной), даже если сегодня он сам этого не хочет. Занятия, не являющиеся по-

вседневыми, продумываются заранее и рассчитываются по времени. Некоторые клиенты говорят о сильном утомлении после переживания страха. Некоторым после работы с серьезной целью для восстановления требуется день и более.

Клиент может пытаться «побороть» или «преодолеть» страх, собравшись и максимально ускоряя события. Такая тактика непродуктивна; стремиться следует к тому, чтобы переживание было встречено лицом к лицу и принято, чтобы клиент сумел не воспользоваться подготовленными путями отступления и «подпорками» (см. с. ?) и, совершая первый шаг, почувствовал уверенность.

2. Планирование заданий и принцип постепенности. Повседневная деятельность предоставляет огромный выбор возможностей и потенциальных результатов. Обычно отдельные элементы и планы можно выбирать в соответствии с достигнутыми результатами. К примеру, встреча на ланче может описана по следующим параметрам:

- встреча с надёжным другом или с менее близким человеком;
- встреча на знакомой (например, дома) или незнакомой территории;
- если ланч будет происходить вне дома, можно заранее исследовать назначенное место встречи, выяснив, насколько тамлюдно в определённое время дня, как стоят столы и т.п.
- будут ли объяснения с участниками ланча по поводу испытываемых клиентом проблем тревожности, и что планирует делать клиент, если возникнут трудности;
- приглашение планируется сделать задолго до ланча или непосредственно перед ним, чтобы избежать тревожного ожидания;
- свободно ехать на собственной машине или поставить себя в зависимость от движения общественного транспорта или планов друга;
- выбрать стол поближе или подальше от выхода;
- определить продолжительность встречи или оставить этот вопрос открытым;
- планы на случай серьезной паники: например, уйти в туалет, уйти отсидеться в машине и вернуться, когда состояние стабилизируется;
- решение о приеме транквилизаторов для облегчения состояния.

Даже в передвижении по мосту можно выделить отдельные этапы (прикинуть на глаз его размеры; пройти часть пути и вернуться; пройти по нему с человеком, которому доверяешь; пройти по нему, чтобы встретить друга на противоположной стороне; проехать по нему в одиночестве на машине; наконец, пройти по мосту в одиночестве, близко к краю и т. д.).

Обсуждение тревожных инцидентов должно помочь клиенту усвоить следующие принципы:

- необходимо повторять (регулярно практиковаться). Клиентам следует планировать конфронтацию с провоцирующими тревожность ситуациями, по крайней мере, несколько раз в неделю;

- когда тревога возникает, дать себе достаточно времени для того, чтобы ее интенсивность снизилась до приемлемого уровня;
- пытаться следовать запланированной деятельности, принимая во внимание рекомендации, перечисленные в пункте под названием «Осторожный оптимизм»;
- выбирать новую деятельность, которая лишь ненамного труднее уже завершённой;
- быть гибким в достижении целей, то есть в случае невозможности добиться полного выполнения задачи, удовлетворяться частичным, вместо того, чтобы бросить заниматься этим вообще;
- выбирать значимую деятельность, которая может принести некоторый реальный выигрыш (например, совершение покупок, встреча с другом, выполнение необходимых домашних дел, занятия спортом или хобби);
- не допускать, чтобы в ситуацию заманивали (по капризу того, кто влияет на планы клиента, зависит от клиента или является для него ненадёжным источником помощи и т. д.).

3.Использование «подпорок». «Подпоркой» может быть любое средство или опора, усиливающая веру клиента в успешное достижение цели. При этом по мере усиления уверенности от подпорок нужно отказываться. Обычно в качестве подпорок могут выступать:

- сигналы безопасности (присутствие друзей и др.);
- переключение внимания (от тревожных мыслей и ситуаций);
- беспроектные планы.

Для переключения внимания клиенту можно посоветовать заговорить с кем-нибудь или внимательно рассматривать предметы в витрине магазина. Одна клиентка всегда носила с собой плеер и слушала песни любимой группы, в которых находила ответы на волнующие вопросы, надежду и поддержку, помогающие справиться с тревогой.

Приём транквилизаторов может помочь, если к нему прибегают в единичных случаях. Кратковременный эффект, получаемый с их помощью, например, в случае хронической бессонницы, имеет относительную ценность, в то время как нормальный сон может быть достигнут только в ходе длительной психологической работы.

4.Отстраненное принятие. Когда клиент приходит к осознанию безвредности своих ощущений и лучшему пониманию своего страха, ему можно предложить попробовать занять позицию отстраненного наблюдателя по отношению к происходящему в момент приступа паники. «Принять» переживание - значит позволить себе прожить его полностью, или, согласно известному выражению, «погрузиться» в тревогу.

Приближаясь к тревожащей цели, клиент должен двигаться так, как ему удобно, не торопясь и не напрягаясь. Заметив, что возникает напряжение, клиент может остановиться, если необходимо, присесть или прислониться к стене. Можно записывать возникающие переживания и мысли или обращать-

ся к себе со словами: «Это неприятно, но это пройдет» или «Я знаю, это очередная паника – она не причинит мне вреда».

В запасе у клиента должен быть набор эффективно помогающих ему фраз или образов, например: «Ладно, умирать, так с музыкой!» или «Я верю себя Богу. Да будет воля Его». Можно использовать также образ успешно разрешенной в прошлом ситуации, которая в настоящий момент вызывает тревогу.

Одной из составляющих стратегии принятия может стать опыт рассказа о своей проблеме и объяснения ее сущности другим людям. (Не следует это делать с коллегами по работе.) Если клиент не хочет выполнять такое задание, то сопротивление может объясняться тем, что он стыдится своей проблемы, и это следует обсудить.

5. Использование помощников. Консультанту следует выяснить, может ли клиент полагаться на чью-либо помощь, когда выполняет конфронтацию со сложной ситуацией. Хорошо, если помощники есть, потому что они: поддерживают и мотивируют клиента; выполняют роль источника безопасности; отвлекают клиента от тревожных мыслей.

Клиенту следует объяснить помощникам принципы конфронтации и роль помощника в своей программе. Рекомендации для помощников может предложить консультант. При этом можно использовать отпечатанные стандартные тезисы (см. Приложение Б). Клиент сам решает, какую цель следует выдвигать после достижения предыдущей. Партнёр клиента не обязательно окажется самым подходящим помощником, особенно, если он обижен или слишком опекает клиента, обесценивает успехи или тревожится за клиента. Эти моменты следует обсудить на общей встрече, куда приглашается партнер или член семьи - в том случае, если клиент не может сделать этого сам.

Идеальным помощником будет человек, имевший опыт избавления от страха или способный к сопереживанию. Помощник должен быть надёжным, заслуживающим доверия и воздерживающимся от оценок. Помощь должна оказываться регулярно и в соответствии с планом. На это может потребоваться много времени, поскольку длительные сессии полезнее, чем короткие. К данной деятельности могут привлекаться участники местных групп самопомощи. Клиент нуждается в помощи только на определенном этапе освоения техники саморегуляции при конфронтации с угрожающими ситуациями, и постепенно необходимость в ней отпадает.

6. Закрепление прогресса. Клиенты должны знать, что для закрепления успеха необходимо повторять конфронтацию. Изменения поведения в единственном случае недостаточно для решения проблемы тревожности. Следует предупредить клиентов, что достигнутый уровень уверенности может снижаться время болезни, в состоянии депрессии или стресса, и что им следует соответственно подстраивать деятельность под своё состояние. Клиенту может показаться трудным повторное выполнение задания, если за эпизодом паники следовали недели бездействия.

Консультант периодически повторно оценивает прогресс, для чего просит клиента пересмотреть первоначальный список целей. Клиенты часто забывают или не придают должного значения тем переменам, которые в них произошли, и такой возврат дает ощущение успеха и побуждает к новым усилиям.

Когда снижается напряжённость в поведении клиента, появляются новые возможности, меняются отношения, и нарастающее чувство свободы может испугать. Консультанту следует отвести специальное время для того, чтобы помочь клиенту пересмотреть его отношение к жизни.

Отпускать клиента следует по возможности постепенно, не прерывая встречи внезапно. Когда будет поставлена точка, зависит в основном от собственных целей и амбиций клиента. Со временем они могут меняться, и клиенты могут обращаться за помощью в решении проблем уже другого характера.

Вмешательство: когнитивное реструктурирование

Данная техника должна помочь клиенту научиться более рациональному отношению к тем ситуациям, в которых он склонен видеть нечто угрожающее; например, заново оценить, насколько вероятно возникновение определенных угрожающих событий, а также имеющиеся в распоряжении ресурсы для совладания с ними. Некоторые нереалистичные представления об угрозе довольно специфичны и определяются контекстом. Другие порождаются общими дисфункциональными установками, которые играют роль своеобразных жизненных правил, действующих во многих ситуациях. В данном разделе я рассматриваю только более специфические и доступные внешние мысли, связанные с беспокойством (см. в Главе 8 описание методов работы с дисфункциональными установками). Однако, когда консультант начинает анализ значений внешних мыслей, становится очевидно, что их можно соотнести с дисфункциональными установками. Критическое обсуждение таких установок, скорее всего, окажется длительным процессом, к которому клиент должен специально готовиться, и поэтому консультанту нужно заранее принять решение, будет ли данная форма консультирования полезна для клиента и стоит ли её предлагать.

Подготовка к когнитивному реструктурированию

Необходимо объяснить роль мысли в формировании эмоции, используя иллюстративные примеры и примеры, извлеченные из рассказов самого клиента о своей проблеме. Кроме того, можно предложить клиенту материалы для чтения по данной теме (см. Приложение А). Некоторые клиенты утверждают, что у них нет никаких мыслей, когда они чувствуют себя тревожно или когда переживают свои «симптомы». Но в большинстве случаев осто-

рожное и настойчивое исследование связанных с проблемой обстоятельств, *дает* доказательства наличия иррационального мышления.

Клиент может отчётливо осознавать, что волнение не связано с реальностью. При бесстрастном рассмотрении становится очевидным отсутствие реального содержания у забот о том, что может случиться, и клиент это знает; однако, в состоянии сильного беспокойства ожидание чего-то ужасного кажется оправданным, достойным внимания и несомненным. Клиенты должны знать, что развитие способности думать более реалистично в состоянии беспокойства требует времени и практики, но это задача разрешима.

Встреча от начала до конца не может быть посвящена только когнитивному реструктурированию. Поводом для его применения может быть какой-то момент в обсуждении домашних заданий или нечаянная реплика клиента. Тем не менее, консультант всегда должен предупреждать о переходе к реструктурированию, иначе клиент будет считать, что любая его мысль является предметом критического анализа. Консультант, например, может сказать:

«Давайте разберемся, что вы сейчас сказали»

«Давайте проведём эксперимент, чтобы посмотреть, насколько разумна эта идея»

«Я хотел бы знать, какие у вас есть причины так думать»

Техники реструктурирования

Существует четыре основные методики:

- поведенческие пробы для проверки представлений;
- установление значения симптомов или пугающих последствий отнесение их к действию безопасных (или менее угрожающих) причин;
- критика иррациональных представлений посредством анализа неявных допущений и обоснований, служащих для их поддержания;
- обучение способам действия, применение которых в ситуациях угрозы может приводить к ее переоценке.

Поведенческие пробы. Клиент может считать, что совершение определенного действия влечет за собой некую катастрофу. Клиенту предлагают проверить данное представление, и следуя инструкциям консультанта, обнаруживает, что страх не обоснован. Примеры:

Женщина, которая из-за последствий перенесенного в детстве полиомиелитом пользовалась протезом, боялась, что если она упадет, то закричит и будет выглядеть нелепо. Она могла свободно передвигаться на своей машине и отходить от неё метров на сто. Вместе с консультантом она вышла в парк, и они прошли расстояние, соответствующее ее «границам». Здесь консультант попросил ее упасть и закричать, что она и сделала (консультант мог показать ей пример, если бы проявила нежелание выполнять данную инструкцию). Затем ее попросили посмотреть на прохожих и определить их реакцию. Полное отсутствие интереса к её действиям дало сильный эффект. Она сразу же почувствовала, что может отойти от своей машины еще на 50 метров.

Мужчина не мог сидеть напротив другого человека в поезде или автобусе из-за страха, что на него будут пристально смотреть. Он боялся, что окружающие увидят его волнение или покрасневшее лицо. Ему дали задание специально сесть напротив другого человека и время от времени посматривать в его направлении. Предположение мужчины о том, что его будут разглядывать, не подтвердилось, кроме того, он обнаружил, что если на людей смотреть, они будут отводить глаза.

Одна женщина боялась, что обмочится, если доступ к выходу и/или к туалету будет закрыт. В таких ситуациях ей казалось, что её мочевой пузырь готов лопнуть, даже если она недавно его опорожнила. Она согласилась на протяжении 40 минут находиться в закрытом помещении (при необходимости она могла позвонить консультанту). Когда закончилось время и оказалось, что она не обмочилась, это вызвало удивление и желание потрогать сиденье стула, чтобы убедиться в реальности ощущений. Проба повторилась после того, как она выпила некоторое количество жидкости.

Для усиления эффекта поведенческой пробы клиента просят оценить до и после нее: вероятность (в процентах) пугающих последствий; степень (по соответствующей шкале) ожидаемой в данной ситуации тревожности. Дополнительные вопросы направлены на выявление деталей того, как клиент объясняет результат пробы. Неудавшиеся пробы также полезны, так как позволяют обнаружить ранее неизвестные аспекты проблемы. Стиль опроса не должен напоминать о «проверке на глупость». Клиент делает выводы, отвечая на такие вопросы, как:

- Как соотносится полученный вами опыт с тем, чего вы ожидали?
- Что вы думали, когда ... ?
- Почему вы считаете, что не произошло событие X, или люди не вели себя способом X?
- Что изменилось бы, если бы (рядом не было консультанта, встреча длилась дольше, произошло X и т.д.)?
- Почему вы считаете, что этот случай вас не так уж напугал?
- Как это изменит ваши мысли по поводу паники/тревоги, возникающих в ситуации X?

Консультант обобщает опыт, полученный в ходе выполнения упражнения, и заручается подтверждением того, что клиент согласен с предлагаемой формулировкой.

Установление значения и поиск других причин. Чем больше клиент знает о причинах чувства тревоги и способен объяснить его действием либо реальных жизненных проблем, либо безвредных естественных явлений, тем более выражено ощущение контроля. Консультант использует недавние эпизоды тревожности или наблюдаемые во время встречи спонтанные проявления эмоций для переучивания клиента. Дневниковые записи позволяют проследить влияние таких признаков, как утрата свободы передвижения, отсутствие сигналов безопасности, эмоциональное или физическое возбуждение, есте-

ственные стрессоры, кофеина, непроработанных психологических травм и т.д.

Иногда необычным ощущениям полезно дать внушающие уверенность объяснения. Если клиент считает, что консультант хорошо разбирается в вопросах тревожности, то последний приобретает авторитет человека, которому можно доверять. Консультант может усиливать свою позицию, предсказывая «симптом», который, по его мнению, может быть у клиента, например: «Некоторые люди с проблемами тревожности имеют странные навязчивые мысли, которые они не могут выбросить из головы, например, о том, чтобы сделать что-то неприличное – а у вас такого никогда не было?»

Клиенты часто спрашивают с дрожью в голосе, «нормально» ли такое-то ощущение. Им бывает важно узнать, что нечто подобное консультант слышал и от других клиентов с проблемами тревожности. Там, где это возможно, ощущение относится к проявлениям *не* тревожности, а естественных процессов. Вообще-то нужно стремиться к точности, но иногда полезно прибегнуть к гипотетическим рассуждениям и даже вымышленным объяснениям. Важно, чтобы объяснение было доступно для клиента с определенным уровнем владения языком знания психологии. Например, Клэр Уикс говорит с клиентами о панике, вызываемой «взвинченными нервами» и об «упадке сил», происходящем из-за «мышечной слабости». Такой стиль объяснения может подходить некоторым клиентам.

Клиенту, который волнуется, когда не слышит, как бьется сердце, можно объяснить, что нерегулярный ритм - явление естественное (и чем медленнее бьется сердце, тем более он нерегулярен), и если сердцебиение под влиянием физических или эмоциональных нагрузок учащается, то позже для восстановления нормального ритма требуется пауза. (Естественное объяснение ощущений, связанных с дыханием, было дано ранее в этой главе.) Как правило, полезно подчеркнуть, что то же самое ощущение, если оно возникает в других условиях, чаще всего воспринимается как «обычное». Никого нестораживает, если сердце колотится после энергичного бега, или если человек, который только что узнал, что получил в наследство состояние, также чувствует слабость и дрожь, и т.п.

Когда клиента волнует наличие какого-либо ощущения, прежде, чем предлагать альтернативное объяснение, нужно понять причины такого отношения. Простое сообщение о том, что, как показали результаты медицинского обследования, у клиента все нормально, необходимо, но редко бывает достаточно, так как клиент строит свое понимание не на тех данных, которые могут быть опровергнуты результатами клинического исследования. Одна клиентка боялась, что её голова распухнет и взорвется, и объясняла это тем, что кровь может прорвать стенки сосудов мозга. Она указывала три источника, из которых черпала доказательства. Во-первых, она слышала шум в ушах, интенсивность которого изменялась в зависимости от пульса. С увеличением пульса шум становился невыносимо громким. Она отождествляла громкость

шума и давление в голове. Вторым источником был не совсем хороший результат медицинского обследования, проведенного с целью успокоить ее страхи, связанные с соматическим состоянием. Сканирование головы выявило признаки небольшого неоперабельного аневризма, по поводу которого ей было сказано «ничего страшного». Наконец, она лечилась от повышенного кровяного давления.

Ниже приведен составленный клиенткой список пугающих мыслей, после чего ее попросили предложить альтернативные объяснения ощущений (поиск других причин) и найти основания для критики своих представлений.

Пугающие мысли:

- Я чувствую, что моя голова пухнет и может взорваться.
- Кровь в моей голове под давлением проходит через узкие сосуды.
- Кровь прорвёт стенки сосудов.
- Громкий шум означает, что давление увеличивается.
- У меня аневризм, а это дефект.

Рядом располагалась колонка, в которой клиентка перечислила противоречащие своим представлениям мысли.

Альтернативные объяснения и доказательства обратного:

- То, что я *чувствую*, что моя голова стала больше, не значит, что она *стала* больше.
- Не существует свидетельств того, что когда-либо чья-либо голова взрывалась таким образом.
- Хотя у меня небольшое повышение кровяного давления, до сих пор эта проблема решалась с помощью лекарств.
- Когда мозговое кровообращение нарушено, этого нельзя не заметить, мои же мыслительные способности в норме;
- Нет доказательств того, что мои сосуды сужены. Аневризм – это расширение, а не сужение кровяного сосуда.
- Аневризм мог бы уже разорваться бы из-за высокого кровяного давления; поэтому маловероятно, что это произойдет именно сейчас.
- Увеличение аневризма проявлялось бы в болях или случаях потери сознания.
- Я ошибалась, полагая, что, когда шум в ушах громче, выше моё кровяное давление.

Клиентке должна была перечитывать оба списка раз в день обязательно, и дополнительно, когда ее тревожило ощущение опухающей и взрывающейся головы. Также ей дали инструкцию сократить число проверок, предпринимаемых ею для определения размеров головы. Не только потому, что такие проверки не дают достоверной информации, но они также подразумевают, что голова всё-таки *может* распухнуть из-за действия названных иррациональных причин. В терминах теории научения, измерение головы негативно подкрепляется сигналами безопасности («моя голова прежнего размера»). Устранение этих сигналов безопасности ведет к восприятию сигналов опасности

(«моя голова пухнет») и возможности реагировать по-другому (например, игнорировать ощущение и противопоставлять своим мыслям рациональное объяснение).

Критика иррациональных представлений. Последний пример демонстрирует техники критики иррациональных представлений. Когнитивные терапевты выделяют несколько типов иррационального мышления, характерного для эмоциональных проблем (см. Таблицу 7.7), порождающего специфические иррациональные представления.

Таблица 7.7. Типы иррационального мышления, характерного для проблем тревожности

Избирательное абстрагирование	Клиент выделяет один аспект ситуации и интерпретирует всю ситуацию в целом исключительно на его основе
Произвольное умозаключение	Клиент делает выводы на основе недостаточных или даже противоречащих друг другу доказательств
Сверхообщение	Из одного аспекта ситуации клиент выводит необоснованное общее заключение
Преувеличение и преуменьшение	Клиент преувеличивает негативные аспекты ситуации и преуменьшает позитивные
Персонализация	Клиент рассматривает угрожающие внешние события как направленные лично против него, тогда как для установления такой связи оснований нет.

В рамках данного пособия невозможно отнестись с должным вниманием ко всему многообразию методов когнитивной терапии, но несколько примеров процесса критического анализа приведены в Главе 5 при описании направленного фантазирования. Поэтому продолжим цитировать тот же протокол. Он иллюстрирует приемы критического анализа и поиска альтернативных причин. Большая часть клиентов способна вернуться к эпизодам тревоги с помощью фантазии, переживая те же чувства и мысли, которые были у них в то время. Благодаря гибкости техники фантазирования и способности клиента погрузиться в мир фантазии, имитирующей реальность, возникают уникальные возможности для обнаружения и критики иррациональных представлений. В помещенном ниже протоколе комментарии к логически ошибочным высказываниям, связанным с иррациональными представлениями, даются рядом с изложением содержания фантазии. Комментарии раскрывают также процесс критического анализа.

Продолжение протокола направленного фантазирования, иллюстрирующее процесс когнитивного реструктурирования

Клиентка вспомнила о реальном инциденте, когда она случайно оказалась запертой внутри чьей-то квартиры. Для выявления наиболее сильных страхов ее попросили представить ситуацию с более выраженными призна-

ками угрозы - она находится в автобусе, из которого нельзя выйти. (Следует напомнить, что клиентка пережила панику, находясь в автобусе, недавно паниковала в автобусе и сейчас эти переживания актуализируются.)

Записи в протоколе

Ко: Представьте себе, что бы произошло, если бы вы были в автобусе и почувствовали неконтролируемый страх. Что бы тогда произошло?

Кл: Думаю, я бы стала визжать и кричать: «Пустите!» И это ужасно стыдно.

Ко: Да.

Кл: Но я не думаю, что в такой ситуации можно себя как-то контролировать. Что могут люди? – они ничего не могут, если рассуждать логически о таких случаях.

Ко: Постарайтесь представить прошлый вечер - вы не можете контролировать свой страх. Вы бы закричали. Попробуйте представить, как вы кричите.

Кл: Да. Я бы устроила переполох.

Ко: Переполох?

Кл: Ну знаете, когда что-то случается, люди говорят: «Что-то не так», и всегда находится человек, из-за которого возникают проблемы.

Ко: Чьи это проблемы - ваши или их?

Кл: И мои, и их, наверно.

Ко: Как вы думаете, что они могли бы сделать или сказать?

Кл: Мне кажется, они подумают, что я ненормальная.

Ко: А вы сами иногда чувствуете себя такой?

Кл: Да.

Ко: Что такое «ненормальная»?

Комментарий

Моделирование гипотетической ситуации для выявления последствий страха.

Для нее потерять контроль стыдно.

Соглашается, что это так.

Создание образа, способствующего доступу к сопутствующим мыслям.

Еще более неприятное последствие (произвольное умозаключение и преувеличение).

Уточнение.

Запрос конкретных деталей для прояснения смысла.

Клиентка думает, что её примут за психически больную (произвольное умозаключение и преувеличение).

Уточнение.

Кл: Ну, что-то не так с головой. Я считаю, что у нормального человека так не бывает. А у меня это есть. Когда слышишь о людях в инвалидных колясках, которые на самом деле больны – и они лечатся, да? А мне лечиться не от чего. Со мной физически всё в порядке, а я не могу делать простейшие вещи.

Ко: Вам стыдно из-за того, что вы не можете этого делать?

Кл: Да, верно.

Ко: Итак, вы в автобусе, и давайте предположим, что ситуация вышла из-под контроля. Вы чувствуете, что вам нужно выбраться. Вы пробиваетесь вниз по ступенькам, люди смотрят на вас, думая, что с этой женщиной что-то не так, наверно, она ненормальная.

Кл: Верно.

Ко: Вы смущены и вам стыдно за себя?

Кл: Смотришь вокруг и видишь детей, и я думаю, что же они подумают о человеке, взрослом человеке, который так себя ведёт.

Ко: Ведёт себя как ребёнок?

Кл: Да, верно.

Ко: И тогда вы чувствуете, что психически больны?

Кл: Я думаю, из-за чего-то же это происходит. Это всё связано с головой, да?

Ко: Как вы думаете, быть сумасшедшим – то же самое, что чувствовать сильный страх?

Кл: Ну, на самом деле, я никогда не видела сумасшедших. Поэтому ...

Ко: Что вы понимаете под сумасшествием?

Кл: О сумасшедших же говорят, что они делают то же самое, да? – они визжат и кричат.

Доказывает, что это ненормально, если ты не способен делать простейшие вещи; невозможно ни физическое объяснение, ни лечение, ни оправдание.

Интерпретирует суждения клиентки как причину стыда. Дальнейшее уточнение.

Возвращает к фантазированию, объединяет содержание мыслей, исследует дальнейшие ассоциации.

Уточнение.

Пытается определить устойчивость представления.

Считает, что страх возникает из-за психического заболевания.

Пытается найти другую причину «сильного страха».

Признает, что у неё недостаточно знаний, чтобы проводить сравнение.

Уточнение.

Из того, что некоторые сумасшедшие кричат, делает вывод, что она тоже сумасшедшая, так как она ис-

Ко: Визжат и кричат?

Кл: Впадают в истерику. И со мной тоже самое. Я завизжу и закричу.

Ко: Вы знаете кого-нибудь, кто визжал и кричал таким вот образом?

Кл: Нет, только видела по телевизору.

Ко: Итак, вы знаете о том, что такое сумасшедший человек, из телепередач.

Кл: Да.

Ко: И вы считаете, что ведёте себя так же?

Кл: Да, не полностью контролируя себя.

Ко: И вы только что сказали, что то, что происходит с вами, нелогично.
[Пауза]

Кл: Да. Я лично не знаю никого, кто жаловался бы на такое.

Ко: А другие страхи, которые бывают у людей. Знаете ли вы кого-нибудь, кто испытывает страхи?

Кл: Нет.

Ко: Совсем никого?

Кл: В моей семье нет. У моего мужа совсем нет страхов. Единственный человек, кто чего-то боится, так это моя соседка. Она боится зубного врача, но, я полагаю, большинство людей боится этого. Но только не я.

Ко: Как вы думаете, может ли у кого-нибудь ещё быть страх, подобный вашему?

пытывает непреодолимое желание закричать, когда охвачена паникой (произвольное умозаключение).

Уточнение.

Под «ненормальностью» подразумевает истерию. Боится потерять контроль над своими импульсами во время паники.

Проверяет, почему этот импульс связывается с «ненормальностью».

Проявляет отсутствие личного знания.

Консультант тянет время, чтобы понять, как опровергнуть произвольные умозаключения клиентки.

Консультант решает обсудить утверждение, что желание закричать неразумно, когда напуганный человек находится в замкнутом пространстве, и что порыв закричать естественен и не является признаком истерии.

Сомневается.

Доказывает, что страхи других людей нормальны, а её – нет.

Доказывает, что её страх обычен.

Кл: Должны быть и другие – иначе этому не было бы названия.

Ко: Попробуйте представить кого-нибудь запертым в шкафу. Как бы при этом чувствовало себя большинство людей?

Кл: Не знаю.

Ко: Представьте вашего мужа запертым в шкафу. Вы сказали, он не чувствует страха.

Кл: У него нет *никаких* страхов.

Ко: Ну и как вы думаете, что же он делал бы, если бы его заперли в шкафу и он не мог бы оттуда выбраться?

Кл: Не знаю.

Ко: Как вы думаете, что он делал бы?

Кл: Наверно, он стучал бы и надеялся на лучшее. Думаю, он такой.

Ко: Да, он бы просто стучал. Но некоторые люди стали бы визжать и кричать, да?

Кл: Да.

Ко: Я хочу сказать, что некоторым людям не нравится быть запертыми в тесноте, правда? Бояться этого нормально, но вы этого боитесь сильнее, чем многие люди, да?

Кл: Ну?

Ко: Я думаю, многие люди стали бы визжать и кричать при таких обстоятельствах. Вы даже сказали бы, что некоторые люди впали бы в истерику, но я лично не стал бы употреблять это слово. Я думаю, это сильная реакция страха, а не психическая болезнь.

Кл: Почему же я скорчилась на полу?

Ко: Почему вы скорчились на полу?

Кл: Я совсем забыла об этом до прошлого вечера.

Ко: Скорчились, а не встали или сели?

Предлагает экстремальный пример «нормального» страха.

Не принимает данную логику рассуждения.

Кажется, клиентка понимает намек. Пытается переобучить и найти другие причины импульса закричать.

Клиентка не уверена.

Приводит доказательство тому, что в прошлом ее поведение было истеричным.

Пауза для размышлений.

Уточняет значение.

Кл: Ну да.

Ко: Что было с вашими ногами? Вы чувствовали, слабость в ногах?

Пытается использовать как аргумент для обоснования естественной реакции страха.

Кл: Точно. Вся я, я так и не пошевелилась, пока они не выбили дверь.

Ко: То есть, вы чувствовали себя слишком слабой, чтобы встать?

Кл: Да.

Ко: Поэтому вы и скорчились на полу, да? То, что вы описываете – это очень распространённая реакция на сильный страх. Ноги людей становятся как желе. Вы слышали когда-либо это выражение?

То обстоятельство, что она скорчилась на полу, используется для поддержки нового объяснения причин.

Кл: Да, мои ноги становятся такими, когда я нервничаю.

Ко: Итак, то, что вы испытывали, было сильным страхом. Ваши ноги стали как желе. Возможно, то, что ваше тело дрожало и сгибалось, было естественно. Как вы думаете, что может означать это желание сжаться?

Кл: Я не знаю.

Ко: Вы считаете, что это странно?

Заставляет уточнить.

Кл: Да. Я даже не попыталась найти отвёртку, чтобы вытащить замок из двери.

Ко: То есть, вы обнаружили, что не можете последовательно рассуждать?

Кл: Да.

Ко: Да, это ещё одно из проявлений страха. Когда вы ужасно переживаете из-за чего-то, вы не можете сосредоточиться. Вы не можете мыслить логически. Вы не можете вести себя разумно, потому что все, что вас занимает - это страх и желание убежать.

Вторая часть высказывания снова переадресована к страху и используется для объяснения отсутствия разумности в поведении.

Хотя работе с представлениями в ходе фантазирования имеются такие преимущества, как спонтанность и непосредственность, но у консультанта слишком мало времени, чтобы успеть развернуть свои мысли. Другими словами, время уходит на анализ высказываний клиента, определение типа со-

вершаемой им логической ошибки, обдумывание стратегии критики. Другой способ, описанный ранее, подразумевает неторопливое рассмотрение отдельных представлений, их запись, предоставление клиенту достаточного количества времени для рассмотрения аргументов за и против. Для записей используется специальная форма в виде таблицы с несколькими колонками (см. Таблицу 7.8), при этом степень убежденности клиента оценивается до и после процесса обсуждения. Схематичное изображение (см. Рисунок 5.1) также полезно, потому что клиенту становится хорошо видно действие отдельных компонентов порочного круга и их связь с иррациональными представлениями.

Приведенный протокол показывает, как с помощью диалога в стиле Сократа клиент втягивается в процесс обсуждения. Консультант время от времени проверяет, правильно ли он понимает высказывания клиента, и резюмирует сказанное. Наоборот, если консультант побуждает клиента к тому, чтобы определенный аргумент был вычленен и рассматривался отдельно, нужно попросить клиента сказать, как он понял объяснения консультанта, зачем это делается. Получая данные о динамике убежденности с помощью оценок по шкале от 0 до 100 процентов, можно составить для клиента диаграмму (например, как теперь вы оцениваете вероятность того, что импульс закричать является признаком психического расстройства?)

Оставшиеся сомнения и исключения из общего правила следует перечислить и подвергнуть критике, используя результаты поведенческих проб или проверки истинности. Консультант и клиент могут в игровом формате поменяться ролями; консультант отстаивает мнения клиента, который, таким образом, вынужден их критиковать. Преимущество данной техники заключается в том, что клиент стремится найти доводы и доказательства, позволяющие отвергнуть его собственные иррациональные представления. Консультант может также принять на себя роль адвоката дьявола; эта вспомогательная тактика позволяет подкрепить критическую позицию клиента при работе с самыми стойкими представлениями невероятными сценариями.

Таблица 7.8.

Формат дневниковых записей и анализа иррациональных представлений

Дата	Ситуация	Эмоциональный стресс	Иррациональные представления	Рациональное опровержение	Результат
	Событие, образ,	1.Описание 2.Оценка	1.Описание 2.Оценка (0-	Описание реакции	Повторная оценка

	воспоминание	(0-100)	100)		1.Эмоция 2.Иррацион. представл.
Пон.	Поездка в переполненном автобусе	1.Паника 2.80%	(а) Я закричу (60%) (б) Люди подумают, что я сумасшедшая (80%)	1.Я никогда не делала этого раньше 2.Страх – это не умственное заболевание	1.50% (а) 20% (б) 40%

(Пример взят из протокола направленного фантазирования, Глава 7.)

Инструкции для клиента: Если вы испытываете эмоциональный стресс, занесите этот случай в свой дневник сразу, как только будете способны. Обозначьте дату и ситуацию, в которой это произошло (включая любой образ или воспоминание, которое могли вызвать стресс). Укажите, какого рода это состояние (тревожность, паника и т.п.) и оцените его тяжесть по шкале 0-100, где 0 – покой, а 100 – состояние наивысшего беспокойства. В следующей колонке запишите любое иррациональное представление, которое приходило в голову тот момент, и оцените, насколько сильно вы были в нем убеждены (0=совсем не убежден(а); 100=полностью убежден(а)). Попробуйте рационально опровергнуть убеждение, задавая себе вопросы, как мы делали во время наших встреч. Оцените, насколько сильной теперь может быть ваша эмоция в аналогичной ситуации, и насколько вы теперь убеждены в правильности иррационального представления.

Закрепление успеха, достигнутого в когнитивном реструктурировании

Есть мнение, что человеку достаточно один раз признать истинным некое утверждение, и в дальнейшем для того, чтобы придерживаться вновь возникшей точки зрения, никакой перепроверки аргументов за и против ему не потребуется. Техника когнитивного реструктурирования опирается на представление об иррациональном мышлении как о некой привычке допускать, что иррациональное мышление больше похоже на привычку, которую нужно скорее разрушать, нежели стирать с помощью «инсайта». Кроме того, пока клиент не будет готов принять идею о том, что эмоция напрямую связана характером *интерпретации* и *представления* о ситуации, реструктурирование вряд ли будет успешным.

Оценка когнитивного компонента проблемы, проведенная в течение нескольких первых встреч, не даст полной картины иррациональных представлений клиента. Как правило, тематика расширяется в ходе анализа и обсуждения новых и новых эпизодов тревожности. Анализ может показать желательность проведения поведенческих проб. Выполняя их, клиент получает

ценную для него обратную связь, которая в то же время способствует проводимому консультантом когнитивному анализу. Можно утверждать, что процесс когнитивного изменения происходит тогда, когда клиент отмечает (иногда с удивлением), что он *не* реагировал на ситуацию привычным для себя образом.

Закрепить эффект когнитивного реструктурирования помогают следующие приемы:

- Побуждать клиента к распознаванию иррациональных мыслей и опровержению их в как можно большем количестве ситуаций.
- Способствовать воспоминанию и повторению, просить клиента записывать его рациональные реакции на иррациональные мысли (например, по схеме АВС-анализа или в виде перечня) и регулярно перечитывать их.
- Во время встречи использовать возможности, заключенные в любом спонтанном замечании или эмоциональной реакции, отражающих некую иррациональную мысль, для ознакомления клиента с альтернативными интерпретациями.
- Использовать фантазирование или ролевую игру для моделирования переживания беспокойства и побуждения клиента отрабатывать рациональные реакции.

Стремясь к тому, чтобы повышался уровень осведомленности клиента об иррациональном мышлении в целом, следует, однако, так планировать встречи, посвящённые когнитивному реструктурированию, чтобы на каждой из них поднималось бы и глубоко исследовалось только одна-две темы. Благодаря этому клиент не будет перегружен и сбит с толку, а консультант сумеет полностью выявить содержание анализируемой иррациональной мысли. По прошествии времени целью когнитивного анализа может стать влияние, оказываемое глубинными дисфункциональными установками. Описанный выше метод консультирования может быть модифицирован в целях оказания клиентам помощи в переоценке обоснованности глубоко укорененных убеждений (см. Главу 8).

Страх болезни

Как можно видеть из ранее обсуждавшихся примеров, телесное ощущение («симптом») может быть интерпретировано клиентом как признак серьёзного физического заболевания. Представление о наличии заболевания является иррациональным, если нет объективных оснований для его предположения, а все возможные диагностические обследования дают отрицательный результат. Некоторые клиенты сознают, что их страх иррационален (то есть, согласны с тем, что их представления безосновательны), тогда как другие действительно считают себя физически больными или болевающими. Убежденность в этом может варьировать от слабой до сильнейшей. Если под болезнью понимать постоянную скрытую угрозу здоровью, то клиенту не нужны такие доказательства ее наличия, какими являются катастрофические проявления заболевания во время эпизодов паники или тревожности.

Страх болезни и уверенность в своей болезни не следует путать с соматическими жалобами на, скажем, боль или тошноту, органическую причину которых не удастся обнаружить. У таких клиентов первоначальные жалобы касаются скорее симптома (и болезненных ощущений), чем страха перед тем, чем они вызваны. Также важно знать, что многие клиенты имеют хронические заболевания, которые, не являясь исходной причиной жалоб на тревожность, могут косвенно ее усугублять. Например, из-за нарушения деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой системы усугубляются трудности дыхания, связанные с тревожностью. Такие сенсорные нарушения, как плохое зрение или слабый слух, снижают порог страха в определенных обстоятельствах. Человек с выраженной потерей слуха не слышит звуков дорожного движения при переходе дороги или звука шагов идущего позади человека, и поэтому будет сильнее бояться попасть под машину или стать объектом нападения.

Если у консультанта имеется какое-либо подозрение на действие неизвестных физических факторов, принято запрашивать историю болезни и направлять клиента к врачам. Когда роль физического расстройства в телесном ощущении или дискомфорте подтверждается исследованиями, клиенту будет полезна помощь в осознании связи между физическим фактором и симптомом и в понимании медицинских предписаний.

Клиент может верить в свою болезнь и бояться болезни на основании следующих фактов:

- наличие подобных заболеваний, перенесенные в прошлом самим клиентом или его близкими (например, друг мог умереть от сердечного приступа);
- наличие семейной истории какого-либо «дефекта» (например, болезни сердца, дряхлость);
- наличие информации из СМИ (например, касающаяся ВИЧ-инфекции);
- наличие незнакомых или сверхинтенсивных телесных ощущений. Они могут иметь реальную, объяснимую причину или быть результатом чрезмерного внимания к телесным состояниям и неадекватного отношения к нормальным ощущениям, например, биению сердца;
- неудачный опыт лечения реального заболевания (собственный, в семье или у друзей) и связанное с этим недоверие мнению или деятельности врачей. Ошибочными могли быть, в частности, диагноз или оценка степени тяжести выявленных нарушений.

Паника, вызываемая страхом болезни, реже возникает у клиентов, которые не ожидают немедленного катастрофического последствия при переживании «симптома» (то есть «болезнь» имеет долгосрочные последствия), и (как отмечено ранее) если при возбуждении вегетативной нервной системы, опосредованном угрозой, не усиливается интенсивность телесного симптома (когда он существует). При отсутствии перечисленных условий для клиента скорее будут характерны чрезмерная озабоченность и мнительность в отно-

шении к своему здоровью. В поведении такая тревога по поводу здоровья (иногда называемая ипохондрией) может проявляться следующим образом:

- постоянный поиск признаков телесных нарушений, приводящий к неадекватной оценке и неверной идентификации нормальных ощущений;
- избирательное внимание к информации, имеющей отношение к заболеваниям (в журналах, телепрограммах и т. д.);
- навязчивое обследование тела (например, разглядывание в зеркале или ощупывание);
- постоянная потребность в обнадеживании, прежде всего, со стороны медиков, но также и членов семьи. Время от времени клиенту нужно будет убедиться в том, что врач или больница находятся от него не слишком далеко.

Вмешательство при страхе болезни

Клиент может отвергать любое описание его проблемы в немедицинских терминах, и это становится серьезным препятствием для консультирования (см. Главу 9). С такими клиентами можно найти общий язык, ориентируясь на их желание получать постоянную поддержку и информацию о течении своего заболевания. Учитывая различия между рациональными и иррациональными представлениями, важно выработать согласованную оценку реальной возможности развития того заболевания, которого боится клиент. Клиенту может потребоваться помощь в том, чтобы адекватно отнестись к имеющимся симптомам (например, повышенному кровяному давлению). Оценка может формироваться в ходе обсуждения медицинского заключения по поводу заболевания (и причин, по которым клиент ему не доверяет) и выработки альтернативных объяснений «симптомов» клиента. При этом источником надежды для клиента должна быть не личность консультанта, а объективные факты. Если клиент напрямую просит его успокоить, консультант может сказать: «Итак, мы рассмотрели факты, какой вывод вы делаете?» Может возникнуть необходимость обращения к специалистам, которые обследовали клиента, для получения информации о его здоровье из первых рук. Порой, но это случается редко, может понадобиться дополнительное диагностическое обследование.

Специфические «симптомы» (такие, как стресс или учащенное дыхание) могут получить убедительное альтернативное объяснение, особенно когда дневниковые записи показывают, что они проявляются в контексте психологически значимых событий. У одной женщины, например, приступы сильного головокружения возникали при встрече с новой женой ее бывшего мужа.

Формой работы с некоторыми причинами тревоги по поводу здоровья может быть поведенческая проба. К примеру, клиент, который боится спровоцировать сердечный приступ, выполнив упражнение, может убедиться, что

вызываемое физической нагрузкой учащение пульса не имеет никаких опасных последствий. Одну женщину, которая считала, что её паника возникает из-за низкого содержания сахара в крови, попросили систематически через определенные интервалы фиксировать свою тревожность и содержание сахара в крови (аппарат для тестирования был предоставлен её врачом). Полученные результаты убедили её в ошибочности её представлений.

Общая цель работы заключается в том, чтобы клиент прекратил бесконечно проверять здоровье и требовать внушения надежды. Проверки можно прекращать постепенно, если клиент не может остановиться сразу, например, ограничивая частоту «текущих» визитов к терапевту до одного раза в месяц. При этом допускается встреча с такими ситуациями, которые вызывают умеренно выраженную реакцию бегства. Одному клиенту, который не мог есть в закусочных (опасаясь того, что при приготовлении пищи в нее может попасть кровь носителя ВИЧ-инфекции), сначала предоставили обнадеживающую информацию по поводу условий распространения вируса, а затем посоветовали возобновить свои подобных заведений. Прекращая проверки и избегания, клиент становится способным ко встрече с источником тревожности, связанной со здоровьем. Такой поворот событий может оказаться обескураживающим для человека, который обеспечивает поддержку клиента. В этом случае можно в устной или письменной форме заключить договор о порядке предоставления поддержки. Консультант может действовать как посредник и объяснять основные моменты сопровождающим клиента людям.

Из обсуждавшихся ранее положений вытекает, что для достижения прочного успеха непродолжительной конфронтации с избегаемой ситуацией может оказаться недостаточно. Конфронтацию нужно будет повторять и разворачивать во времени (например, постоянное чтение любых журналов вне зависимости от того, имеются ли в них статьи по поводу вызывающей страх болезни).

В возникновение страха болезни могли внести свой вклад специфические травмирующие события, и значение этих событий всегда должно приниматься во внимание: например, обвинение себя или других в смерти любимого человека, раздражение по отношению к определённым больницам или врачам, тревога об опасно больном близком человеке. Иногда тревога о здоровье связана с иррациональными представлениями, приемы реструктурирования которых описаны выше; например:

Мне *необходимо* знать точно, почему у меня такой симптом;

По отношению к моим симптомам *необходимы* действия врачей.

В некоторых случаях представления о здоровье следует считать скорее дисфункциональными установками:

Я *обязан* оставаться полностью здоровым всю жизнь.

Несправедливо, что я должен испытывать неприятные ощущения.

Критика подобных установок проводится с применением методов, описываемых в следующей главе.

Рекомендуемая литература

Приступы паники являются сейчас предметом особого интереса, поэтому публикуется масса книг и статей, посвященных как теории, так и практике (например, Baker, 1989; Barlow and Cerny, 1988; Clark, 1986; Clark and Beck, 1988; McNally, 1990; Rachman and Maser, 1988; Walker et al., 1991). Роли гипервентиляции особенно много внимания уделяют Ley (1985) и Clark and Salkovskis (1992). Влияние пространственных и двигательных стимулов рассматривалось Jacob et al. (1989). О страхах болезни читайте у Warwick and Salkovskis (1990). Полезные советы по саморегуляции при конфронтации с тревожащими ситуациями даёт Neuman (1985). Основным источником по вопросам когнитивной терапии тревожности является работа Beck et al. (1985). Blackburn and Davidson (1990) также дают полезные практические рекомендации.

Написано множество книг, посвященных по состоянию паники или агорафобии, терапии паники, но не так много из них можно рекомендовать. Среди них - известные работы Weekes (1972, 1977 и др.), а также Neuman (1985), Marks (1980) и Goldstein (1988).

Обеспокоенность, социальная тревожность и другие виды распространения проблемы тревожности

В данном случае речь идет о проблемах, при описании которых клиент говорит о постоянном напряжении, тревоге или беспокойстве. Здесь ситуативные причины возникновения тревожности менее очевидны, а приступы паники не являются основным проявлением. Избегание выражено не так сильно и обуславливается оно причинами более сложного характера.

Не все клиенты, чья тревожность проявляется в описанном генерализованном виде, имеют именно тот тип проблем, который рассматривается в данной главе. В частности, проблема тревожности может распространяться вследствие генерализации очага угрозы. Человек, боящийся собак, вне дома может ожидать встречи с одной из них в любое время, следовательно, будет почти все время ощущать тревожность. Или клиент может с тревогой ожидать приступа паники практически в любой ситуации. В таких случаях следует работать с той специфической угрозой или проблемой паники, из которой всё это проистекает.

Распространение проблем тревожности ещё не до конца изучено. Я предлагаю поочередно рассмотреть несколько различных аспектов и хочу сразу предупредить, что консультант, скорее всего, столкнётся со всеми этими особенностями в разных комбинациях.

Обеспокоенность потенциальными опасностями в будущем

Проблема состоит в устойчивом и общем беспокойстве, вызываемом потенциально опасными или неприятными событиями, которые могут произойти с любым человеком, но клиент считает, что они произойдут именно с ним и будут иметь невообразимо тяжелые последствия. Такое волнение воспринимается клиентом как навязчивое и насильственное состояние. Степень реалистичности испытываемой обеспокоенности значительно различается у разных клиентов. Озабоченность возможными негативными последствиями событий часто влияет на процесс принятия решений, приводя к сомнениям и неуверенности.

Клиент может говорить, что всегда был «беспокойным» или «нервным» человеком и на самом деле не ожидать в этом отношении никаких изменений. Такие клиенты начинают искать помощь, когда жизнь становится слишком стрессовой, а их привычка волноваться выходит из-под контроля. Почти все стороны жизни становятся средоточием беспокойства (например, семья, деньги, работа, здоровье), а одна из них выходит на первый план вследствие наличия специфического стрессора, примером чего может быть переезд. Клиенты, для которых характерно подавленное настроение, также склонны выражать обеспокоенность по поводу одной или нескольких сфер жизни. Массовые исследования показали, что постоянная обеспокоенность является наиболее распространённой формой проблем тревожности, но создаётся впе-

чатление, что люди с таким отношением к жизни менее склонны искать консультативной помощи, чем те, которые испытывают приступы паники или специфические страхи. Последние более очевидным образом ограничивают жизнь человека.

Вмешательство: контроль стимулов

Цель - минимизировать вероятность возникновения обеспокоенности и максимально увеличить длительность свободных от тревоги периодов спокойствия и благополучия. Техника основана на представлении о том, что определённые средовые условия могут провоцировать беспокойные или, напротив, приятные мысли. Дневниковые записи позволяют выявлять такие связи. Клиенту можно задать вопрос: «Какие виды деятельности помогают вам забыть о беспокойстве?» или «В каких ситуациях вы беспокоитесь меньше?»

Один клиент, бухгалтер, работал на дому, и вид бумаг провоцировал у него беспокойные мысли. Ему посоветовали разделить работу и досуг во времени и в пространстве: ограничить место работы только офисным помещением, завести отдельный рабочий телефон, включать автоответчик, когда он не на работе, и принимать клиентов только в назначенные часы. Клиенту посоветовали так организовать свой отдых, чтобы было удобно чем-нибудь заниматься (чтением, слушанием музыки и т.д.).

Лучше всего способствуют достижению *нетревожного* состояния такие виды деятельности, которые сильно нагружают зрение и требуют значительной моторной координации, например, рукоделие, техническое творчество, занятия спортом и рисование. Эти виды деятельности полностью поглощают внимание клиента и, тем самым, отвлекают от беспокойных мыслей. Иногда от беспокойства лучше помогает прогулка в приятном месте, чем участие в релаксационном тренинге. Клиентов следует побуждать к некоторой систематизации своей деятельности и дневниковых записей, чтобы консультант мог быть в курсе событий.

Другая стратегия, которая может помочь, заключается в том, что клиент получает инструкцию позволять себе беспокойство только в определённое время дня (например, получасовой период вечером). Такая инструкция может звучать следующим образом:

- Научитесь распознавать свою обеспокоенность, а затем определять ее наличие как можно раньше.
- Как только вы обнаруживаете, что начали беспокоиться, отложите свою тревогу до вашего «периода беспокойства».
- Вместо того, чтобы беспокоиться, сосредоточьте все свое внимание на том, чем в данный момент вы занимаетесь или что вас окружает.
- Организуйте ситуацию так, чтобы каждый день в одно и то же время и в одном и том же месте проводить свой тридцатиминутный период беспо-

койства.

- В течение периода беспокойства все отведенные 30 минут интенсивно волнуйтесь обо всём, что вас заботит.

Нерешительность, непостоянство и неэффективное решение проблем

Связь между беспокойством и нерешительностью была отмечена ранее. Во многих случаях беспокойство вызывают маловероятные события в будущем, на которые человек не может напрямую влиять: например, клиент может беспокоиться, когда кто-то из близких летит на самолёте. Однако, клиенты также беспокоятся о ежедневных решениях и реальных затруднениях, но предпринимаемые ими действия (если таковые имеются) часто неэффективны. Причину беспокойства можно представить клиенту как проблему, имеющую рациональное решение. Обычно такой подход вполне понятен, потому что редко бывает, что клиенты не способны эффективно решать проблемы ни в какой из сфер жизни. Решение проблем включает следующие этапы:

- Необходимо определить основные параметры проблемы, чтобы клиент смог установить, что является желательным результатом, какой исход нельзя допустить любой ценой, каковы его запасные позиции («последняя линия обороны») и какие ограничения имеются у избранного клиентом образа действий.
- Составляется список возможных действий и их последствий, учитывая выигрыши и потери, которые несет каждое из них.
- Используется прием взвешивания выигрышей и потерь и принимается решение.
- Клиент дает отчет о последствиях реализации принятого решения и возвращается к первоначальной формулировке проблемы в свете полученного результата.

Стрессогенные события, о которых беспокоится клиент, выявляются по дневниковым записям. Если стресс кратковременен, то после получения отчета о нем консультант предлагает клиенту обсудить относительные достоинства принятого решения и других вариантов и подумать, чему научил полученный результат.

В процессе формулирования проблемы могут обнаруживаться иррациональные представления, которые подвергаются критическому анализу, как описано в Главе 7. Иногда неспособность к эффективному решению проблемы определяется отсутствием навыков или знаний, например, навыка уверенного ответа, и тогда предпочтительной формой вмешательства является тренинг развития навыков.

Следующий случай показывает, как обсуждение с клиенткой решения проблемы, вызывающего у нее тревогу, привело к выявлению иррациональных представлений. Они препятствовали адекватному отношению к тем фак-

там, на основе которых она пыталась выработать решение, а также усугубляли испытываемое ею эмоциональное напряжение.

Клиентка была сильно обеспокоена необходимостью сделать выбор между тем, чтобы уехать на свадьбу друга или остаться дома и провести время с мужчиной, которому она очень нравилась, хотя они были мало знакомы. Ей было очень приятно получить приглашение на свадьбу, но она вряд ли могла позволить себе такую дальнюю поездку. Были перечислены преимущества и недостатки присутствия и отсутствия на свадьбе. Не поехать значило потерять не только возможность получить удовольствие, но и подтвердить свою значимость для друга. Она чувствовала, что отказ от поездки также станет для её приятеля сигналом, говорящим о том, что она зависима и, на самом деле, остаётся дома ради него; тогда она будет о себе худшего мнения из-за этой зависимости.

Решение, имеющее очевидные преимущества и устраняющее выбор между положительными альтернативами, представлялось очевидным, однако необъяснимо вызывало мучительное беспокойство и озабоченность по поводу своей правильности. В действительности, бесконечное обдумывание вариантов означало, что в конечном итоге речь шла о ее самооценке. Не веря в то, что окружающие ценят ее благодаря её реальным качествам, она пыталась заручиться их одобрением, делая то, что, как ей казалось, больше всего им понравится. Однако, признавая за собой эту склонность, одновременно она хотела производить впечатление человека, не зависящего от чужого одобрения.

При формулировке альтернатив она поняла, что:

- ни принятие приглашения, ни отказ от возможности укрепить свои отношения дома не повлияли бы существенно на то, как к ней относятся значимые другие;
- если бы она захотела почувствовать, что ее ценят, она могла бы добиться этого другими путями, например, в случае отказа от поездки на свадьбу договорившись о возможности другой встречи в обозримом будущем;
- она могла бы повысить самооценку, возвратив взятые займы деньги, а не потратив эти деньги на поездку.

Признавая зависимость от того, как её оценивают окружающие, она тревожилась о том, чтобы не стать «прилипалой». Однако она неявно представляла себе, что будет расцениваться как «прилипание», а что - совершенно обычным выражением её потребностей. После того, как ей была оказана помощь в формулировке критерия, она увидела, что:

- то, что она не примет приглашение, не будет означать, что она цепляется за своего нового знакомого;
- она сумеет повести себя так, чтобы создать нужное ей впечатление о причинах остаться дома.

Важным элементом проблеморазрешающего подхода является побуждение клиентов к контролю над событиями и отказу от отношения к себе как к жертве обстоятельств. Эта женщина, рассказывая о последствиях решения

об отказе от поездки, сообщила о том, что в результате ее самооценка не снизилась, а выросла.

Консультирование выявило дисфункциональную установку («Я нуждаюсь в том, чтобы каждый оценивал меня, и я не должна отказываться от возможности получить одобрение других»). Имея такую установку, она многие ситуации воспринимала как влияющие на ее самоуважение. В случаях, подобных этому, эпизоды беспокойства, зафиксированные в дневнике, могут постоянно затрагивать одну и ту же тему. *Профилактическая работа с дисфункциональными установками может проводиться с помощью описанных ниже техник.*

Дисфункциональные установки

В данном разделе мы дополним описание тех принципов и техник, которые были упомянуты в предыдущих главах. На первоначальной стадии консультирования часто проводится работа по наиболее безотлагательным жалобам клиента, что не оставляет возможности для выявления и опровержения дисфункциональных установок. Рекомендации по решению данных задач приведены ниже.

Описанный выше случай с женщиной, которая была убеждена в необходимости всегда искать одобрения других, иллюстрирует основные черты дисфункциональных установок. Её пример, кроме прочего, показывает также, что осознание клиентом своей озабоченности и специфической чувствительности может вызвать реакцию сверх-компенсации. Например, эта женщина намеревалась создать образ независимости, чтобы произвести хорошее впечатление на мужчину, которому она нравилась. Эти попытки компенсации могут привести к обратному результату и закрепить неадекватные установки. Так, если другой верно считывает их на интуитивном уровне, то его поведение по отношению к клиенту будет таким, как если бы клиент действительно *был* зависимым, и поэтому подтверждать имеющееся у него представление о себе.

Дисфункциональная установка имеет следующие характеристики:

- Это *общая* установка, влияющая на восприятие самого себя и окружающих во многих ситуациях.
- Она действует автоматически, как привычка, и поэтому ее обнаружение и модификация требуют усилий.
- Она составляет предмет глубокой убежденности.
- Ее можно концептуализировать в форме некоего абстрактного правила.

С рациональной точки зрения признаком, делающим установку дисфункциональной, является ее ригидная и абсолютная форма. Реакции человека на определённые типы ситуаций лишены гибкости. Поэтому существенно важно, чтобы консультант умел осторожно помогать клиенту в осознании имеющихся установок. Более того, весьма вероятно, что дисфункциональная установка воз-

никла в таком контексте опыта ранних семейных отношений или травм, для которого она являлась компонентом адаптивной реакции на сложную ситуацию. Клиент может не желать обсуждать такого рода воспоминания. В таком случае клиенту помогают раскрыться или, по крайней мере, установить смысловые связи между обстоятельствами настоящей и прошлой жизни. Это может дать клиенту возможность увидеть, что установки, бывшие раньше адекватными, теперь такими уже не являются.

Проясняя представления клиента, консультанту следует следить за тем, чтобы не совершать весьма распространенную ошибку, которая заключается в проведении анализа *за* клиента. Самое путанное, но самостоятельное проговаривание собственных мыслей принесет клиентам больше пользы, чем выслушивание мудрых умозаключений консультанта. Научиться такой сдержанности - сложная задача, и существует опасность впасть в чтение лекций, проповедь или даже забрасывание клиента контраргументами. Такой прессинг с целью убеждения очевидно не имеет смысла.

Следующие рекомендации призваны помочь консультанту в нейтрализации таких тенденций:

- Ознакомьте клиента с основными положениями когнитивной терапии (на примерах из жизни клиента или просто из жизни) о прямой зависимости между интерпретацией ситуации и переживаемой эмоцией. На этой стадии ознакомления могут быть полезны книги, адресованные неискущённому в психологии читателю (см. Приложение А).
- Используйте стиль сократический диалога, позволяя клиенту допытываться до смысла всего сказанного (например, какие предположения были сделаны, как различные утверждения отражают общую тему или противоречие). Некоторые полезные вопросы:
 - «Какое у вас основание для того, чтобы так считать?»
 - «Какими могут быть альтернативные объяснения?»
 - «Как может кто-либо другой (ваши друзья, партнёр, коллеги) относиться к этому?»
 - «Пожалуйста, объясните ваши доводы»
 - «Видите ли вы какое-либо противоречие в том, как вы об этом говорили?»
 - «Как вы думаете, могли ли вы упустить из виду какие-либо противоречащие факты?»
 - «Вы рассуждали об этом, придерживаясь логики противопоставления черного и белого, – как вы думаете, существует ли какой-либо средний вариант?»
 - «Попытайтесь рассказать мне, какая скрытая установка могла сказаться в описанной вами ситуации»
- Не отвечайте на вопрос за клиента. Мягко, но настойчиво побуждайте клиента говорить.
- Задавайте вопросы, имеющие ясную цель (избегайте поспешных вопросов

без чёткого представления о том, что вы выясняете).

- Задавайте конкретные и прямые вопросы.
- Задавайте вопросы вовремя, поскольку это влияет на взаимопонимание, то есть, не возвращайтесь к уже проработанной теме и не прерывайте ход мысли клиента, переходя к новой теме обсуждения. Усвойте общее правило: заниматься теми вопросами, которые наиболее важны для клиента на данной встрече. Спрашивайте клиента о том, что для него наиболее существенно, а не игнорируйте эту информацию.
- Сосредоточьтесь только на одной или двух темах в течение одной встречи вместо того, чтобы перескакивать с одной идеи на другую.
- Оставляйте время (для себя и для клиента) для размышления над значением сказанного. Спросите, например: «Подумайте, что ещё может иметь к этому отношение?»
- Используйте язык клиента там, где это возможно. Например, один клиент был расстроен полученным от начальника противоречивым сообщением, смысл которого он определил для себя в катастрофических терминах. Он почувствовал себя отстраненным от «игры на ровном поле²». Показательно, что он видел это абстрактное «игровое поле» как расположенное на крутом склоне, а не слегка наклонное. Поэтому принцип черно-белого мышления был описан в соответствующей форме, легко доступной для его понимания.

Вмешательство: модификация дисфункциональных установок

Цель – помочь клиентам понять, что используемые ими для оценки ситуаций стандарты выглядят слишком жесткими и чрезмерно обобщенными, если смотреть на них рационально, с учетом реальных фактов. Клиент может считать, что он *должен* или даже *обязан* относиться к вещам определённым образом, потому что иначе (и это обычно не аргументируется клиентом) они станут неконтролируемыми или приведут к катастрофе. Вот некоторые техники выявления дисфункциональных установок:

- прослеживание влияния одной установки на нескольких примерах. Клиента просят рассмотреть ряд утверждений, выражающих его мысли или представления, и найти общую установку, связывающую их. Если клиент не в состоянии сделать этого, консультант предлагает несколько вариантов связи примеров друг с другом, и предлагает клиенту обсудить их относительные преимущества. Если какой-либо вариант принят, клиент должен изложить его своими словами (например: «Как же лучше обозначить связующую идею? Пожалуйста, скажите это своими словами»).
- обнаружение в явной формулировке мнения или оценки скрытого дополнительного смысла. Это можно продемонстрировать, вернувшись к описанному выше случаю с женщиной. В ответ на её фразу «Я ненавижу отка-

² То есть, по общим для всех игроков правилам - Прим. перев.

зываются от приглашений» ее спросили: «Почему вы считаете, что плохо иногда отказываться от приглашений?» Из ответа следовало, что приглашения для нее являются свидетельством ее значимости для других людей и, далее, что отказ будет означать как то, что люди будут меньше ценить её, так и то, что она нуждается (она *должна* иметь) в таком доказательстве своей значимости.

- методика перевода стрелки, в которой каждый ответ клиента сопровождается вопросом «А что это будет означать для вас?» или «Что в этом будет плохого?» (Это описано в Главе 4.)

Цель вмешательства заключается в том, чтобы помочь клиенту выявить установку и снизить жёсткость ее влияния. Стремление к радикальной модификации базовых установок клиента относительно себя и мира - задача насколько невыполнимая, настолько же и нежелательная. Многого можно достичь, применяя мягкое средство Сократовского диалога. Когда клиенты становятся способны ясно излагать смысл своих утверждений, они часто бывают поражены тем, насколько резко или безапелляционно высказывались раньше.

Могут быть полезны следующие дополнительные методики:

- Обсуждение полезности установки, например, подведение клиента к признанию того, что наличие установки представляет значительную угрозу. Как она помогает в удовлетворении других потребностей, имеющих у клиента? Составление списка возможностей и ограничений, связанных с действием установки, помогает клиенту оценить последствия существования жестких абсолютных установок. Упражнения могут помочь клиенту в выработке новой, не столь опасной версии установки.
- Выделение *контекста*, в котором была приобретена установка (например, социальное или культурное окружение или чрезмерные родительские требования). Это помогает клиенту понять, что то, что было *когда-то* полезным, не является таковым в настоящее время. В новом контексте (и при наличии ресурсов, которыми располагает взрослый человек) установка может быть пересмотрена и переоценена.
- Критический анализ оснований установки. Применение данной методики в отношении конкретных представлений было описано выше. Цель критики оснований – убедить, что на самом деле они *не доказывают* истинность дисфункциональной установки. Этого можно достигать с помощью критики логики умозаключения, демонстрации возможности альтернативной интерпретации фактов или указания на непоследовательность клиента в обращении с доказательствами.
- Демонстрация логической дефектности самой установки. Например, клиент может считать: «Если я буду делать всё правильно, я буду вознаграждён». Клиенту предлагают на примерах из его собственной жизни или на историях других людей убедиться в том, что установка не оправдывается.
- Проверка на соответствие реальности. Клиенту предлагают вести себя так, как будто он нарушает собственную установку, для того, чтобы увидеть

последствия. Например, клиента просят отказаться выполнять просьбу друга, чтобы проверить, отвергнут ли его из-за этого. Клиент, который считает, что ни при каких условиях нельзя быть эгоистичным, получает домашнее задание совершить эгоистичный поступок. Обсуждение результатов таких упражнений, скорее всего, должно привести к переформулировке установки в более гибкой форме.

Неспособность расслабиться

Клиент может сообщать о том, что ему трудно достичь состояния психологического или физического расслабления или того и другого вместе. Для чрезмерного психического возбуждения характерно частое возникновение навязчивых мыслей; они могут принимать форму опасений, мысленных проверок или просто заикленности на таких маловажных мыслях, как список покупок. Клиентам, которые отовсюду ждут угрозы, могут мешать телесные или иные сигналы, препятствующие переходу к состоянию рассеянной приятной мечтательности, которое ассоциируется с релаксацией.

При постоянной готовности к угрозе характерно мышечное напряжение, апатия и доминирование деятельности симпатической нервной системы. Дыхание и пульс могут участиться и стать нерегулярными, нарушается процесс пищеварения, выступает холодный пот. Мышечное напряжение может выражаться в головной боли или в какой-либо иной особенности - произвольных движениях, нервном расхаживании, судорогах.

Описанные мною проявления воспринимается многими как «сущность» тревожности, и они выступают за её «преодоление» с помощью применения «навыков преодоления», например, реакции быстрого расслабления. Основной идеей моей книги является представление о том, что для проблемы тревожности путем тщательного анализа должны быть найдены породившие их причины. Если это произошло, то, как правило, для обуздания «тревожности» как таковой применения каких-либо специальных техник не требуется. Однако, некоторым клиентам (и трудно сказать, по какому принципу они отличаются от остальных) обучение релаксации может оказать неоценимую помощь. Действительно, психологический покой, наступающий при глубоком расслаблении, может быть для человека новым и ресурсным состоянием.

Перед тем, как применить какую-либо трениговую технику, стоит проверить, что стиль жизни клиента благоприятствует релаксации:

1. Выясните, пьёт ли клиент чай, кофе или принимает другие стимулирующие/лекарственные препараты и посоветуйте насколько возможно уменьшить их употребление.
2. Определите соотношение между работой и отдыхом, а также особенности сна. Помогите клиенту вспомнить доступные ему виды деятельности, способствующие достижению покоя, и расширить их список. Используйте психологические стратегии для работы с проблемами сна.

3. Контролируйте регулярность использования клиентом техник релаксации.

Вмешательство: релаксация (работа со стилем жизни)

Тема релаксации в значительной мере относится к вопросам стиля жизни и личной философии. Делать что-либо спокойно и принимать неизбежность жизненных трудностей - значит занимать определённую позицию по отношению к миру. Такой взгляд на релаксацию можно противопоставить обучению релаксации как навыку регуляции тревожного возбуждения в специфических ситуациях. Обучение навыкам может представлять ценность для клиентов, у которых способность расслабляться в более широком смысле слова была уже сформирована.

Клиентам, которым вообще трудно «отключиться психологически или физически», может помочь программа тренинга релаксации в качестве полезного компонента более широкой стратегии изменения стиля жизни. Опыт глубокой релаксации в кабинете консультанта может побудить клиента продолжить занятия самостоятельно. Однако, иногда первых заметных результатов тренинга приходится ждать в течение двух или даже трёх месяцев, и клиент должен быть предупреждён об этом.

Тренинг релаксации имеет три основные цели, состоящие в том, чтобы научить клиента:

- отличать состояние возбуждения/напряжения от состояния расслабления;
- обнаруживать ранние признаки возникающего напряжения и изменять поведение до того, как спираль возбуждения/напряжения начинает раскручиваться;
- овладеть техниками, способствующими достижению расслабления и научиться тому, чтобы на повседневные дела затрачивалось меньше усилий без снижения эффективности.

Клиенту логически доказывают, во-первых, что способность к расслаблению развивается благодаря регулярной практике, во-вторых, что эта способность обеспечивает более спокойный стиль осуществления всех видов деятельности. Например, по-разному можно сидеть, стоять, ходить, вести машину, есть. Тренинг включает в себя:

- Обучение клиента глубокой релаксации в кабинете консультанта (обычно требуется 2-5 сеансов).
- Задание клиенту заниматься релаксацией дома один-два раза в неделю в течение 20-30 минут, сначала используя аудиозаписи инструкций, а позже без них. О любых возникающих при этом трудностях сообщать консультанту.
- Задание клиенту наблюдать за собой во время выполнения разных видов деятельности и намеренно расслабляться, если возникает напряжение (например, переменить положение тела, расслабить напряжённые мышцы, сделать выдох или опустить плечи). Можно разработать схему самонаблюдения (например, выделив в качестве контрольных точек событие, ко-

торое происходит с интервалами в течение дня). Систематические дневниковые записи о моментах возникновения напряжения могут дать клиенту информацию, необходимую для распознавания первых его признаков и применения техник расслабления.

В литературе имеются описания многочисленных методов обучения достижения более глубокой релаксации, среди которых трудно выделить лучшие. Я применяю свой набор методов, описание которого дается ниже. (Читатели, которые хотят работать строго в рамках определенного подхода, могут обратиться к списку рекомендуемой литературы.) Для клиентов можно делать записи в течение проводимой в кабинете встречи (или отдельно в более спокойных условиях) а также рекомендовать какие-либо из имеющихся в продаже. Для домашних занятий необходимы условия: важно, чтобы клиент каждый день мог располагать временем, в течение которого его никто не будет прерывать, и находиться при этом в комфортном теплом месте. Клиенту рекомендуется также приготовить для занятий жесткую кровать, толстый ковер или удобный стул с подголовником.

Процедура тренинга релаксации Обстановка в кабинете: она должна быть настолько это возможно спокойна, телефон отключен, яркий свет приглушён, стоит кушетка или удобный стул с подголовником. Инструкция для клиента: сосредоточиться на голосе консультанта и выполнять его рекомендации. Цель – достижение расслабления, нормального состояния, а не впадения клиента в гипноз. Клиента просят сообщать о любых возникающих трудностях. Клиента просят ослабить давление тесной одежды и закрыть глаза.

Команды клиенту даются тихим успокаивающим голосом. Ниже даны рекомендации по содержанию команд и порядку их предъявления.

1. Сосредоточение на текущих телесных ощущениях в каждой части тела, начиная от пальцев ног и до головы; например: «Прочувствуйте ощущения, которые идут от ваших ступней и лодыжек. Если вы чувствуете какое-либо напряжение, сконцентрируйтесь на напряжении, почувствуйте напряжение, и постепенно оно начнёт ослабевать и исчезнет.» (Заметьте, что не во всех техниках в начале рекомендуется напрягать группы мышц. Как показала моя практика, единственное, зачем это стоит делать, - усиление переживаемого ощущения напряженности при дополнительном легком напряжении мышц. Не следует прибегать к данному приему, если у клиента есть проблемы с суставами или мышцами.)
2. Предложение почувствовать тепло, тяжесть, размягчение и расслабление всего тела или отдельных его частях, например: «Ощутите, как тепло и тяжесть распространяются по вашим ступням и лодыжкам»; «Вы можете почувствовать легкое покалывание в ногах, когда они расслабляются все больше и больше.»

3. Характер дыхания: нужно стремиться к диафрагмальному, а не грудному дыханию, оно должно быть естественным, непринуждённым; например: «Теперь осознайте своё дыхание. Просто дышите нормально и спокойно. Чувствуйте, как приподнимается ваш живот на вдохе и опускается на выдохе. При выдохе убедитесь, что выдыхаете весь воздух. Когда вы делаете это, почувствуйте, как расслабляется ваша грудная клетка и опускаются ваши плечи. Когда вы выдыхаете, почувствуйте, как волна расслабления проходит по вашим рукам и вашему телу. Сделайте паузу на секунду после выдоха и насладитесь этим ощущением. Не беспокойтесь о вдохе, он сам о себе позаботится.» (Делайте ударение на нормальном дыхании и его автоматической природе. Я обнаружил, что намеренные попытки манипулирования дыханием, кроме паузы между выдохом и вдохом и побуждения к диафрагмальному дыханию, могут лишь помешать. При этом систематическая дыхательная тренировка будет полезна для клиентов с проблемой гипервентиляции; см. Главу 7).
4. Психологическая релаксация: Клиент вызывает в воображении образ любимого (успокаивающего) места, или консультант предлагает представить некую стандартную обстановку, например, пляж или деревня. Клиента просят сосредоточиться на конкретных деталях сцены (прикосновение, запах, свет, звуки). Клиенту говорят, что, если на ум приходят не относящиеся к сцене мысли, ему нужно вернуться к сцене и работать с ней. Представление обстановки служит средством погружения в расслабляющее фантазирование и отвлечения внимания от негативных навязчивых мыслей. Команды по углублению расслабления могут включаться в сцену: «Представьте себе ступени, спускающиеся к пляжу. Вы на верхней ступеньке. С каждым шагом позволяйте себе всё больше и больше расслабляться, всё больше и больше чувствовать умиротворение и т. п.»

Порядок комбинирования элементов Он является свободным, но я считаю эффективной такую последовательность:

1. Фокус на всём теле («Почувствуйте, что ваше тело опадает, прочувствуйте, как стул поддерживает его» и т. д.);
2. Фокус на частях тела; сначала ступни, пальцы ног, лодыжки, затем нижняя часть ног, верхняя часть ног, ягодицы;
3. Дыхание в соответствии с приведенными рекомендациями, фокус на груди, плечах, затем руках и пальцах рук;
4. Фокус на голове и шее (лоб, щёки, нижняя челюсть, язык и глазные мышцы);
5. Работа с мысленным образом (10-15 минут);
6. Повторение этапов 1-4;
7. Слова: «Через несколько минут я сосчитаю от пяти до одного. Когда я скажу «один», откройте глаза и постепенно возвращайтесь».

8. Получение от клиента обратной связи по поводу оставшегося напряжения, способности осуществлять диафрагмальное дыхание, яркости образа и других вопросов.

Клиент может почувствовать смущение во время первых одного или двух сеансов, и если это происходит, следует понять причины. Беспокойство может быть вызвано страхом потери контроля. В некоторых случаях клиентов расстраивают мысли, которые всплывают на поверхность в состоянии расслабления. При должном руководстве такие помехи редко сохраняются долгое время. В случае необходимости форму проведения упражнения можно изменять (например, проводить занятия с открытыми глазами).

Прикладная релаксация

Цель тренинга прикладной релаксации – научить клиента задействовать реакцию быстрого расслабления (РБР) для минимизации реакций страха, вызываемого специфическими ситуациями. Процедура напоминает процедуру выработки новой совладающей реакции. Такое применение релаксации, разумеется, не является единственно возможным. Виды вмешательства, задействующие воображение и внутреннюю отработку действий (или «практику в уме»), обычно дают больший эффект, если клиент приступает к работе в состоянии покоя. Ниже приведено краткое описание этапов применения техники прикладной релаксации (для уточнения используйте источники из «Рекомендуемой литературы»).

Сделайте следующее вступление: «Релаксация – это навык, которому можно научиться, если практиковаться, и который вы можете использовать для уменьшения своих тревожных реакций на события, происходящие в повседневной жизни. Кроме того, что вы будете овладевать РБР, я попрошу вас делать каждый день записи в дневник о тех случаях, когда возникало напряжение или тревога. Это поможет вам научиться понимать, какие ситуации вызывают у вас данные реакции. Еще вы узнаете, какие телесные ощущения предупреждают о возникающем напряжении. Когда вы научитесь определять их, вы сможете пользоваться РБР для того, чтобы брать напряжённость под контроль, не дожидаясь, пока она станет сильной. Но сначала я обучу вас РБР и покажу вам, как вы можете связывать ее с определенным словом, например, «расслабление» или «спокойствие». Произнесение про себя такого слова поможет вам расслабиться быстрее».

Клиент осваивает глубокую релаксацию при постепенном уменьшении количества словесных подсказок консультанта или аудиозаписей инструкций. Клиент обучается методу быстрого фокусирования на теле (например, с пальцев ног до головы), чтобы сократить количество времени на расслабление до нескольких минут.

Консультант учит клиента при каждом выдохе связывать произносимое в уме слово (на усмотрение клиента, «расслабление» или «спокойствие») с

командами на достижение глубокой релаксации. Время, отведённое на релаксацию, сокращается на этом этапе до 20-30 секунд.

Клиент практикуется в РБР, чтобы свести свою реакцию до быстрого (10-15 секунд) представления вызывающих тревожность образов, которые называются консультантом. Клиент может обнаружить, что ему помогает глубокий вдох перед выдохом и произнесением ключевого слова. Проводится наблюдение за телом, чтобы выявить зоны напряжения. Данный навык усиленно отрабатывается, пока не становится эффективным средством быстрого снижения тревоги или напряженности в обстановке занятий в кабинете консультанта. Кроме воображаемых сцен, релаксацию можно практиковать при выполнении упражнений по моделированию преодоления реальных стрессогенных ситуаций, например, разыгрывании консультантом и клиентом поддразнивания.

Клиент учится применять РБР дома и в повседневной обстановке в случаях, когда с помощью самонаблюдения обнаруживает, что определенная ситуация запускает механизм неадаптивной реакции. Целью является выработка умения задействовать технику РБР на возможно более ранней стадии, пока еще не возникло напряжение/тревожность. Применение техники и его результаты фиксируются в дневнике и, таким образом, становятся известными консультанту.

Случай из практики: мужчина, который испытывает чрезмерное беспокойство и перевозбуждение

Мистер Р. – 57-летний преподаватель, который в настоящее время находится в отпуске по болезни. Он хронически болен, его заболевание не мешает работать, но усугубляет стресс, который он испытывает на работе. Он говорит о том, что чувствует тревожность и раздражительность во многих ситуациях, и что склонен выходить из себя, когда его раздражают «неуважительные, даже наглые» студенты. Он чувствует себя «в ловушке», когда едет по дороге с оживлённым движением и ненавидит очереди в магазине. Он «не может расслабиться», ему трудно заснуть. Он мучается из-за головных болей и утомления и говорит, что находится «на грани нервного срыва». Он постоянно беспокоится о рабочих и семейных делах, особенно о безопасности члена семьи, который отправляется в путешествие. По ночам он проверяет, включен ли газ и заперты ли двери. Он боится, что «не выдержит», если так будет продолжаться дальше. Во время первого интервью он беспокоен, возбуждён и говорит без остановки.

Предварительное описание проблемы. Внешние факторы: Он всегда любил свою работу, но в течение нескольких последних лет организационные перемены и возросшая ответственность возложили на него дополнительные требования. Он считал необходимым работать сверхурочно, в том числе по выходным, и не догуливал полностью свой отпуск. Он решил раньше срока

уйти на пенсию и в настоящий момент не знает, разрешат ли ему это, и как он будет себя вести, если ему откажут. К своему физическому состоянию он относится как к фактору внешнему и имеющему неожиданные проявления. Никаких других стрессоров он не обнаруживает, проживая в хорошем доме в окружении любящей и заботливой семьи.

Внутренние факторы: Он считает, что в основном его трудности возникают из-за таких качеств, как «перфекционизм» и «склонность к беспокойству». В последнее время «делать все в соответствии с моими собственными высокими стандартами» становится все тяжелее. Работа стала источником стресса, а понизить требования, предъявляемые им к самому себе, он не может. Это происходит не из-за неумения решать проблемы. Он составляет список текущих задач и безо всяких подсказок определяет преимущества и недостатки четырех различных вариантов решения проблемы стресса на работе. Он смог выбрать один из них (преждевременный уход на пенсию) и действует в соответствующем направлении. При этом он придерживается следующего метода решения проблем. Списки тщательно заносятся в компьютер. Он постоянно пополняет базу данных своей корреспонденции, счетов и некоторых других менее значимых документов. Часть вечера он посвящает обновлению данной информации.

Цели мистера Р.: он имеет ясное представление о причинах своих трудностей. Его главная цель – «бросить работу и вести здоровый образ жизни». Он хочет «замедлиться и отключиться». Он считает, что его высокие стандарты, в общем, скорее приносили пользу, чем препятствовали его карьере, и предпочитает скорее сократить свои обязательства, чем поступиться своими стандартами.

Формулировка: мистер Р. уже выбрал свой способ избавиться от стресса на работе, но, до тех пор, пока он не знает, будет ли принято его заявление о выходе на досрочную пенсию, данная ситуация будет его тревожить. Это ограничивает потенциальный эффект применения методов, направленных на прямую помощь в «замедлении и расслаблении». Он уже он готов поменять свой образ жизни, но еще не свои стандарты. Можно предположить существование ригидной установки, типа «Я *обязан* делать всё хорошо». Однако, кажется, что он готов к тому, чтобы стать более гибким в этом вопросе. Например, часть навязанной самому себе нагрузки на работе возникла из стремления подходить слишком основательно даже к сравнительно незначительным вопросам. Учитывая его желание избегать неприятных последствий от выполнения чего-либо по заниженным стандартам, важно выяснить, каковы эти последствия, насколько серьёзными они могут быть для него, и насколько они соответствуют действительным последствиям снижения стандартов.

Первоначальные цели и стратегия вмешательства:

1. Оказывать поддержку мистеру Р. и давать советы, если потребуется, до тех пор, пока не утвердят его заявление о выходе на пенсию;

2. Побуждать мистера Р. сокращать действия, побуждаемые стремлением к совершенству, и осторожно обсуждать установку, формулируемую как «Я *обязан* делать все хорошо»;
3. Проводить когнитивное реструктурирование ситуаций, вызывающих у мистера Р. постоянное беспокойство (семейные обязанности, здоровье и безопасность);
4. Побуждать к успокаивающей и доставляющей удовольствие деятельности.

Мистер Р. наблюдался с интервалом 2-4 недель в течение девяти месяцев. Результат:

1. Поддержка – заявление мистера Р. было принято через семь месяцев, на протяжении которых он эффективно использовал предоставляемую поддержку и советы. По получении ответа он испытал предсказуемое облегчение.
2. Перфекционизм – обсуждались причины перфекционизма и придаваемой ему клиентом важности. Он пришёл к выводу, что профессия и домашние дела не приносили бы ему удовлетворения, если бы не выполнялись в соответствии с его высокими стандартами. Тем не менее, он согласился, что ему стоит ограничить число принимаемых на себя дел, и пересмотреть стандарты для менее значимых из них. Мистер Р. смог отказать в просьбах из своего колледжа «прийти помочь». Он выделил среди своих списков дел на каждый день планы высокой, средней и низкой значимости и стал способен в большинстве случаев игнорировать последние.
3. Ежедневное беспокойство – он смог по-новому отнестись к чрезмерно завышаемой ранее вероятности неприятных событий, поджидающих его или его семью. (Беседа выявила историю травматического события, которое настраивало его на возможность возникновения несчастных случаев с кем-либо из его семьи.)
4. Релаксация – мистер Р. был сильно возбуждён как психически, так и физически. Просто посидеть со мной в течение часа без хождения из угла в угол или пережевывания своих опасений само по себе было достижением. Расслабляющие упражнения выполнялись с частичным успехом в кабинете, но заниматься релаксацией дома он не мог. Большие результаты были достигнуты посредством рекомендаций работать медленнее, не ставить себе точных крайних сроков, и приучить себя регулярно ходить туда, где ему интересно находиться. Он получил также совет ходить медленнее, меньше напрягаться при ходьбе и специально наблюдать окружающее. Выполняя эти рекомендации, мистер Р. обрёл со временем способность «расслабляться и забываться».

Диффузная социальная тревожность

«Социальная тревожность» - это термин без определенного содержания, применяемый при описании различных проблем, начиная от чувства дискомфорта, испытываемого в совершенно конкретных ситуациях (например, произнесение речи) вплоть до беспокойства, вызываемого практически любой

формой социального взаимодействия. При работе с направленной социальной тревожностью используются описанные в предыдущих главах техники. Проблемы диффузной тревожности сложнее, и в данном разделе я предлагаю некоторые средства концептуализации, помогающие при их оценке. Разделяемый мною подход подразумевает, что воздействие на клиента оказывается в основном посредством домашних заданий и обсуждения реальных событий его жизни. По сравнению с другими проблемами тревожности, диффузная социальная тревожность более замысловато вплетается в обстоятельства жизни клиента, вместе с которыми может быть предметом только постепенного воздействия. К примеру, образование компании друзей, построение новых близких отношений, смена работы занимают месяцы и года, а не недели. Критические «тревожащие события» происходят редко, поэтому сроки консультирования могут быть увеличены, чтобы дать клиенту время для апробации и закрепления новых представлений и способов поведения.

Консультирование уже само по себе является социальным взаимодействием, и клиент может бояться выставлять напоказ то, что считает своей «неправильностью», и сопротивляться процессу консультирования. Поэтому важно предварительно сформировать надежную основу для доверительных отношений. Содержание взаимодействия между клиентом и консультантом во время встречи может иногда использоваться в качестве предмета обсуждения и когнитивного реструктурирования. Я считаю, что это не должно быть основной целью взаимодействия во время консультирования; метод, которого я придерживаюсь, подразумевает воздействие на социальные отношения в собственном окружении клиента.

Составляя представление о проблеме, необходимо серьёзно отнестись к вероятности того, что проблемы клиента представляют собой логическое следствие действия внешних обстоятельств, даже если клиент может быть склонен к их патологизации или самообвинению. Например, высоко тревожный гомосексуалист чувствовал, что на работе ему приходится притворяться и смеяться над шутками про гомосексуалистов. Хотя на своей нынешней работе он не мог рассчитывать на одобрение своей сексуальной ориентации со стороны коллег, он пришел к убеждению, что ему будет намного менее тревожно в обстановке отсутствия интереса к чьей бы то ни было сексуальной ориентации. В результате, он запланировал значительные перемены в стиле жизни и работы. Другая клиентка – 40-летняя одинокая женщина, большинство друзей которой имели свои семьи. Она избегала многих социальных ситуаций и, в особенности, многолюдных вечеринок. В ходе прояснения своих целей она поняла, что даже приглашения на такие мероприятия ей неприятны, и что она переросла большинство старых друзей. Изменение образа жизни, заключавшееся в том, что она стала более инициативна и самостоятельна в социальных отношениях, принесло ей большее социальное удовлетворение и меньшую тревожность.

Концептуальная модель социальной тревожности

У многих клиентов избегание социальных ситуаций не имеет тотального характера, так как это обошлось бы им слишком дорого; они предпочитают поддерживать профессиональные и личные связи, пока это возможно. Тем не менее, такие более тонкие формы избегания, как минимальное участие и «пустые глаза», - явления обычные. Многие клиенты, чтобы помочь себе пройти испытание социальными контактами, принимают алкоголь, который некоторым помогает даже получить от отношений удовольствие. Очевидно и то, что многие социально тревожные люди постоянно решают проблемы, связанные с социальным взаимодействием, но это не снижает чувство тревожности. Это требует объяснения, так как раньше я указывал на особую важность для процесса консультирования приема конфронтации с вызывающей тревожность ситуацией. Предлагаются следующие гипотезы (они не являются взаимоисключающими) объясняющие отсутствие спонтанного снижения беспокойства. Основной аргумент заключается в утверждении чрезвычайной сложности социального взаимодействия, и невозможности спонтанного снижения беспокойства до тех пор, пока человек не научится учитывать эту сложность и не захочет изменить стандарты, которыми он руководствуется для оценки собственного поведения и поведения других людей.

Отсутствие социальных умений. Человек, который не приобрёл навыки, необходимые для адекватной ориентации в социальных ситуациях или для достижения в отношениях взаимности, вряд ли будет социально успешен. Если к тому же он осознаёт отсутствие навыков и понимает, что не нравится окружающим, возникают жалобы на тревожность. Страх критики или отвержения затрудняет применение тех навыков, которыми клиент в принципе хорошо владеет. Проблемы тревожности, которые возникают из-за отсутствия навыков, можно преодолевать с помощью выработки уверенности и других социальных умений в ролевых играх или реальных жизненных ситуациях. Рекомендации по тренингу социальных навыков выходят за тематические рамки данного пособия, но их легко можно найти во множестве замечательных книг, к которым может обратиться заинтересованный читатель (см. список рекомендованной литературы).

Препятствия для социального поведения. Наличие высокой степени телесного возбуждения и опасений по поводу своего социального поведения с высокой вероятности будет затруднять нормальный ход социального взаимодействия. Поэтому человек, который знает, что за ним наблюдают, или замечает, что его сердце колотится, а сам он краснеет или дрожит, сосредотачивает внимание на своих мыслях и ощущениях, а не на социальном контакте как таковом. Человек отвлекается и не может с должной полнотой воспринимать соответствующие социальные сигналы; в результате сигналы становятся бесполезными. В сложных случаях человек чувствует, что его голова «пустеет». Это, в свою очередь, может привести к негативной реакции со стороны дру-

гого человека. Однако, как правило, клиент переоценивает степень, до которой его поведение не соответствует (как он себе воображает) ожиданиям окружающих.

Человек особенно склонен к сосредоточению внимания на себе самом, когда признаки телесного возбуждения становятся видимыми (например, дрожь, покраснение, подёргивание). Эти реакции беспокоят клиента, даже если другой человек их едва замечает, а если и замечает, то никак не комментирует. Именно тогда, когда человек испытывает наименьшую степень уверенности или находится под чьим-либо пристальным взглядом, сосредоточенность на себе самом наносит наибольший вред поведению.

Неверное установление причинно-следственных связей. Обнаружено, что социально тревожные люди склонны винить за неуспешные социальные контакты только себя, в то время как не менее оправданным является альтернативное объяснение неуспеха. Наоборот, если всё идёт хорошо, они отказываются признать свой вклад, предпочитая приписывать успех удаче или особому стечению обстоятельств. Эти устойчивые установки означают, что такие люди не могут адекватно воспринимать обратную связь, и приводят в соответствие с реальностью своё социальное поведение слишком медленно. Возможно, что такой способ устанавливать причинно-следственные связи определяется представлением человека о необходимости быть хорошим для других, которым больше понравится, если он возьмёт на себя вину за неудачу. Развитая самокритика является также стратегией, позволяющей избегать повторения одних и тех же промахов. Однако стратегия *не-признания* своей успешности ведет к тому, что окружающие не будут ждать от человека чего-либо подобного в будущем.

Деадаптивные представления. Принципы рациональности не так легко применяется в отношении социального мира, как в отношении восприятия физических угроз. Даже если мы не можем назвать представления человека как собственно иррациональные, они могут быть настолько ни на чьи больше не похожими, что их носитель стабильно понимает социальные ситуации не общепринятым образом и вызывает поэтому негативное отношение окружающих. В этом смысле его представления дезадаптивны, и клиент может продемонстрировать поспешную готовность признать, что дело обстоит именно так. Иногда социальная тревожность является одним из последствий наличия дезадаптивных и ригидных представлений, среди которых встречаются следующие:

- Клиент слишком высоко или слишком низко оценивает свои способности или свойства.
- Клиент считает, что при любых обстоятельствах он должен твердо придерживаться имеющихся у него стандартов оценки своего поведения.
- Клиент ошибочно полагает, что окружающие судят и оценивают его таким же образом.

Например, люди, ожидающие критики со стороны окружающих (потому, что они не соответствуют собственным стандартам или тем, которые, по их мнению, определяют отношение к ним других), склонны считать, что любая неоднозначная или просто нейтральная социальная обратная связь наносит урон их поведению и в целом самоотношению. Молчание другого человека интерпретируется как «игнорирование» или «пренебрежение», хотя на самом деле такое прочтение не соответствует истинному отношению партнера по общению. Если клиент ожидает, что его будут игнорировать, то само это ожидание становится самореализующимся. Таким образом, такие невербальные сигналы, как отведение глаз от собеседника, выражающие неоднозначное отношение человека к взаимодействию, кем-то могут быть восприняты как сигнал об отсутствии желания поддерживать данный социальный контакт.

Хронически низкая самооценка. Социальная тревожность может быть связана с представлением человека о себе как о никчёмном и незначительном, как в рассмотренном в данной главе случае дисфункциональной установки. Такое самоотношение часто порождается полученным в прошлом разрушительным, оскорбительным или травматическим опытом. В таком случае может быть необходимым помочь клиенту осознать сформировавшуюся в то время установку, восстановить в памяти и реструктурировать воспоминания о травматических взаимоотношениях. Однако данная тема не рассматривается в нашем пособии.

Вмешательство при диффузной социальной тревожности

Саморегуляция в ситуациях конфронтации и отработка навыков, основанные на работе с дневниковыми записями. Основная цель конфронтации с провоцирующими тревожность ситуациями очень редко может быть достигнута при работе с фантазийным материалом. Очевидным преимуществом группового консультирования является возможность создания в группе модели социума, и популярность курсов тренинга уверенного поведения показывает, что стандартные упражнения могут быть полезны. В этом разделе я ограничусь описанием индивидуального подхода, особенностью которого является фокусировка на повседневной деятельности клиента. Он направлен на не прямое воздействие, осуществляемое посредством системы домашних заданий. Дневниковые записи о происшествиях становятся предметом ретроспективного анализа; проводится заблаговременная подготовка к ожидаемым событиям. Благодаря этому обсуждаемые при данном подходе темы заведомо значимы и существенны для клиента, и их разрешение будет иметь для него немедленные последствия. Итак, клиент и консультант работают следующим образом:

1. Клиент сообщает о текущих событиях, произошедших в сфере социального взаимодействия или при выполнении домашних заданий.

2. Выделяются трудности, и клиенту помогают установить адекватные причинно-следственные связи. Деадаптивные представления выявляются и анализируются.
3. Определяются успешно завершившиеся контакты клиента с тем, чтобы выявить способствовавшие успеху факторы, и чем эти контакты отличаются от указанных в пункте (2).
4. Определяются возможности клиента управлять ситуациями по-разному; повторяют одну и ту же ситуацию, и клиент пытается применить к ним различные варианты решения. Разные возможности могут отрабатываться во внутреннем плане действия или в ролевой игре. Клиент получает советы по поводу ориентации в реальности, достигаемой при получении от окружающих обратной связи, но не на основании произвольных предположений.
5. Клиент сообщает о том, успешно или нет было выполнено задание, и цикл повторяется.

При данном подходе возникает риск упустить из вида детали, имеющие отношение к прошлому (например, развитие проблемы, прошлая травма) или к будущему. На практике эти темы часто всплывают в ходе обсуждения текущих событий, и, в любом случае, им можно посвятить часть встречи или встречу целиком. Вопросы, связанные с ценностями, личной философией и долгосрочными целями непременно будут возникать, какие бы изменения не происходили в социальной жизни клиента. Предпочтительнее обсуждать эти вопросы в контексте выбора конкретных, а не абстрактных альтернатив.

Ещё одной сложностью фокусировки на событиях повседневной жизни является затруднительность в таком режиме строгого упорядочения заданий по возрастанию сложности. Консультант может отговорить клиента от сверхамбициозных попыток делать что-то, что должно привести к огорчению или разочарованию. Наоборот, простые рутинные действия, например, посещение прачечной, можно сделать более сложными, давая клиенту задание попытаться завести там разговор. Один клиент, совершенно одинокий безработный мужчина, предложил задание, которое соответствовало уровню достижимой для него сложности. Хотя несколькими годами ранее ему удалось прекратить злоупотребление спиртным, он начал посещать встречи Анонимных Алкоголиков, встретил там симпатизирующих ему людей и стал с ними дружить. Обычно, если в консультировании устанавливается стиль сотрудничества, клиент может сам предлагать способы расширения перечня доступных ему форм обычной социальной активности, как в данном примере.

Исследующая управляемая фантазия и внутренняя отработка. Применение техники управляемой фантазии позволяет осуществлять сбор информации о привычных реакциях клиента. Она также даёт возможность для внутренней отработки альтернативных реакций. Управляемая фантазия в меньшей степени, по сравнению с поведенческой отработкой в ходе ролевой игры, вызывает

ощущение угрозы, ее можно гибко приспособлять под конкретную задачу, и в ней обычно возникают непровольные реакции, которые точно отражают стиль взаимодействия, характерный для клиента.

Пример: Женщина испытывала трудности при вступлении и поддержании интимных отношений с противоположным полом, и для выяснения причин этого была применена техника управляемой фантазии (см. Главу 6). Она мысленно вернулась к тому, что произошло во время недавнего свидания. Выяснилось, что мужчина, с которым она была, вел себя (по её мнению) слишком развязно: он брал её под руку, переходя дорогу, и держал её руку в такси. Обсуждение содержания фантазии позволило нам определить предположения, сделанные ею относительно намерений мужчины, желательную для нее степень интимности, и её страх, что она не сможет контролировать уровень проявления интимности. В фантазию были внесены изменения, связанные с включением немного более интимных ухаживаний, и она рассказала о своих непровольных реакциях. Они были сильными и агрессивными, и поэтому было проведено обсуждение, а затем внутренняя отработка различных способов прекращения ухаживаний. Она почувствовала себя достаточно уверенно для того, чтобы перенести их в реальность, и спустя уже неделю рассказала, что в похожей ситуации вела себя не агрессивно, а уверенно. Считая, что контролирует ситуацию, она меньше тревожилась о том, что может произойти на свидании. Кажется, в данном случае удалось предотвратить неоправданное прекращение отношений.

Поведенческая отработка и обмен ролями. Ролевую игру принято использовать в целях отработки социальных взаимодействий, вызывающих сложности, о которых клиент упоминает в своём дневнике. Она также может быть полезной для моделирования ситуаций, которые ожидаются в ближайшем будущем. Тем не менее, не все ситуации можно с лёгкостью разыгрывать, пример тому - описанный выше случай. Некоторые клиенты никак не соглашались на ролевую игру, но этот метод *действительно* имеет такое очевидное преимущество для консультанта, как возможность наблюдать за поведением клиента своими глазами.

Перед тем, как начать поведенческую отработку, клиенту четко объясняют ее цель (оценка, приобретение навыков или то и другое вместе), подчеркивая, что ролевая игра является безопасным и контролируемым способом работы с затруднениями. Обычная процедура заключается в следующем:

1. Клиент описывает социальную ситуацию, которая вызывает у него тревогу или трудности (лучше, если событие происходило недавно).
2. Консультант организует ролевую игру, длящуюся не больше нескольких минут, воспроизводя полученное описание. Клиент не получает никаких инструкций, кроме просьбы как вести себя как обычно.

3. Клиента спрашивают, что он думает о ролевой игре, удалось ли достаточно верно воспроизвести испытываемые им трудности, а также просят оценить адекватность своего поведения и результат.
4. Если клиент не может сразу указать на моменты, которые следует изменить, консультант сам отмечает один или два момента, над которыми надо поработать (объем обратной связи в ролевой игре ограничивается во избежание перегрузки клиента). Те моменты в ролевой игре, с которыми клиент хорошо справился, отмечаются положительным отзывом.
5. Та же самая последовательность осуществляется повторно после обсуждения того, как клиент (или консультант) мог по-другому сыграть свою роль. Консультант может моделировать другое течение событий в игре, предлагая клиенту имитировать либо содержательные, либо невербальные аспекты. Можно также просто дать клиенту совет, как по-другому вести себя, и предложить с учетом этого переиграть сцену.
6. Теперь клиента просят рассказать о том, получены ли новые впечатления, изменился ли результат и удовлетворяют ли улучшения, достигнутые благодаря новому способу поведения в ситуации. Важно сделать так, чтобы клиент по итогам упражнения вынес собственное суждение, и при этом озвучил все замечания и возражения. Кроме того, консультант может предложить повторное проигрывание, в котором в духе обучения через экспериментирование делается акцент на отдельных моментах, даже если клиент чувствует, что не соответствует предлагаемой роли.

Ролевая игра может быть полезна в качестве техники определения дезадаптивных представлений. Например, клиент может утверждать, что игра - это обман и аморальное занятие. Обсуждая эту позицию, можно выйти на дискуссию о том, насколько в действительности социальная презентация изменчива в разных ситуациях, и благодаря этому, на вопрос об установках, связанных с социальными ожиданиями.

Обмен ролями. Этот метод предназначен для того, чтобы клиент мог узнать, как он выглядит со стороны. Консультант воспроизводит настолько похоже, насколько это возможно, поведение клиента в ролевой игре. Это даёт клиенту представление о том, что чувствует человек, взаимодействуя с таким, как клиент, и можно ли что-либо изменить для достижения более социально одобряемого результата. При правильном проведении методики клиент захочет попробовать повести себя по-другому, когда они с консультантом обратно поменяются ролями в игре.

Обмен ролями также даёт клиенту возможность критически отнестись к собственным дезадаптивным представлениям, действие которых разыгрывает консультант.

Рекомендуемая литература

Развернутое обсуждение беспокойства и контроля над стимулами смотрите у Borkovec et al. (1983, 1986) и Borkovec (1990). Проблемо-разрешающие

методы описаны Goldfried and Davison (1976). Концепция глубинных иррациональных представлений (или дисфункциональных установок) широко обсуждалась в литературе по рационально-эмотивной терапии (например, Ellis and Harper, 1975; Dryden and DiGiuseppe, 1990; Warren and Zgourides, 1991) и когнитивной терапии Бэка (например, Beck et al., 1985; Blackburn and Davidson, 1990).

Теме релаксации посвящены множество книг и статей. Barber (1984) даёт обобщенное представление. Существует много медицинских руководств, особенно по последовательной мышечной релаксации (например, Bernstein and Borkovec, 1973). Benson (1976) и Borysenko (1988) предлагают недорогие руководства для неспециалистов. Прикладная релаксация описывается Deffenbacher and Snyder (1981) и Ost (1987). О социальной тревожности можно прочитать у Butler (1985, 1989), Cheek et al. (1966), Hartman (1986), Heimberg et al. (1987) и Hope et al. (1989). Среди популярных руководств по тренингу уверенности назову Alberti and Emmons (1982), Dickson (1982) и Lange and Jakubowski (1976).

Сложные вопросы и завершение отношений консультирования

Можно перечислять типичные трудности, которые возникают при работе с проблемами тревожности, но каждый клиент уникален, и точное определение причин неудовлетворительного результата в каждом случае требует специальных усилий. Я рассмотрю потенциальные трудности на трёх стадиях консультирования – ориентирования, оценки и вмешательства, а затем выскажу свои соображения по поводу процесса выхода из отношений консультирования.

Сложности ориентирования клиента

До того, как может быть достигнут какой-либо успех, клиент захочет убедиться в том, что он правильно выбрал консультанта, и что предлагаемые специалистом формы помощи ему подходят. Консультант дает объяснения по общим положениям процесса (в беседе или рекомендуя прочитать специальную литературу; см. Приложение), кроме того, предлагает клиенту задать все имеющиеся у него вопросы. Также полезно, а иногда и необходимо, информировать и обучать членов семьи или партнёров. На этой стадии можно столкнуться со следующими препятствиями.

Клиент сосредоточен на симптомах и их медицинском лечении

Клиенты, которые воспринимают проблемы тревожности как соматические симптомы и считают себя физически больными, являются сложными клиентами. Во-первых, физические факторы, не являясь причиной проблемы, могут ее усугублять. Консультант должен убедиться в том, что правильно понимает вклад физического состояния, и при наличии сомнений получить информацию от медиков. Однозначное заключение о соотношении психологических и соматических факторов может быть выработано далеко не в каждом случае, и иногда лучше оставить вопрос открытым. Мнение клиента о наличии заболеваний следует учитывать, если даже оно ничем не может быть подтверждено. Если клиент сопротивляется доказательствам *отсутствия* предполагаемых физических заболеваний, консультанту ничего не остается, как только следовать за ним, либо питая надежду на то, что желание быть больным станет слабее, либо пытаясь переубедить, рискуя при этом потерять клиента. Клиент, твердо уверенный в соматической природе своей проблемы, не настроен на получение психологической помощи. Тогда консультирование становится средством выявления психологической составляющей, а сотрудничество с клиентом - способом установления участия и силы воздействия психологических факторов. Поведенческие пробы, эксперименты с фантазированием и дневниковые записи часто оказываются эффективными сред-

ствами для демонстрации влияния контекста и когнитивных процессов (см. Главу 7, страх болезни).

Пассивность

Характер отношения к проблеме тревожности, когда ее считают болезнью, часто определяется как передача ответственности «эксперту». Клиент ждёт, что проблема исчезнет быстро и безо всякого дискомфорта. Причины таких ожиданий должны исследоваться отдельно, но нельзя выводить из лестных для самолюбия консультанта высказываний типа «Я знаю, вы сможете мне помочь». Если клиент не в состоянии понять, что эти ожидания неоправданны, консультант должен твердо заявить, что он может только показать путь, но пройти по нему и добиться успеха - это потребует усилий самого клиента, причем путь может быть долгим и тяжелым. Если консультанта спрашивают, как много потребуется времени на «устранение» проблемы, лучше всего сказать, что спешка приведёт к ещё большим проблемам, но что некоторые признаки успеха появятся после 3-5 сеансов. При этом можно предложить помощь в проведении анализа ситуации. Когда клиент стал хорошо представлять себе, что такое консультирование, ему можно предложить пересмотреть свои требования. Затраты времени, потраченного на проведение ориентирования и подготовку сопротивляющихся или пассивных клиентов, всегда окупаются.

Препятствия для адекватной оценки

Наличие одной основной проблемы не должно отвлекать консультанта от существования и других препятствующих успеху проблем. Среди них могут быть как физические расстройства (см. Главу 1), так и психологические трудности. Из виду может быть упущено следующее:

- другая проблема тревожности (например, социальная тревожность, фобия крови);
- синдром гипервентиляции (см. Главу 7);
- проблемы другого типа (например, неуверенность, депрессия или навязчивые действия);
- проблемы в отношениях;
- непроработанная тяжёлая утрата или травма;
- зависимость от седативных препаратов, алкоголя или других веществ.

Отношение клиента к значимым другим

Проблема может возникнуть в контексте конфликта или стресса в отношениях. Ко времени обращения за помощью эти трудности могут исчезнуть сами собой. Так это или нет, не следует автоматически считать, что межличностный конфликт «стал причиной» проблемы тревожности и рабо-

тать надо в первую очередь с ним. С равной вероятностью проблема тревожности может вызывать межличностные трудности. Консультирование само по себе, повышая уверенность или независимость, будет оказывать влияние и на отношения клиента.

В любом случае консультант может посчитать целесообразным поговорить с близкими клиенту людьми (при его согласии). Обычно такие беседы проводятся со всеми вместе. При следующих обстоятельствах возникает необходимость специального интервью:

Во-первых, если при оценке выясняется, что клиента тревожит поведение других (или отсутствие определенного поведения). Вместо конструктивной реакции на такое положение вещей (выражение сожаления, злости, обиды, вины, требований), клиент относит свое эмоциональное расстройство на счет «тревожности». Например, специальные вопросы в ходе оценки проблемы одной женщины, которая жаловалась на тревожность, выявили, что она злилась на своего мужа, который несколькими месяцами ранее совершил суицидальную попытку, и боялась, что он не справится со своими проблемами и оставит семью. К сожалению, супруг отказался прийти вместе с моей клиенткой, а потом перестала ходить и она сама. Она снова появилась через несколько месяцев, когда отношения в паре стали более гармоничными. К этому времени тревожность ее волновала гораздо меньше, она огорчалась и злилась по другим поводам. В случае этой клиентки работа с собственно «проблемой тревожности» не имела бы смысла.

Во-вторых, в случаях, когда значимый другой отрицает свое участие в проблеме клиента, или, не отрицая, отказывается сотрудничать, консультант может помочь ему лучше приспособиться к неприятной ситуации. Описания беспокойства в дневнике позволяют определить, каков характер влияния межличностных отношений на проблему, и что с этим можно делать. Когда клиенту дают задание действовать более уверенно или независимо (что часто отражает суть проблемы), его следует предупредить, что такого рода перемены будут иметь значительные последствия, в том числе непредвиденные. В идеале, клиент может начать строить отношения по-другому, но не всегда. Отношения зависимости с родителем, супругом или партнёром становятся весьма напряженными, а могут временно или навсегда разрушаться. Понятно, почему некоторые клиенты отказываются что-либо менять - ведь это угрожает самому существованию отношений. Иногда по этой причине клиент может отказаться от консультирования. В некоторых случаях страх перед большей независимостью обусловлен знанием того, что альтернативного источника безопасности (работа, дружба и т.д.) нет.

В-третьих, если клиент хочет вовлечь близких ему людей в процесс вмешательства. В ходе общего собеседования (см. Главу 7) можно договориться о том, какая именно помощь желательна. Если участие других имеет показной характер, могут возникать следующие трудности: растёт чувствительность клиента к угрозе, он получает противоречивые советы, возникает

зависть к достижениям клиента, продвижение к успеху вызывает стремление его «осадить», клиент боится реакции окружающих на происходящие с ним изменения.

Иногда бывает полезно побуждать клиента обсуждать свои проблемы с людьми неблизкими, чтобы окружающие о них знали и при случае могли бы помочь. Обнаружение того, что другие люди имеют схожие проблемы, или что они не реагируют негативно на поведение клиента, помогает избавиться от чувства стыда, сопровождающего проблему тревожности.

Непроработанная тяжёлая утрата или травма

Значимость пережитой травмы или тяжёлой утраты может быть не достаточно учтена по следующим причинам: клиент не имеет доступа к соответствующим воспоминаниям, он не хочет говорить о ней или не говорит о ней, потому что не видит связи с проблемой тревожности. Консультант должен быть бдительным в отношении признаков причинно-следственных связей такого рода и систематически задавать вопросы типа: «Напоминает ли вам это о чём-нибудь, что произошло в прошлом?» Наиболее значимыми свидетельствами существования непроработанной травмы являются:

- навязчивые мысли или образы (то есть, психическое содержание, неконтролируемо вторгающееся в течение любой психической деятельности и отвлекающее внимание). Они обнаруживаются в ходе ведения дневника, можно также попросить клиента завести блокнот и конспективно записывать туда навязчивые мысли, приходящие на ум;
- наблюдаемые во время встреч признаки волнения, например, напряжение в голосе, внезапное изменение выражения лица, слёзы;
- отсутствие эмоциональной реакции при разговоре на определённые темы (сам клиент может рассказывать о том, что называет своей эмоциональной холодностью);
- умеренно выраженное стремление к избеганию, например, определенных мест или упоминания определённых имён, или желание, чтобы все вещи, связанные с воспоминаниями об умершем человеке, оставались «на том же самом месте».

Если наличие травмы установлено, клиенту можно помочь заново пережить травматический опыт в процессе фантазирования и реструктурирования памяти (см. примеры в Рекомендуемой литературе). Такое вмешательство может помочь клиенту справиться с текущей проблемой тревожности.

Зависимость от седативных препаратов

В медицинском сообществе раздаются споры о том, насколько безопасны и полезны такие препараты. Против лекарств настроены сегодня и многие клиенты. Консультанты приняли в наследство клиентов, которые принимали

седативные средства в течение многих лет и боятся прекратить их приём. При этом развивается психологическая, а в некоторых случаях и физическая зависимость. Препарат превращается в сигнал безопасности, в отсутствие которого клиент теряет способность ко встрече со стрессовыми ситуациями (хотя для некоторых клиентов достаточно просто иметь препарат при себе). Если сформировалась физическая зависимость, то при попытке сокращения приёма клиент переживает синдром отмены (его признаки совпадают с типичными для тревожности реакциями). Если синдром отмены сильно выражен и составляет основную проблему клиента, то целесообразно направить его к специалисту в области психиатрии.

Успокоительные препараты делятся на бензодиазепины, антидепрессанты (трициклические или моноамин оксидазы) и бета-блокаторы. Следует иметь подробную информацию о том, как эти препараты были выписаны и каковы побочные эффекты их применения (см. Рекомендуемую литературу). К сожалению, большинство клиентов, которым назначены эти препараты, не наблюдаются у лечащих врачей. Индивидуальная чувствительность и переносимость препаратов сильно различается, поэтому необходим контроль побочных эффектов и уточнение доз. Клиенты могут принимать их не так, как было назначено, или даже превышать дозы. Некоторые препараты нужно принимать «при необходимости», в то время как другие – через определённые промежутки, которые следует соблюдать. Некоторые препараты, такие, как бензодиазепины, действуют быстро и непродолжительное время (несколько часов). Это является преимуществом при временном приёме, но при длительном употреблении может провоцировать циклическое повышение и понижение уровня беспокойства, что ведёт к быстрому развитию психологической зависимости. Привыкание к бензодиазепинам развивается в течение нескольких недель, и поэтому некоторые психиатры рекомендуют назначать их только на короткий срок (максимум - на несколько месяцев).

Следует принять решение, что в случае, если клиент принимал седативные средства в течение шести месяцев или больше (некоторые клиенты употребляют их десятилетиями) без существенного эффекта, консультирование должно проводиться одновременно с программой отмены лекарств. Эту программу всегда проводят с полного согласия клиента и в сотрудничестве с врачом, предписавшим прием данных средств. Несмотря на то, что прием препаратов, особенно в начале, может приносить очевидную пользу, рекомендуется его сокращать, за исключением обозначенных ниже случаев. Необходимо учитывать следующее. Во-первых, проведение программы отмены занимает не менее шести недель и требует тщательного наблюдения и контроля (более подробную информацию ищите в Рекомендованной литературе). Во-вторых, клиенты, вдруг ставшие «противниками лекарств» (под влиянием СМИ или из-за воспринимаемого ими критического отношения консультанта), могут сразу прекратить прием всех препаратов, даже тех, которые были выписаны не «от тревожности». В-третьих, отмена может обост-

ритель проблему тревожности, которая подавлялась лекарствами, а также иметь собственные побочные эффекты. В-четвертых, клиентам, переживающим в настоящий момент выраженный (но временный) стресс, возможно, безопаснее отложить отмену до того времени, когда завершится период стресса. В любом случае консультант учитывает как доверие клиента к нему в вопросе отмены приема лекарств, так и то, насколько беспокойно чувствует себя клиент (то есть, сочетание эффектов отмены и «ответной» тревожности).

Краткие рекомендации по применению и отмене седативных препаратов. Установите названия назначенных препаратов, дозы, схему приёма и последствия изменения дозы, отмеченные клиентом. Отслеживайте измерения в приеме средств.

Выясните, понятно ли клиенту, что и зачем он принимает.

Препараты, назначенные для приёма от случая к случаю, можно принимать и далее до тех пор, пока клиент не почувствует уверенность в том, что может обходиться без них; например, некоторые публичные люди принимают бета-блокаторы для уменьшения сердцебиения и тремора; при перемежающейся бессоннице показан прием медикаментов, если недосыпание снижает сопротивление стрессорам. Однократный приём препарата может помочь клиенту переступить через барьер страха в конкретной ситуации, например, первого полёта на самолёте.

Хронический приём препаратов может затруднять консультирование, если он угнетает эмоции или притупляет сознание. Однако, приём лекарственных средств редко является *главной* помехой консультирования. К консультированию можно приступать без требования предварительной отмены приёма лекарственных препаратов. Обычно, как только клиент убеждается в эффективности консультирования, желание отказаться от лекарств возникает само собой. Тогда нужно будет решить, какой препарат отменяется в первую очередь (если назначено несколько), и обязательно договориться о том, что отмена будет постепенной. Рекомендуется еженедельная проверка. С особой осторожностью следует относиться к антидепрессантам. Они не дают заметного быстрого эффекта, и клиент может ошибочно считать, что они не действуют. (Заметьте, что такие препараты использовались и как антидепрессанты, и как седативные.) Некоторые врачи перед тем, как начинать реализацию программы отмены, переведут клиента с краткодействующего бензодиазепина на его форму с продолжительным периодом действия (или на другой тип препарата).

Помогите клиенту отличать побочные эффекты отмены от возврата проблемы тревожности. Выраженность таких побочных эффектов, как бессонница, раздражительность, смятение и спазмы в течение периода отмены должна снижаться.

Кроме некоторых указанных исключений, я не сталкивался в своей практике с тем, что отмена препаратов приводила к большим проблемам. Если всё же это произошло, следует направить клиента к психиатру.

Алкогольная зависимость

Клиентов, злоупотребляющих алкоголем (у них наблюдаются такие проявления отмены, как дрожь, возбуждение, повышенное потоотделение, страхи или депрессия), следует направлять в специальные учреждения. Многие тревожные клиенты имеют менее серьёзную проблему пьянства. Они могут испытывать похмелье, но пока еще не пьют для того, чтобы избавиться от проявлений синдрома отмены. Алкоголь может облегчить проблему тревожности на короткое время (так как он подавляет функции коры, опосредующие негативные мысли и социальную регуляцию), но затем обычно наблюдается своеобразная отдача, то есть повышение напряжения, нервозности или возбуждения, которое длится нескольких часов, дней или даже недель. Регулярно пьющий человек может не знать об этом до тех пор, пока количество выпиваемого алкоголя не увеличивается. Таким образом, в долговременной перспективе алкоголь только усугубляет проблему тревожности.

Решает ли клиент совсем отказаться от алкоголя или сократить его количество – это целиком его дело. Когда употребление алкоголя имеет очевидную связь со стрессом или проблемой тревожности, нужда в нем будет сокращаться в ходе консультирования. Часто контроль над употреблением является наиболее подходящей целью. Клиент сообщает окружающим о своем намерении перестать пить и фиксировать случаи употребления в дневнике. Анализ этих записей укажет на ощутимые изменения в отношении к спиртному: например, решение не пить в определённой компании, договор с участниками застолья об ограничении его продолжительности, изменение количества и характера употребления. Дневник также покажет, как алкоголь используется в качестве совладающей стратегии. Для более подробных рекомендаций по работе с проблемой употребления алкоголя обратитесь к Рекомендуемой литературе.

Что может помешать успеху вмешательства

Даже при самой тщательной оценке и планировании вмешательства консультирование не протекает беспрепятственно. Ниже перечислены некоторые возможные причины неуспешного консультирования.

1. Клиент был недостаточно подготовлен к вмешательству или недостаточно принимает его; например, не понимает суть, не верит в эффективность, не знает, что от него требуется, рассматривает обращение за помощью как признак собственной слабости.
2. Клиент имеет нереалистичные ожидания по поводу эффекта вмешательства; например, ждёт более быстрого изменения или ожидает, что консультант возьмет на себя ответственность за изменения.
3. Консультант не замечает, что клиент склонен демонстрировать согласие (из-за традиционного почтения к «эксперту» или усвоенного стиля пассивного сопротивления).

4. Консультант не подстраивается под привычный характер общения клиента; например, дает объяснения в слишком упрощённой или, наоборот, изощренной манере, неуместно шутит или отделяется от забот клиента.
5. Клиент сопротивляется или обесценивает любой признак изменения. Это может быть связано с нереалистичными ожиданиями или с дисфункциональными установками типа: «Меня сильно подкосило то, что случилось, и я не способен измениться».
6. Клиенту не была оказана в должном объеме помощь в формировании новых целей или более безопасного/удовлетворительного стиля жизни; то есть, клиент может предпочитать оставаться в стрессовой ситуации, дающей хоть какие-то гарантии безопасности и сохранности, если потенциально лучшая ситуация для него является непонятной.
7. В жизни клиента существует хронический источник стресса, конфликта или неопределённости, влияние которого не получило должной оценки. Это влияние может выражаться в озабоченности клиента (поэтому все его ресурсы направлены на ускользающие от внимания консультанта задачи) или в поддержании высокого уровня возбуждения, которое замедляет формирования угасания/привыкания во время конфронтационных вмешательств. Можно рекомендовать перенести фокус консультирования с проблемы тревожности на разрешение соответствующей проблемы или оказание помощи клиенту в принятии важных жизненных решений.
8. При проведении конфронтационного вмешательства могут возникнуть следующие проблемы:
 - Ситуация (реальная или символическая), по отношению к которой проводится техника конфронтации, не имеет отношения к значимым (или наиболее значимым) элементам тревожной памяти. Ситуация может актуализировать угрозы, которые не были ранее обнаружены.
 - Консультант движется слишком быстро, поскольку не дает достаточно времени для достижения доверительных отношений или не заинтересован в получении обратной связи от клиента.
 - Эффект угасания/привыкания не переносится на значимые повседневные ситуации, поэтому такие ситуации должны быть дополнительно включены в программу. С другой стороны, неприятные события повседневной жизни (например, враждебные реакции, промахи) могут повысить уязвимость клиента.
 - Конфронтации проводятся недостаточно регулярно, длительно или систематично.
 - Уровень постепенности этапов программы конфронтации недостаточен для поступательного формирования уверенности. Клиента теряет мотивацию, выполняя недоступно сложные для него задания.
 - Клиент приступает к конфронтации с неадекватным психологическим настроением; например, избегает полного вхождения в ситуацию, воспринимает её как нереальную, «борется» с напряжением или не может принять ис-

- пытываемый дискомфорт («отдаться» ему).
- Недостаточное внимание уделялось закреплению успеха (то есть «избыточному обучению») и установлению готовности клиента справиться со сложными событиями, которые возникают редко, но в жизни клиента их появление вероятно.
9. При реструктурировании представлений и критическом анализе установок отсутствие успеха отражает, скорее, ошибки в применении техник, а не присущие самому подходу недостатки. Для достижения высокого уровня профессионализма необходимо супервизорство со стороны эксперта. Могут возникнуть следующие трудности:
- У клиента не было соответствующей подготовки; например, он не был готов к сотрудничеству или к пониманию когнитивной модели.
 - Клиент не определил проблему, для работы с которой следует применять данную технику.
 - Консультант склонен скорее давать ответы, чем позволять клиенту прийти к своим собственным заключениям («управляемое открытие»).
 - Существует склонность слишком увлекаться размышлениями и не уделяется должного внимания решению проблем и изменению поведения.
 - Встреча лишена структуры и фокуса; попытки работать одновременно со слишком большим количеством тем.
 - Техника применена преждевременно, до того, как был выявлен смысл ситуации и определены мысли/установки.
 - Клиент не способен определить мысли/установки, связанные с проблемой тревожности, несмотря на все предпринимаемые усилия сделать это; соответствующие воспоминания могут вызывать слишком сильное беспокойство; скрываются мысли, оцениваемые клиентом как нелепые или стыдные; ни консультант, ни клиент не могут проследить и объяснить связи между рациональными и эмоциональными компонентами.
 - Консультант недостаточно настойчиво применяет технику критического анализа оснований иррациональных представлений или клиент не прибегает к ней в проблемной ситуации.
 - Нереалистичная оценка клиента своих способностей или тяжести угрозы усиливается значимыми другими.
10. Систематическое нежелание выполнять домашние задания. Следует рассмотреть следующие причины:
- У клиента не было соответствующей подготовки; задания были слишком сложными и/или нужно было очень многое запоминать.
 - Клиент не мог понять смысла выполнения заданий; они казались ему не относящимися к делу.
 - Задание касалось таких проблем или негативных мыслей, которых у клиента не существовало.
 - Ситуация клиента изменилась; например, вновь возникшие обстоятельства ограничили время, которым он может свободно распоряжаться.

- В сопротивлении клиента выражаются его оценка терапевтических отношений или негативные ожидания от консультирования.

Завершение консультирования

В Главе 3 я привел доводы за заключение с клиентом контракта на срок открытый, но ограничиваемый некоторыми условиями, которые там перечислены. Исключение из общего правила открытого контракта может быть сделано в случае, если проблема тревожности клиента непосредственно связана со страхом негативной оценки, отвержения или «нелюбви». Окончание консультирования может быть использовано для подтверждения оправданности этих страхов. Упомянуть о том, что завершение консультирования будет трудным для клиента, можно во время первой оценочной встречи. Информативной является реакция на предыдущие профессиональные контакты. Просьба сказать, «как долго» будет проходить консультирование, также может быть значима в этом отношении. С такими клиентами рекомендуется заключать контракты на фиксированный срок, и по мере истечения срока напоминать, сколько встреч осталось. При необходимости можно будет заключить новый контракт. Для одного из стилей консультирования зависимость клиента от консультанта является ценностью, и беспокойство по поводу окончания отношений используется как условие когнитивного анализа проблем. Однако, в фокусе данной стратегии находятся скорее отношения клиент–консультант, а не события жизни клиента. Не исключено, что это несовместимо с характерным для когнитивно-бихевиорального подхода стилем открытого общения и сотрудничества. Другими словами, хотя такие чувства открыто принимаются, они не становятся поводом для применения техник.

С необходимостью настанет такой момент, когда консультирование «официально» завершится, и обычно это происходит, когда клиент посчитает, что его основные проблемы решены. Менее удовлетворительными можно считать случаи, когда консультанту приходится готовить клиента к выходу из взаимоотношений, потому что становится понятно, что дальнейший прогресс невозможен. Консультант информирует клиента о положении дел как можно раньше и анализирует с ним причины отсутствия успеха с клиентом, предпринимая тем самым последнюю попытку произвести воздействие. Если было выявлено какое-либо конкретное препятствие, то консультант может предложить продолжить взаимодействие позже, когда обстоятельства клиента изменятся или когда клиент сможет по-другому отнестись к предложенному подходу. На практике многие клиенты отказываются от консультирования ещё до того, как возникает возможность для такого типа обсуждений. Бессмысленно возлагать вину на противоположную сторону, и консультант иногда должен честно признать, что он не знает, что делать. Можно предложить обратиться за другими формами помощи.

В более благоприятном случае, когда проблема решается, последняя встреча посвящается обзору достигнутых результатов. Если в будущем ожидаются трудности, то способы их преодоления обсуждаются, а при необходимости отрабатываются. Многие клиенты испытывают признательность, получая контактный телефон для обращения при возникновении непредвиденных проблем, и, как правило, не злоупотребляют такой возможностью.

Контрольная встреча проводится по истечении периода, длительность которого зависит от степени уверенности клиента в своей способности справиться с трудностями (например, 1-4 месяца). Цель контроля заключается в необходимости удостовериться, что изменения стабильны. Если же это не так, или если клиент сообщает о новых затруднениях, положение можно исправить, предприняв соответствующие действия.

Рекомендуемая литература

Препятствия для достижения успеха в общем обсуждались Emmelkamp and Bouman (1991). Chambless and Goldstein (1981) более глубоко рассматривают связи различных аспектов ревожности и фобии. О тяжёлой утрате и травме читайте у Ramsay (1979), Steketee and Foa (1987) и Worden (1983). Просто, но информативно о седативных препаратах рассказывают Greist et al. (1966), выступая за их применение. Советы по отмене седативных средств смотрите у Trickett (1986). Полезное руководство по самопомощи при решении проблемы употребления алкоголя написано Robertson and Heather (1986).

Приложение А

Материалы для начинающих: анкеты и книги.

Анкеты

Фобии

Анкета по страхам (Marks and Mathews, 1979).

Опросник (Wolpe and Lang, 1964).

Диагностика особенностей тревоги и депрессии

Опросник стабильных характеристик тревоги (Spielberger et al., 1970).

Шкала Лидза для оценки тревожности и депрессии (Snaith et al., 1976).

Шкала Зунга для самооценки тревожности (Zung, 1979).

Анкета по когнитивной и соматической тревожности (Schwartz et al., 1978).

Опросник депрессии Бэка (Beck et al., 1961).

«Страх страха»

Анкета по телесным ощущениям и анкета по агорафобическим состояниям (Chambless et al., 1984).

Индекс чувствительности к тревожности (Reiss et al., 1986).

Диагностика избегания

Мобильный опросник по агорафобии (Chambless et al., 1985).

Социальная тревожность, стеснительность и неуверенность.

Шкала социального избегания и беспокойства (Watson and Friend, 1969).

Шкала негативной оценки (Watson and Friend, 1969).

Стэнфордский опросник застенчивости (Zimbardo, 1977).

Шкала неуверенности по Рафусу (Rathus, 1973).

Диагностика иррационального мышления.

Шкала убеждений (Malouff and Schutte, 1986).

Информационные брошюры и книги

О преодолении или совладании со страхом и тревожностью:

Преодоление агорафобии: Избавление от боязни внешнего мира (Goldstein, 1988).

Агорафобия: природа и лечение (Mathews et al., 1981: руководства для пациента, стр. 160-205).

Жизнь со страхом (Marks, 1980).

Битва со страхом: Восьминедельная программа по излечению от ваших страхов (Neuman, 1985).

Свобода от психологических страданий (Weekes, 1972).

О принципах когнитивной терапии:

«Избавление от тревожности» (Beck et al. (1985), Приложение 1, стр. 315-22).

Избавление от депрессии (Blackburn, 1987).

Чувствовать себя в порядке: терапия нового настроения (Burns, 1980).

Приложение Б

Тезисы по тревожности

Эти тезисы предназначены для новых клиентов и имеет целью их ориентацию в теоретических положениях и видах вмешательства, описанных в данном пособии. Это составляющая подготовительной стадии консультирования, тезисы можно скопировать и заранее дать клиенту, чтобы они помогли клиенту сформулировать свои вопросы.

Проблемы тревожности и как их можно решать с помощью когнитивно-бихевиорального консультирования

В этих тезисах рассказывается о когнитивно-бихевиоральном подходе к проблемам тревожности - том типе консультирования, который вы выбираете. Каждый человек уникален и поэтому не всё, что написано ниже, будет относиться к вам.

Что предлагает вам консультирование

Каждый из нас время от времени испытывает тревожность, но влияет она на людей самым разным образом. *Тревожность, ставшая проблемой*, – это более тяжёлая форма *нормальной тревожности*. Она более интенсивна или похожа на устойчивую привычку, которую трудно преодолеть. Консультирование поможет вам выяснить, как ваша тревожность превратилась в проблему, мешающую вашей жизни. Оно также покажет вам, как *вы, вы сами*, можете её преодолеть. Проблема тревожности – это не медицинское заболевание и не психическое расстройство. Она связана с тем, что с вами произошло, теми стрессам, которые вы испытываете, с тем, что вы думаете о себе, и с теми страхам, которые вы испытываете по поводу себя или своего будущего. Сейчас для вас это может быть неочевидным, но во время консультирования вы придёте к этому.

Возможно, вы всегда думали о себе как о «беспокойном» или «нервном человеке». Консультирование не сделает вас полностью другим человеком. Некоторая степень тревожности и нервозности нормальна и есть у каждого из нас. Некоторые люди более склонны к этому, чем остальные. В консультировании мы имеем дело только с *чрезмерной* и *необоснованной* тревожностью. В частности, консультант будет заниматься тем, чтобы помочь вам выяснить, связана ли ваша проблема тревожности с глубинными представлениями о чём-то плохом (или даже просто с образом чего-либо пугающего), о которых вы сами, на тот момент, полностью не знаете. Такая форма консультирования основана на представлении, что то, что вы *думаете* о ситуации, влияет на то, что вы *чувствуете* по отношению к ней. Иногда вы боитесь самих проявлений тревожности. Например, «Я выставлю себя посмешищем, если у меня

будет паника» или «Моё будущее полетит к чёрту, если я не смогу унять дрожь в руках».

Некоторые типичные проблемы тревожности

Во многих проблемах тревожности ваш разум и тело реагируют так, как будто вы сталкиваетесь с прямой опасностью или угрозой. Реакции схожи с теми, что вы могли бы испытывать при наличии действительной опасности, например, при столкновении с уличным грабителем или при тяжёлом стрессе. Это состояние может быть сильным и подавляющим, и поэтому вы можете чувствовать, что с вашей психикой или телом не всё в порядке. Но это не так. Реакции вашей психики и тела являются частью их нормального функционирования. Благодаря им ваша психика сосредотачивается на опасности, с которой приходится иметь дело, а ваше тело подготавливается к решительным действиям. Когда речь идет о проблеме тревожности, вы можете реагировать на воспоминания о пережитой травме или на что-то ненавистное (например, пауки), или на что-то страшное в будущем (например, какая-то неудача или болезнь). Как уже отмечалось, сами по себе реакции на тревожность тоже могут пугать. Например, вы можете представлять себе, что не сможете произнести ни слова, если станете говорить перед публикой. Назовем типичные проблемы тревожности. В вашем конкретном случае их может не быть:

- пустота в голове, неспособность сконцентрироваться;
- навязчивые беспокойные мысли или неприятные воспоминания;
- интенсивная неприязнь или боязнь некоторых ситуаций и, поэтому, их избегание (например, разговор с незнакомым человеком, инъекция);
- «приступы паники», возникающие при подавленном настроении; беспокойство о том, что один из них наступит неожиданно;
- неприятные телесные ощущения (например, потливость, сильное сердцебиение, мышечное напряжение);
- мышечное подёргивание или судороги.

Что произойдёт во время консультирования?

Первый шаг – собрать как можно больше информации о вашей проблеме тревожности, о том, что ее провоцирует, и о других стрессовых факторах вашей жизни. Для вас важно понять, как вы относитесь к ситуациям и что вы думаете о своей способности справиться с проблемой тревожности. Консультант помогает вам прийти к этому самому, когда вы отвечаете на вопросы, но еще и когда вы мысленно представляете ситуации или делаете что-то, что вызывает у вас тревогу. Вас могут попросить записывать в дневник каждый случай, когда возникает тревожность, неделю за неделей. Записи будут обсуждаться во время встреч для того, чтобы вы стали лучше понимать свою проблему.

Вторая стадия помогает вам приобрести навыки и уверенность при столкновении с ситуациями (в том числе, воображаемыми), которые вас беспокоят. Это всегда делается постепенно, при вашем активном участии в определении наилучшего пути. Кроме такой работы в ходе встречи, консультант будет просить вас выполнить задания в промежутках между встречами. Эти задания также разрабатываются вместе с вами. Одновременно консультант поможет вам выяснить, что делает ситуацию пугающей – что вы думаете о ней или о собственных способностях справиться с ней. Например, достаточно ли обоснованы ваши представления? Может ли произойти то, чего вы боитесь? Достаточно ли высоко оцениваете вы ваши собственные способности? Вам покажут, как исследовать такие мысли самому. Вы не сможете изменить свое мышление, если будете просто слушать, что говорит вам консультант. Вам прежде всего придется убедить себя самого. Вы поймете, на чем основаны ваши представления, когда вам покажут, что можно сомневаться в доказательствах или делать что-то по-другому и исследовать результаты.

Кроме того, вы будете обсуждать с консультантом и другие стороны вашей жизни, в которых, например, вам трудно общаться, принимать важные решения, справляться со стрессом, как будто за вами следит кто-то старший. Цель здесь – помочь вам преодолеть эти трудности наилучшим образом, чтобы вы получили энергию и ресурсы для преодоления проблемы тревожности, мешающей вам жить.

Успешность этой формы консультирования в высшей степени зависит от вашей решимости встретиться с тревогами лицом к лицу и от вашей готовности обучаться тем методам, которые предлагает консультант. Никто не может напрямую решить проблему другого человека, если только речь не идет о чем-то вроде отсутствия жилья или денег. Консультант может только показать вам, чему нужно учиться, и показать путь к такому положению дел, при котором вам захочется работать, засучив рукава. Консультант будет ожидать от вас обратной связи по поводу того, что вы думаете о встречах, и того, что вы сообщите, если почувствуете недопонимание.

Когнитивно-бихевиоральное консультирование, как правило, не является долговременной формой оказания помощи. Оно займёт несколько месяцев, но не лет. Встречи, скорее всего, поначалу будут частыми (допустим, еженедельными), затем по мере того, как вы начнёте решать ваши проблемы, промежуток между ними будет увеличиваться. Вы, конечно, сможете продолжать время от времени встречаться со своим консультантом и по завершении основных сеансов. Могут возникнуть проблемы, которых вы не предвидели, или кризис может вернуть вас на исходные позиции. Консультирование, предлагаемое вам, не является «быстрым решением». Благодаря преодолению своей проблемы вы научитесь решать и другие проблемы, которые будут возникать у вас, как и любого другого человека. То, чему вы научитесь, пригодится вам на всю оставшуюся жизнь.